

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_188207

UNIVERSAL
LIBRARY

۱۶۳

سلسلہ شریعت اسلامیہ

صغاری احصاء

جلد دوم

تصنیف

ہورین لمیم ایم۔ اے ایل ایل ڈی، ایس۔ سی۔ ڈی، ایف۔ آر۔ ایس

ترجمہ

قاضی محمد حسین ایم۔ اے وکشن چندر ایم۔ اے

پروفیسر ان گلیہ جامعہ عثمانیہ

۱۳۳۸ھ م ۱۳۳۸ھ م ۲۹

طبع خانہ عثمانیہ عکبر پبلشرز

یہ کتاب سرزمین امن اینڈ کمپنی کی اجازت سے جن کو
حق اشاعت حاصل ہے اردو میں ترجمہ کر کے
طبع و شائع کی گئی ہے

دیباچہ (از مصنف)

اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے دیباچہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس میں احصاء کے اُن حصوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو زیادہ تر اس مضمون کے اطلاقات کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت اس کی ترتیب کچھ غیر معمولی سی تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہولت بخش ثابت ہوئی ہے۔ اس ایڈیشن کی مکمل نظر ثانی کی گئی ہے اور اس میں متعدد تبدیلیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ علاوہ معمولی ترمیمات اور ترتیب کی تبدیلیوں کے ایک دو باتوں کا ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

ایک خاص باب قوت نما اور اس سے متعلق تفاعلوں کے لئے قوت کر دیا گیا ہے۔ قوت نما تفاعل کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ مساوات

$$\frac{فرما}{فرلا} = ما$$

کا معیاری حل ہے۔ اس تفاعل کی اہمیت ریاضیات میں صرف اسی خاصیت کی وجہ سے ہے اور اس لئے اس کی ابتدا اس خاصیت سے کرنا ہی واجب معلوم ہوتا ہے۔ سلسلہ قوت نما کا کوئی نظریہ جو باضابطہ کہلائے جائیگا کچھ مستحق ہو سکتا ہے بالکل ابتدائی نہیں کہا جاسکتا لیکن

یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ وہ طریقہ جس کی یہاں پابندی کی گئی ہے علم احصاء کے تعلق کے مد نظر کسی اور طریقہ سے زیادہ مکمل نہیں اور ہر لحاظ سے قابل ترجیح بھی ہے۔

لاستنباطی سلسلوں کی بحث میں خاص طور پر ان کے تفرق اور مکمل کے متعلق کئی تبدیلیاں عمل میں لائی گئی ہیں پہلی اشاعتوں میں ان سوالوں پر یکساں استمفاق کے نظریہ کی مدد سے عام طریقہ بحث کی گئی تھی، احصاء کی کتاب میں اس وقت اس نظریہ کا داخل کر لینا شاید مجھے بیجا نہ تھا جبکہ کسی انگریزی مقالہ میں اس کا ملنا محال تھا لیکن کتاب کے باقی حصہ کے ساتھ موضوع کے لحاظ سے ذرا بے جوڑ ہونے کی وجہ سے اب اسکو ترک کر دیا گیا ہے۔ اسکی بجائے وہ بحث داخل کی گئی ہے جو صرف قونی سلسلوں سے متعلق ہے اور زیادہ تر اسی نمونہ کے سلسلوں سے طالب علم کو واسطہ پڑیگا جب تک کہ وہ مضمون میں زیادہ اعلیٰ مدارج تک ترقی نہ کر جائے۔

کمیت کے مرکوزوں، دو درجی معیاروں، اور اسی قبیل کے چیزوں کا اختصار کیا گیا ہے یا انکو ترک کر دیا گیا ہے اور ان کا بیشتر حصہ مصنف کی دوسری کتابوں میں منتقل کر دیا گیا ہے فقط

جون ۱۹۱۹ء

ہورس لمیب

فہرست مضامین


صفحہ	مَضْمُون	دفعہ
	چھٹا باب تمکمل	
۲۲۱	سُئل کی نوعیت	۷۲
۲۲۳	معیاری شکلیں	۷۳
۲۲۶	ضابطوں کی سادہ توسیع	۷۴
۲۳۸	دو درجی نسب نما والی منطق کسریں	۷۵
۲۳۲	شکل (۱) + (۲) + (۳) + (۴) + (۵) + (۶) + (۷) + (۸) + (۹) + (۱۰) + (۱۱) + (۱۲) + (۱۳) + (۱۴) + (۱۵) + (۱۶) + (۱۷) + (۱۸) + (۱۹) + (۲۰) + (۲۱) + (۲۲) + (۲۳) + (۲۴) + (۲۵) + (۲۶) + (۲۷) + (۲۸) + (۲۹) + (۳۰) + (۳۱) + (۳۲) + (۳۳) + (۳۴) + (۳۵) + (۳۶) + (۳۷) + (۳۸) + (۳۹) + (۴۰) + (۴۱) + (۴۲) + (۴۳) + (۴۴) + (۴۵) + (۴۶) + (۴۷) + (۴۸) + (۴۹) + (۵۰)	۷۶
۲۳۵	متغیر کی تبدیلی	۷۷
۲۳۸	مشائی تفاظوں کا مکمل	۷۸
۲۴۰	مشائی ابدال	۷۹
۲۴۱	مکمل باحصص	۸۰

۲۴۴	متواتر تحویل سے تکمیل	۸۱
۲۴۶	تحویلی ضابطے (سلسل)	۸۲
۲۴۸	منطق کسروں کا تکمیل	۸۳
۲۵۱	ساوی اصلیں	۸۴
۲۵۳	دو درجہ اجزاء کے ضربی	۸۵
۲۵۷	غیر منطق تفاعلوں کا تکمیل	۸۶
۲۶۰	اشلہ نمبری ۲۳ تا ۳۰	
ساتواں باب		
محدود تکملے		
۲۷۴	تہید - رقبوں کا سوال	۸۷
۲۷۸	مقلوب تفرق کے ساتھ تعلق	۸۸
۲۸۰	تکملہ کی عام تعریف	۸۹
۲۸۳	استدقاق کا ثبوت	۹۰
۲۸۷	فہ (لا) فرلا کی خاصیتیں	۹۱
۲۸۹	محدود تکملہ کا تفرق اسکی کسی حد کے لحاظ سے	۹۲
۲۹۰	نامحدود تکملہ کا وجود	۹۳
۲۹۱	محدود تکملہ کے محسوب کرنیکا قاعدہ	۹۴
	وہ صورتیں جہاں تفاعل فہ (لا) یا تکمیل کے حدود	۹۵
۲۹۳	لامتناہی ہو جاتے ہیں۔	
۲۹۶	دفعہ ۹۴ کے قاعدہ کا استعمال	۹۶
۲۹۸	تحویلی ضابطے	۹۷
۳۰۲	مربوطہ تکملے	۹۸

۳۰۴	امثلہ نمبری ۳۱ تا ۳۵	
	ابھواں باب	
	ہندی استعمال	
۳۱۷	رقبہ کی تعریف	۹۹
۳۱۸	کارٹینری محدودوں میں رقبہ کے لئے ضابطہ	۱۰۰
۳۲۱	رقبہ کو کیا علامت دی جاتی چاہئے	۱۰۱
۳۲۴	قطبی محدودوں کے لحاظ سے رقبے	۱۰۲
۳۲۶	رقبہ جو ایک متحرک خط اپنی حرکت میں عبور کرتا ہے	۱۰۳
۳۲۹	ایسٹر کے سطح پیمائے کا نظریہ	۱۰۴
۳۳۲	مجسوں کے حجم	۱۰۵
۳۳۴	کسی مجسم کے حجم کے لئے عام جملہ	۱۰۶
۳۳۶	گردشی مجسم	۱۰۷
۳۳۷	بعض متعلق صورتیں	۱۰۸
۳۳۸	سپین کا قاعدہ	۱۰۹
۳۴۱	شعنی خطوط کا طول معلوم کرنا	۱۱۰
۳۴۴	تقسیم شدہ ضابطے	۱۱۱
۳۴۷	قطبی محدودوں کے لحاظ سے قوسیں	۱۱۲
۳۴۹	گردشی سطحوں کے رقبے	۱۱۳
۳۵۳	تقریبی محکم	۱۱۴
۳۵۷	اوسط قیمتیں	۱۱۵
۳۶۰	ہندی اشکال کے اوسط مرکز	۱۱۶
۳۶۴	سپین کے مسئلے	۱۱۷
۳۶۸	ضعفی کے مسئلے	۱۱۸

۳۷۴	امثلہ نمبر ۳۶ تا ۴۱	
	نواں باب	
	خاص منحنی	
۳۸۹	جبر منحنی جو ایک تشاکل کا محور کہتے ہیں	۱۱۹
۳۹۷	ماورائی منحنی	۱۲۰
۴۰۰	ایسا زو کے منحنی	۱۲۱
۴۰۳	خط تدویر	۱۲۲
۴۰۷	برتدویر اور درتدویر	۱۲۳
۴۱۱	خاص صورتیں	۱۲۴
۴۱۶	دائری حرکتوں کا ایک دوسرے پر انطباق۔ بردورے	۱۲۵
۴۲۱	قطبی محدودوں کے لحاظ سے منحنی۔ ٹولبی خطوط	۱۲۶
۴۲۳	گہونگا منحنی اور خط صنوبری	۱۲۷
۴۲۵	منحنی $R = r \cos \theta$	۱۲۸
۴۲۶	مماسی قطبی مساوات	۱۲۹
۴۲۹	مربوط منحنی۔ تغلیب	۱۳۰
۴۳۲	پائیں منحنی۔ متکافی قطبی	۱۳۱
۴۳۷	دو قطبی محدود	۱۳۲
۴۴۲	امثلہ نمبر ۴۲ تا ۴۵	
	دسواں باب	
	انحناء	

۴۵۴	انحنا کا ناپ	۱۳۳
۴۵۸	منحنی کی ذاتی مساوات	۱۳۴
۴۶۱	نیم قطر انحنا کے لئے ضابطے	۱۳۵
۴۶۴	نیوٹن کا طریقہ	۱۳۶
۴۶۸	لٹمی دائرہ	۱۳۷
۴۷۰	لغاف	۱۳۸
۴۷۱	لغاف دریافت کرنیکا عام طریقہ	۱۳۹
۴۷۳	جبریہ طریقہ	۱۴۰
۴۷۵	لغافوں کی تماسی خاصیت	۱۴۱
۴۷۸	برہمنیچہ قوس	۱۴۲
۴۸۳	برہمنیچہ قوس	۱۴۳
۴۸۶	درجہ اولیٰ اور متوازی منحنی	۱۴۴
۴۸۸	متحرک شکل کا فوری مرکز	۱۴۵
۴۹۳	لڑکنے والے منحنیات میں استعمال	۱۴۶
۴۹۵	نقطہ گردونیہ کا انحنا	۱۴۷
۴۹۹	خط گردونیہ کا انحنا	۱۴۸
۵۰۱	کسی شکل کی مسلسل حرکت اپنی مستوی سطح میں	۱۴۹
۵۰۳	بر دو بیوں کی بطور گردونیوں کے دوسری تکوین	۱۵۰
۵۰۶	امثلہ نمبر ۴۶ تا ۴۹	



حصہ دوم

پچھٹا باب

تکمل

۱۶۱

۲۷۰۔ مسئلہ کی نوعیت۔ ابواب گزشتہ میں ہم نے

تفاعلوں کے تغیر کی شرح پر غور کیا ہے۔ احصائے کمالات کی طرف اب ہم رجوع ہوتے ہیں بالکل الگ مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر تفاعل کے تغیر کی شرح دی ہوئی ہو اور متبوع متغیر کی کسی خاص قیمت کے لئے تفاعل کی قیمت مقرر کر دی گئی ہو تو متبوع متغیر کی کسی اور قیمت کے لئے ہمیں تفاعل کی قیمت دریافت کرنا ہے۔ علامتوں میں مساوات

$$\frac{F}{R} = f_m (L) \quad \dots \dots (1)$$

کامل درکار ہے جبکہ $f_m (L)$ متغیر L کا دیا ہوا تفاعل ہے اس شرط کے تحت کہ L کی کسی مقررہ قیمت (فرض کرو L) کے لئے f_m ایک خاص قیمت (جب) اختیار کرے۔ مثلاً متحرک نقطہ کی رفتار کا قانون اور وقت t پر نقطہ کا مقام دیا گیا ہو تو ان امور کی بنا پر کسی وقت t پر نقطہ کا مقام دریافت کرنا مقصود ہو سکتا ہے۔ یہ بات

$$\text{مساوات} \quad \frac{F}{R} = f_m (t) \quad \dots \dots (2)$$

کو حل کرنے کے معادل ہے جس میں $f_m (t)$ وقت t کا معلوم تفاعل ہے اس شرط کے تحت کہ $t = t$ کے لئے $f_m = f_m$ ۔

اگر ہم ایک مسلسل تفاعل طما (لا) ایسا دریافت کر سکیں کہ

$$\text{طما} (لا) = \text{فما} (لا)$$

تو مساوات (۱) ذیل کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے

$$\text{فرما} = \text{فرلا} \text{ طما} (لا) \dots\dots\dots (۳)$$

پس اگر ما پر مسلسل ہونے کی قید لگا دی جائے جو احصا کے اکثر عملی اطلاقات کی صورت میں پوری ہوتی ہے تو دفعہ ۵۶ کے مطابق

$$\text{ما} = \text{طما} (لا) + \text{ما} \text{ جہاں مستقل ہے} \dots\dots\dots (۴)$$

مساوات (۱) کا چھانٹک تعلق ہے مستقل مر کی ٹھیک قیمت غیر معین ہے اور اس لئے 'ما' اختیاری مستقل کہلاتا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس کی مدد سے سوال کی باقی ماندہ شرط جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے پوری ہو سکتی ہے۔

$$\text{پس اگر لا} = \text{لا کے لئے ما} = \text{ب تو}$$

$$\text{ب} = \text{طما} (۱) + \text{مر}$$

$$\text{اور اس لئے ما} - \text{ب} = \text{طما} (لا) - \text{طما} (۱) \dots\dots\dots (۵)$$

اگر دفعہ ۲۵ کے مطابق عامل فرما کے لئے علامت عفا کام میں

لائی جائے تو مساوات (۱) ذیل کی شکل میں لکھی جاسکتی ہے

$$\text{عفا} = \text{ما} = \text{فما} (لا) \dots\dots\dots (۶)$$

اور جبریہ تقیم کے اصولوں کے مطابق اس کا حل

$$\text{ما} = \text{عفا} \text{ فما} (لا) \dots\dots\dots (۷)$$

کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے جبکہ مطلوب عامل عفا کی تعریف یہ ہو کہ

$$\text{عفا} \{ \text{عفا} \text{ فما} (لا) \} = \text{فما} (لا) \dots\dots\dots (۸)$$

تفاعل عفا فما (لا) (۹)
اگر اس کا وجود ہو تو فما (لا) کا لحاظ لا کے نامعلوم و مکمل کہلاتا ہے۔

عام طور پر امکوہم

۱) فم (لا) فرلا (۱۰) سے تعبیر کریں گے۔

اس ترتیب کی بہت سی وجہ اگلے باب میں سمجھائی جائے گی۔ فی الحال (۱۰) کو (۹) کے لکھنے کا ایک دوسرا طریقہ خیال کرنا چاہئے۔

ریاضی کی اکثر شاخوں میں مید سے اوپر غلوب اعمال کے درمیان امتیاز کرنا اکثر ضروری ہوتا ہے۔ مید حاصل وہ ہے جو منقرہ قاعدوں کے مطابق کسی دئے ہوئے تفاعل پر ہمیشہ جا بجا ہو سکے اور اس سے غیر مشتبہ نتیجہ حاصل ہو۔ غلوب عمل کی نوعیت ایک سوال کی ہی ہے یہاں جس وہ تفاعل دریافت کرنا ہوتا ہے جس پر ایک خاص طریقہ سے عمل کرنے سے ایک منقرہ نتیجہ حاصل ہو۔ ممکن ہے کہ اس سوال کا جواب ہو یا اس کا جواب ہو یا ایک سے زیادہ جواب ہوں یا نہ ہوں (دفعہ ۱۶)۔ عامل عفا کی صورت میں ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ اگر اس کا ایک جواب موجود ہو تو جمع کردہ مستقل ہر کے غیر معین ہونے کی وجہ سے جوابوں کی تعداد دلالتا ہوگی۔ لیکن ہر صورت میں جواب ملتا ہے یا نہیں ابھی تحقیق طلب ہے۔ تاہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل تفاعل کا نامحدود تکملہ وجود رکھتا ہے اگرچہ اس وسعت کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کرنا کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی۔ اس باب کے باقی ماندہ حصے میں ہم مختلف اقسام کے ریاضی تفاعلوں کے نامحدود تکملے عملی طور پر دریافت کرنے کے سوال پر غور کریں گے۔

مثال۔ اگر ایک متحرک نقطہ کی رفتار ۶ + ج ت دی ہوئی ہے تو

$$\text{فرس} = ۶ + ج ت = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} (۶ ت + \frac{۱}{۴} ج ت) \dots (۱۱)$$

پس $س = ۶ ت + \frac{۱}{۴} ج ت + م$ (۱۲)
شرط $س = س$ بوقت $ت = ت$ سے م کو دریافت کر کے درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے کہ

$$س - س = ۶ (ت - ت) + \frac{۱}{۴} ج (ت - ت) \dots (۱۳)$$

۳۔ معیاری شکلیں :- کوئی ایسے ال قوانین موجود نہیں ہیں جنکی

مد سے کسی دے ہوئے مسلسل تفاعل فہ (لا) کا 'نامحدود تکملہ'
 ل فہ (لا) فرلا یا عفتا فہ (لا) دریافت ہو سکے۔ جیسا کہ اوپر بتایا
 جا چکا ہے مکمل مغلوب عمل ہے جس میں تفرق کے سیدھے عمل کے پہلے نتیجوں
 کی یادداشت ہی رہنا بنائی جاسکتی ہے۔

نیز اگرچہ تکملہ ایک خاص معنی میں ہمیشہ وجود رکھتا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ ریاضی میں
 عام طور پر استعمال ہونے والے جبریہ یا ماورائی تفاعلوں کے رقوم میں (محدود شکل میں)
 بیان نہ ہو سکے۔ انکی مثالیں ہیں

$$ل \text{ ہو } فرلا، ل \text{ جب لا } فرلا، ل \text{ ل } فرلا$$

اور انکی فہرست آسانی سے بے حد بڑھائی جاسکتی ہے۔
 محتملات کی کم و بیش باقاعدہ فہرست بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہئے
 کہ مختلف سادہ تفاعلوں کے تفرقات کی ایک فہرست بنالیں۔ ان میں سے ہر ایک
 عمل کی تعلیم سے نامحدود مکمل کا ایک ضابطہ حاکم ہو جائیگا۔ اختیاری مستقل کو
 جو ہر نامحدود تکملہ میں جمع کیا جاتا ہے صریحی طور پر درج کرنے کی چند ان ضرورت
 نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایک ہی جملہ کے دو مختلف طریقوں سے حاصل کئے
 ہوئے محتملات میں صرف مستقل کا فرق ہوتا ہے ایسے موقعوں پر اختیاری مستقل کی
 غیر موجودگی طالب علم پر شدت سے محسوس ہوگی۔

طالب علم کو ذیل کے اساسی نتیجوں سے پوری واقفیت حاصل کر لینی چاہئے۔

$$فرلا (ن) = لا (ن) \quad ل \text{ لا } فرلا = لا \text{ لا } فرلا \quad ل \text{ لا } فرلا = لا \text{ لا } فرلا$$

$$فرلا \text{ لوک لا} = لا \quad ل \text{ لا } فرلا = لوک لا \quad ل \text{ لا } فرلا = لوک لا$$

$$فرلا \text{ ہو } لا = لا \text{ ہو } لا \quad ل \text{ لا } فرلا = لا \text{ لا } فرلا \quad ل \text{ لا } فرلا = لا \text{ لا } فرلا$$

$$فرلا \text{ جب لا} = لا \quad ل \text{ لا } فرلا = لا \text{ لا } فرلا \quad ل \text{ لا } فرلا = لا \text{ لا } فرلا$$

فرلا $\frac{1}{2}$ جم لا = جب لا	ک جب لا فرلا = جم لا (ع)
فرلا $\frac{1}{2}$ سر لا = قط لا	ک قط لا فرلا = سر لا (ف)
فرلا $\frac{1}{2}$ قم لا = قم لا	ک قم لا فرلا = مم لا (گ)
فرلا $\frac{1}{2}$ جب لا = $\frac{1}{2}$	ک $\frac{1}{2}$ جب لا = $\frac{1}{2}$ (ح)
فرلا $\frac{1}{2}$ سر لا = $\frac{1}{2}$	ک $\frac{1}{2}$ سر لا = $\frac{1}{2}$ (ط)
فرلا $\frac{1}{2}$ جنب لا = جنب لا	ک جنب لا فرلا = جنب لا (ث)
فرلا $\frac{1}{2}$ جنب لا = جنب لا	ک جنب لا فرلا = جنب لا (ک)
فرلا $\frac{1}{2}$ مسر لا = قطر لا	ک قطر لا فرلا = مسر لا (ل)
فرلا $\frac{1}{2}$ ممز لا = قمز لا	ک قمز لا فرلا = ممز لا (م)
فرلا $\frac{1}{2}$ جنب لا = $\frac{1}{2}$	ک $\frac{1}{2}$ جنب لا = $\frac{1}{2}$ (ن)
فرلا $\frac{1}{2}$ جنب لا = $\frac{1}{2}$	ک $\frac{1}{2}$ جنب لا = $\frac{1}{2}$ (ظ)

↑ علامت کے بارے میں دفعہ ۳۳ دیکھو۔

↑ علامت کے بارے میں دفعہ ۳۴ دیکھو۔

$$\frac{\text{فر لا}}{\text{من لا}} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} \text{ اگر لا} > 1, \int \frac{\text{فر لا}}{\text{من لا}} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} \text{ لوک } \frac{1}{1-1}$$

..... (پ)

$$\frac{\text{فر لا}}{\text{من لا}} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} \text{ اگر لا} < 1, \int \frac{\text{فر لا}}{\text{من لا}} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} \text{ لوک } \frac{1}{1-1}$$

..... (ق)

ان میں سے چند ضابطوں کے استعمال میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اول تو (ح) (آ) (ن) (ط) (پ) (ق) میں لا کی علامت سہولت کے لئے مثبت لے لی گئی ہے۔ یہ ہمیشہ جائز ہے کیونکہ شکل میں صرف لا کا مربع واقع ہوتا، نیز جب لا منفی ہو تو ضابطہ (ج) میں ترسیم کرتی پرے کی کیونکہ منفی مقدار کا لوکارتم نہیں ہوتا۔ اس صورت میں لا = - لا اور

$$\text{ما} = \text{لوک لا رکھنے سے}$$

$$\frac{\text{فر لا}}{\text{فر لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{فر لا}} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$$

$$\int \frac{\text{فر لا}}{\text{فر لا}} = \text{لوک لا}$$

لا کے مثبت یا منفی ہونے کی دونوں صورتیں ذیل کے ضابطے میں شریک ہیں

$$\int \frac{\text{فر لا}}{\text{فر لا}} = \text{لوک لا} \dots\dots\dots (ب)$$

نیز (ط) میں لا کو مثبت مان لیا گیا ہے۔ اور (پ) میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ
 $1 > 1$ اور (ق) میں کہ $1 < 1$ ۔

۴۔ ضابطوں کی مادہ توسیع ۱۔ اوپر کے نتائج کی توسیع کر نیکے لئے

اول ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا میں مستقل جمع کر دینے سے ضابطوں کی شکل میں کوئی بنیادی فرق نہیں پڑتا۔ [دفعہ ۳۲ (آ) دیکھو]

پس ظاہر ہے کہ $\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۱)

$\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۲)

$\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۳)

اور اسی طرح - چند دیگر مثالیں دفعہ ۵ اور ۶ میں دی گئی ہیں -
نیز اگر $\frac{1}{(1+1)}$ کو مستقل m سے ضرب دے دیا جائے تو شکل پہلے جیسی ہی رہتی
ہے سو اس کے اسکے m پر تقسیم ہو جاتا ہے - [دفعہ ۳۲ (۶) دیکھو]

مثلاً $\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۴)

$\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۵)

۱۶۶

اور علیٰ بنالقیاس -
نیز $\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۶) جہاں مستطیل ہے

اور $\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۷)

کیونکہ اگر دونوں طرف $\frac{1}{(1+1)}$ سے عمل کریں تو ہر ایک صورت میں دفعہ ۲۹ اور ۳۰
کی رو سے ایک مساوات کے متبادلہ حاصل ہوتی ہے - (۷) میں یہ فرض کر لیا گیا
ہے کہ ارقام کی تعداد محدود ہے -

پس منطق صحیح تعامل $\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۸)

کا نامحدود تک $\frac{1}{(1+1)} = \frac{1}{2}$ (۹)

اب فرض کرو کہ منطق کسی شکل $\frac{1}{(1+1)}$ (۱۰)

عمل تقسیم سے یہ ایک منطق صحیح تفاعل اور کسر $\frac{1}{(1+1)}$ (۱۱)
 کے حاصل جمع میں تحویل ہو سکتی ہے، پہلے حصے کا کھل اوپر کے قاعدہ سے عمل میں لاسکتے
 ہیں اور (۱) کا کھل ہے ۱ لوگ (۱+۱) (۱۲)

مثال (۱) $\int (1-1) \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3} (1-1) = \frac{2}{3} (1-1)$

مثال (۲) $\int \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \frac{1}{0} (1-1) = \frac{1}{0} (1-1)$

مثال (۳) $\int \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \frac{1}{0} (1-1) = \frac{1}{0} (1-1)$

مثال (۴) $\int \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \frac{1}{0} (1-1) = \frac{1}{0} (1-1)$

مثال (۵) $\int \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \frac{1}{0} (1-1) = \frac{1}{0} (1-1)$

$\frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \frac{1}{0} (1-1) = \frac{1}{0} (1-1)$

۵۔ دو درجی نسب نما والی منطق کسیر :- اب ہم بتائینگے کہ

فا (۱) (۱)

کی شکل کے کسی جملہ کو کس طرح کھل کر لے سکتے ہیں جہاں فا (۱) متغیر لا کا منطق صحیح
 تفاعل ہے۔ اگر ضرورت ہو تو شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرو تاکہ باقی
 لا + ب کی شکل کا رہ جائے۔ پس تفاعل (۱) ایک منطق صحیح تفاعل اور کسر

(۲) (۲)

کے حاصل جمع کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ پہلا حصہ دفعہ ۷ کے طریقہ سے کھل کر لیا جاتا
 ہے۔ اب صرف حصہ (۲) پر غور کرنا باقی ہے۔

پہلے ہم $\frac{1}{(لا + پ لا + ق)}$ (۳) پر غور کریں گے۔

نتیجہ شکل اس بات پر منحصر ہے کہ آیا پ کے ق سے $پ لا + ق$ سے
تو دو درجی جملہ حقیقی اور جدا گانہ اجزاء ضربی میں تحویل ہو سکتا ہے پس

$\frac{1}{(لا + پ لا + ق)} = \frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)}$ (۴)
اور مستقلات $لا$ اور $پ$ کو مناسب قیمت دے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ

$\frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)} = \frac{1}{(لا - لا)}$ (۵)
یہ مساوات تمام اہل بشرطیکہ

$1 = \frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)}$ (۶)
یعنی $1 = \frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)}$ اور $1 = \frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)}$ (۷)

یعنی $1 = \frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)}$ اور $1 = \frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)}$ (۸)

پس $\frac{1}{(لا - لا)} = \frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)}$ (۹)
لوگ $(لا - لا)$ - لوگ $(لا - لا)$ =

$\frac{1}{(لا - لا)} = \frac{1}{(لا - لا)} + \frac{1}{(لا - لا)}$ (۹)

جب ہم نے ایک مرتبہ اس بات کو معلوم کر لیا کہ (۵) کے دونوں طرف میں متساوی مساوی
کئے جاسکتے ہیں تو $لا$ اور $پ$ کی قیمت ذیل کے طریقہ سے زیادہ آسانی سے دریافت
ہو سکتی ہے۔ اول ہم دونوں طرف $(لا - لا)$ سے ضرب دیتے ہیں اور پھر اس میں
 $لا = لا$ رکھنے سے $لا$ کی قیمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دونوں طرف
 $(لا - لا)$ سے ضرب دیکر $پ = پ$ رکھنے سے $پ$ کی قیمت حاصل ہوتی ہے۔
پس ذیل کا قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔ $لا$ دریافت کرنے کے لئے جملہ کے

نسب نمایں اس کے متناظر خروئی ضربی کو نکال دو اور باقی ماندہ جملہ میں لا = عا
بج کر دو۔ اسی طرح دب کے لئے۔

اگر پ' = م ق تو

$$\frac{لا + پ' + ق}{لا + پ' + ق} = \frac{لا + پ' + ق}{لا + پ' + ق}$$

$$\text{اور } \frac{لا + پ' + ق}{لا + پ' + ق} = \frac{1}{لا + پ' + ق} \dots \dots \dots (۱۰)$$

اگر پ' > م ق تو

لا + پ' + ق = (لا + پ' + ق) + (ق - پ') = (لا - عا) + پ' + عا
جس میں عا اور پ' حقیقی ہیں اور پ' کو مثبت لے لیا جاسکتا ہے۔
اب دفعہ ۳ (آ) کی سادہ توسیع سے

$$\frac{لا + پ' + ق}{لا + پ' + ق} = \frac{1}{لا + پ' + ق} \dots \dots \dots (۱۱)$$

پ' < م ق والا نتیجہ (۱۱) کے مشابہ شکل میں لکھا جاسکتا ہے کیونکہ ہم لکھ سکتے ہیں

لا + پ' + ق = (لا + پ' + ق) - (پ' - ق) = (لا - عا) + پ' + عا
جس میں عا اور پ' حقیقی ہیں اور پ' کو مثبت فرض کر لیا جاسکتا ہے۔ اب اگر
لا - عا > پ' سے تو دفعہ ۴ (پ) سے

$$\frac{لا + پ' + ق}{لا + پ' + ق} = \frac{1}{لا + پ' + ق} \dots \dots \dots (۱۲)$$

اس میں اگر عا + پ' = عا اور عا - پ' = عا رکھیں تو دفعہ ۴ سے باسانی
ثابت کیا جاسکتا ہے کہ یہ (۹) کے معادل ہے۔

اگر لا - عا < پ' تو

$$\frac{لا + پ' + ق}{لا + پ' + ق} = \frac{1}{لا + پ' + ق} \dots \dots \dots (۱۳)$$

اب زیادہ عام شکل (۱۲) پر غور کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لا اور عا کے مناسب
انتخاب سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ

$$(۱۵) \dots\dots\dots \frac{ا}{ب} = \frac{ل(۲+ا+پ)}{م+ا}$$

$$(۱۶) \dots\dots\dots \frac{ل}{م} = \frac{۱}{۲} \text{ اور } \frac{ا}{ب} = \frac{۱}{۲} \text{ پ}$$

$$\text{پس } \frac{ا(۲+ا+پ)}{ل(۲+ا+پ)} = \frac{ل}{م} \text{ فرلا } \frac{ا(۲+ا+پ)}{ل(۲+ا+پ)} = \frac{ل}{م} \text{ فرلا } \frac{ا(۲+ا+پ)}{ل(۲+ا+پ)}$$

$$(۱۷) \dots\dots\dots$$

ظاہر ہے کہ بائیں طرف کے دو ٹکڑات میں پہلا

$$(۱۸) \dots\dots\dots \frac{ل(۲+ا+پ)}{م+ا} \text{ لوگ}$$

کے مساوی ہے اور دوسرے پر اوپر بحث ہو چکی ہے۔

اگر نسب نامہ حقیقی جداگانہ اجزاء میں قبول ہو سکتا ہے تو (۱۷) کے دائیں جانب کے ٹکڑہ کو "بڑی کسروں" کے طریقے سے زیادہ آسانی سے دریافت کر سکتے ہیں۔ مثلاً

$$(۱۹) \dots\dots\dots \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} + \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب}$$

۱۶۹

$$\frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} + \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} \text{ بشرطیکہ}$$

$$(۲۰) \dots\dots\dots \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} + \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} \text{ یعنی بشرطیکہ}$$

$$(۲۱) \dots\dots\dots \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} + \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} \text{ یعنی}$$

ہر صورت میں اس طول عمل کی ضرورت نہیں کیونکہ ا اور ب کی قیمتیں صفحہ (۲۲۹) پر کے طریقے سے آسانی دریافت ہو سکتی ہیں۔

$$\text{پس (۱۷) کے ٹکڑے سے } \frac{ا(۲+ا+پ)}{ل(۲+ا+پ)} = \frac{ل}{م} \text{ لوگ } \frac{ا(۲+ا+پ)}{ل(۲+ا+پ)} = \frac{ل}{م} \text{ لوگ}$$

$$(۲۲) \dots\dots\dots$$

$$\text{مثال (۱) } \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} + \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} \text{ کی قیمت دریافت کرو۔}$$

$$\text{فرض کرو کہ } \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب} + \frac{ا}{ب} = \frac{ا}{ب}$$

تو مذکورہ بالا طریقہ سے $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

پس $\int \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \log(1-2) + \frac{1}{3} \log(1+2) = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2}$
بطریقہ دیگر

$\int \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2}$

مثال (۲) - $\int \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2}$

مثال (۳) - $\int \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2}$

مثال (۴) - $\int \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2}$

$\int \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2} = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2}$

مثال (۵) - $\frac{3-2}{(1+2)(2-2)}$ کو تکمیل کرو۔

فرض کر دو کہ $\frac{3-2}{(1+2)(2-2)} = \frac{1}{1+2} + \frac{1}{2-2}$

اس سے حاصل ہوتا ہے کہ $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$
اس لئے زیر بحث تکملہ $\frac{1}{3} \log(1-2) + \frac{1}{3} \log(1+2) = \frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2}$

شکل ۷۶ - $\frac{1}{3} \log \frac{1+2}{1-2}$

اس قسم کے تقاضوں کے لئے بھی اوپر سے ملتا جلتا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔

(آ) اگر $\frac{1}{3}$ مثبت ہے تو یہ ذیل کی شکل کے معادل ہے

$$(۱) \dots\dots\dots \frac{لا + ب}{لا + پ + لا + ق}$$

سب سے پہلے شکل (۲) پر غور کرو۔

مربع کو کامل بنانے سے جذری علامت کے اندر کا جملہ (لا - ع) $\pm$ بھائی کی ایک یا دوسری شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ اب دفعہ ۴ (ص ۷۷) اور (ط ۷) سے

$$(۳) \dots\dots\dots \frac{فر لا}{بھ} = \frac{لا - ع}{بھ} \text{ جنہا } ۱ -$$

$$(۴) \dots\dots\dots \frac{فر لا}{بھ} = \frac{لا - ع}{بھ} \text{ جنہا } ۱ -$$

اور $\frac{لا - ع + ۲ بھ}{بھ}$ ان تقاطعوں کو ذیل کی شکلوں میں بھی لکھا جاسکتا ہے

$$\frac{لا - ع + ۲ بھ}{بھ} \text{ یا } \frac{لا - ع + ۲ بھ}{بھ} \text{ لوگ}$$

(۵) \dots\dots\dots

[دفعہ ۴۶ دیکھو]

عام صورت (۱) میں ہم فرض کرتے ہیں

$$(۶) \dots\dots\dots لا + ب = لا + پ + لا + ق + ع +$$

جو پوری ہوتی ہے اگر $لا = لا$ اور $بھ = بھ - پ + لا$ ۔

$$\text{اسلئے } \frac{لا + ب}{لا + پ + لا + ق} = \frac{لا}{لا + پ + لا + ق} \text{ فر لا } \frac{لا + ب}{لا + پ + لا + ق}$$

(۸) \dots\dots\dots

پہلا کلمہ $لا + پ + لا + ق$ کے مساوی ہے اور دوسرے پاد بیعت ہو چکی ہے۔
(۲) اب ہم فرض کرتے ہیں کہ اس دفعہ کی ابتدائی شکل میں سر $لا$ منفی ہے۔ تب عمومیت میں فرق آنے کے بغیر سے - کے مساوی لیا جاسکتا ہے۔
پہلے تقابل

$$(۹) \dots\dots\dots \frac{۱}{۱اق + پ - لا - لا}$$

پر غور کرو -

اب سوائے اس صورت کے جبکہ دودرجی جگر حقیقتاً منفی ہو (جس صورت میں لا کی تمام حقیقی قیمتوں کے لئے یہ خیالی ہوگا) جملہ کو بیا - (لا - عا) کی شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے -

$$(۱۰) \dots\dots\dots \frac{۱ - لا - عا}{ب} = \frac{فرلا}{۱ا + ب - لا - عا}$$

$$(۱۱) \dots\dots\dots \frac{۱ا + ب}{۱اق + پ - لا - لا}$$

$$(۱۲) \dots\dots\dots ۱ا + ب = ۱ا + پ - لا + عا$$

$$(۱۳) \dots\dots\dots ۱ا + ب = ۱ا + پ - لا + عا$$

$$\text{اس لئے } ۱ا + ب = ۱ا + پ - لا + عا$$

$$(۱۴) \dots\dots\dots \frac{فرلا}{۱اق + پ - لا - لا}$$

ان دو میں سے پہلا نکلہ ۱اق + پ - لا - لا کے مساوی ہے اور دوسرے پر اوپر بحث ہو چکی ہے -

$$\text{مثال ۱ - } ۱ا + ب = ۱ا + پ - لا + عا$$

$$۱ا + ب = ۱ا + پ - لا + عا$$

$$۱ا + ب = ۱ا + پ - لا + عا$$

$$\text{مثال ۲-} \int \frac{1+2x}{1+x^2+4x^4} dx = \int \frac{1+(1+2x)}{1+x^2+4x^4} dx = \int \frac{1+2x}{1+x^2+4x^4} dx$$

$$\frac{1+2x}{1+x^2+4x^4} = \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{3x^2} = \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{3x^2}$$

$$\frac{1+2x}{1+x^2+4x^4} = \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{3x^2}$$

$$\text{مثال ۱۳-} \int \frac{1-x}{1+x} dx = \int \frac{1-x}{1+x} dx = \int \frac{1-x}{1+x} dx$$

$$= \int \frac{1-x}{1+x} dx$$

۷۷۔ - متغیر کی تبدیلی: مکمل کے دریافت کرنے میں دو ترکیبیں خاص طور پر مفید ثابت ہوئی ہیں ایک تو نئے متبوع متغیر کا انتخاب اور دوسرے مکمل بالخصوص۔

فرض کرو کہ مکمل ۶ = $\int f(x) dx$ فرلا (۱)
میں متغیر کو لا سے ت میں بدلنا ہے جہاں لا نئے متغیر کا ویا ہوا تھا
تو دفعہ ۳۲ سے

$$(۲) \dots \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{f(x)}{f'(x)} \times \frac{f'(x)}{f'(x)} = \frac{f(x)}{f'(x)} \times \frac{f'(x)}{f'(x)}$$

اور اس لئے مطلوب علامت $\int$ کی تعریف سے

$$۶ = \int f(x) dx = \int \frac{f(x)}{f'(x)} f'(x) dx$$

$$\text{پس } \int f(x) dx = \int \frac{f(x)}{f'(x)} f'(x) dx \dots (۳) \dots (*)$$

[اس سے قاعدہ نکلتا ہے کہ علامت $\int$ کے بعد فرلا کی بجائے $\frac{f(x)}{f'(x)}$ فرت درج کر دو]

اور برعکس اس کے جب کبھی دیا ہوا شکل

$$J \text{ فہ} (ع) \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} \text{ فرلا} \dots \dots \dots (۴)$$

کا ہو تو اسکی بجائے $J \text{ فہ} (ع) \text{ فرع}$ (۵)
کہہ سکتے ہیں اور اکثر اسے دریافت کرنا آسان ہوتا ہے۔
ذیل کی صورتیں ضروری ہیں۔

$$(آ) \quad J \text{ فہ} (لا + لا) \text{ فرلا} = J \text{ فہ} (ع) \text{ فرع} \dots \dots \dots (۶)$$

جہاں $ع = لا + لا$

$$(۲) \quad J \text{ فہ} (گ لا) \text{ فرلا} = \frac{1}{2} J \text{ فہ} (ع) \text{ فرع} \dots \dots \dots (۷)$$

جہاں $ع = گ لا$ ۔ یہ دونوں نتیجے دفعہ ۴ میں استعمال میں آچکے ہیں۔

$$(۳) \quad J \text{ فہ} (لا^۲) \text{ لا فرلا} = \frac{1}{4} J \text{ فہ} (ع) \text{ فرع} \dots \dots \dots (۸)$$

جہاں $ع = لا^۲$
ذیل کے شکلے (۸) کی مثالیں ہیں۔

$$\text{مثال (۱)} - J \text{ لا} \text{ لا} \text{ فرلا} = \frac{\text{فرع}}{\text{ع} (ع + ۱)} J = \frac{\text{لا فرلا}}{\text{لا}^۲ (لا + ۱)} J$$

$$= \frac{1}{2} J \left(\frac{1}{ع} - \frac{1}{ع + ۱} \right) \text{ فرع} = \frac{1}{2} \text{ لوک} \frac{ع}{ع + ۱} = \frac{1}{2} \text{ لوک} \frac{لا^۲}{لا + ۱}$$

$$= \text{لوک} \frac{لا}{لا + ۱}$$

$$\text{مثال (۲)} - J \text{ لا فرلا} = \frac{1}{2} J \text{ فرع} = \frac{1}{2} J \left(\frac{1}{ع} - \frac{1}{ع + ۱} \right) \text{ فرع}$$

$$= \frac{1}{4} \text{ لوک} \frac{ع - ۱}{ع + ۱} = \frac{1}{4} \text{ لوک} \frac{لا - ۱}{لا + ۱}$$

$$(۵) \dots\dots\dots = \frac{\text{فرس لا}}{\text{س لا}} = \text{لوگ س لا}$$

اس سے ہم اخذ کرتے ہیں

$$(۶) \dots\dots\dots = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \text{لوگ س لا} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}}$$

ضوابط (۱) تا (۶) معیاری نتیجے شمار ہوتے ہیں اور انہیں حفظ کر لینا چاہئے

$$(۳) \dots\dots\dots = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}}$$

$$(۷) \dots\dots\dots = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}}$$

اب آئیں اگر س لا = ع رکھیں تو

$$(۸) \dots\dots\dots = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}}$$

اور یہ دفعہ ۳ کی معیاری شکلوں (آ)، (پ)، (ق) میں سے کسی ایک کے تحت آتا ہے۔

$$(۹) \dots\dots\dots = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}}$$

$$(۱۰) \dots\dots\dots = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{جم لا}}$$

اور ہمیں س لا = ع رکھنے سے

$$\dots\dots\dots = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}}$$

$$(۱۱) \dots\dots\dots = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}} = \frac{\text{فر ع}}{\text{جم لا}}$$

لا = ا جب طہ اور فرلا = ا جم طہ فرطہ رکھتے

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \quad \text{فرلا} = \arcsin x \quad \text{ا} = \arcsin x \quad \text{جم طہ فرطہ} = \arcsin x + \arcsin x = 2 \arcsin x$$

$$\frac{1}{2} \arcsin x = \arcsin \frac{x}{2} \quad \text{ا} = \arcsin \frac{x}{2} \quad \text{جم طہ} = \arcsin \frac{x}{2} + \arcsin \frac{x}{2} = 2 \arcsin \frac{x}{2}$$

(۲).....

مثال (۲) تکمیل فرلا = $\frac{\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1+x^2}}{2}$ فرلا (۳) دریافت کرو۔

لا = ا جب طہ اور فرلا = ا جم طہ فرطہ رکھتے

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \quad \text{فرلا} = \arcsin x \quad \text{ا} = \arcsin x \quad \text{جم طہ فرطہ} = \arcsin x + \arcsin x = 2 \arcsin x$$

$$= \arcsin x - \arcsin x = 0 \quad \text{ا} = \arcsin x \quad \text{جم طہ} = \arcsin x + \arcsin x = 2 \arcsin x$$

۱۴۸

مثال (۳) - $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$ کو دریافت کرو۔

اگر لا = ا جم طہ اور فرلا = ا جب طہ فرطہ اس میں درج کریں تو

$$\frac{1}{2} \arcsin x = \arcsin \frac{x}{2} \quad \text{ا} = \arcsin \frac{x}{2} \quad \text{جم طہ} = \arcsin \frac{x}{2} + \arcsin \frac{x}{2} = 2 \arcsin \frac{x}{2}$$

۸۰۔ تکمیل بالخصص - دفعہ ۱ میں جس طریقہ کا ذکر کیا گیا ہے

یعنی ”تکمیل بالخصص“ وہ دفعہ ۳ کے مضامین

$$\frac{1}{2} \arcsin x = \arcsin \frac{x}{2} \quad \text{ا} = \arcsin \frac{x}{2} \quad \text{جم طہ} = \arcsin \frac{x}{2} + \arcsin \frac{x}{2} = 2 \arcsin \frac{x}{2}$$

کو الٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ طرہین کو تکمیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$= \arcsin x - \arcsin x = 0 \quad \text{ا} = \arcsin x \quad \text{جم طہ} = \arcsin x + \arcsin x = 2 \arcsin x$$

جس سے $\text{ع} \text{ف} \text{زلا} = \text{ع} \text{د} - \text{و} \text{زلا} \text{ف} \text{زلا} \dots\dots\dots (۲)$
اس سے ذیل کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔

اگر تکمیل شدنی جملہ دو اجزاء کا حاصل ضرب ہو جیسے سے ایک $(\text{ف} \text{و} \text{زلا})$ فوراً تکمیل ہو سکے تو اسے یہ فرض کر کے تکمیل کیا جاسکتا ہے کہ دوسرا جزو (ع) مستقل ہے بشرطیکہ تکمیل شدہ جزو (و) اور دوسرے جزو کے مشتق $(\text{ف} \text{و} \text{زلا})$ کے حاصل ضرب کے تکمیل کو اس میں سے گھٹا دیا جائے۔

(۲) میں $\text{و} = \text{لا}$ رکھنے سے ایک بہت مفید خاص شکل حاصل ہوتی ہے یعنی

$\text{ع} \text{ف} \text{زلا} = \text{لا} \text{ع} - \text{لا} \text{ف} \text{زلا} \dots\dots\dots (۳)$
اس قاعدہ کے استعمال کی چند اہم مثالیں ذیل میں درج ہیں

(۱) $\text{لوگ لا} \text{ف} \text{زلا} = \text{لا} \text{لوگ لا} - \text{لا} \text{لا} \times \frac{1}{\text{لا} \text{ف} \text{زلا}}$

$\text{لا} \text{لوگ لا} - \text{لا} \dots\dots\dots (۴)$

(۲) $\text{لا} \text{لا} - \text{لا} \text{لا} \text{ف} \text{زلا}$ دریافت کرو۔

نتیجہ (۳) میں $\text{ع} = \text{لا} - \text{لا} \text{لا}$ رکھنے سے

$\text{لا} \text{لا} - \text{لا} \text{ف} \text{زلا} = \text{لا} \text{لا} - \text{لا} \text{لا} + \text{لا} \text{لا} \text{ف} \text{زلا} \dots\dots\dots (۵)$

$\times$ اگر ہم $\text{ف} \text{و} \text{زلا}$ کی بجائے وکیس یعنی وکی بجائے عفا و تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے

عفا (ع) - عفا (و) - عفا (ع) - عفا (و) - عفا (ع) - عفا (و)

$$\text{لیکن } \frac{1}{1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ فرلا} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ فرلا} = \frac{1}{6} - \frac{1}{7} = \frac{1}{42} \text{ فرلا}$$

$$(۶) \dots \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ فرلا} = \frac{1}{6} - \frac{1}{7} = \frac{1}{42} \text{ فرلا}$$

(۶) اور (۵) کے حامل جمع کو بتدریج تقسیم کرنے سے حامل ہوتا ہے کہ

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ فرلا} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ فرلا} = \frac{1}{6} - \frac{1}{7} = \frac{1}{42} \text{ فرلا} \dots (۷)$$

ذہن ۹۷ مثال (۱) کے ساتھ مقابلہ کرو۔

بالکل اسی طریقہ سے ہمیں حامل ہونا چاہئے

$$(۸) \dots \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ فرلا} = \frac{1}{6} - \frac{1}{7} = \frac{1}{42} \text{ فرلا} = \frac{1}{42} - \frac{1}{43} = \frac{1}{1806} \text{ فرلا}$$

$$(۹) \dots \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ فرلا} = \frac{1}{6} - \frac{1}{7} = \frac{1}{42} \text{ فرلا} = \frac{1}{42} - \frac{1}{43} = \frac{1}{1806} \text{ فرلا}$$

(۱۰) تکملوں پ = ق = جم بہا لا فرلا اور ق = ق = جم بہا لا فرلا۔ (۱۰)

کی قیمتیں دریافت کرنا۔

$$(۱۲) \text{ میں } ۷ = \text{جم بہا لا اور } ۷ = \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا}$$

$$\text{پ} = \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا} = \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا} = \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا}$$

$$(۱۱) \dots \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا} = \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا}$$

$$\text{اسی طرح ق} = \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا} = \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا}$$

$$(۱۲) \dots \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا} = \frac{1}{۷} \text{ ق = جم بہا لا}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{پس صاپ - بہا ق = ق = جم بہا لا} \\ \text{بہا پ + صا ق = ق = جم بہا لا} \end{array} \right. \dots (۱۳)$$

تو عن = $\frac{1}{بہ} جب بہ لا لا^۵ -$ $\frac{1}{ن} جب بہ لا لا^۵ ن لا^۵$ فلا

= $\frac{1}{بہ} جب بہ لا لا^۵ -$ $\frac{ن}{بہ} و$ (۷)

اور و = $\frac{1}{بہ} جم بہ لا لا^۵ -$ $\frac{1}{بہ} جم بہ لا^۵ ن لا^۵$ فلا

= $\frac{1}{بہ} جم بہ لا لا^۵ +$ $\frac{ن}{بہ} عن$ (۸)

۱۸ اگر ن کوئی مثبت صحیح عدد ہے تو ان ضابطوں کی مدد سے عن اور و معلوم
ہندسوں عریا و کے رقوم میں ظاہر ہوسکتے ہیں۔
مثال (۱۱)۔ پس اگر بہ = ۱ تو

عن = لا جب لا - ن و - ۱ اور و = لا جم لا + ن عن (۹)

مثلاً ع = لا جب لا - ۳ و = لا جب لا - ۳ - (لا جم لا + ۲ ع)
= لا جب لا + ۳ - (لا جم لا - ۶) (لا جب لا - ۶) =

یعنی $\frac{1}{ن} لا جم لا فلا = (لا - ۶) جب لا + (۳ - لا) جم لا$

(۳) اگر عن = $\frac{1}{ن} مس ط فرط$ (۱۰)

= $\frac{1}{ن} مس ط فرط - (قط ط - ۱) فرط$

= $\frac{1}{ن} مس ط فرط - (مس ط - ۱) مس ط فرط$

تو عن = $\frac{1}{ن} مس ط فرط -$ عن (۱۱)

پس اگر ن مثبت صحیح عدد ہو تو عن کی قیمت ن کے طاق یا جفت ہونے پر بالترتیب

ع = $\frac{1}{ن} مس ط فرط =$ لوک نقط ط (۱۲)

یا ع = $\frac{1}{ن} فرط =$ ط (۱۳)

پرنصر ہوگی۔

اسی طرح اگر $و = ل م ط ف ط$ (۱۴)تو ثابت ہو سکتا ہے کہ $و = ل م ط ف ط$ (۱۵)

۸۶۔ تحویلی ضابطے (سلسل)۔

۱۔ فرض کرو کہ $ع = ل ج م ط ف ط$ تو $ع = ل ج م ط ف ط$ (ج ب ط ج م ط) = جب ط ج م ط

- (ج ب ط م × (ن-۱) ج م ط × (ج ب ط م) ف ط

= جب ط ج م ط + (ن-۱) ل (۱-ج م ط) ج م ط ف ط

= جب ط ج م ط + (ن-۱) ل (۱-ج م ط) ج م ط ف ط

دوسری طرف لجا کر ن پر تقسیم کرنے سے

 $ع = ل ج م ط ف ط + (ن-۱) ل (۱-ج م ط) ج م ط ف ط$ (۲)

اس ضابطہ کو تواتر استعمال کرنے سے ہر قدم پر قوت بقدر ۲ کے کم ہو جاتی ہے، اور آخر الامر اگر ن مثبت صحیح عدد ہو تو محکمہ عن کی قیمت یا تو

۱۔ $ع = ل ج م ط ف ط$ = جب ط ف ط (۳)

پرنصر ہوگی یا ع = ل ف ط = ط (۴)

پرنصر ہو سکتی ہے جو جب اسکے ن طاق یا جفت ہو۔

(۲) اسی طریقہ پر اگر $و = ل ج م ط ف ط$ (۵)تو $و = ل ج م ط ج م ط + (ن-۱) ل (۱-ج م ط) ج م ط ف ط$ (۶)

پس اگر ن مثبت صحیح عدد ہو تو و کی قیمت

$$و = \text{رجب طہ فرطہ} = \text{جم طہ} \dots\dots\dots (۷)$$

$$یا و = \text{رجب طہ} = \text{طہ} \dots\dots\dots (۸)$$

پرلا کے منحصر کی جاسکتی ہے۔

$$(۳) \text{ یہی طریقہ فام تر شکل عم بن} = \text{رجب طہ جم طہ فرطہ} \dots\dots\dots (۹)$$

کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔

$$\text{اب عم بن} = \text{رجب طہ جم} - \text{طہ فر (رجب طہ)}$$

$$= \frac{1}{1+م} \text{جب طہ جم} - \text{طہ} - \frac{1}{1+م} \text{رجب طہ} \times (1-ن) \text{جم طہ} \times \text{رجب طہ فرطہ}$$

$$= \frac{1}{1+م} \text{جب طہ جم} - \text{طہ} + \frac{(1-ن)}{(1+م)} \text{رجب طہ جم طہ فرطہ} \times (1-جم طہ فرطہ)$$

$$= \frac{1}{1+م} \text{رجب طہ جم} - \text{طہ} + \frac{1-ن}{1+م} (\text{عم بن} - ۲ - \text{عم بن})$$

کسر دور کرنے اور ایک جنس رقموں کو اکٹھا کر کے $(م+ن)$ سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{عم بن} = \frac{1}{م+ن} \text{جب طہ جم} - \text{طہ} + \frac{1-ن}{م+ن} \text{عم بن} \dots\dots\dots (۱۰)$$

اسی طریقہ سے حاصل ہوگا

$$\text{عم بن} = \frac{1}{م+ن} \text{جب طہ جم} - \text{طہ} + \frac{1-م}{م+ن} \text{عم بن} \dots\dots\dots (۱۱)$$

ضابطوں (۱۰) اور (۱۱) کے متواتر استعمال سے ہر قدم پر کوئی قوت ناقدر کے گھٹایا جاسکتا ہے اور بالآخر اگر م اور ن مثبت مجمع عدد ہوں تو مکمل عم بن کی قیمت فیصل کے چار شکلات میں سے کسی ایک پر منحصر کجا جاسکتی ہے۔

$$ع = \text{رجب طہ جم طہ فرطہ} = \frac{1}{۲} \text{جب طہ} \dots\dots\dots (۱۲)$$

جبر و مقابلہ کے اس اصولی نظریہ پر حادی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو قاعدے اب دئے جائینگے ان سے حال کردہ تہجوں کی تصدیق تجربہ سے بد آسانی ہو سکتی ہے۔

۱۸۴ اول یہ فرض کرو کہ مساوات $F(لا) = ... (لا - ح) ... (۳)$ کی تمام اصلیں حقیقی اور جدا گانہ ہیں اور یہ $ع, ح, ح, ح, ... (لا - ح)$ ہیں۔ تب نیز الاقلام $F(لا)$ درجہ اول کے $ن$ جدا گانہ اجزائے ضربی میں تحلیل ہو جاتا ہے یعنی

$$F(لا) = (لا - ح) (لا - ع) ... (لا - ح) ... (۴)$$

اب یہ ثابت کرنا آسان ہے کہ اس صورت میں کسرا، $ن$ جزوی کسروں کے مجموعہ میں تحلیل ہو جاتی ہے جن کے نسب نما $F(لا)$ کے مختلف اجزائے ضربی ہیں چنانچہ

$$F(لا) = \frac{لا}{لا - ع} + \frac{لا}{لا - ح} = \frac{لا}{(لا - ع) ... (لا - ح)}$$

$$+ \frac{لا}{لا - ح} + \dots + \frac{لا}{لا - ح} + \dots (۵)$$

جہیں $لا, لا, لا, ...$ مستقل ہیں۔ اب اگر (۵) کو کسروں سے

صاف کیا جائے اور دونوں طرف $لا, لا, لا, ...$ لاکے مساوی رکھے جائیں تو $ن$ مستقل مقداروں کو دریافت کرنے کے لئے ٹھیک $ن$ مساویں حاصل

ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ زیر بحث شرائط ایک دوسرے سے آزاد

اور باہم موافق ہیں اور $لا, لا, لا, ...$ کی کسی قسم کی دریافت ہو سکتی

ہیں جو (۵) کو پورے کسروں اور نیزہ مستقل وحید القیمت ہوں۔ تاہم دونوں منطق صحیح

تفاعل جنہیں شمالاً مساوی ثابت کرنا ہے بالترتیب $لا = ع, لا = ع, ...$

$... لا = ع$ کے لئے مساوی ہونے کے بشرطیکہ

$$\left\{ \begin{array}{l} (ع - ع) (ع - ع) ... (ع - ع) = ف(ع) \\ (ع - ع) (ع - ع) ... (ع - ع) = ف(ع) \\ \dots \\ (ع - ع) (ع - ع) ... (ع - ع) = ف(ع) \end{array} \right. (۶)$$

یعنی $\frac{فا(ح۱)}{ف(ح۱)} = \frac{فا(ح۲)}{ف(ح۲)} = \dots = \frac{فا(ح۱۰)}{ف(ح۱۰)}$ (۷)

اب چونکہ (ن-۱) درجہ کے منطق صحیح تفاعل لا کی (ن-۱) سے زیادہ جدا گانہ قیمتوں کے لئے مساوی نہیں ہو سکتے سوائے اس صورت کے جبکہ وہ تمام اُلا مساوی ہوں، اس لئے ثابت ہوا کہ مستقلوں کی ان قیمتوں کے لئے (۵) مساوات متماثلہ ہے۔ پس

$$\frac{فا(لا)}{ف(لا)} = \frac{لا(لوک(لا-۱))}{لا(لوک(لا-۲))} + \dots + \frac{لا(لوک(لا-۱۰))}{لا(لوک(لا-۱۱))} \dots (۸)$$

مثال (۱) $\frac{لا}{لا(۵-۴+۳+۲+۱)} = \dots (۹)$ کی قیمت دریافت کرو۔

$$اب \quad \frac{لا}{لا(۵-۴+۳+۲+۱)} = \frac{لا}{لا(۵-۴+۳+۲+۱)} + \dots$$

$$= (۱) + \frac{لا}{لا(۱-۰)} + \frac{لا(۱)}{لا(۱+۰)} + \frac{لا(۲)}{لا(۲+۰)} + \dots (۱۰)$$

اگر سورصاف کی جائیں اور سروں کو مساوی رکھا جائے تو 'ج' کی قیمت دریافت کرنے کے لئے پانچ اُلا مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اوپر کا طریقہ استعمال کرنا آسان تر ہے۔ اگر فرض کی ہوئی متماثلہ کو (لا-۱) سے ضرب دیا جائے اور پھر اس میں لا = ۱ رکھ دیا جائے تو اس کی قیمت دریافت ہو جاتی ہے اور اسی طرح باقی سروں کے لئے۔

۱۸۵

پس $\frac{لا}{لا(۵-۴+۳+۲+۱)} = لا - \frac{۱}{۱-لا} \times \frac{۱}{۱} + \frac{۱}{۱+لا} \times \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲+لا} \times \frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۳+لا} \times \frac{۱}{۴} + \dots (۱۱)$
اس نتیجہ کی برآسانی تصدیق ہو سکتی ہے۔

$$اس لئے ریخت نمبر = \frac{۱}{۴} لا - \frac{۱}{۴} لوک(لا-۱) - \frac{۱}{۴} لوک(لا) + \frac{۱}{۴} لوک(لا-۲) \dots (۱۲)$$

$$+ \frac{۱}{۴} لوک(لا-۳) \dots (۱۳)$$

اگر فریقین کو (۱- لا) سے ضرب دیں اور پھر لا = ۱ رکھ دیں تو حاصل ہوتا ہے ج = ۱
 نیز لا سے ضرب دیکر لا = ۰ رکھنے سے ب = ۱ دریافت ہوتا ہے۔ اب صرف
 ۱ کی قیمت کسی اور طریقہ سے دریافت کرنا باقی ہے۔ اگر مساوات (۴) کے دونوں
 جانب لا سے ضرب دیں اور لا = ۰ کر دیں تو حاصل ہوتا ہے ا = ج = ۰ یعنی
 (۱- لا) اس کے معادل طریقہ یہ ہے کہ کسر صاف کرنے کے بعد لا کے سروں کو مساوی
 رکھا جائے۔ نیز لا کو کوئی خاص قیمت دے سکتے ہیں مثلاً لا = ۱-۱ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے
 - ا + ب + ج = $\frac{1}{1}$
 اور پہلے نتیجوں کی مدد سے (۱- لا) حاصل ہوتا ہے۔

پس $\int \frac{فرلا}{(لا-۱)^۲} = \int \left(\frac{1}{لا-۱} + \frac{1}{لا} + \frac{1}{لا} \right) فرلا$
 = لوگ لا - $\frac{1}{لا}$ - لوگ (۱- لا) (۵)
 مثال (۲) - $\int \frac{۱+لا^۲}{(۳-لا)(۲+لا)}$ (۶) کی قیمت دریافت کرو۔
 فرض کرو کہ

$$(۷) \dots \dots \dots \frac{ج}{(۳-لا)} + \frac{ب}{۳-لا} + \frac{ا}{۲+لا} = \frac{۱+لا^۲}{(۳-لا)(۲+لا)}$$

ستقلوں کے دریافت کرنے کے اجمالی طریقہ سے

$$\frac{۴}{۵} = \frac{۱+۲}{۲+۳} = ج \quad \frac{۳}{۲۵} = \frac{۱+۲۰}{(۳-۲۰)}$$

نیز لا سے ضرب دیکر لا = ۰ کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$ا + ب = ۰ \text{ یعنی } ب = \frac{۳}{۲۵}$$

$$(۸) \dots \dots \dots \frac{۴}{(۳-لا)۵} - \frac{۳}{۲۵} \text{ لوگ } (۲+لا) + \frac{۳}{۲۵} \text{ لوگ } (۳-لا) \dots \dots (۹)$$

$$\text{مثال (۳) - } \int \frac{لا^۲ فرلا}{(۱+لا^۲)}$$

کی قیمت دریافت کرو۔

دفعہ ۷۷ (۳) کی یاد دہانی کی جاتی ہے کہ $\frac{لا^۲}{(لا+۱)}$ کو لا کا تفاعل مانکر محض معائنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

$$\frac{لا^۲}{(لا+۱)} = \frac{لا^۲}{(لا+۱)} - \frac{لا}{(لا+۱)} = \frac{لا^۲ - لا}{(لا+۱)}$$

پس $\frac{لا^۲ - لا}{(لا+۱)} = \frac{لا}{(لا+۱)} - \frac{لا}{(لا+۱)} = \frac{لا}{(لا+۱)}$ لوگ $\frac{لا}{(لا+۱)}$

(۱۰).....

۸۵۔ دو درجی اجزائے ضربی - مذکور بالا طریقے ہمیشہ استعمال ہو سکتے

ہیں لیکن اگر ف (لا) کی کچھ اصلین خیالی ہوں تو اول تکملہ خیالی شکل میں حاصل ہوگا۔ اگر ہم خیالی جلوں پر غور کرنے سے پچھتا چاہتے ہیں تو ذیل کے طریقے پر عمل کرنا چاہئے۔

۱۸۷ مساواتوں کے نظریہ سے ہمیں معلوم ہے کہ کثیر الارقام ف (لا) جسکے تمام حقیقی ہوں پہلے اور دوسرے درجے کے حقیقی اجزاء میں تحلیل ہو سکتا ہے۔ پس

تفاعل $\frac{ف(لا)}{ف(لا)}$ (۱)

کو جزوی کسو میں تحلیل کرنے کی ضمن میں ثابت کیا جاسکتا ہے کہ

(۱) ہر خطی جزو لا۔ عدا کے لئے جو تکرار نہیں پاتا کسی شکل $\frac{لا}{لا - عدا}$ (۲)

(ب) ہر خطی جزو لا۔ بہا کے لئے جو درجہ تکرار پاتا ہے د کسو کا سلسلہ ذیل کی شکل کا ہے

(۳)..... $\frac{بہا}{لا - بہا} + \frac{بہا}{لا - بہا} + \frac{بہا}{لا - بہا}$

(ج) ہر دو درجی جزو لا + پ لا + ق کے لئے جو تکرار نہیں پاتا کسی شکل ہے

(۴)..... $\frac{ج لا + د}{لا + پ لا + ق}$

(۱۵) اور ہم دودرجی جزو لا + پ لا + ق کیلئے جو درجہ بیکار یا تا ہے کسور کا سلسلہ ذیل کی شکل کا ہے

$$(۵) \dots \frac{\text{ج لا + د ر}}{(\text{لا + پ لا + ق})} + \dots + \frac{\text{ج لا + د ر}}{(\text{لا + پ لا + ق})} + \frac{\text{ج لا + د ر}}{(\text{لا + پ لا + ق})}$$

یہ دیکھنا آسان ہے کہ اس طور پر مستطلات کی عین کافی تعداد حاصل ہوتی ہے تاکہ مسئلہ کے باہم مساوی رہنے کے طریقہ سے تفاعل (۱) کی جزوی کسور کے پورے نظام (۵) کے ساتھ مطابقت قائم ہو سکے۔

✽ اب صرف یہ غور کرنا باقی رہا ہے کہ جزوی کسور ج س لا + د س (۶) ... (۶)

کا نامحدود مکملہ کس طرح دریافت کیا جائے۔ س = ا کی صورت پر دفعہ ۴ میں غور کیا جا چکا ہے اور عام صورت ایک تخیلی ضابطہ کی مدد سے اس شکل میں تحویل کیجا سکتی ہے۔ سب سے پہلے لہ اور مہ ایسے دریافت کئے جاسکتے ہیں کہ

$$(۷) \dots \frac{\text{ج س لا + د س}}{(\text{لا + پ لا + ق})} = \text{لہ} + \frac{۲ \text{ لا + پ}}{(\text{لا + پ لا + ق})} + \frac{\text{مہ}}{(\text{لا + پ لا + ق})} \dots (۷)$$

یعنی لہ = $\frac{۱}{۲}$ ج س اور مہ = د س - $\frac{۱}{۲}$ پ ج س (۸) ... (۸)

نتیجہ (۷) کے دائیں جانب کی پہلی رقم کا مکملہ ہے

$$(۹) \dots \frac{\text{لہ}}{۱} \times \frac{۱}{(\text{س} - ۱)} = \frac{۱}{(\text{لا + پ لا + ق})} \dots (۹)$$

اور اب صرف ذیل کی قیمت معلوم کرنا باقی ہے

$$(۱۰) \dots \frac{\text{فر لا}}{(\text{لا + پ لا + ق})} - \frac{\text{فر ت}}{(\text{ت + ج})} \dots (۱۰)$$

✽ ذیل کی بحث میرے مضمون کو مکمل کرنے کی غرض سے یہاں دی گئی ہے، علی طور پر اس کے استمال کی شاذ و نادر ضرورت پڑتی ہے۔ اس س کو مٹوی رکھنے سے طالب علم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (۱۰) کھونے کے جملوں کو مکمل کرنے کا دوسرا طریقہ شمال (۱۲) میں آگے دیا گیا ہے۔

جبکہ ت = لا + $\frac{1}{p}$ پ اور ج = ق - $\frac{1}{p}$ پ (۱۱)

$$\frac{ت}{فرت} = \left\{ \frac{ت}{(ت + ج)س - ۱} \right\} = \frac{۱}{(ت + ج)س - ۱} - \frac{۱}{(ت + ج)س - ۱} \times \frac{ج}{(ت + ج)س}$$

$$= \frac{۱}{(ت + ج)س - ۱} - \frac{ج}{(ت + ج)س \times ((ت + ج)س - ۱)}$$

$$= \frac{(۳ - س۲) - ج}{(ت + ج)س - ۱} \times \frac{ج}{(ت + ج)س} \dots (۱۲)$$

پس تکمل کرنے سے

$$\frac{ت}{(ت + ج)س - ۱} = \frac{فرت}{(ت + ج)س - ۱} \times \frac{۱}{(ت + ج)س} + \frac{فرت}{(ت + ج)س - ۱} \times \frac{ج}{(ت + ج)س}$$

$$\frac{فرت}{(ت + ج)س - ۱} = \frac{فرت}{(ت + ج)س - ۱} \times \frac{۱}{(ت + ج)س} + \frac{فرت}{(ت + ج)س - ۱} \times \frac{ج}{(ت + ج)س}$$

..... (۱۳)

اس لیے پہلی ترقیم پر واپس آنے سے

$$\frac{فرا}{(لا + پ لا + ق)س - ۱} = \frac{۱}{(ق - پ)س - ۱} \times \frac{۱}{(لا + پ لا + ق)س - ۱} \times \frac{لا + پ لا + ق}{(لا + پ لا + ق)س - ۱}$$

$$+ \frac{(۳ - س۲)}{(ق - پ)س - ۱} \times \frac{فرا}{(لا + پ لا + ق)س - ۱} \dots (۱۴)$$

ادری مطلوبہ تجویلی ضابطہ ہے۔ اس نتیجے کے متواتر اشمال سے ٹکڑہ (۱۰) کی قیمت آئیں

$$\frac{فرا}{(لا + پ لا + ق)س - ۱} \dots (۱۵)$$

پر لا کے خصص کی جاسکتی ہے اور اس ٹکڑہ (۱۵) کی قیمت دفعہ ۵ سے معلوم ہے۔

$$\text{مثال (۱۱)} \quad \frac{فرا}{(لا + پ لا + ق)س - ۱} \dots (۱۶) \quad \text{کی قیمت دریافت کرو۔}$$

نسب نامے کے دو درجہ دوم کے اجزا (لا + لا + ۱) اور (لا - لا + ۱) ہیں اور ان کی ترتیب میل نہیں ہو سکتی۔

اس لئے اوپر کے قاعدہ کے مطابق ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$(۱۷) \dots\dots\dots \frac{۱}{لا^۲ + لا + ۱} = \frac{ا + لا + جب}{لا + لا + ۱} + \frac{ج + لا + ک}{لا^۲ - لا + ۱}$$

یعنی ۱ = (ا + لا + جب) (لا - لا + ۱) + (ج + لا + ک) (لا + لا + ۱) لا کی مختلف قوتوں کے سرسادی رکھنے سے

۱۸۹

$$۰ = (ج + لا + ک) - (ا + لا + جب) + ک = ۰$$

$$ا + ج - جب - ک = ۰ \text{ اور } جب + ک = ۱$$

پس ۱ = ج - ۱ = ج اور جب = ک = ۱/۲ (۱۸) اب دفعہ ۵ کے طریقہ سے مکمل دریافت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ

$$\int \frac{لا}{لا^۲ + لا + ۱} = \frac{۱}{۲} \int \frac{۱ + لا}{لا^۲ + لا + ۱} - \frac{۱}{۲} \int \frac{۱ - لا}{لا^۲ - لا + ۱} \text{ فرلا}$$

$$= \frac{۱}{۴} \int \frac{۱ + (۱ + لا)}{لا^۲ + لا + ۱} - \frac{۱}{۴} \int \frac{۱ - (۱ - لا)}{لا^۲ - لا + ۱} \text{ فرلا}$$

$$= \frac{۱}{۴} \text{ لوگ } (لا^۲ + لا + ۱) - \frac{۱}{۴} \text{ لوگ } (لا^۲ - لا + ۱) + \frac{۱}{۴} \int \frac{لا}{لا^۲ + لا + ۱} + \frac{۱}{۴} \int \frac{لا}{لا^۲ - لا + ۱} \text{ فرلا}$$

$$= \frac{۱}{۴} \text{ لوگ } \frac{لا^۲ + لا + ۱}{لا^۲ - لا + ۱} + \frac{۱}{۴} \left(\text{سر} \frac{۱ + لا}{لا^۲} + \text{سر} \frac{۱ - لا}{لا^۲} \right)$$

$$= \frac{۱}{۴} \text{ لوگ } \frac{لا^۲ + لا + ۱}{لا^۲ - لا + ۱} + \frac{۱}{۴} \text{ سر} \frac{لا}{لا^۲ - ۱} \dots\dots\dots (۱۹)$$

مثال (۲) $\int \frac{فرلا}{(۱ + لا)^۲}$ (۲۰) کی قیمت دریافت کرو۔

نتیجہ (۱۴) کے مطابق انکی قیمت دریافت ہو سکتی ہے لیکن ذیل کا طریقہ زیادہ آسان ہے۔ اگر لا = س طرہ رکھا جائے تو

مثال (۲) $\int \frac{\text{فرلا}}{(۲+۱)۱۱+۱۱} کی قیمت دریافت کرو۔$

$$۱+۱ = ت^۱ \text{ اور } \frac{\text{فرلا}}{\text{فرت}} = ت^۲ \text{ رکھنے سے}$$

$$\text{تکملہ} = \int \frac{ت^۱ \text{ فرت}}{ت(۱+۱)} = ۲ \int \frac{\text{فرت}}{ت+۱} = ۲ \text{ مس ت} = ۲ \text{ مس } ۱۱+۱۱$$

(۳) اگر لا دو درجی جے کے جذر کو ظاہر کرے تو فرض کرو کہ

$$۱۱ = لا + لا + ب + لا + ج$$

اور فا (لا، لا، لا) متغیرات لا اور لا کا منطبق تفاعل ہے تو تکملہ (لا، لا، لا) فرلا کی قیمت دریافت کرنے کا سوال ذیل کے ابدال سے منطبق تفاعل کے تکملہ میں تحول ہو سکتا ہے۔

اگر مثبت ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں $۱۱ = لا \times لا + لا + پ + لا + ق \dots (۶)$
جس میں $پ = \frac{ب}{۲}$ اور $ق = \frac{ج}{۲}$ ۔ اب فرض کرو کہ

$$۱۱ = لا + لا + پ + لا + ق = ت - لا$$

$$\text{پس } لا = \frac{ت - ق}{ت + پ} \text{ اور } \frac{\text{فرلا}}{\text{فرت}} = \frac{ت(۲ + پ + ق)}{۲(پ + ق)} \dots (۷)$$

$$\text{اور } لا + لا + پ + لا + ق = \frac{ت + پ + ق}{ت + پ} \dots (۸)$$

اس ابدال سے ظاہر ہے کہ سوال ت کے منطبق تفاعل کے مکمل میں تحول ہو جاتا ہے۔

اگر لا + پ + لا + ق کے اجزاء حقیقی ہیں تو فرض کرو

$$لا + پ + لا + ق = (لا - ب) (لا - ب) \dots (۹)$$

توزیل کا ابدال بھی استعمال کر سکتے ہیں

$$لا - ب = (لا - ب) (لا - ب) \dots (۱۰)$$

$$\text{جس سے لا} = \text{ع} + \frac{\text{ب} - \text{ع}}{\text{ا} - \text{ت}} \text{ اور } \frac{\text{فر لا}}{\text{فر ت}} = \frac{۲(\text{ب} - \text{ع})}{\text{ا} - \text{ت}} \dots (۱۱)$$

$$\text{اور } \sqrt{\text{لا} + \text{پ} + \text{ق}} = \text{ق}$$

$$(۱۲) \dots \dots \frac{\text{ت}(\text{ع} - \text{ب})}{\text{ا} - \text{ت}} = \text{ت}(\text{ع} - \text{لا}) =$$

اگر منفی ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں

$$(۱۳) \dots \dots \dots \sqrt{\text{ق} + \text{پ} - \text{لا}} = \text{لا}$$

جہیں $\text{پ} = \frac{\text{ب}}{\text{ا}}$ اور $\text{ق} = \frac{\text{ج}}{\text{ا}}$ اگر غیر حقیقی ہے تو لازماً $\text{ق} + \text{پ} - \text{لا}$ کے اجزاء ضربی حقیقی ہونے چاہئیں۔ ورنہ اسکی خلاف صورت میں لا کی تمام قیمتوں کے لئے اس جملہ کی علامت ایک ہی رہے گی اور ظاہر ہے کہ لا کی کافی طور پر بڑی قیمتوں کے لئے یہ جملہ منفی ہے اس لئے اسکی قیمت ہمیشہ منفی ہوگی۔

پس $\text{ق} + \text{پ} - \text{لا} = \text{لا} = \frac{۲(\text{ع} - \text{ب})}{\text{ا} - \text{ت}} \dots (۱۴)$

جس میں ع اور ب حقیقی ہیں۔ فرض کرو کہ

$$(۱۵) \dots \dots \dots \text{ب} - \text{ع} = \text{لا} = \frac{\text{ت}(\text{ع} - \text{ب})}{\text{ا} - \text{ت}} \dots (۱۵)$$

$$\text{تو } \text{لا} = \text{ع} + \frac{\text{ب} - \text{ع}}{\text{ا} - \text{ت}} \text{ اور } \frac{\text{فر لا}}{\text{فر ت}} = \frac{۲(\text{ب} - \text{ع})}{\text{ا} - \text{ت}} \dots (۱۶)$$

$$\text{اور } \sqrt{\text{ق} + \text{پ} - \text{لا}} = \text{لا} = \frac{\text{ت}(\text{ع} - \text{ب})}{\text{ا} - \text{ت}} \dots (۱۷)$$

اب ظاہر ہے کہ ان ابدالوں سے $\text{ق} + \text{پ} - \text{لا}$ فر لا فر ت متغیر کا منطقی تفاعل ہو جاتا ہے۔

اور کی تحقیقات ایک جہت تک اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ میں متحمل سمجھے تفاعل متحمل ہو سکتے ہیں اور ان سے خاص قسم کے نتیجے حاصل ہوتے ہیں لیکن خاص خاص صورتوں میں عملی طور پر متحمل دیگر طریقوں سے آسانی سے عمل میں آسکتا ہے۔

اس باب کے دوران میں ایسی کئی مثالیں آچکی ہیں۔ اور نمونے کے طور پر ایک اور دو مثالیں یہاں دی جاتی ہیں۔
مثال (۳)۔ ۱۔ نسب ماکو ناطق بنانے سے

$$\int \frac{فرلا}{\sqrt{لا+لا+لا}} = \int \{ \sqrt{لا+لا} - لا \} فرلا$$

$$= \frac{2}{3} (لا+لا) - \frac{2}{3} لا =$$

$$\text{مثال (۳)۔ ۱۔} \int \frac{فرلا}{\sqrt{لا+لا+لا}} = \int \{ لا - \sqrt{لا+لا} \} فرلا$$

۱۹۲

$$= \frac{1}{4} لا - \int لا \sqrt{لا+لا} فرلا$$

$$= \frac{1}{4} لا - \frac{1}{4} لا \sqrt{لا+لا} + \frac{1}{4} \text{جنز لا}$$

بطر دیگر لا = جنز ۶ رکھنے سے مکملہ ذیل کی شکل اختیار کرتا ہے

$$\int \text{جنز ۶ فرع} = \int \text{قو جنز ۶ فرع}$$

$$= \frac{1}{4} \int (1 - \text{قو}^2) فرع = \frac{1}{4} فرع + \frac{1}{4} \text{قو}^2$$

اور اسالی سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ دونوں نتیجوں میں صرف متعل کافرق ہے۔

امثلہ ۲۳

ذیل کے جلوں کے نامحدود کمالات دریافت کرو اور تفرق کر کے انکی تصدیق کرو۔

$$(۲) \quad \frac{1}{\sqrt{لا+لا}} , \frac{1}{\sqrt{لا+لا}}$$

$$(۱) \quad \frac{1}{لا-لا} , \frac{1}{\sqrt{لا+لا}}$$

$$(۳) \quad \frac{1}{لا} , \frac{1}{لا} , \frac{لا+لا}{لا}$$

$$(۳) \quad \frac{1}{لا-لا} , \frac{1}{\sqrt{لا+لا}}$$

- (۵) $\frac{1}{\sqrt{2-3\lambda}}, \frac{1}{\sqrt{\lambda+2\lambda}}$
- (۶) $\frac{\lambda+1}{\lambda}, \frac{\lambda+1}{\lambda}$
- (۷) $\frac{\lambda+2}{\lambda-3}, \frac{\lambda-1}{\lambda+3}$
- (۸) $\left(\frac{1}{\lambda} + \lambda\right)^2, \left(\frac{1}{\lambda} + \lambda\right)^2$
- (۹) $\frac{\lambda-1}{\lambda+1}, \frac{\lambda+1}{\lambda-1}$
- (۱۰) $\frac{\lambda^2}{\lambda-1}, \frac{\lambda^2}{\lambda+1}$
- (۱۱) $\frac{\lambda-1}{\lambda+1}, \frac{\lambda+1}{\lambda-1}$
- (۱۲) $\text{جم}^2 \lambda, \text{مم}^2 \lambda$
- (۱۳) $\text{جم}^2 \lambda - \text{جبل}^2 \lambda$
- (۱۴) $\text{جم}^2 \lambda, \text{جمن}^2 \lambda$
- (۱۵) $\text{مسنر}^2 \lambda, \text{مسنر}^2 \lambda$
- (۱۶) $\frac{\lambda-1}{\lambda+1}, \frac{\lambda+1}{\lambda-1}$

اشد ۲۴

حرکیاتی سوالات

(۱) ایک ذرہ قانون $\frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = \text{ج} - \text{ب}$ کے مطابق حرکت کر رہا ہے۔ ثابت

کر دو کہ ساکن ہونے سے پہلے وہ فاصلہ $\frac{\text{ج}^2}{2\text{ب}}$ طے کریگا۔ (ج اسراع بجائز ارض)

(۲) اگر ایک نقطہ سکون سے وقت $t = 0$ پر مستقل اسراع کے ساتھ حرکت شروع کرے اور کسی وقفہ کے بعد اسکی رفتار v ہو اور اس وقفہ کے اندر اوسط رفتار $\bar{v}$ ہو تو

ثابت کر دو کہ $\bar{v} = \frac{1}{2}v$ ۔

(۳) سوال (۲) کی ترقیم میں اگر اسراع a کے متناسب ہو تو

$$\bar{v} = \frac{1}{2}v \times \frac{a}{a}$$

(۴) ایک ذرہ کی حرکت کا قانون $\frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = \text{ج} - \text{ب}$ ہے۔ ثابت کر دو کہ

ت۔۔ سے ساکن ہونے تک فاصلہ $\frac{و}{ن}$ ملے ہوگا۔

(۵) اگر مزاحم واسطیں متحرک ذرہ کی رفتار $\frac{فرس}{فرت}$ = و۔ قوت ہو تو ثابت کرو کہ ذرہ وقت ت۔۔ کے مقام سے فاصلہ $\frac{و}{ن}$ کبھی ملے نہیں کر سکتا۔

(۶) ایک ذرہ قانون $\frac{فرس}{فرت}$ = و۔ قوت جسم ن ت کے مطابق حرکت کرتا ہے ثابت کرو کہ ت۔۔ سے ساکن ہونے تک فاصلہ $\frac{ن قوت + ک}{ن + ک}$ ملے کرتا ہے۔

(۷) ثابت محور کے گرد گھومنے والے جسم کی زاویہ رفتار $\frac{فرط}{فرت}$ = ن نظرن ت ثابت کرو کہ اگر ط =۔۔ وقت ت =۔۔ تو ط = م سن ا قوت =۔۔

امثلہ ۲۵

(درجہ دوم کے نسب نما)

$$(۱) \int \frac{۱+۱}{۲۱+۱} فرلا = سن^۱ لا + لوک م^۱ ۱+۱ لا$$

$$(۲) \int \frac{۲ لا}{۲۱+۱} فرلا = \frac{۱}{۲} لا^۲ - لوک م^۱ ۱+۱ لا$$

$$(۳) \int \frac{۲ لا}{۲۱-۱} فرلا = - \frac{۱}{۲} لا^۲ - لوک م^۱ ۱-۱ لا$$

$$(۴) \int \frac{فرلا}{۲۱+۲۱-۱} = سن^۱ (۲ لا-۱)$$

$$(۵) \int \frac{فرلا}{۱+۲ لا+۱} = لوک م^۱ \frac{۱+۲ لا}{۱+۲ لا}$$

$$(۶) \int \frac{۳+۲۱}{۵+۲۱-۲۱} فرلا = \frac{۳}{۲۱} لوک (۲-۲۱+۵) + \frac{۳۴}{۳۱۲} ستر \frac{۳-۲۱}{۳۱۲}$$

$$(۷) \int \frac{۱-۲۱}{۲+۲۱+۲۱} فرلا = لوک (۲+۲۱+۲۱) - \frac{۳}{۲۱} ستر \frac{۱+۲۱}{۲۱}$$

$$(۸) \int \frac{(۱+۲۱)+۲}{۱+۲۱-۲۱} فرلا = لوک (۲-۲۱+۱) + \frac{۲}{۳۱} ستر \frac{۱-۲۱}{۳۱}$$

$$(۹) \int \frac{۱+۲}{۲(۱-۲۱)} فرلا = لوک (۱-۲۱) - \frac{۲}{۱-۲۱}$$

$$(۱۰) \int \frac{لا فرلا}{(۸+۲۱+۲۱)} = لوک \frac{۲(۲+۲۱)}{(۲+۲۱)}$$

$$(۱۱) \int \frac{(۱-۲۱)}{(۲-۲۱)(۳-۲۱)} فرلا = لا - ۲ لوک (۲-۲۱) + ۸ لوک (۳-۲۱)$$

$$(۱۲) \int \frac{(۱+۲۱)+۲}{۱-۲۱-۲۱} فرلا = لا + \frac{۳}{۵} لوک (۱+۲۱-۵) - \frac{۳}{۵} لوک (۱-۲۱-۵)$$

$$(۱۳) \int \frac{۲۱-۱}{۲۱-۱} فرلا = لا + \frac{۲۱}{۳} + \frac{۲۱}{۵} + \dots + \frac{۱}{۱-۲۱} \times \frac{۱-۲۱}{۱-۲۱}$$

$$(۱۴) \int \frac{۲۱(۱-۱)-۱}{۲۱+۱} فرلا = لا - \frac{۱}{۳} + \frac{۲۱}{۵} + \dots + \frac{۱}{۱-۲۱} \times \frac{۱-۲۱}{۱-۲۱}$$

امثل ۲۶

$$(۱) \int \frac{۱}{۲۱} جبّا \frac{۳}{۲۱} لا$$

$$(۲) \int \frac{۱}{۳۱} جبّا \frac{۳}{۲۱} لا$$

$$(۳) \int \frac{۱}{(۱-۲۱)} جبّا (۲-۱) لا$$

$$(۴) \int \frac{فرلا}{(۱+لا)۲} = جنز (۱+لا)$$

$$(۵) \int \frac{فرلا}{(۱-لا)۲} = جنز (۱-لا)$$

$$(۶) \int \frac{فرلا}{(۱+لا)۳} = \frac{۱}{۳} جنز \frac{۱+لا}{۲}$$

$$(۷) \int \frac{فرلا}{(۱-لا)۳} = \frac{۱}{۳} جنز \frac{۱-لا}{۲}$$

$$(۸) \int \frac{فرلا}{(لا-۱)۲} = جنم (۱-\frac{لا}{۱})$$

$$(۹) \int \frac{فرلا}{(لا-۱)۳} = \frac{۱}{۳} جنم (۱-\frac{لا}{۱}) + \frac{۱}{۲} جنم \frac{۱-لا}{۱}$$

$$(۱۰) \int \frac{فرلا}{(لا+۱)۲} = جنم \frac{لا+۱}{لا-۱}$$

$$(۱۱) \int \frac{فرلا}{(لا-۱)۲} = جنم \frac{لا-۱}{لا+۱} + جنم \frac{لا}{لا-۱}$$

امشله ۲

متغیر کی تبدیلی

$$(۱) \int \frac{لا فرلا}{(لا-۱)۳} = \frac{۱}{۳} لوک \frac{۱}{لا-۱}$$

$$(۲) \int \frac{لا فرلا}{(لا-۱)۴} = \frac{۱}{۴} لوک \frac{لا+۱}{لا-۱}، \int \frac{لا فرلا}{(لا+۱)۴} = \frac{۱}{۴} لوک \frac{لا-۱}{لا+۱}$$

$$(۳) \int \frac{لوک لا فرلا}{لا} = \frac{۱}{۲} (لوک لا)$$

$$(۲) \quad \text{ج ب لا جم لا فر لا} = \frac{۱}{۲} \text{ج ب لا}$$

$$(۵) \quad \text{ج ب لا} = \frac{\text{ج ب لا}}{۱-۱} \text{فر لا} = \frac{۱}{۲} (\text{ج ب لا})$$

$$(۶) \quad \text{ج ب لا} = \frac{\text{ج ب لا}}{۱-۱} \text{فر لا} = \text{لوک (ا ب ج لا)}$$

$$\text{ج ب لا} = \frac{\text{ج ب لا}}{۱-۱} = \frac{۱}{۲} \text{لوک (لو + ب ج لا)}$$

$$(۷) \quad \text{ج ب لا جم لا فر لا} = \frac{۱}{۳} \text{ج ب لا}$$

$$(۸) \quad \text{ج ب لا جم لا} = \frac{\text{ج ب لا}}{۱-۱} \text{فر لا} = \frac{۱}{۲} \text{لوک (ا ج ب لا + ب ج لا)}$$

$$(۹) \quad \text{مس لا فر لا} = \frac{۱}{۲} \text{مس لا + لوک جم لا}$$

$$(۱۰) \quad \text{ج ب لا} = \frac{\text{ج ب لا}}{۱-۱} \text{فر لا} = \frac{۱}{۳} \text{قط لا}$$

$$(۱۱) \quad \text{قط لا فر لا} = \text{مس لا} + \frac{۱}{۳} \text{مس لا}$$

$$(۱۲) \quad \text{قط لا + مس لا} = \text{فر لا} = \text{لوک} = \frac{۱}{۱-۱} \text{ج ب لا}$$

$$\text{قط لا - مس لا} = \text{فر لا} = \text{لوک (ا ب ج لا)}$$

$$(۱۳) \quad \text{فر لا} = \frac{\text{فر لا}}{۱-۱} = \text{تم لا - مم لا}$$

$$(۱۴) \quad \text{فر لا} = \frac{\text{فر لا}}{۱-۱} = \text{مس لا - قط لا} = \frac{۱}{۱-۱} \text{مس لا + قط لا}$$

$$(۱۵) \int \frac{\text{فرلا}}{\text{جب لا جم لا}} = \text{مس لا} - \text{مم لا}$$

$$(۱۶) \int \frac{\text{فرلا}}{\text{جب لا جم لا}} = \text{قط لا} + \text{لوک مس لا}$$

$$(۱۷) \int \frac{\text{فرلا}}{\text{جب لا جم لا}} = \frac{۱}{۲} \text{قط لا} + \text{لوک مس لا}$$

$$(۱۸) \int \frac{\text{فرلا}}{\text{مس لا}} = \frac{۱}{۲} \text{لا} + \frac{۱}{۲} \text{لوک رجیم لا} + \text{جب لا}$$

$$(۱۹) \int \frac{\text{فرلا}}{\text{لا جم لا}} = \frac{۱}{۲} \text{سن} - \frac{۱}{۲} \text{مس لا}$$

$$(۲۰) \int \frac{\text{لا لا لا} + \text{لا لا}'}{\text{فرلا}} = \frac{۱}{۴} (\text{لا} + \text{لا}')^{\frac{۴}{۳}}$$

$$(۲۱) \int \frac{\text{فرلا}}{\text{لا (لا + ۱)}} = \frac{۱}{\text{ن}} \text{لوک} \frac{\text{لا}^{\text{ن}}}{\text{لا} + ۱}$$

$$(۲۲) \text{زایدی ابدالوں سے} \int \frac{\text{لا لا} + \text{لا لا}'}{\text{فرلا}} \text{ اور } \int \frac{\text{لا لا} - \text{لا لا}'}{\text{فرلا}} \text{ کی قیمتیں}$$

دریافت کرو۔

$$(۲۳) \int \frac{\text{فرلا}}{\text{لا لا لا} + ۱} = - \frac{\text{لا لا} + ۱}{\text{لا}}$$

$$(۲۴) \int \frac{\text{فرلا}}{\text{لا لا لا} - ۱} = - \frac{\text{لا لا} - ۱}{\text{لا}}$$

$$(۲۵) \int \frac{\text{لا لا}'}{\text{لا لا} + ۱} = \frac{۱}{۲} (\text{لا لا}')^{\frac{۲}{۳}} + \text{لا لا}'$$

امثله ۲۸ تکمل بالخصص

$$(۱) \quad \text{لا فولا} \text{ لا فولا} = \text{لا} (\text{لا} - \text{لا}) \text{ فولا}$$

$$(۲) \quad \text{لا لوگ لا فولا} = \frac{۱}{۲} \text{ لا} (\text{لوگ لا} - \frac{۱}{۲})$$

$$(۳) \quad \text{لا}^{\text{ا}} \text{لوگ لا فولا} = \frac{\text{لا}^{\text{ا}+\text{ا}}}{\text{ا}+\text{م}} (\text{لوگ لا} - \frac{۱}{\text{ا}+\text{م}})$$

$$(۴) \quad \text{لا جب لا فولا} = \text{لا جم لا} + \text{جب لا}$$

$$(۵) \quad \text{لا جم لا فولا} = \text{لا جب لا} + \text{جم لا}$$

$$(۶) \quad \text{لا جب لا جم لا فولا} = \frac{۱}{۲} \text{ لا جم لا} + \frac{۱}{۲} \text{ جب لا}$$

$$(۷) \quad \text{لا جم لا جم لا فولا} = \frac{\text{لا جم لا} - \text{لا جم لا}}{\text{م}^2 - \text{ن}^2}$$

$$(۸) \quad \text{لا جب لا جب لا فولا} = \frac{\text{لا جب لا} - \text{لا جب لا}}{\text{م}^2 - \text{ن}^2}$$

$$(۹) \quad \text{لا جب لا جم لا فولا} = \frac{\text{لا جم لا} - \text{لا جم لا}}{\text{م}^2 - \text{ن}^2}$$

$$(۱۰) \quad \text{لا جب لا فولا} = \text{لا جب لا} + \text{لا} - \text{لا}$$

$$(۱۱) \quad \text{لا مس لا فولا} = \text{لا مس لا} - \text{لوگ لا} + \text{لا}$$

$$(۱۲) \quad \text{لا قط لا فولا} = \text{لا قط لا} - \text{جنز لا}$$

$$(۱۳) \quad \text{ل لا سس - لا فر لا} = \frac{1}{4} (1 + \text{لا}^2) \text{سس - لا} - \frac{1}{4} \text{لا}$$

$$(۱۴) \quad \text{ل لا قط لا فر لا} = \text{لا سس لا} + \text{لوک جم لا}$$

$$(۱۵) \quad \text{ل لا + جب لا فر لا} = \frac{\text{لا سس لا}}{1 + \text{جم لا}}$$

$$(۱۶) \quad \text{ل لا جب لا فر لا} = \frac{\text{لا سس لا}}{1 - \text{لا}} - \frac{1}{1 - \text{لا}} \text{لا جب لا} + \text{لا}$$

$$(۱۷) \quad \text{ل جم لا جم لا فر لا} = \frac{1}{4} (\text{جب لا جم لا} + \text{جم لا جب لا})$$

$$(۱۸) \quad \text{ل جب لا جب لا فر لا} = \frac{1}{4} (\text{جم لا جب لا} - \text{جب لا جم لا})$$

$$(۱۹) \quad \text{ل جم لا جب لا فر لا} = \frac{1}{4} (\text{جب لا جب لا} - \text{جم لا جم لا})$$

$$(۲۰) \quad \text{ل جب لا جم لا فر لا} = \frac{1}{4} (\text{جم لا جم لا} + \text{جب لا جب لا})$$

$$(۲۱) \quad \text{ل فوجب لا جم لا فر لا} = \frac{1}{11} (\text{جب}^2 \text{لا} - 2 \text{جم}^2 \text{لا}) \text{فو}$$

$$(۲۲) \quad \text{ل لا فو لا فر لا} = - (\text{لا}^4 + 5 \text{لا}^3 + 20 \text{لا}^2 + 40 \text{لا} + 120) \text{فو}$$

$$(۲۳) \quad \text{ل لا جب لا فر لا} = - (\text{لا}^4 - 12 \text{لا}^3 + 24 \text{جم لا} + 24 \text{لا}^2 - 24 \text{لا}) \text{جب لا}$$

$$(۲۴) \quad \text{اگر عن} = \text{ل لا جم لا فر لا} \text{ اور } \text{و} = \text{ل لا جب لا فر لا}$$

تو ثابت کرو کہ عن = لا جب لا - ن و اور و = لا جم لا - ن ع۔

اس کی مدد سے ہم اور وہ کی قیمتیں دریافت کرو

$$\{ \text{ع} = (\text{لا}^4 + 12 \text{لا}^3 + 24 \text{جم لا} - 24 \text{لا}^2 - 24 \text{لا}) \text{جب لا} \}$$

$$\text{و} = (\text{لا}^4 + 12 \text{لا}^3 + 24 \text{جم لا} - 24 \text{لا}^2 - 24 \text{لا}) \text{جب لا}$$

(۲۵) اگر ع متغیر لا کا منطق صحیح تفاعل ہے تو ثابت کرو کہ

(۲۶) سرول ا اور جب کی قیمت دریافت کرو کہ

$$\frac{\text{فرلا}}{(ا + ب \cdot جم لا)} = \frac{\text{ا جب لا}}{(ا + ب \cdot جم لا)} + \frac{\text{ب}}{(ا + ب \cdot جم لا)}$$

$$[ا = \frac{ب}{ا + ب} \cdot ب = \frac{ب}{ا + ب}]$$

۱۹۸

مشل ۲۹

(منطق کسور)

(۱) $\int \frac{\text{فرلا}}{(ا - لا)(ا - لا)} = \frac{\text{لوک}}{(ا - لا)}$

(۲) $\int \frac{\text{فرلا}}{(ا - لا)(ا - لا)} = \frac{ا + لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)}$

(۳) $\int \frac{\text{فرلا}}{(ا - لا)(ا - لا)} = \frac{ا}{ا - لا} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)} = \frac{ا}{ا - لا} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)}$

(۴) $\int \frac{\text{فرلا}}{(ا - لا)(ا - لا)} = \frac{ا - لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)} = \frac{ا - لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)}$

(۵) $\int \frac{\text{فرلا}}{(ا - لا)(ا - لا)} = \frac{ا - لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)} = \frac{ا - لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)}$

(۶) $\int \frac{\text{فرلا}}{(ا - لا)(ا - لا)} = \frac{ا - لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)} = \frac{ا - لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)}$

(۷) $\int \frac{\text{فرلا}}{(ا - لا)(ا - لا)} = \frac{ا - لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)} = \frac{ا - لا}{(ا - لا)(ا - لا)} \cdot \frac{ا(ا - لا)}{ا(ا - لا)}$

$$\frac{\text{ب}^2 \text{لوک} (\text{لا} - \text{ب})}{(\text{ب} - \text{ج}) (\text{ج} - \text{ل})} + \frac{\text{ج}^2 \text{لوک} (\text{لا} - \text{ج})}{(\text{ج} - \text{ل}) (\text{ل} - \text{ب})}$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{(\text{لا} + \text{ل}) (\text{لا} + \text{ب})} = \frac{1}{\text{ج}^2 - \text{ل}^2} \left(\frac{\text{ل}}{\text{ل} - \text{ب}} - \frac{\text{لا}}{\text{لا} - \text{ب}} \right) \quad (۸)$$

$$\int \frac{\text{لا فرلا}}{(\text{لا} + \text{ل}) (\text{لا} + \text{ب})} = \frac{1}{(\text{ب} - \text{ل})^2} \text{لوک} \frac{\text{لا} + \text{ل}}{\text{لا} + \text{ب}} \quad (۹)$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{(\text{لا} + \text{ل}) (\text{لا} + \text{ب})} = \frac{1}{\text{ل} - \text{ب}} \left(\text{لوک} \frac{\text{لا}}{\text{لا} + \text{ب}} - \frac{\text{لا}}{\text{لا} - \text{ب}} \right) \quad (۱۰)$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{(\text{لا} + \text{ل}) (\text{لا} + \text{ب})} = \frac{1}{\text{ل} - \text{ب}} \left\{ \text{لوک} (\text{لا} + \text{ل}) - \frac{\text{لا}}{\text{لا} - \text{ب}} \right\} \quad (۱۱)$$

$$\int \frac{\text{لا فرلا}}{\text{ل}^2 (\text{لا} + \text{ل}) (۱ + \text{ل})} = - \frac{2}{\text{ل} + ۲} + \text{لوک} \frac{\text{لا} + ۲}{۱ + \text{ل}} \quad (۱۲)$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{\text{ل}^2 (\text{لا} + \text{ل}) (۱ + \text{ل})} = \frac{۲}{\text{ل} + ۲} + \text{لوک} (\text{لا} + ۱) \quad (۱۳)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{\text{ل}^2 (\text{لا} - \text{ل}) (۱ + \text{ل})} = \frac{1}{۳} \text{لوک} \frac{\text{لا} + ۱}{۱ - \text{ل}} - \frac{1}{۲} \times \frac{1}{۱ - \text{ل}} \quad (۱۴)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{\text{ل}^2 (۱ - \text{ل}) (\text{لا} - \text{ل})} = - \frac{1}{۲} \times \frac{\text{لا}}{۱ - \text{ل}} + \frac{1}{۳} \text{لوک} \frac{\text{لا} + ۱}{۱ - \text{ل}} \quad (۱۵)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{\text{ل}^2 (\text{لا} - ۱) (\text{لا} - \text{ل})} = \frac{۲ - \text{لا}}{(\text{لا} - ۱) (\text{لا} - \text{ل})} + ۲ \text{لوک} \frac{\text{لا}}{\text{لا} - ۱} \quad (۱۶) \quad ۱۹۹$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{\text{ل}^2 (۱ - \text{ل}) (\text{لا} - \text{ل})} = - \frac{1}{۲} \times \frac{\text{لا}}{۱ - \text{ل}} - \frac{1}{۳} \text{لوک} \frac{\text{لا} + ۱}{۱ - \text{ل}} \quad (۱۷)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{\text{ل}^2 (\text{لا} - ۱) (\text{لا} - \text{ل})} = - \frac{۳}{۳} \text{لوک} \frac{\text{لا} - ۱}{۱ + \text{ل}} - \frac{1}{۲} \times \frac{\text{لا}}{۱ - \text{ل}} \quad (۱۸)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{(1+\text{لا})^2} = -\frac{1}{\text{لا}} + \frac{1}{2\text{لا}^2} - \text{لوک} (1+\text{لا}) + \text{لوک لا} \quad (19)$$

$$\int \frac{2+\text{لا}}{(1+\text{لا})^3} = \text{فرلا} = 2\text{لوک} \frac{\text{لا}}{1+\text{لا}} - \frac{2}{1+\text{لا}} + \frac{1}{2(1+\text{لا})^2} \quad (20)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{(1-\text{لا})^3} = \frac{3}{14} \text{لوک} \frac{1-\text{لا}}{1+\text{لا}} + \frac{3}{8} \times \frac{\text{لا}}{1-\text{لا}} - \frac{1}{2} \times \frac{\text{لا}}{(1-\text{لا})^2} \quad (21)$$

$$\int \frac{1+\text{لا}}{(1+\text{لا})^2} = \text{فرلا} = \text{لوک} \frac{\text{لا}}{2\text{لا}+1} + \text{مس لا} \quad (22)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{\text{لا}-1} = \frac{1}{2} \text{لوک} \frac{1+\text{لا}}{\text{لا}-1} + \frac{1}{2} \text{مس لا} \quad (23)$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{\text{لا}-1} = \frac{1}{4} \text{لوک} \frac{1+\text{لا}}{\text{لا}-1} - \frac{1}{20} \text{مس لا} \quad (23)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{3\text{لا}+1} = \frac{1}{4} \text{لوک} \frac{(1+\text{لا})^2}{2\text{لا}+1} + \frac{1}{32} \text{مس} \frac{1-2\text{لا}}{3} \quad (25)$$

$$\int \frac{\text{لا} \text{فرلا}}{2\text{لا}+1} = \frac{1}{4} \text{لوک} \frac{1-\text{لا}}{2(1+\text{لا})} + \frac{1}{32} \text{مس} \frac{1-2\text{لا}}{3} \quad (26)$$

$$\int \frac{\text{فرلا}}{(1+\text{لا})(1+\text{لا}^2)} = \frac{1}{2} \text{لوک} (1+\text{لا}) - \frac{1}{4} \text{لوک} (1+\text{لا}^2) + \frac{1}{4} \text{مس لا} \quad (27)$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{(1+\text{لا})(1+\text{لا}^2)} = \frac{1}{2} \text{لوک} (1+\text{لا}) + \frac{1}{4} \text{لوک} (1+\text{لا}^2) - \frac{1}{4} \text{مس لا} \quad (28)$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{2\text{لا}^2+\text{لا}+1} = \frac{1}{4} \text{لوک} \frac{1-\text{لا}}{1+\text{لا}} + \frac{2}{3} \text{مس} \frac{\text{لا}}{2} \quad (29)$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{(1+\text{لا})(1+\text{لا}^2)} = \text{لوک} (1+\text{لا}^2) - \frac{1}{4} \text{لوک} (1+\text{لا}) \quad (30)$$

$$\int \frac{\text{لا}^2 \text{فرلا}}{(1+\text{لا})(1+\text{لا}^2)} = \frac{1}{2} \text{لوک} (1+\text{لا}^2) - \frac{1}{4} \text{لوک} (1+\text{لا}) + \frac{1}{2} \text{مس} \frac{1}{(1+\text{لا})^2} \quad (31)$$

$$\int \frac{لا^۲ - ۱}{لا^۲ + لا + ۱} فرلا = \frac{۱}{۲} لوک \frac{لا^۲ - لا - ۱}{لا^۲ + لا + ۱} \quad (۳۲)$$

$$\int \frac{فرلا}{لا^۴ + لا^۲} = مسن لا + \frac{۱}{لا} - \frac{۱}{۳ لا^۳} \quad (۳۳)$$

$$\int \frac{لا^۳ فرلا}{لا^۴ + لا^۲} = \frac{لا^۲ + ۱}{۲(لا^۲ + ۱)۴} + \dots \quad (۳۴)$$

$$\int \frac{فرلا}{لا^۴ + لا^۲} = \frac{فرلا}{۲(لا^۲ + ۱)۲} - \frac{۳ + ۲ لا^۲}{۲(لا^۲ + ۱)۲} - \frac{۳}{۲} مسن لا \quad (۳۵)$$

$$\int \frac{فرلا}{لا^۴ + لا^۲} = \frac{۱}{۲ لا^۴} لوک \frac{لا^۲ + لا - ۱}{لا^۴ + لا^۲} \quad (۳۶)$$

$$+ \frac{۱}{۲ لا^۲} مسن \frac{لا^۲ + لا - ۱}{لا^۴ + لا^۲}$$

$$\int \frac{لا^۲ فرلا}{لا^۴ + لا^۲} = \frac{۱}{۲ لا^۴} لوک \frac{لا^۲ + لا - ۱}{لا^۴ + لا^۲} \quad (۳۷)$$

$$+ \frac{۱}{۲ لا^۲} مسن \frac{لا^۲ + لا - ۱}{لا^۴ + لا^۲}$$

امثل ۳

(غیر متعلق تفاعل)

$$\int \frac{لا^۲ + لا - ۱}{لا^۴ + لا^۲} فرلا = \frac{۲}{۳} (لا + ۱) - \frac{۲}{۳} (لا + ۱) \times \frac{۲}{۳} \quad (۱)$$

$$\int \frac{فرلا}{لا^۴ + لا^۲} = \frac{۲}{۳ (لا - ۱)} \left\{ (لا + ۱) - \frac{۲}{۳} (لا + ۱) \right\} \quad (۲)$$

$$\int \frac{فرلا}{لا^۴ + لا^۲} = \frac{۲}{۳ (لا - ۱)} لوک (لا - ۱) \quad (۳)$$

- (۴) $\int \frac{فرلا}{(لا-۱)لا} = \text{لوک} \frac{۱+لا}{لا-۱}$
- (۵) $\int \frac{فرلا}{(لا-۱)لا+۱} = \frac{۱}{۲} \text{ مستر} \frac{لا+۱}{۲}$
- (۶) $\int \frac{فرلا}{(لا+۱)لا-۱} = \frac{۱}{۲} \text{ مستر} \frac{لا-۱}{۲}$
- (۷) $\int \frac{فرلا}{لا+لا-۱} = \text{لوک} (لا+لا-۱) \frac{۲}{۳} \text{ مستر} \frac{۲}{۳} \frac{۱+لا-۱}{۳}$
- (۸) $\int \frac{لا}{لا-۱} = \frac{فرلا}{لا-۱} + \frac{۱}{لا+۱} \text{ لوک} \frac{لا-۱}{لا+۱}$
- (۹) $\int \frac{فرلا}{لا+لا-۱} = \text{لوک} \frac{لا+لا-۱}{لا+لا+۱}$
- (۱۰) $\int \frac{فرلا}{لا+لا-۱} = -\frac{لا+لا}{لا} - \frac{۱}{۲} \text{ لوک} \frac{لا+لا-۱}{لا+لا+۱}$
- (۱۱) $\int \frac{لا^۲ فرلا}{لا+لا+۱} = \frac{۱}{۲} لا \frac{لا+لا+۱}{لا+لا+۱} - \frac{۱}{۲} \text{ جبن} لا$
- (۱۲) $\int \frac{لا^۲ فرلا}{(لا+۱)لا} = -\frac{لا}{لا+لا+۱} + \text{جبن} لا$
- (۱۳) $\int \frac{فرلا}{(لا+۱)لا-۱} = \frac{۱}{۲} \text{ مستر} \frac{لا}{لا-۱}$
- (۱۴) $\int \frac{فرلا}{(لا-۱)لا+۱} = \frac{۱}{۲} \text{ لوک} \frac{لا+لا+۱}{لا-۱}$



ساتواں باب

محدود تکملے

۲۰۱

۸۷۔ تمہید۔ رقبوں کا سوال۔ تکمل کے سوال کا جو مفہوم اب ہم بیان کر چکے اس کے لحاظ سے یہ سوال بہت قدیم ہے لیکن اس کے حل کا عام طریقہ حال میں ہی نیوٹن اور لیب نیز کے وقت میں حاصل ہوا۔ اس دفعہ اور انکی دفعہ میں اس طریقہ کو منطقی تفصیلات میں جانے کے بغیر مختصر طور پر بیان کیا جائیگا اور یہ مان لیا جائیگا کہ ”رقبوں کا سوال“ کافی طور پر اس طریقہ کی تشبیلی ندرت ہے۔ اس طرح اصل اصول آسانی سے سمجھ میں آجائیگا۔ اسکے بعد دفعات ۸۹ تا ۹۴ میں اس سوال پر نئے سرے سے زیادہ عام اور دقیق نقطہ نظر سے بحث کی جائے گی۔


فرض کرو کہ وہ رقبہ دریافت کرنا مطلوب ہے جو سلسلہ منحنی

فأ = فبا (لا) (۱)

محور لا اور معینوں لا = ا، لا = ب کے درمیان گھرا ہوا ہے یقین کی خاطر یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ا، لا کی سمت زیر بحث میں مثبت ہے اور ب < ا۔ اس سمت ب۔ ا کو ہم ذیلی حصوں ہ، ہ، ہ، ہ، ہ

☆ اس دفعہ اور انکی دفعہ میں لفظ ”رقبہ“ کو عام و جدائی یا عقلی مفہوم کے مطابق لیا جائے گا جدید نقطہ نظر سے رقبہ کی نئی تعریف ضروری ہے۔ دیکھو دفعہ ۹۹۔

میں تقسیم کرتے اور ان کو قاعدے مان کر مستطیلوں کا ایک سلسلہ بناتے ہیں جن کے ارتفاع ترتیب وار $ما'، ما'، ما'، ...$ مان منحنی کے ایسے معین ہیں




۲۰۲۔ جنہیں مختلف قاعدوں کے اندر کے کسی اختیاری نقطوں سے منحنی تک کھینچا گیا ہے۔ اس طور پر جو مستطیل بنائے جائیں ان کے رقبوں کا مجموعہ رقبہ مطلوبہ کا ایک تقرب ہو گا۔ ممکن ہے کہ یہ تقرب رقبہ کو صحیح طور پر تعبیر کرے لیکن یہ ظاہر ہے کہ ذیلی حصوں $ہا'، ہا'، ہا'، ...$ ہن کو جتنا چھوٹا لیا جائیگا یعنی تقسیم کے حصوں کی متناظر تعداد جب قدر زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ تقرب بہتر ہوگا۔ ان مستطیلوں کے مجموعہ کی آہٹا جبکہ حصوں کو لا آہٹا چھوٹا بنا دیا جائے مطلوبہ رقبہ ہو گا۔

احصا کی ایجاد سے پہلے اسی طرح کا عمل یا اسکے مرادف کوئی اور عمل ہر منحنی کے لئے بشرط امکان الگ طور پر کیا جاتا تھا، اکثر اوقات یہ طریقے نہایت فہیم اور خوش فکر ہو کرتے تھے۔ ذیل کی مثالیں بطور توضیح کے دی جاتی ہیں۔

مثال ۱۔ جو رقبہ مکانی $ما = لا'$ ، محور $لا$ اور معینوں $لا = لا'$ کے ب کے

درمیان گھرا ہوا ہے اسے دریافت کرو۔



رکھو $h_1 = h_2 = \dots = h_n = h$ تو

$$h_1 = h_2 = \dots = h_n = h \quad \text{.....} \quad h_1 = h_2 = \dots = h_n = h$$

ہمیں ذیل کے مجموعہ پر غور کرنا ہے

$$h_1 + h_2 + \dots + h_n = h \{ 1 + (1-n) + \dots + (1-n) \}$$

$$= h \{ 1 + (1-n) + \dots + (1-n) \}$$

$$= h \{ 1 + (1-n) + \dots + (1-n) \}$$

$$= h \{ 1 + (1-n) + \dots + (1-n) \}$$

جب 'n' مال بہ لاتنا ہی ہوتا ہے تو اسکی انتہائی قیمت ہوتی ہے

$$h \{ 1 + (1-n) + \dots + (1-n) \}$$

مثال ۲۔ منحنی کی عام صورت $y = a^x$ (۴) جہاں 'a' کی کوئی
صحیح یا کمزور قیمت، مثبت یا منفی سوائے ۱ کے ہو اس طور پر بحث میں آ سکتی ہے۔
سنت (ب-۱) کے نقاط تقسیم کے فضلوں کو حسابی سلسلہ میں لینے کی بجائے
جیسے عام طور پر لیا جاتا ہے ہندسی سلسلہ میں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح فصلے یہ ہوتے ہیں
 $\frac{1}{a}, \frac{1}{a^2}, \frac{1}{a^3}, \dots, \frac{1}{a^n}$ جہاں $\frac{1}{a} = \frac{1}{a^1}$

ذیل کے مجموعہ کی انتہا پر غور کرنا ہوگا

$$\Sigma = \{ \text{جب } (ع + \frac{3}{2}) + \text{جب } (ع + \frac{3}{2}) + \dots + \text{جب } (ب - \frac{3}{2}) \}$$

۲۰۲ جہاں ہر وقفہ کے وسط پر جب لاکھ قیمتیں لگی گئی ہیں۔ اب

$$\frac{\text{جب } \frac{3}{2}}{\frac{3}{2}} = \Sigma = 2 \text{ جب } \frac{3}{2} \text{ جب } (ع + \frac{3}{2}) + 2 \text{ جب } \frac{3}{2} \text{ جب } (ع + \frac{3}{2})$$

$$+ \dots + 2 \text{ جب } \frac{3}{2} \text{ جب } (ب - \frac{3}{2}) + 2 \text{ جب } \frac{3}{2} \text{ جب } (ب - \frac{3}{2}) \\ = \text{جم } ع - \text{جم } (ع + \frac{3}{2}) \\ + \text{جم } (ع + \frac{3}{2}) - \text{جم } (ع + \frac{3}{2})$$

$$\text{جم } (ب - \frac{3}{2}) - \text{جم } (ب - \frac{3}{2})$$

$$+ \text{جم } (ب - \frac{3}{2}) - \text{جم } (ب - \frac{3}{2})$$

$$= \text{جم } ع - \text{جم } (ب - \frac{3}{2}) \dots \dots \dots (۱۳)$$

اس لئے انتہا کی طرف گزرتے سے (ع ← ۰) مطلوبہ رقبہ ہے

$$\text{جم } ع - \text{جم } (ب - \frac{3}{2}) \dots \dots \dots (۱۴)$$

۸۸۔ مقلوب تفرق کے ساتھ تعلق۔ اوپر کی طرح کے حسابات


تکمیلی احصائے قاعدہ کی مدد سے عمل میں لائے جاتے ہیں اس کی طرف اب ہم متوجہ ہوتے ہیں اگر کوئی ثابت رکھا جائے اور ب کو بدلا جائے تو دفعہ ۸ کا رقبہ

ب کا تقابل ہے اور یہ تقابل صفر ہوتا ہے جبکہ ب = ۰۔ اگر ب کو صفائی اضافہ مف ب دیا جائے تو رقبہ کا اضافہ آخر الامر ایک مستطیل سے رقبہ کے مساوی ہوگا جس کا عرض مف ب اور ارتفاع فہ (ب) ہے (دیکھو دفعہ ۵۴) پس اگر رقبہ زیر بحث ہی ہو تو

$$\text{مف ق} = \text{فہ (ب) مف ب} \dots \dots \dots (۱)$$

یا

$$\text{فرق} = \text{فہ (ب)} \dots\dots\dots (۲)$$



شکل ۴۵

اگر پہ (لا) ایک ایسا متغیر ہو کہ پہ (لا) = فہ (لا) یعنی پہ (لا) فہ (لا) کا "نامحدود شکل" ہو تو

$$\text{فرق} = \text{پہ (ب)} \dots\dots\dots (۳)$$

دفعہ ۵۶ سے حاصل ہوتا ہے کہ

ق = پہ (ب) + م (۴)

جہاں م مستقل ہے اور چونکہ ق صفر ہوتا ہے ب = م کے لئے اسلئے لازماً ہونا چاہئے م = پہ (ب) پس ق = پہ (ب) - پہ (ب) (۵)

گویا رقبہ معلوم کرنے کا سوال اس طرح نامحدود شکل کے سوال میں بدل گیا جس پر گزشتہ باب میں بحث کی گئی ہے۔

مثال ۱۔ اگر فہ (لا) = لا تو پہ (لا) = $\frac{۱+۳}{۱+۳}$ اور

اگر فضا (لا) = $\frac{1}{8}$ تو پہلا (لا) = لوک (لا) اور قی = لوک $\frac{7}{8}$ (۴)

مثال ۲۔ اگر $f(x) = (x-1)^2 + 2$ ہو تو $f(x)$ کی کم ترین قیمت کا مجموعہ x کی تمام ممکنہ قیمتوں کے ساتھ کیا ہے؟

اور قیاس - حجم بہا - (- حجم ص) = حجم ص - حجم بہا (۸)

۸۹۔ تنکلمہ کی عام تعریف۔ ترقیم۔ چھوٹی یا صفاری مقداروں کے

ایک سلسلہ کی اقامتی قیمت دریافت کرنے کا عمل ایسا ہے جس کے علم ہند
اور علم عمل میں بیشمار استعمال اور اطلاق ہیں۔ اب ہم اس پر باضابطہ طور پر
بحث کریں گے اور ساتھ ہی ان امور کی طرف توجہ کریں گے جو محض نظری اہمیت
رکھتے ہیں اور جن سے انہیں قطع نظر کی گئی ہے۔

فرض کرو کہ ما = فہم (لا)، لا کا تفاعل ہے اور اسکو ہم معلوم (اور اسلئے محمد) فرض کرتے ہیں اور سے ب تک (بشمول طہین) لا کی تمام قیمتوں کے لئے۔ فرض کرو کہ سعت ب۔ اور کو وقفوں

کی کسی تعداد میں تقسیم کیا گیا ہے، ان سب وقفوں کی ایک ہی علامت ہے اور

(۲)..... ۱-ب = ۱ + ... + ۱ + ۱ + ۱

۴۰۲ فرض کرو کہ یا کی ایک قیمت ۱۰ ہے جو ۱۰ وقفہ ۱۱ میں اختیار کرتا ہے اور ۱۰ کی ایک قیمت ۱۰ ہے جو یہ وقفہ ۱۱ میں اختیار کرتا ہے، علیٰ ہذا القیاس اور فرض کرو کہ

$$(3) \dots\dots\dots \frac{1}{2} + \dots\dots\dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 3$$

اس حاصل جمع کی قیمت عام طور پر ایک توسعت ب۔ ا کے طریقہ تقسیم کے ساتھ بدلیگی اور دوسرے ان مختلف وقفوں (۱) کے اندر قیمتوں 'ا'، 'ب'، 'ج' کے انتخاب پر۔ لیکن اگر یہ شرط عائد کر دی جائے

کہ ان میں سے کوئی وقفہ بھی ایک مقررہ مقدار ک سے تجاوز نہیں کر سکتا تو بعض صورتوں میں ہم دیکھنے لگے آ اور ان صورتوں میں اکثر ایسے تفاعلوں کے نمونے شامل ہونگے جن سے احصا کے استعمال کی ضمن میں واسطہ پڑنا سے اور گئی اور ا کہ ج کی قیمت ک کے کم ہونے کے ساتھ ایک معین انتہائی قیمت سے اس کی طرف اس طور پر رال ہوتی ہے کہ ک کو کافی طور پر چھوٹا لینے سے اس امر کا یقین ہو سکتا ہے کہ ج کا تفاوت سے سے کسی چھوٹی سے چھوٹی مقررہ مقدار کی نسبت کم ہوگا۔

جس مجموعہ کو ج سے تعبیر کیا گیا ہے اسے زیادہ تفصیل سے یوں بیان کر سکتے ہیں

ج ب و امف لا یا ج ب ف د (لا) م ف ب لا (۳)

جہاں م ف ب لا کو لا کے اضافوں 'ا'، 'ب'، 'ج' کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ جب اضافے م ف ب لا تمام لا انتہا چھوٹے ہوتے ہیں اور اس لئے انکی تعداد لا انتہا بڑھتی ہے تو اس انتہائی قیمت کو (جیکہ اسکا وجود ہو) جسکی طرف یہ مجموعہ مستحق ہوتا ہے حدود ا اور ب کے درمیان ف د (لا) کا "محدود تکملہ" کہتے ہیں اسے ہم

ک م ف ب لا یا ک ب ف د (لا) ف ب لا (۵) $\int_a^b y dx$

سے تعبیر کریں گے اس سے ترقیم کو اختیار کرنے سے مل کی وہ منہ لیں جن سے

انتہائی قیمت حاصل کی گئی تھی بیش نظر رہتی ہیں⁺۔

ایسے سوالات جن میں (۳) جیسے مجموعہ کی انتہائی قیمت مطلوب ہوتی ہے علم ریاضی کی تقریباً ہر شاخ میں پائے جاتے ہیں۔ تنقہنی کے رقبہ پر پہلے بحث کی گئی ہے۔ اور دیگر سادہ مثالیں یہ ہیں۔ قوس کا طول جسے اندر (یا بیرونی) کثیر الاضلاع کے محیط کی انتہا خیال کیا جائے، گردشی مجسم کا حجم وغیرہ۔ آٹھویں باب میں ان پر خاص طور پر بحث کی جائے گی۔

حرکیات میں متغیر قوت کے دھکے (Impulse) کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ وقت کے کسی وقفہ میں قوت کا "زمانی تکملہ" ہے یعنی اگر قوت Q کا تفاعل خیال کیا جائے تو دھکے وقفہ t ۔ تب میں ذیل کے مجموعہ کی انتہائی قیمت ہے

$$Q_1 t_1 + Q_2 t_2 + \dots + Q_n t_n \dots (۶)$$

جہاں $t_1, t_2, \dots, t_n$ وقفہ t کے ذیلی حصے ہیں اس طور پر کہ

$$t_1 + t_2 + \dots + t_n = t \dots (۷)$$

اور $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ان وقفوں میں قوت کی قیمتیں ہیں۔ پس ہماری موجودہ ترسیم کے لحاظ سے دھکے ہے

$$Q \cdot t \dots (۸)$$

نوٹ:۔ تکملہ کی میں علامت $\int$ حرف s کی خاص صورت ہے اسکو پہلے ریاضی دانوں نے (Summation) حاصل جمع کی علامت کے لئے اختیار کیا۔ تکمل کی صحت کو اس طور پر ظاہر کرنے کا طریقہ فوریں کی ایجاد ہے۔

$\int$ فہ (لا) فر لا میں علامت $\int$ مجموعہ کا میسم (م) سمجھا جاتا ہے (مجموعہ)

نیوٹن کے دوسرے قانون حرکت کے مطابق کسی کمیت (گ) کے معیار کی تبدیلی اس دھکے کے مساوی ہوتی ہے جو اسے لگتا ہے یا

$$گ - گ' = \int ق فرت \dots \dots (9)$$

جہاں $گ'$ ابتدائی اور انتہائی رفتاریں ہیں۔
نیز متغیر قوت کا کام قوت کا مکانی تکملہ ہے۔ اگر قوت $ق$ جسم کے مقام $دس$ کا تفاعل ہو تو $س$ جیسے $س$ سے $س$ تک بلتا ہے کام جو کیا گیا ہے وہ ہے

$$\int ق فرس \dots \dots (10)$$

مثلاً گیس کی اکائی کمیت جب حجم $ج$ سے $ج'$ تک پھیلتی ہے تو جو کام ہوتا ہوگا

$$\int ج د فرج \dots \dots (11)$$

ہے اگر حجم $ج$ کے وقت دباؤ $د$ ہو۔ اسے ہم دیکھ سکتے ہیں اگر گیس کو اکائی رقبہ کی تراش کے اسطوانہ میں فشارہ کے ذریعہ بند کیا ہوا فرض کیا جائے تکملہ (۱۰) یا (۱۱) کی برسیی تعبیر اکثر اوقات عملیات میں استعمال کیجاتی ہے مثلاً (۱۰) کی صورت میں اگر ایک جسمی بنایا جائے جس میں سے فضلہ ہو اور $ق$ معین تو کام اس رقبہ سے تعبیر ہوگا جو جسمی $س$ کے محور اور $س$ اور $س'$ کے متناظر معینوں کے درمیان گھرا ہوا ہے یہ واٹ کی نامزدہ تصویر کا اصول ہے۔

۹۰۔ استدقاق کا ثبوت - جب مجموعہ $ج$ کی ایک

معین انتہائی قیمت ہو جیسا اور بیان ہوا تو فدا (لا) کو قابل تکمل کہا جاتا ہے۔

یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ ہر مسلسل تفاعل اس مفہوم کے مطابق قابل تکمل ہے لیکن باضابطہ ثبوت کے مد نظر ہم اپنی توجہ صرف اس خاص صورت تک محدود رکھینگے جس میں متغیر متبع کی سمیت محدود تعداد کے ایسے وقفوں میں تقسیم ہو سکتی ہے جن میں سے ہر ایک میں تفاعل یا تو استقلال کے ساتھ بڑھتا ہے یا استقلال کے ساتھ گھٹتا ہے۔ عملی نقطہ نظر سے یہ کافی ہوگا۔ (محدود ہونے کی قید کے علاوہ) کوئی اور قید عائد کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو ثابت حدود مقرر کئے جاسکتے ہیں جن کے درمیان $\sum$ لازماً واقع ہوتا ہے۔ اگر وقفہ (ب-ا) کے اندر تفاعل فدا (لا) کی قیمتوں کی نیچلی اور اوپر کی حدود (دفعہ ۱) لہا اور مہا ہوں تو ظاہر ہے کہ $\sum$ ذیل کے جملوں کے درمیان واقع ہوگا۔

$$لہا (ہم + ہم + ... + ہن) = لہا (ب-ا)$$

اور مہا (ہم + ہم + ... + ہن) = مہا (ب-ا)
تخصیص کی خاطر اب ہم مان لیتے ہیں کہ $لہا < ا$ اور فدا (لا) استقلال کے ساتھ بڑھتا ہے جسے 'لا' سے ب تک بڑھتا ہے۔
وقفہ (ب-ا) کی تقسیم کے کسی خاص طریقہ

$$ہم، ہم،، ہن \dots\dots\dots (۱)$$

پر غور کرو اور فرض کرو کہ

$$\sum = ماہم + مامہم + ... + مانہن \dots\dots\dots (۲)$$

+ اس کے پیچھے ہیں کہ تکملہ کے لئے ریاضی ضابطہ حاصل ہو سکتا ہے۔


جہاں دفعہ ۸۹ کے مطابق مار کوئی قیمت ہے جو تفاعل وقفہ ہر میں اختیار کرتا ہے۔

اب (۲) میں مار، مام، مان کی بجائے تفاعل کی دو قیمتیں رکھو جو ان وقفوں کے شروع میں ہیں، اس طرح کوئی رقم نہیں بڑھے گی۔ اگر محصل مجموعہ کو $\sum$ سے تعبیر کیا جائے تو

(۳) $\sum \leftarrow \sum$

اس کے بعد اگر مار، مام، مان کی بجائے تفاعل کی دو قیمتیں درج کی جائیں جو بالترتیب ان وقفوں کے آخر سرور پر ہیں تو کوئی رقم کم نہیں ہوگی۔ اس لئے محصل مجموعہ $\sum$ ہو تو

(۴) $\sum \rightarrow \sum$



شکل (۴۹)

شکل ۴۹ میں مقدار $\sum$ ایسی مستطیلوں کے سلسلہ کا مجموعہ ہے جیسے پ ن اور $\sum$ ایسی مستطیلوں کا مجموعہ جیسے س ن۔ اس لئے فرق $\sum$ ۔ $\sum$ ایسی مستطیلوں کے مجموعہ سے تعبیر ہوتا ہے جسے س ن۔ موزر الذکر مستطیلوں کے ارتفاعوں کا مجموعہ ک پ۔ $\sum$ ایسا فہما (ب)۔ فن (۱) ہے، اگر ک بڑے سے بڑا قاعدہ ہو یا وقفوں (۱۱)

میں سے بڑے سے بڑا وقفہ ہو تو

۳۔ ۳۔ ۳ گ [فدا (ب)۔ فدا (ا)] (۵)
 اب سعت (ب۔ ا) کی تقسیم کے تمام ممکن طریقوں پر غور کرنے سے ہم
 دیکھتے ہیں کہ مجموعات ۳ کی جو ہمیشہ (ب۔ ا) سے کم رہتے ہیں اور
 ایک آتا ہوگی۔ اسے ۳ سے تعبیر کرو اور مجموعات ۳ کی جو ہمیشہ (ب۔ ا)
 سے بڑے رہتے ہیں ایک چلی آتا ہوگی جسے ۳ سے تعبیر کرو۔ نیز یہ ظاہر ہے کہ
 ۳۔ ۳۔ ۳ سے حاصل ہوتا ہے کہ فرق ۳۔ ۳ کو لازماً
 صفر اور گ {فدا (ب)۔ فدا (ا)} کے درمیان واقع ہونا چاہئے۔
 اس بیان میں گ اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے جتنا ہم چاہیں اس لئے ظاہر ہے کہ
 ۳ اور ۳ مساوی ہونے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کی مشترک قیمت کو
 ہم ۳ سے تعبیر کریں گے۔
 آخر لامر یہ ظاہر ہے کہ


۳۔ ۳۔ ۳ | ۳۔ ۳۔ ۳ گ {فدا (ب)۔ فدا (ا)}

اس لئے گ کو کافی طور پر چھوٹا لینے سے ہم اس امر کا پورا اطمینان کر سکتے
 ہیں کہ ۳۔ ۳۔ ۳ | کسی مقررہ مقدار سے کم ہوگا خواہ یہ مقدار کتنی ہی چھوٹی ہو۔
 اسی طرح کا ثبوت درست ہوگا اگر تفاعل فدا (ا) (سعت (ب۔ ا)
 میں اشتغال کے ساتھ لکھتے۔

اس لئے حاصل ہوتا ہے کہ آخری نتیجہ درست رہے گا اگر سعت کو اسے
 چھوٹے وقفوں کی محدود تعداد میں توڑا جائے جن میں سے ہر ایک میں تفاعل
 یا تو اشتغال کے ساتھ بڑھتا ہے یا اشتغال کے ساتھ گھٹتا ہے۔ دیکھو شکل ۴

※ نیوٹن نے Principia, lib 1; Sec. 1 lemma iii. (1687)

میں جو ثبوت دیا ہے یہ ثبوت اس کی توسیع ہے۔ تمام ہندسی تخیلات کو محال کر
 استدلال کو محض تحلیلی شکل میں پیش کرنا آسان ہوگا۔



نکل (۴۷)


۳۱۔ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ $b > a$ ۔ اگر $b > a$ تو وقفے $[a, b]$ ہا، ہا، ہن منفی ہونے کے مستلزام میں اصولاً کوئی فرق نہیں لگتا۔
۹۱۔ f فدا (لا) فرلا کی خاصیتیں۔

(۱) اگر نکلوں f فدا (لا) فرلا اور f فدا (لا) فرلا کا باہم مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں تکملے ایک ہی مجموعہ کی انتہا خیال کئے جاسکتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ ایک صورت میں لا کے اضافے ہا، ہا، ہن جن سے ملکر وقفہ $b - a$ یا (۱-۲) بنتا ہے دوسری صورت کے اضافوں کے لحاظ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔

اسلئے f فدا (لا) فرلا = f فدا (لا) فرلا (۱)

(۲) نیز تعریف سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ

f فدا (لا) فرلا = f فدا (لا) فرلا + f فدا (لا) فرلا (۲)




شکل (۳۸)

فدا (لا) فرلا

شکل ۳۸ سے اسکی تریسی توضیح ہوتی ہے
(۳) اگر فدا (لا) کی کم سے کم اور بڑی سے
بڑی قیمتیں لہ اور مہا ہوں جیسے
لا، د سے ب تک گزرتا ہے تو شکل

قیمتوں لہ (ب-د) اور مہا (ب-د) کے درمیان واقع ہوتا ہے اور اسلئے لازماً
یہ (ب-د)

کے مساوی ہے جہاں لہ اور مہا کے درمیان مقدار یہ واقع ہے۔
اگر فدا (لا) مسلسل ہو تو مسعت (ب-د) کے اندر یہ تفاعل وہ تمام
قیمتیں اختیار کرتا ہے جو لہ مہا کے درمیان واقع ہیں۔ اسلئے د اور ب
کے درمیان لا کی کوئی ایک قیمت (ج)



شکل (۳۹)

ج = د + طہ (ب-د)

جہاں طہ کوئی مقدار ہے جو د اور ا کے درمیان واقع ہے اس قرار داد کے مطابق

فدا (لا) فرلا = (ب-د) فدا د + طہ (ب-د) کم (۳)

(۴) زیادہ عام طور پر اگر ع، و، مائیں ایسے لا کے تفاعل ہوں کہ د سے

ب تک لا کی قیمتوں کے لئے ع < م < و (۴)

تو شکل د م فرلا (۵)

لحاظ قیمت تکملوں $\bar{ل} ع$ فرلا اور $\bar{ل} و$ فرلا (۶) کے درمیان واقع ہوگا۔

پہلے فرض کرو کہ $\bar{ب} < \bar{ل}$ ۔ تب $\bar{ل} ع$ فرلا۔ $\bar{ل} م$ فرلا۔ $\bar{ل} و$ فرلا۔ (۷) کی رو سے اس مجموعہ کی ہر رقم جس کی انتہا آخری تکملہ ہے مثبت ہوگی۔ اس لئے

$\bar{ل} م$ فرلا $> \bar{ل} ع$ فرلا (۷)

اور اسی طرح $\bar{ل} م$ فرلا $< \bar{ل} و$ فرلا (۸) اگر $\bar{ب} > \bar{ل}$ تو (۷) اور (۸) کی نامساواتیں الٹ جائیں گی۔
۹۲۔ محدود تکملہ کا تفرق اسکی کسی حد کے لحاظ سے۔

فرض کرو کہ $\bar{ت} = \bar{ل} ف$ (لا) فرلا (۱)

صیغہ "تکمل کے حدود" $\bar{ل} ب$ کا تفاعل ہے اور عام طور پر بدلیگا جبکہ انہیں سے کوئی ایک بدلے۔ اور کو ثابت مان کر $\bar{ت}$ کا مشتق تفاعل لحاظ اوپری حد کے مرتب کرو اس طرح

$\bar{ت} + \bar{مف} = \bar{ل} ف$ (لا) فرلا۔ $\bar{ل} ف$ (لا) فرلا۔ $\bar{ل} ف$ (لا) فرلا۔ $\bar{ل} ف$ (لا) فرلا۔ $\bar{ل} ف$ (لا) فرلا۔ $\bar{ل} ف$ (لا) فرلا۔

(۲)۔

دفعہ ۹۱ (۲) کی رو سے۔ اس لئے

مفات = $\int$ فہ (لا) فرلا = مف ب فہ (ب + طہ مف ب) (۳)
 دفعہ ۹۱ (۳) کی رو سے - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفات مف ب کے ساتھ معدوم ہوتا ہے یعنی ت ب کا مسلسل تفاعل ہے۔

۲۱۲

نیز چونکہ $\frac{\text{مفات}}{\text{مف ب}} = \text{فہ (ب + طہ مف ب)}$ (۴)
 اتہا مف ب ← لینے سے

$\frac{\text{فرت}}{\text{فرب}} = \text{فہ (ب)}$ (۵)
 اسی طرح اگر اوپر کی حد ب کو ثابت رکھ کر نجلی حد ا کو بدلا جائے تو ت ا کا مسلسل تفاعل ہوگا اور

$\frac{\text{فرت}}{\text{فرا}} = \text{فہ (ا)}$ (۶)

۹۲۔ نامحدود تکملہ کا وجود - اب ہم دکھا سکتے ہیں کہ کوئی

تفاعل فہ (لا) جسکی نوعیت وہ ہو جو دفعہ ۹۰ میں بیان کی گئی ہے۔ ایک نامحدود تکملہ رکھتا ہے یعنی ایک ایسے قابل تعین (ضروری نہیں کہ یہ محسوب بھی ہو سکے) تفاعل پہ (لا) کا وجود ہے کہ

پہا (لا) = فہا (لا) (۱)

یا پہا (لا) = عفا فہا (لا) (۲)

کیونکہ اگر کہا جائے پہ (ضمہ) = $\int$ فہا (لا) فرلا (۳)

تو بائیں جانب کا جملہ دفعہ ۹۰ کی رو سے، ضمہ کا ایک قابل تعین تفاعل ہے اور اوپر کی تحقیق سے واضح ہے کہ اس شرط کو پورا کرتا ہے

پہا (ضمہ) = فہا (ضمہ) (۴)

موجودہ نقطہ نظر سے (۳) میں تکمل کی پچھلی حد اختیار ہی ہے اور اس لئے تفاعل پہ (۲) جمع شدنی مستقل کی حد تک قابل تعین ہے کیونکہ دفعہ ۹۱ (۲) کی رو سے (۳) میں پچھلی حد کے طور پر (۱) کی بجائے (۲) درج کرنا گویا بائیں جانب تکملہ

$$\text{م}^1 \text{فہ (لا) فرلا}$$

کا جمع کر دینا ہے۔ مقابلہ کردہ دفعہ ۷۲ کے ساتھ۔

۹۴۔ محدود تکملہ کے محسوب کرنیکا قاعدہ۔

جب کبھی پہ (لا) کی تحلیلی شکل معلوم ہو جس کا پہلا مشتق فہ (لا) ہے تو محدود تکملہ

$$\text{ت} = \text{م}^1 \text{فہ (لا) فرلا} \dots \dots \dots (۱)$$

کی قیمت فوراً لکھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اگر (۱) کو ثابت رکھا جائے تو دفعہ ۹۲ سے ۲۱۳

$$\text{فرت} = \frac{\text{فہ (ب)}}{\text{پہ (ب)}} \dots \dots \dots (۲)$$

بموجب فرض۔ دفعہ ۵۶ سے حاصل ہوتا ہے کہ ت اور پہ (ب) صرف "ایک مستقل" کے لحاظ سے متفادت ہو سکتے ہیں یعنی ان میں فرق صرف ایک مستقل مقدار کا ہو سکتا ہے جو ب پر منحصر نہ ہو۔ پس

$$\text{م}^1 \text{فہ (لا) فرلا} = \text{پہ (ب)} + \text{م} \dots \dots \dots (۳)$$

م چونکہ ب پر منحصر نہیں اس لئے م معلوم کرنے کے لئے رکھو ب = (جس سے

$$\text{پہ (۱)} + \text{م} = \text{م}^1 \text{فہ (لا) فرلا} = ۰ \dots \dots \dots (۴)$$

اس لئے م = - پہ (۱) اور

ج فہ (لا) فرلا = پہ (ب) - پہ (ا) (۵)
 متکلمی احصا کا یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس سے کسی معلومہ تفاعل فہ (لا)
 کے محدود کلمہ کی قیمت دریافت کرنے کا مسئلہ مقلوب تفاعل پہ (لا)
 یا عفا فہ (لا) کے حاصل ہونے پر مبنی ہوتا ہے۔ اب اسکی وجہ
 ظاہر ہے کہ اس مقلوب تفاعل کو اس شکل

ج فہ (لا) فرلا (۶)
 سے کیوں تعبیر کرتے ہیں۔ (۶) صرف ج فہ (لا) فرلا (۷)
 کا اختصار ہے جہاں ا اختیاری ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ا میں کوئی
 تبدیلی محض مستقل کو بدل دینے کے مرادف ہے۔

ترقیم [پہ (ب) - پہ (ا)] (۸)
 کو اکثر اوقات اختصار کے طور پر پہ (ب) - پہ (ا) کے لئے استعمال
 کیا جاتا ہے۔

مثال ۱۔ ج فہ (لا) فرلا (۹)

یہاں فہ (لا) = فہ (لا) = ج فہ (لا) = ج فہ (لا)

پس ج فہ (لا) فرلا = ج فہ (لا) = ج فہ (لا) (۱۰)

مثال ۲۔ ج فہ (لا) فرلا (۱۱)

یہاں فہ (لا) = ج فہ (لا) = ج فہ (لا) = ج فہ (لا)

پس $\frac{\infty}{\infty}$ جب لا فلا $\frac{\infty}{\infty}$ (۱۲)

۹۵۔ صہویرین تفاعل فہ (لا) یا مکمل کے دو لامتناہی ہو جائیں۔

اور مثالوں پر غور کرنے سے بیشتر دفعہ $\frac{\infty}{\infty}$ کے مکمل کی تعریف کو ذرا وسیع کرنا مناسب ہو گا۔ وہاں یہ مان لیا گیا تھا کہ مکمل کے محدود و ب محدود ہیں اور تفاعل فہ (لا) تمام وسعت ب۔ ا میں محدود ہے۔ اب ہم دیکھینگے کہ بعض حالات میں ان شرائط کو ذرا دھیل کر دینا کیسے ممکن ہے۔ (آ) فرض کر دو کہ فہ (لا) (لا) کی تمام محدود قیمتوں کے لئے محدود اور مسلسل ہے۔

تکملہ $\frac{\infty}{\infty}$ فہ (لا) (۱)

پر غور کرو جہاں صہ $\frac{\infty}{\infty}$ ۔ اگر صہ کو لامتناہی بنانے سے تکملہ ایک معین انتہائی قیمت کی طرف مائل ہو تو اس انتہائی قیمت کو تکملہ

$\frac{\infty}{\infty}$ فہ (لا) فلا (۲)

سے تعبیر کرتے ہیں اور تکملہ (۱) کو صہ $\frac{\infty}{\infty}$ کے لئے ”ستدق“ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ لامتناہی سلسلوں کے نظریہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے (دفعہ ۵) استدقاق کے لئے یہ کافی شرط نہیں ہے کہ

نہا $\frac{\infty}{\infty}$ فہ (لا) = ... (۳)

نیز یہ شرط ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ استدقاق اس صورت میں بھی ممکن ہو سکتا ہے جبکہ لا $\frac{\infty}{\infty}$ کے لئے فہ (لا) کی کوئی معین انتہائی قیمت نہ ہو۔

اسی طرح کی تعریف $\frac{\infty}{\infty}$ فہ (لا) فلا (۴)

کے لئے بھی مرتب ہو سکتی ہے۔

(۲) فرض کرو کہ فہ (لا) لامتناہی ہو جاتا ہے تکمیل کے حدود پر یا ان کے

درمیان۔ صرف اُس صورت پر غور کرنا کافی ہوگا جہاں لا کی صرف ایک قیمت ہو جس کے لئے فہ (لا) ∞ ۔ عام صورت اس صورت میں تحویل ہو سکتی ہے اگر سرعت ب۔ ا کو چھوٹے وقفوں میں توڑ دیا جائے۔

اگر فہ (لا) (صرف) اوپر کی حد پر لامتناہی ہوتا ہو تو ہم سب سے پہلے مکملہ

ب۔ صہ
فہ (لا) فرلا (۵)

پر غور کرتے ہیں جہاں صہ مثبت ہے۔ اگر صہ کو لامتناہی کم کرنے سے مکملہ ایک معین انتہائی قیمت کی طرف مائل ہو تو اس قیمت کو ہم مکملہ

ب۔ صہ (لا) فرلا کی تعریف قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح کی تعریف اُس صورت پر حاوی ہوگی جہاں فہ (لا) بجلی حد لا پر لامتناہی ہوتا ہے۔

اگر فہ (لا) حدود ا' ب کے درمیان لامتناہی ہوتا ہو مثلاً
لا = ج کے لئے تو ہم اس مجموعہ پر غور کرتے ہیں

ج۔ صہ
فہ (لا) فرلا + فہ (لا) فرلا (۶)

اگر صہ (اور صہ) کے کم کرنے سے ان میں سے ہر ایک مکملہ ایک معین انتہائی قیمت کی طرف مائل ہو تو ان قیمتوں کے مجموعہ کو مکملہ

ب۔ صہ مان لیا جاتا ہے کہ فہ (لا) اکیلے نقطوں کی محدود تعداد پر صی لامتناہی ہوتا ہے۔

$$+ \quad \text{فد} (لا) \text{ فرلا} \dots \dots \dots (۷) +$$

کی تعریف کے طور پر اختیار کر لیا جاتا ہے۔

جب، فد (لا) تنہا نقطوں کی محدود تعداد پر لامتناہی یا غیر مسلسل ہوتا ایسی صورتوں کا استعمال ہون ہو سکتا ہے کہ سمیت کو ایسے چھوٹے وقفوں میں تقسیم کیا جائے جن کا نقاط غیر مسلسل احاطہ کر لیں۔

$$\text{مثال ۱۔} \quad \text{فد} (لا) \text{ فرلا} = \left[-\frac{1}{\infty} \text{ فو} \right] = \frac{1}{\infty} - \text{فو} \dots (۸)$$

یہ سہ بڑھتا ہے یہ جلد انتہا $\frac{1}{\infty}$ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لئے

$$\text{فد} (لا) \text{ فرلا} = \frac{1}{\infty} \dots \dots \dots (۹)$$

$$\text{مثال ۲۔} \quad \text{فد} (لا) \text{ فرلا} = \left[\text{لوک} (لا) \right] = \text{لوک} (لا) \dots \dots (۱۰)$$

یہ سہ کے ساتھ لامتناہی بڑھتا ہے۔ اس لئے سہ ∞ کے لئے کوئی انتہائی

$$\text{نہا} \quad \frac{1}{\infty} = 0 \dots \dots \dots (۱۱)$$

۱۰ ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں جہاں ذیل کا ہر ایک تکملہ

$$\text{فد} (لا) \text{ فرلا} \quad \text{اور} \quad \text{فد} (لا) \text{ فرلا} \quad \text{ج۔ صہ}$$

آخر لامتناہی ہو لیکن اگر کوئی خاص متناہی صفر ہونے والی تعدادوں صہ، صہ پر عالم کیا جائے تو ان دو تکملوں کے لامتناہی جزو اس طور پر ایک دوسرے کو ذرا سج کر سکتے ہیں کہ مجموعہ محدود رہے۔ رشتہ مذکورہ اگر سہ = سہ ہو تو نتیجہ محدود کہ وجہ

اسکا وجود ہو کوشتی (Cauchy) کے تکملہ (۷) کی ”صدری قیمت“ کہاہے۔

مثال ۲۔ دفعہ ۱۰ کی رو سے

$$\frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} = \frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}}$$

۲۱۷ اگر حد مثبت ہو تو جیسے ۱۰ سے لانتناہی کی طرف مائل ہوتا ہے آخری رقم اپنی انتہائی قیمت صفر کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس لئے

$$\frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} = \frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} \quad (۴)$$

اسی طرح

$$\frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} = \frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} \quad (۵)$$

مثال ۳۔

$$\frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} = \frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} \quad (۶)$$

تفاعل سن الا کثیر القیمت تفاعل سن (دفعہ ۱۲) لیکن یہ چنداں بہت نہیں رکھتا کہ کوئی قیمت لی جائے بشرطیکہ ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ یکساں طور پر بدلتا ہے جیسے لا تکمیل کی سمت میں سے گذرتا ہے۔ اس لئے اگر لیا جائے سن ۱۰ = ۰۔ تو سن ۱۰ سے وہ قیمت مراد ہوگی جو یکساں طور پر ۰ سے سن تک پہنچتی ہے۔ جب ۱۰ سے لا انتہا بڑھتا ہے تو یہ قیمت انتہا ۱۰ کی طرف مائل ہوتی ہے

$$\frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} = \frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} \quad (۶)$$

مثال ۴۔ دفعہ ۱۰ کی رو سے

۲۱۸

$$\frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}} = \frac{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا} + \text{جم بدلا} - \text{فولا}}{\text{عاجب بدلا} + \text{بدلا}}$$

۱۰ سے ۱۰ تک بڑھتا ہے، ۱۰ سے ۱۰ تک

بڑھتا ہے اور اسلئے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ مسن [$\frac{ع}{بہ}$ مس طہ] صفر ہے $\frac{۲}{۳}$ تک بڑھتا ہے۔

اس لئے $\frac{۲}{۳}$ فرطہ $\frac{۲}{۳}$ = $\frac{۲}{۳}$ [$\frac{ع}{بہ}$] (۷)
طالب علم نے گذشتہ باب کی ضمن میں دیکھا ہوگا کہ جب متغیر کے بدلنے سے نامحدود تکمل عمل میں لایا جاتا ہے (دفعات ۷، ۹) تو عمل کا نہایت تکلیف دہ حصہ وہ ہوتا ہے جس میں ابتدائی متغیر کی طرف عود کیا جاتا ہے۔ جب معلومہ حدود کے درمیان محدود تکملہ دریافت کرنا مقصود ہو تو عمل کا یہ حصہ غیر ضروری ہوتا ہے اور نامحدود تکملہ حاصل کر کے اس میں نئے حدود درج کر دینا کافی ہوتا ہے۔

مثال ۵۔ $\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$] فرلا کو معلوم کرو۔

دفعہ ۷ میں لا = رجب طہ رکھنے سے ماہل ہوا

$\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$] فرلا = $\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$] فرطہ = $\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$] رجب طہ + $\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$]
اب اگر طہ سے $\frac{۲}{۳}$ تک بدلتا تو لا سے $\frac{۱}{۲}$ تک بدلتا۔ اسلئے
 $\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$] فرلا = $\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$] رجب طہ + $\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$]

$\frac{۱}{۲}$ [$\frac{ع}{بہ}$] (۹)

۹۷۔ تحویلی ضابطے - دفعات ۸، ۸۲ کے طریقے جب محدود

تکملوں کی تحویل میں استعمال کئے جاتے ہیں تو تکمل شدہ رقوم کے دونوں حدود پر صفر ہو جانے سے خاص طور پر سادہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) اگر $\frac{۲}{۳}$ جم طہ فرطہ (۱)

تو دفعہ ۸۲ (۲) کی رو سے

$$ع = \left[\frac{1}{ن} \text{ جب } طما \text{ جم } طما^1 + \frac{1}{ن} - \frac{1}{ع} \right] \dots (۲)$$

اگر ن < ۱ تو پہلا حصہ صفر ہو جاتا ہے کیونکہ جب ۰ = جم طما = ۰

$$\text{اس لئے } \frac{1}{ن} \text{ جم } طما \text{ فرطما} = \frac{1}{ن} - \frac{1}{جم} طما \text{ فرطما} \dots (۳)$$

اسی طرح سے دفعہ ۸۲ (۶) کی رو سے

$$\frac{1}{ن} \text{ جب } طما \text{ فرطما} = \frac{1}{ن} - \frac{1}{جم} طما \text{ فرطما} \dots (۴)$$

اگر ن مثبت صحیح عدد ہو تو (۳) کے متوازن استعمال سے

$$\frac{1}{جم} طما \text{ فرطما}$$

$$\dots (۵) \quad \frac{1}{جم} طما \text{ فرطما} = ۱ \text{ یا } \frac{1}{جم} طما \text{ فرطما} = \frac{1}{۲} \dots$$

کی رقوم میں بیان کیا جاسکتا ہے بموجب اس کے کہ ن طاق ہو یا جفت۔

اسی طرح سے $\frac{1}{جم} طما \text{ فرطما}$ کو

$$\frac{1}{جم} طما \text{ فرطما} = ۱ \text{ یا } \frac{1}{جم} طما \text{ فرطما} = \frac{1}{۲} \dots (۶)$$

پر منحصر کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{مثال ۱۔ } \frac{1}{جم} طما \text{ فرطما} = \frac{۲}{۵} \text{ یا } \frac{1}{جم} طما \text{ فرطما}$$

$$= \frac{۲}{۵} \times \frac{۲}{۲} = \frac{۴}{۱۵} \text{ یا } \frac{1}{جم} طما \text{ فرطما} = \frac{۴}{۱۵}$$

اس طور پر دو تین مثالیں مل کر نیکے بعد طالب علم تھیب کے متوازن اجزاء صغریٰ کو زبانی

لکھ سکیگا، مثلاً

$$\pi \frac{5}{32} = \frac{7}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{4} = \text{جہ طہ فرطہ}$$

اوپر کے شکلوں کی عام قیمتیں آسانی سے لکھی جاسکتی ہیں۔ مثلاً اگر ن طاق ہو تو

$$\text{جہ طہ فرطہ} = \text{جہ طہ فرطہ} = \frac{(1-n)(3-n) \times 2 \times \dots \times n}{3 \times \dots \times (2-n)} \dots (7)$$

لیکن اگر ن جفت ہو تو

$$\text{جہ طہ فرطہ} = \text{جہ طہ فرطہ} = \frac{\pi \times \frac{1 \times \dots \times (3-n)(1-n)}{2 \times \dots \times (2-n)}}{2} \dots (8)$$

(۸)

اس نمونہ کے تکملے احصا کے طبعی استعمال میں اکثر واقع ہوتے ہیں۔

$$(2) \text{ اگر } m = \text{جہ طہ جہ طہ فرطہ} \dots (9)$$

تو دفعہ ۸۲ (۱۰) کی رو سے

$$m = \left[\frac{1}{m+n} \text{جہ طہ جہ طہ}^{1-n} \right] + \frac{1-n}{m+n} m \dots (10)$$

اگر $n < 1$ تو [] کے اندر کا جملہ دونوں حدود پر محدود ہوتا ہے۔ اس طرح

$$\text{جہ طہ جہ طہ فرطہ} = \frac{1-n}{m+n} \text{جہ طہ جہ طہ}^{1-n} \dots (11)$$

اسی طرح دفعہ ۸۲ (۱۱) سے ماہل ہوتا ہے اگر $m < 1$

$$\text{جہ طہ جہ طہ فرطہ} = \frac{1-m}{m+n} \text{جہ طہ جہ طہ}^{1-m} \dots (12)$$

ان مضامین کے ذریعہ کوئی سا قوت ناجی بقدر ۲ کے کم کیا جاسکتا ہے اور اس عمل کی تکرار سے تکملہ (۹) ایسے تکملہ پر آ کے منحصر ہو سکتا ہے جس میں قوت نا یا بقدر ۲ ہو۔ مں مثبت صحیح عدد ہوں۔ آخر الامر مائل میں ذیل کی کوئی نہ کوئی صورت دیکھوں گی

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{جب } \text{طہ} \text{ جم } \text{طہ} \text{ فرطہ} = \frac{1}{2} \quad , \quad \text{جب } \text{فرطہ} = \frac{\pi}{4} \\ \text{جب } \text{طہ} \text{ فرطہ} = 1 \quad , \quad \text{جب } \text{جم } \text{طہ} \text{ فرطہ} = 1 \end{array} \right. \dots (۱۳)$$

مثال ۲۔ $\text{جب } \text{طہ} \text{ جم } \text{طہ} \text{ فرطہ} = \frac{\pi}{8} \quad \text{جب } \text{طہ} \text{ جم } \text{طہ} \text{ فرطہ}$
 $= \frac{\pi}{4} \times \frac{\pi}{4} = \text{جب } \text{طہ} \text{ جم } \text{طہ} \text{ فرطہ}$

(۱۲) کی رو سے - نیز (۱۱) سے

$$\text{جب } \text{طہ} \text{ جم } \text{طہ} \text{ فرطہ} = \frac{\pi}{4} \quad \text{جب } \text{طہ} \text{ جم } \text{طہ} \text{ فرطہ} = \frac{\pi}{4} \times \frac{\pi}{4}$$

$$\text{اس لئے } \text{جب } \text{طہ} \text{ جم } \text{طہ} \text{ فرطہ} = \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} \times \frac{\pi}{4} \times \frac{\pi}{4} = \frac{1}{16}$$

تھوڑی شوق کے بعد جواب فوراً لکھا جاسکیگا۔ مثلاً

$$\text{جب } \text{طہ} \text{ جم } \text{طہ} \text{ فرطہ} = \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{8} = \frac{\pi}{256}$$

ضابطوں (۱۱) اور (۱۲) نیز (۳) اور (۴) کی علی شقوں میں ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو یاد رکھنا مناسب ہے۔

$$\text{نیز جبری مکملہ } \text{لا}^{\text{ا}} (1 - \text{لا})^{\text{ن}} \text{ فرلا} \dots \dots \dots (۱۴)$$

میں رکھو لا = جب طہ تو اس کی یہ صورت ہو جاتی ہے

$$\text{جب } \text{طہ}^{\text{ا}} + \text{طہ}^{\text{ن}} \text{ جم } \text{طہ}^{\text{ا}} + \text{طہ}^{\text{ن}} \text{ فرطہ} \dots \dots \dots (۱۵)$$

اسکی قیمت اوپر کے ضابطوں سے لکھی جاسکتی ہے جب کسی ۱+۴۲ اور ۱+۵۲ + ۱
 مثبت صحیح عدد ہوں یا منفی ہوں۔

اسی طرح تکملہ $^1\text{م}^1\text{لا}^1(1-1)\text{لا}^1(1-1)\text{فرلا}^1 \dots \dots \dots (12)$
 میں رکھو لا = جب $\text{طا}^1\text{جم}^1$ تکملہ یہ شکل اختیار کرتا ہے

$^2\text{م}^2\text{لا}^2(1-1)\text{فرلا}^2 = \text{جب}^2\text{طا}^2\text{جم}^2$ (14)
 مثال ۳- $^1\text{م}^1\text{لا}^1(1-1)\text{فرلا}^1 = \text{جب}^1\text{طا}^1\text{جم}^1$

$$\frac{12}{315} = 1 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{9} \times 2 =$$

مثال ۴- $^1\text{م}^1\text{لا}^1(1-1)\text{فرلا}^1 = \text{جب}^1\text{طا}^1\text{جم}^1$

۹۸ - مربوط تکملے۔ محدود تکملوں کے متعلق کئی مسئلے ہیں جو دفعہ ۸۹
 کی تعریف سے محض وجدانی طور پر حاصل ہوتے ہیں مثلاً

$^1\text{م}^1\text{ف}^1(1-1)\text{فرلا}^1 = \text{جب}^1\text{ف}^1(1-1)\text{فرلا}^1 \dots \dots \dots (1)$
 اس کے ثبوت کے لئے لکھو لا = ۱ - لا 'فرلا' = فرلا تکمل کے حدود ہیں
 لا = ۰، لا = ۱ کے جواب میں لا = ۱، لا = ۰ بالترتیب۔ پس
 $^1\text{م}^1\text{ف}^1(1-1)\text{فرلا}^1 = \text{جب}^1\text{ف}^1(1-1)\text{فرلا}^1$

آخر میں زیر نکال دیا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں۔
 اوپر کا عمل مبدا کو نقطہ لا = ۱ پر لجا کر محور لا کی سمت کو بدل دینے
 مرادف ہے، اس طور پر معلوم ہو گا کہ (۱) سے جو ترقی تعبیر ہوتے ہیں وہ
 متشامل ہیں۔
 (۱) کی ضروری شکل یہ ہے


$\int f (جِب طه) فرطه = \int f^* (جَم طه) فرطه (۲)$

مثال ۱۔ مثلاً $\int جِب طه فرطه = \int جَم طه فرطه$

پس ہر ایک تکملہ $= \frac{1}{p} \int (جِب طه + جَم طه) فرطه = \frac{1}{p} \int فرطه = \frac{1}{p}$

اگر $f(x) = (x)$ کا جخت تفاعل ہو یعنی $f(x) = (x)$ = $f(x)$ (۳)

تو $\int f(x) (x) فرلا = 2 \int f(x) (x) فرلا (۴) ۲۲۲$



پہلے تکملہ سے جو رقبہ تبسیر
ہوتا ہے صرف اس کی نصفیت

محور صاف سے ہوتی ہے۔

برعکس اس کے اگر $f(x) = (x)$

(x) کا طاق تفاعل ہو یعنی

$f(x) = (x) = f(x) ... (۵)$

تو $\int f(x) (x) فرلا = ... (۶)$

کیونکہ اس مجموعہ میں سبکی انتہا یہ محو

تکملہ ہے (دفعہ ۸۹)


جزو $f(x) = (x)$ مفلا

اور متقابل کی علامت والا جزو

$f(x) = (x)$ مفلا

دونوں ملکر ایک دوسرے کے

ساقط کرتے ہیں۔



مثال ۲- $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{جب}^{\pi} \text{طہ} \text{جم}^{\pi} \text{طہ} \text{فرطہ} = 2 \int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{جب}^{\frac{\pi}{2}} \text{طہ} \text{جم}^{\frac{\pi}{2}} \text{طہ} \text{فرطہ}$

$$\frac{\pi}{15} = 1 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} \times 2 =$$

اور $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{جب}^{\pi} \text{طہ} \text{جم}^{\pi} \text{طہ} \text{فرطہ} =$ کیونکہ جب طہ طہ کے ساتھ

علامت بدلتا ہے۔

ایسے ہی وجوہات کی بنا پر اگر $\text{فہ} (1-2) = \text{فہ} (2-1) \dots \dots (4)$

تو $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{فہ} (2-1) \text{فرلا} = 2 \int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{فہ} (1-2) \text{فرلا} \dots \dots (8)$

لیکن اگر $\text{فہ} (1-2) = - \text{فہ} (2-1) \dots \dots (9)$

تو $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{فہ} (2-1) \text{فرلا} = 0 \dots \dots (10)$

(۸) کی خاص صورت کے طور پر ہم حاصل کرتے ہیں

$\int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{فہ} (\text{جب}^{\pi} \text{طہ}) \text{فرطہ} = 2 \int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{فہ} (\text{جب}^{\frac{\pi}{2}} \text{طہ}) \text{فرطہ} \dots (11)$

کیونکہ جب $(\pi - \text{طہ}) = \text{جب}^{\pi} \text{طہ}$

مثال ۳- $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{جب}^{\pi} \text{طہ} \text{جم}^{\pi} \text{طہ} \text{فرطہ} = 2 \int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{جب}^{\frac{\pi}{2}} \text{طہ} \text{جم}^{\frac{\pi}{2}} \text{طہ} \text{فرطہ}$

۲۲۳

$$\frac{\pi}{15} = 1 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times 2 =$$

اور $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{جب}^{\pi} \text{طہ} \text{جم}^{\pi} \text{طہ} \text{فرطہ} =$

امثلہ ۳

۱۔ دہرہ مثال کے طریقہ سے ثابت کرو کہ $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{لا}^{\pi} \text{فرلا} = \int_1^{\frac{\pi}{2}} \text{لا}^{\frac{\pi}{2}} \text{فرلا} \dots (12)$

$$-۵ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲+۱)} = \text{لوک} (۲لا+۱), \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲-۱)} = \text{لوک} (۲لا+۳)$$

$$-۶ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا+۱)} = \text{لوک} ۲, \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲+۱)} = \frac{۱}{۲} \text{لوک} ۲$$

$$-۷ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲-۱)} = \frac{\pi^۲}{۳۱۳}$$

$$-۸ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲+۱)} = ۱ - \frac{\pi}{۲}$$

$$-۹ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲+۱)(لا^۲+۲)} = \frac{\pi}{۲(لا+۱)}$$

$$-۱۰ \quad \int_1^{\infty} \frac{لا^۲ فرلا}{(لا^۲+۱)(لا^۲+۲)} = \frac{\pi}{۲(لا+۱)}$$

$$-۱۱ \quad \int_1^{\infty} \frac{لا^۲ فرلا}{(لا^۲+۱)(لا^۲+۲)} = \frac{۱}{ب} \text{لوک} \frac{۱}{ب}$$

$$-۱۲ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲+۱)} = ۱ - \text{لوک} ۲, \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲+۱)} = \text{لوک} ۲ - \frac{۱}{۲}$$

$$-۱۳ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲+۱)} = \frac{\pi}{۲}$$

$$-۱۴ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲-۱)} = \frac{\pi}{۲}, \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا^۲+۱)} = \text{لوک} (۲لا+۱)$$

$$-۱۵ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا-۱)} = \pi, \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا-۱)} = \frac{\pi}{۲}$$

$$-۱۶ \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا+۱)} = \pi, \quad \int_1^{\infty} \frac{فرلا}{(لا-۱)} = \pi$$

$$-۱۸ \quad \int \left[\frac{ب-لا}{ا-لا} \right] \frac{ب}{ا} \int = \int \left[\frac{لا-ا}{ب-لا} \right] \frac{ب}{ا} \int \quad \text{فرلا} = \frac{۱}{۲} \pi (ب-ا)$$

$$-۱۹ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{قططه فرطه} = ۱ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{مسطه فرطه} = ۱ - \frac{\pi}{۲}$$

$$-۲۰ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{جب طه فرطه} = ۱ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه فرطه} = ۰$$

$$-۲۱ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه فرطه} = \frac{\pi}{۲} \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{جب طه فرطه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه فرطه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه فرطه} = \frac{\pi}{۲}$$

$$-۲۲ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{قططه فرطه} = \frac{۳}{۲} \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{مسطه فرطه} = \frac{۲}{۳} - \frac{\pi}{۲}$$

۲۲۵

$$-۲۳ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{فرطه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲}$$

$$-۲۴ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{فرطه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲}$$

$$-۲۵ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{مسطه فرطه} = ۱ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{قططه فرطه} = \text{لوک} (۲، ۳)$$

$$-۲۶ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{قططه - مسطه فرطه} = \text{لوک} ۲$$

$$-۲۷ \quad \int \frac{\pi}{۲} \quad \text{فرطه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲} \quad \text{جم طه} = \frac{\pi}{۲}$$

$$-۲۸ \quad \int \frac{۱}{(۱+ن)} \quad \text{لا ن لوک لا فرلا} = -$$

$$-۲۹ \quad \int \frac{۱}{۲} \quad \text{جب لا فرلا} = \frac{\pi}{۲} - ۱ \quad \int \frac{۱}{۲} \quad \text{مس لا فرلا} = \frac{\pi}{۲} - \frac{۱}{۲} \quad \text{لوک} ۲$$

$$۳۰ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = ۱, \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = ۱ - \frac{\pi}{2}$$

$$۳۱ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = ۲ - \pi, \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = ۲ - \frac{\pi}{2}$$

$$۳۲ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \pi, \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \pi - \pi, \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \pi - \pi$$

$$۳۳ - \int (۱ - \sqrt[n]{x}) \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \frac{\pi}{2} \text{ (جب } \sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{x} \text{ جم به)}$$

$$۳۴ - \int \frac{\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x}}{(۱ + \sqrt[n]{x})^2} = \frac{\pi}{8}$$

$$۳۵ - \int \frac{\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x}}{(۱ - \sqrt[n]{x})^2} = \pi \{ ۱ - \sqrt[n]{x} \} \text{ بشرطیکه } ۱ < ۱$$

$$۳۶ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \frac{\pi}{2} - \frac{۱}{2} \text{ کوک } ۲$$

$$۳۷ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \frac{\pi}{2} \text{ (جم } \sqrt[n]{x} \text{ فرلا)}$$

$$۳۸ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \frac{\pi}{2} \text{ (جم } \sqrt[n]{x} \text{ فرلا)}$$

$$۳۹ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \frac{\pi}{2} \text{ (جم } \sqrt[n]{x} \text{ فرلا)}$$

$$۴۰ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \frac{\pi}{2} \text{ (جم } \sqrt[n]{x} \text{ فرلا)}$$

$$۴۱ - \int \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x} = \frac{\pi}{2} \text{ (جم } \sqrt[n]{x} \text{ فرلا)}$$

$$\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}} = \frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$$

امثلہ ۳۳
(تحویلی ضابطے وغیرہ)

۱۔ ذیل کے ٹکڑوں کی قیمتیں لکھو

(۱) $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$ جب $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$

(۲) $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$ جب $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$

$\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$

(۳) $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$ جب $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$

(۴) $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$ جب $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$

$\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$ جب $\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$

۲۔ ابتدائی اصولوں سے ثابت کرو کہ

$$\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}} = \frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$$

$$\frac{\text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ} \quad \text{فطرطہ}}{\text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰} - \text{جزء ۱۰۰۰}}$$

ثابت کرو کہ انکی مشترک قیمت ہے

$$۳- \text{ثابت کرو کہ } \int_0^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 f(1-x) dx$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$$

$$۴- \text{ثابت کرو کہ } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 [f(x) + f(1-x)] dx$$

$$\int_0^1 [f(x) - f(1-x)] dx = 0$$

$$۵- \text{اگر } \int_0^1 f(x) dx = 0 \text{ ہو تو ثابت کرو کہ } \int_0^1 x f(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

$$۶- \int_0^1 x^2 (1-x)^2 dx = \frac{1}{60}$$

$$۷- \int_0^1 x^3 (1-x)^3 dx = \frac{1}{140}$$

$$۸- \int_0^1 x^4 (1-x)^4 dx = \frac{1}{2520}$$

$$۹- \int_0^1 \frac{x^4}{(1-x)^4} dx = \frac{1}{15}, \int_0^1 \frac{x^5}{(1-x)^4} dx = \frac{1}{120}$$

$$۱۰- \int_0^1 x^2 (1-x)^2 dx = \frac{1}{60}, \int_0^1 x^3 (1-x)^2 dx = \frac{1}{120}$$

$$۱۱- \int_0^1 x^3 (1-x)^2 dx = \frac{1}{120}, \int_0^1 x^4 (1-x)^2 dx = \frac{1}{240}$$

$$۱۲- \int_0^1 \frac{x^2}{(1-x)^2} dx = \frac{1}{2}, \int_0^1 \frac{x^3}{(1-x)^2} dx = \frac{1}{4}$$

$$\int_0^1 \frac{x^4}{(1-x)^2} dx = \frac{1}{6}$$

$$۱۳- \int_1^{\infty} (ا ر ج ب ط ه + ب ج م ط ه) ف ر ط ه = \frac{۱۶}{۱۵} + \frac{۱}{۳} ا ر ب + ا ر ب$$

$$۱۴- \int_1^{\infty} \frac{ج م لا - ج ب لا}{ا + ج ب لا ج م لا} ف ر لا =$$

$$۱۵- ثابت کروکه \int_1^{\infty} \frac{ج م ط ه ف ر ط ه}{ا ر ج م ط ه + ب ا ج ب ط ه} = \frac{۲}{۱۲ (ا + ب)}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{ج ب ط ه ف ر ط ه}{ا ر ج م ط ه + ب ا ج ب ط ه} = \frac{۲}{۱۲ (ا + ب)}$$

$$۱۶- ثابت کروکه \int_1^{\infty} (ا + لا) (ا - لا) ف ر لا =$$

$$= \int_1^{\infty} ج ب ط ه^{۱+۲} ج م ط ه^{۱+۲} ف ر ط ه$$

$$۱۷- ثابت کروکه \int_1^{\infty} \frac{ف ر لا}{(ا + لا)^۲} =$$

$$۱۸- اگر ن مثبت صح عدد ہو تو ثابت کروکه \int_1^{\infty} \frac{۳-۲ن}{۱-۲(ا + لا)^۲} ف ر لا = [رکھو لا = مس ما]$$

$$۱۹- اگر ن < ا تو ثابت کروکه \int_1^{\infty} \frac{ف ر لا}{(ا + لا)^{۲+۲ن}} = \frac{۲ \times ۴ \times ۶ \times \dots \times (۲-۲ن)}{۱ \times ۳ \times ۵ \times \dots \times (۱-۲ن)}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{ف ر لا}{(ا + لا)^{۲+۲ن}} = \frac{ن}{۱-۲ن} رکھو لا = ج م ع$$

$$۲۰- ثابت کروکه \int_1^{\infty} \frac{ف ر ع}{ج م ع} = \frac{۲-۲ن}{۱-۲ن} ف ر ع [رکھو ج م ع = ق ط ط ه]$$

۲۱۔ اگر ع = $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$ ثابت کرو کہ ع = $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$

۲۲۔ اگر ع = $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$ ثابت کرو کہ

ع = $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$
 ہندسی طریق پر یا کسی اور طرز سے ع کی قیمت دریافت کرو اور ع، ع کی قیمتیں
 مستند کرو۔

امثلہ ۳۳

۱۔ (۱-۱) $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$ کی قیمت پر غور کر کے ثابت کرو کہ اگر ن مثبت
 صحیح عدد ہو تو

$$1 - \frac{n}{3 \times 1} + \frac{n(n-1)}{5 \times 2 \times 1} - \frac{n(n-1)(n-2)}{7 \times 3 \times 2 \times 1} + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)}{11 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \dots$$

۲۔ اگر (۱+۱) $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$ کی قیمت پر غور کر کے ثابت کرو کہ

۱۔ $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$
 ۳۔ اگر $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$ کی قیمت پر غور کر کے ثابت کرو کہ

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$$

۴۔ ثابت کرو کہ $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$

۵۔ ابتدائی اصولوں سے ثابت کرو کہ

$${}^{\frac{p}{q}}J \text{ جب } {}^{1+}ط\text{ فرط } > {}^{\frac{p}{q}}J \text{ جب } ط\text{ فرط}$$

اس طرح ثابت کرو کہ $\frac{p}{q}$ ، کسر

$$2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14 \times 15 \times 16 \times 17 \times 18 \times 19 \times 20$$

اور اس کسر کے درمیان میں واقع ہوتا ہے جو اوپر کی کسر کے شمار کنندہ اور نسب نامہ دونوں سے آخری جزو ضربی حذف کرنے سے حاصل ہو۔ (والس)۔

۶۔ ابتدائی اصولوں سے ثابت کرو کہ

$${}^{\frac{p}{q}}J \text{ مس } {}^{1+}ط\text{ فرط } > {}^{\frac{p}{q}}J \text{ مس } ط\text{ فرط}$$

اس لئے امثلہ ۳۲ (۵) کا نتیجہ استعمال کرنے سے ثابت کرو کہ ${}^{\frac{p}{q}}J \text{ مس } ط\text{ فرط}$

$$\frac{1}{(1+n)^2} \text{ اور } \frac{1}{(1-n)^2}$$

کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

۷۔ ثابت کرو کہ

$${}^{\frac{p}{q}}J \text{ جب } ط\text{ فرط اور } {}^{\frac{p}{q}}J \text{ جب } ط\text{ فرط}$$

نا قابل تعین ہیں۔

۸۔ ترکیبی تخیلات کی بنا پر ثابت کرو کہ

$${}^{\frac{p}{q}}J \text{ جب } ط\text{ فرط محدود اور قابل تعین ہے۔}$$

۹۔ اگر $f(x)$ (لا) محدود اور مسلسل ہو لا کی ان قیمتوں کے لئے جو x اور y کے درمیان میں سوائے $x=y$ کے جس کے لئے یہ لامتناہی ہوتا ہے تو تکمیل $f(x)$ (لا) فرلا محدود ہے بشرطیکہ ایک مثبت مقدار m ایسی معلوم ہو سکتی ہے

جو ایک سے کم ہے اور

نہیہ لا^ا فہ (لا) محدود ہے۔ [رکھو لا = ت^ن]

۱۰۔ اگر فہ (لا) محدود اور مسلسل ہو لا کی تمام قیمتوں کے لئے تو مکملہ

مجموع فہ (لا) فرلا محدود ہوگا بشرطیکہ ایک مقدار م ایسی مل سکتی ہو ایک سے بڑی ہے

اور نہیہ لا^ا فہ (لا) محدود ہے۔ [رکھو لا = ت^ن]

۱۱۔ ثابت کرو کہ

مجموع لا^ا فرلا اور مجموع لا^ا جب لا^ا فرلا

محدود اور قابل تعین ہیں۔

۱۲۔ ثابت کرو کہ مجموع لا^ا فو فرلا = $\frac{1}{p}$ مجموع لا^ا فو فرلا =

۱۳۔ ثابت کرو کہ مکملہ

مجموع لا^ا فو فرلا (جہاں ن < ۱)

محدود اور قابل تعین ہے۔

۱۴۔ اگر ن < ۱ تو ثابت کرو کہ

مجموع لا^ا فو فرلا = $\frac{1}{p} (ن - ۱)$ مجموع لا^ا فو فرلا

اگر ن مثبت صحیح عدد ہے تو

مجموع لا^ا فو فرلا = $\frac{1}{p}$ ک

۱۵۔ اگر ع = مجموع لا^ا فو فرلا تو ثابت کرو کہ ع = $\frac{ن}{ع}$ ع = ۱۔

جہاں ن مثبت ہے۔ اس لئے ثابت کرو کہ اگر ن صحیح عدد ہو تو

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

۱۶۔ ناقصی تکملہ $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ فرطہ کی جدولیں زاویہ کے منٹ کے

فرق پر فہ کی قیمتوں کے لئے مرتب کی گئی ہیں۔ جدول کے کسی حصہ میں متوازنہ جدولوں کے فرق کے لئے ضابطہ ماحصل کرو۔

مثلاً اگر $k = \frac{1}{4}$ فہ = ۶۰ تو ثابت کرو کہ فرق تقریباً ۳۲۳... ہوگا۔
۱۷۔ اگر ف (لا) اور فہ (لا) محدود اور مسلسل ہوں اور فہ (لا) کی تمام وقفہ لا = ۱ سے لا = ب تک اسی علامت رہے تو

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

جہاں ا ک طہ۔

۱۸۔ یہ بتاؤ کہ تادی $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ = لوک لا سے یہ کیونکر حاصل ہوتا ہے ۲۳۱

کہ موسیقی سلسلہ $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ کی ن رقموں کا مجموعہ

لوک (۱ + ن) اور ۱ + لوک ن کے درمیان واقع ہے۔

ثابت کرو کہ اس سلسلہ کی دس لاکھ رقموں کا مجموعہ ۱۳۵۸ اور ۱۴۵۸ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

۱۹۔ تریسی اصولوں کی بنا پر دکھاؤ کہ اگر ف (لا) استقلال کے ساتھ گھٹتا ہے جیسے لا = ۰ سے تک بڑھتا ہے تو سلسلہ

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

مستقل ہے اور اس کا مجموعہ ت ا د ت + ف (ا) کے درمیان واقع ہوتا ہے
بشرطیکہ تکملہ ت = ف (لا) فرلا عدد ہو۔ اس کو سلسلہ

$$\frac{1}{(1+n)} + \frac{1}{(2+n)} + \frac{1}{(3+n)} + \dots \dots \dots \text{پر استعمال کرو۔}$$

امثلہ ۳۵

- ۱۔ اگر ایک گیس کا دباؤ (د) ہو اور حجم (ح) اور ان میں تعلق ہو د ح = مستقل
تو حجم ح سے ح تک پھیلنے میں کام و ا ح لوک $\frac{1}{ح}$ ہو گا۔
- ۲۔ اگر اس میں رشتہ د ح $\frac{1}{ح}$ = مستقل ہو تو کام ہو گا

$$\frac{1}{ح} - \frac{1}{د ح} = (د ح - د ح) \frac{1}{ح}$$

- ۳۔ ایک لچکدار رسی کا تناؤ ایسے بدلتا ہے جیسے طبعی طول پر اس کا اضافہ۔
ایک طول سے دوسرے طول تک رسی کو کھینچ کر ناپنے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ وہی
ہے گویا تناؤ مستقل ہے اور اس کے ابتدائی اور آخری تناؤں کے نصف مجموعہ کے
مساوی ہے۔
- ۴۔ ایک یونٹ کو اتنا ہی فاصلہ سے سطح زمین تک لانے میں جاذبہ ارض جو کام کرتی ہے
وہ ن فٹ یونٹ کے مساوی ہے۔ جہاں زمین کا نصف قطر ن فٹ ہے۔ (یہ
ان لوگوں کو قوت جاذبہ زمین کے مرکز سے فاصلہ کے مربع کے بالعکس بدلتی ہے)

آمحواں با ط

ہندی استعمال

۹۹۔ رقبہ کی تعریف۔ اصول اقلیدس میں ایسے سائل

ثابت کئے گئے ہیں جن سے اصطلاح ”رقبہ“ کا ٹھیک مفہوم متعین ہوتا ہے مگر صرف اس صورت میں جبکہ اشکال بالتمام خطوط مستقیم سے گھری ہوئی ہوں۔ بالخصوص یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ایک مستطیل کسی دی ہوئی شکل کے مساوی ایک دئے ہوئے قاعدہ پر بنایا جاسکتا ہے، یہ قاعدہ کوئی اختیاری طول ہو سکتا ہے مثلاً طول کی اکائی۔ اس شکل کا رقبہ اس نسبت کے ناپ سے تعبیر ہوگا جو اس مستطیل کو اکائی طول والے ایک مربع کے ساتھ ہے۔ اس عمل کا اطلاق ایسی شکل پر نہیں ہو سکتا جو پورے یا جزوی طور پر منحنی خطوط سے گھری ہوئی ہو۔ اس لئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسی صورت میں ”رقبہ“ کے مفہوم کی تعریف کیا اختیار کی جائے۔ اسے حاصل کرنے کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ دو مستقیم الاضلاع شکلیں بنائی گئی ہیں ایک منحنی شکل کے باہر اور دوسری اس کے اندر پہلی شکل کے اندر یہ منحنی رقبہ شامل ہوتا ہے اور دوسری اس منحنی رقبہ کے اندر واقع ہوتی ہے۔ اندرونی شکل کے رقبہ کے لئے اوپر کی انتہا ہے اور بیرونی شکل کے لئے نیچلی انتہا ہے۔ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں انتہا میں نقطہ لاق ہیں۔ اس مشترک انتہائی قیمت کو اردوئے تعریف دی ہوئی منحنی الاضلاع شکل کے ”رقبہ“ کا ناپ اختیار کیا جاتا ہے۔

مثلاً دائرہ کی صورت میں (دیکھو شکل ۱۷ دفعہ ۱) اگر n ق اندرونی
 کثیر الاضلاع کا ضلع ہو تو کثیر الاضلاع کا رقبہ $\frac{1}{2} \times \text{ول} \times n$ ق ہوگا۔
 اب $\frac{1}{2} \times \text{ول}$ نصف قطر سے کم ہے اور $\frac{1}{2} \times n$ ق دائرہ کے محیط سے
 کم ہے۔ اس لئے اندر بنے ہوئے کثیر الاضلاع کے رقبہ کی اوپر کی انتہا
 $\frac{1}{2} \times 22 \times 10$ یا $\frac{1}{2} \times 22$ سے بڑھ نہیں سکتی جہاں دائرہ کا نیم قطر ہے۔ اسی طرح
 ثابت ہو سکتا ہے کہ بیرونی کثیر الاضلاع کے رقبہ کی نیچلی انتہا $\frac{1}{2} \times 22$ سے کم نہیں
 ہو سکتی۔ علاوہ اس کے اندرونی اور متناظر بیرونی کثیر الاضلاعوں کے رقبوں کا
 فرق ہے $\frac{1}{2} \times n \times \text{ول}$ اور یہ کم ہے $\frac{1}{2} \times (22 \times 10)$ صہ سے
 جہاں صہ $\frac{1}{2} \times n \times \text{ول}$ کی بڑی سے بڑی قیمت ہے۔ چونکہ یہ استفادہ جمیعی
 بنائی جا سکتی ہے جب قدر ہم چاہیں اس لئے مذکورہ بالا اوپر کی اور نیچلی انتہائیں مساوی
 ہیں، اس لئے ہر ایک $\frac{1}{2} \times 22$ کے مساوی ہے۔
 اسی طور پر ثابت ہو سکتا ہے کہ نیم قطر کے کسی دائرہ کے قطع کا رقبہ
 $\frac{1}{2} \times 22$ ہے جہاں طما قطع کا زاویہ ہے۔

۱۰۰۔ کارٹیزنی محدودوں میں رقبہ کے لئے ضابطہ۔

اگر کارٹیزنی محدودوں میں منحنی کی مساوات


ما = فضا (لا) (۱)
 ہو تو منحنی محور کا اور معینوں لا = ر، لا = ب کے درمیان گھرا ہوا رقبہ
 فضا (لا) فرلا یا فضا (لا) فرلا (۲)

تسلیم کر لیا گیا ہے کہ فضا (لا) اس نمونہ کا تقاضا ہے جسکا دفعہ ۹ میں ذکر کیا گیا نتیجہ بالا
 پہلے دفعہ کی تعریف اور دفعہ ۱۰ کی تحقیق سے فوراً اخذ ہو جاتا ہے۔ اگر محور مال ہوں اور ایک
 دوسرے کے ساتھ زاویہ مساوی بنائیں تو خصوصی تطیل ماصف لاکہ بجائے جو مجموعہ میں
 واقع ہوتے ہیں اور جنکی انتہا رقبہ ہے خصوصی متوازی الاضلاع ماصف لا جب مساوی
 ہونگے۔ رقبہ جو منحنی محور کا اور احاطہ کرنے والے دو معینوں کے درمیان

گھرا ہوا ہے اب ہوگا

جب سے $\int$ مافرلا (۳)

بے دے ہوئے خاص حدود کے درمیان لینا چاہئے۔



مثال ۱۔ ناقص $\frac{1}{2} \frac{y^2}{x} + \frac{1}{2} \frac{y^2}{x} = 1 \dots \dots \dots (۱)$
 کے رقبہ کا رقبہ دریافت کرو۔


رقبہ مطلوبہ = $\int \frac{1}{x} y^2 dx = \frac{1}{2} \frac{y^2}{x} - \frac{1}{2} \frac{y^2}{x} = \frac{1}{2} \frac{y^2}{x}$ اس
 حدود تکملہ کی قیمت دفعہ ۹۶ میں معلوم کی گئی تھی۔
 اس لئے کل ناقص کا رقبہ = $\frac{1}{2} \frac{y^2}{x}$

مثال ۲۔ قائم زائد $\frac{1}{2} \frac{y^2}{x} - \frac{1}{2} \frac{y^2}{x} = 1 \dots \dots \dots (۵)$

کی مثبت شلخ کے لئے رکھو $\frac{1}{2} \frac{y^2}{x} = \frac{1}{2} \frac{y^2}{x}$ جنہا $\frac{1}{2} \frac{y^2}{x} = \frac{1}{2} \frac{y^2}{x}$ جنہا $\frac{1}{2} \frac{y^2}{x} = \frac{1}{2} \frac{y^2}{x}$ (۶)
 کیونکہ یہ (۵) کو پورا کرتی ہیں اور ایسے $\frac{1}{2} \frac{y^2}{x}$ کی قیمتوں کی مطلوبہ سمت پوری ہوتی ہے
 یعنی محمد لا اور اس میں کے درمیان کا رقبہ جس کا تعین تغیر سے ہوتا ہے
 $\int \frac{1}{x} y^2 dx = \frac{1}{2} \frac{y^2}{x} - \frac{1}{2} \frac{y^2}{x} = \frac{1}{2} \frac{y^2}{x}$ (جنہا ۶-۱) فرع

$$\frac{1}{4} = \text{جنہ } ۶۲ - \frac{1}{4} \dots\dots\dots ۶ \dots\dots\dots (۷)$$

-۷-



شکل ۵۳

(۷) سے بائیں جانب کی شکل میں پ (ن) کا رقبہ حاصل ہوتا ہے۔

اس لئے زائدی قطع و (پ) کا رقبہ ہے

$$\frac{1}{4} \text{ پ ن } \times \text{ون} - \text{رقبہ پ (ن)} = \frac{1}{4} \times ۶ \dots\dots\dots (۸)$$

ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں زائدی تفاعلوں جنہ و جنہ و غیرہ کے حیثہ و اور دائری تفاعلوں جم طہ، جب طہ و غیرہ کے حیثہ طہ میں ایک مشابہت ہے۔ ہر صورت میں تغیر متغیر نقطہ پ کے جواب میں جس کے محدود (جنہ و جنہ و) یا (جم طہ، جب طہ) ہیں طاعی رقبہ (و پ) کے دوچند کو تعبیر کرتا ہے۔

$$\text{عام قطع زائد } \frac{لا^2}{۲} - \frac{لا^2}{۲} = ۱ \dots\dots\dots (۹)$$

کی صورت میں مثبت شلخ پر کسی نقطہ کے محدود ہیں

$$لا = \text{و جنہ و}، ما = \text{ب جنہ و} \dots\dots\dots (۱۰)$$

اور طاعی رقبہ $\frac{1}{4} \text{ و ب } \times \text{و ب}$ ہے۔

مثال ۳۔ قطع مکانی کی مساوات بلحاظ کسی قطر اور اس پر کے ماس کے ہے

$$ما^2 = ۴ \text{ و لا} \dots\dots\dots (۱۱)$$

سمت میں جانے سے رقبہ دائیں جانب واقع ہو اور منحنی علامت (-) لینا
 یا - بے اگر رقبہ بائیں جانب واقع ہو جہاں 'ا' ق ب
 لا = لا = ب کے جواب میں منحنی کے معین ہیں۔ اگر منحنی 'ا' کب
 کے درمیان محور لا کو کاٹتا ہے تو مکملہ سے رقبہ کا وہ اضافہ (مثبت یا منفی)
 حاصل ہوتا ہے جو دائیں طرف والے رقبہ کو بائیں طرف والے رقبہ پر ہے۔
 ان تعینات کے ساتھ بھی ضابطہ


فما (لا) فلا = ± مس (۲)

کا اطلاق صحیح طور پر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ تمام وقفہ ب-ا
 بحر میں لا کی ہر ایک قیمت کے لئے ما یا فما (لا) کی ایک یگانہ قیمت
 ہو۔ اگر لا کی بجائے ایک اور مقدار 'ت' متبوع مختصر قرار دیکھائے اور
 یہ ایسی ہو کہ جیسے 'ت' بڑے اس کا متناظر نقطہ پ متسل طور پر منحنی کے
 ساتھ حرکت کرے تو ضابطہ

ما $\frac{فلا}{رت}$ فرت (۳)

سے عام معنوں میں وہ رقبہ تعبیر ہوگا جو منحنی، محور لا اور نقاط پ، پ
 [جبکہ لئے ت = ت، اور ت = ت] کے معینوں کے درمیان گھرا ہوا ہے یعنی

* یہ مان لیا گیا ہے کہ محاورہ 'ما کی ستیں وہ ہیں جو شکل میں دکھائی
 گئی ہیں۔ مقابل صورت میں الفاظ "دائیں"، "بائیں" کو باہم بدل
 دینا چاہئے۔
 + مثلاً نیا متغیر منحنی کی قوس میں لی جاسکتی ہے جسے منحنی کے کسی ثابت نقطہ
 سے ناپنا شروع کیا گیا ہو۔



شکل (۵۵)

معیّن ما کے دائیں جانب حرکت کرنے سے جو رقبہ کا حصہ مرسم ہوتا ہے اسکا اضافہ اس رقبہ پر جو بائیں جانب حرکت کرنے سے مرسم ہوتا ہے اس تکملہ سے تعبیر ہوتا ہے کیا اس صورت میں ہوگا جبکہ ما مثبت ہو۔ اگر ما منفی ہو تو اس تکملہ سے رقبہ کی وہ زیادتی تعبیر ہوگی جو بائیں جانب کے مرسم رقبہ کو دائیں جانب کے مرسم رقبہ پر حاصل ہے۔

اگر ت کی کسی قیمت کے لئے 'پ ایک بند منحنی مرسم کر کے اپنے پہلے مقام پر واپس آجائے تو تکملہ

$$پ \frac{ما}{فرت} فرت \dots \dots \dots (۴)$$

کو مناسب حدود کے درمیان لینے سے منحنی کے اندر کا رقبہ حاصل ہوگا اور اسکی علامت + یا - ملے گی بموجب اس کے کہ رقبہ پ کے دائیں یا بائیں جانب رہے جبکہ نقطہ ت کے بدلنے کے ساتھ منحنی مرسم کرے۔ اگر منحنی اپنے آپ کو کاٹے تو ضابطہ (۴) سے گھرب ہوئے رقبوں کی وہ زیادتی حاصل ہوگی جو دائیں

۴ دفعہ ۸۹ میں نمائندہ تصویر کا حوالہ دیا گیا ہے بھاپ نے فشارہ (پیشن) پر آگے کی ماریں جو کام کیا اسکی زیادتی اس کام پر جو پیچے دار ماریں بھاپ خارج کرنے میں ہوا اس رقبہ سے تعبیر ہوتی ہے جو منحنی کے اندر گھرا ہوا ہے۔ پس اس رقبہ سے وہ خالص حوالہ باقی حاصل ہوتی ہے جو فشارہ کو ایک پوری ضرب میں دی گئی۔

طرف کے رقبوں کو بائیں طرف کے رقبوں پر حاصل ہے۔ (دیکھو شکل ۵۵)
بعض اوقات منحنی کا رقبہ معلوم کرنے میں یہ زیادہ سہولت مند ہوتا ہے کہ
لا کی بجائے ما کو تغیر متبوع مانا جائے۔ ایسی صورت میں رقبہ جو منحنی، محور صا
اور خطوط ما = ہ، ما = ک کے درمیان گھرا ہوا ہے صیرجاً اسی قسم کی قیود کے
تابع ذیل کے تکرار سے حاصل ہوتا ہے

لا فرما (۵)
زیادہ عام ضابطہ (۳) کے جواب میں یہ ہوگا


لا فرما فرت (۶)
معاینہ سے معلوم ہوگا کہ علامت کا قاعدہ الٹ دیا جانا چاہئے۔

اگر ایسا کیا جائے تو جملہ $\frac{1}{p}$ (لا فرما - ما فرما) فرت (۷)
سے بند منحنی کا رقبہ تعبیر ہوتا ہے جہاں ت کے حدود ایسے ہیں کہ نقطہ (لا، ما)
اپنے ابتدائی مقام پر واپس آجاتا ہے۔ اب علامت کا کلیہ یہ ہے کہ جملہ (۷)
مثبت ہوتا ہے جبکہ رقبہ ت کے بڑھنے کی سمت میں حرکت کرنے والے
نقطہ کے بائیں جانب واقع ہوتا ہے۔

۱۰۲۔ قطبی محدودوں کے لحاظ سے رقبے۔ اگر منحنی کی مساوات
قطبی محدودوں میں

ر = فدا (طما) (۱)
ہو تو رقبہ جو منحنی اور دو سمتی نیم قطروں طما = عدا، طما = بدما کے
درمیان گھرا ہوا ہے وہ اس ضابطہ سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \int_{\text{مف}}^{\text{ط}} \text{رفطط} \text{ یا } \frac{1}{2} \int_{\text{مف}}^{\text{ط}} [\text{فط} (\text{ط})] \text{رفطط} \dots (۲)$$



شکل (۵۶)

کیونکہ جیسا ساتھ کی شکل میں

دکھایا گیا ہے ہم دائروں کے
قطاعوں کی مدد سے گزرنے
والا رقبہ میں اور گھرا ہوا
رقبہ میں مرتب کر سکتے

ہیں۔ ان میں سے کسی ایک
قطاع کا رقبہ $\frac{1}{2} \int_{\text{مف}}^{\text{ط}} (\text{رفطط})$
ہے جہاں $\int$ اس کا نصف

قطر ہے اور مف ط مساوا ہے اور اس کے قطاعوں کے کسی ایک سلسلہ کا
مجموعہ اس نمونہ کے سلسلہ سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \int_{\text{مف}}^{\text{ط}} \text{رفطط} \dots (۳)$$

اس لئے سلسلہ کی یگانہ انتہا ہے جو (۲) سے تعبیر ہوتی ہے۔
یہاں مان لیا گیا ہے کہ $\int$ مساوی اور ابتدائی سے گزرنے والا
کوئی استمی نیم قطر قوس کو صرف ایک نقطہ پر کٹاتا ہے۔ لیکن اگر ایک نیا
متغیر متبوع کٹ ایسا داخل کیا جائے کہ کٹ کے بڑھنے سے متناظر نقطہ
پہنچی پر سلسلہ طور سے حرکت کرے تو جملہ

$$\frac{1}{2} \int_{\text{مف}}^{\text{ط}} \text{رفطط} \text{ فرت} \dots (۴)$$

خالص اس رقبہ کو تعبیر کرے گا جو استمی نیم قطر کٹ کے کٹ سے کٹ تک
جانے میں عبور کرتا ہے یعنی اس جملہ سے رقبہ کے ان حصوں کا اضافہ (مثبت یا منفی)
جو ط کے بڑھنے کی سمت میں استمی نیم قطر کے حرکت کر نیسے مرتب ہوتے ہیں ان حصوں پر جو

مقابل سمت میں مرسم ہوتے ہیں تعبیر ہوگا۔ علاوہ اس کے اگر ت کے بڑھنے سے نقطہ پ ایک بند منحنی مرسم کر کے واپس اپنی ابتدائی حالت میں آجائے تو جملہ

$$\frac{1}{2} \int_0^r \frac{r}{r^2} \text{ فرت} \dots \dots \dots (5)$$

سے ت کے مناسب حدود کے درمیان عام معنوں میں وہ رقبہ ملے گا جو منحنی سے گھرا ہو یعنی (ت کے بدلنے کے ساتھ جیسے نقطہ پ منحنی مرسم کرتا ہے) اس نقطہ پ کے بائیں جانب جو رقبہ واقع ہوتا ہے اس کی زیادتی اس رقبہ پر جو اٹنائے حرکت میں دائیں جانب واقع ہوتا ہے (یہ زیادتی) اس جملہ (۵) سے تعبیر ہوتی ہے۔ مقابلہ کرو دفعہ ۱۰۱ کے ساتھ۔

یہ دیکھا جائے کہ ضابطہ (۵) دفعہ ۱۰۱ کے ضابطہ (۷) کا مثال ہے۔ اگر دو ساتھ کے نقطوں پ اور ق کے محدود بالترتیب (لا، ما) اور (لا + مفا، ما + مفا) ہوں تو عنصری مثلث و پ ق کا رقبہ علامت کی قرارداد کے ماتحت منطیلی ہندسہ کے ایک ضابطہ کی رو سے یہ ہے

$$\frac{1}{4} (لا مفا - ما مفا لا)$$

ہماری موجودہ ترقیم میں $\frac{1}{4} ر مفا ط$ سے وہی چیز تعبیر ہوتی ہے۔ مثال اس دائرہ کے $2 = ر جب ط$ (۶) کا رقبہ (دیکھو شکل ۳۸ دفعہ ۶۲) ہے

$$\frac{1}{4} \int_0^r \frac{r}{r^2} \text{ جب ط فرت} = \frac{1}{4} \dots (7)$$

ماصل یہ مضیق تصدیق ہے یا مثلثی شکلہ کی قیمت نئی طرح سے دریافت کرنا ہے۔ مثال ۲۔ قطع مکانی

$$= \frac{1}{4} \int_0^r \frac{r}{r^2} \text{ جم ط} \dots \dots \dots (8)$$

کے قطع کا رقبہ دو ایسی قطروں کے درمیان یہ ہے

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{r} r^2 dr = \frac{1}{2} \int r dr = \frac{1}{4} r^2 \quad \text{فرطما} = \frac{1}{4} r^2 \quad \text{اور} \quad \int \frac{1}{r} r^2 dr = \frac{1}{2} r^2 \quad \text{قط} \quad \text{فرطما} = \frac{1}{2} r^2$$

$$= \frac{1}{4} r^2 \quad \text{اور} \quad \left[\text{مس} \frac{1}{2} r^2 + \text{مس} \frac{1}{2} r^2 \right] \dots (9)$$

جسے مناسب حدود کے درمیان لیا جائے۔ اگر حدود $\frac{r}{2}$ اور $\frac{r}{2}$ ہوں تو اس حصہ کا رقبہ بتائے جسے وتر خاص کا ٹٹا ہے جو $\frac{r}{2}$ ہے۔
مثال ۳۔ قطبی محدودوں میں قطع ناقص کی مساوات ہے

$$\frac{1}{r} = \frac{\text{جم} \text{طما}}{r} + \frac{\text{جب} \text{طما}}{b} \dots (10)$$

اس لئے رقبہ ہے

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{r} r^2 dr = \frac{1}{2} \int r dr = \frac{1}{4} r^2 \quad \text{اور} \quad \frac{1}{2} \int \frac{1}{r} r^2 dr = \frac{1}{4} r^2 \quad \text{فرطما}$$

(11).....


آخری تکرار کی قیمت دفعہ ۹۶ میں $\frac{r}{2} / (r \text{ ب})$ معلوم کی گئی ہے۔ اس لئے مطلوبہ رقبہ $\frac{r}{2} \text{ ب}$ ہے۔

۱۰۳۔ رقبہ جو ایک متحرک خط اپنی حرکت میں عبور کرتا ہے۔

ایک متحرک خط جس کا طول مستقل یا تغیر ہے اپنی حرکت سے ایک سطح مستوی میں جو رقبہ عبور کرتا ہے وہ اس طرح محسوب ہو سکتا ہے۔

خط کے دو متصل مقام پ ق اور پ ق ہیں اور انکی سمتیں ج پر ملتی ہیں۔ فرض کرو کہ پ ق اور پ ق کے وسطی نقطے سے باہر م ہیں اور م سے ایک دائرہ کی قوس ہے جو ج کو مرکز مان کر کھینچی جائے اگر زاویہ پ ج پ کو مفطما سے تغیر کیا جائے تو آخر الامر رقبہ پ ق ق پ = ح ق ج ق - ح پ ج پ

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \text{ ج ق } \times \text{ مف ط ه } - \frac{1}{4} \text{ ج پ } \times \text{ مف ط ه } \\ &= \text{ پ ق } \times \frac{1}{4} (\text{ ج پ } + \text{ ج ق }) \text{ مف ط ه } \\ &= \text{ پ ق } \times \text{ ج ر } \times \text{ مف ط ه } = \text{ پ ق } \times \text{ ر س } \end{aligned}$$




اگر طول پ ف کو ع سے تعبیر کیا جائے اور سر کے غصہ کی ہٹاؤ کو مفید شہ سے جہاں یہ ہٹاؤ متحرک خط کی عمودی سمت میں ناپا گیا ہے تو رقبہ جو عبور ہوا اس ضابطہ سے تعبیر ہو گا

یہ توجہ کے قابل ہے کہ دفعات ۱۰۰، ۱۰۲ کے ضابطے اس نتیجہ کی خاص صورتیں ہیں۔ مثلاً دفعہ ۱۰۰ (۳) حاصل ہوگا اگر کہیں

ع = ماکف ثما = مہف لاجب سہ
مندرجہ بالا میں یہ خاموشی سے مان لیا گیا ہے کہ رقبہ ہمیشہ ایک ہی سمت
میں عبور ہوئے ہیں۔ لیکن یہ آسانی سے معلوم ہوگا کہ ضابطہ (۱) بغیر کسی ایسی
قید کے لگ سکیگا بشرطیکہ رقبوں کو مثبت شمار کیا جائے جبکہ یہ خط کے اس
جانب عبور ہوں جس جانب مہف ثما کو مثبت خیال کیا جاتا ہے اور
اسکی مقابل سمت میں منفی۔ مثلاً جو رقبہ ایک ایسا خط مستقیم عبور کرتا ہے جس کا
وسلم نقطہ ثابت ہے اس حساب کے مطابق صفر ہوگا۔

تقریباً ۱۰۰ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے ایک کتاب لکھی جس کا نام "The Principles of Algebra" تھا۔ اس کتاب میں اس شخص نے ایک نیا طریقہ پیش کیا تھا جس سے ایک شخص کو ایک مسئلہ کو حل کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ اس شخص کا نام "Al-Khwarizmi" تھا۔ اس کی کتاب "The Principles of Algebra" نے ایک نیا دور لایا تھا۔ اس کی کتاب میں اس شخص نے ایک نیا طریقہ پیش کیا تھا جس سے ایک شخص کو ایک مسئلہ کو حل کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ اس شخص کا نام "Al-Khwarizmi" تھا۔ اس کی کتاب "The Principles of Algebra" نے ایک نیا دور لایا تھا۔


سرے دو بند ٹمچنیوں کو مرسم کریں اور آخر میں پ ق اپنے اصلی مقام پر آجائے تو اوپر کی قرارداد کے موافق 'ق' کے راستہ سے جو رقبہ محیط ہوتا ہے اسکی زیادتی اس رقبہ پر جو پ کے راستہ سے محیط ہوتا ہے اس تکملہ (۱) سے تعبیر ہوگی بشرطیکہ ان رقبوں کی علامتیں دفعہ ۱۰۲ کے قاعدہ کے مطابق ہوں۔



۱۰۴۔ ایسلسر کے سطح پیمائش (Amsler's planimeter) کا نظریہ -

سطح پیمائش ایک آلہ ہے جس کی مدد سے کاغذ پر کھینچی ہوئی کسی شکل کا رقبہ آلی یا حسی طریقہ پر دریافت کیا جاتا ہے۔

ایسلسر کئی آلات ایجاد ہوئے ہیں، لیکن سب سے سادہ اور مقبول (ایسلسر) کا سطح پیمائش ہے جو ۱۸۵۴ء میں ایجاد ہوا۔ ایسلسر ٹراف ہاسن (سوٹزر لینڈ) کا رہنے والا تھا۔ یہ آلہ دو سلاخوں 'و پ'، 'پ ق' پر مشتمل ہے جو آزادانہ طور پر پ پوسل کی جاتی ہیں۔ سلاخ 'و پ' ایک ثابت نقطہ کے گرد گھوم سکتی ہے۔ اگر ایک مرسم نقطہ (پوسل) سلاخ 'پ ق' کے ساتھ ق پر



لگا دیا جائے اور اس کو
ایک بند مخفی کے گرد بھرا
جائے تو پ ایک دائرہ
کی قوس پر آگئے پیچھے استراز
کرے گا گویا یہ صفرِ قبحہ کا
احاطہ طے کرے گا۔ اسلئے
دفعہ ۱۳ اس کے آخر میں جو مسئلہ
بیان ہوا اس کے مطابق

ق نے جو قبضہ مرستم کیا، ساوی ہوگا

۱۔ فرشتہ (۱)
کے جہاں پ ق کا طول ل ہے اور ل فرشتہ سے پ ق کے
وسطی نقطہ سر کی گئی حرکت تعبیر ہوتی ہے جبکہ ہمیشہ اس کا پ ق کے عمود کی
سمت میں اندازہ کیا جا رہا ہے۔

اب جیسا کہ آلہ کے حقیقی استعمال میں عام طور پر ہوتا ہے اگر پ ق
 جو راجح رنگنے کے بغیر اپنے اصلی مقام پر واپس آجائے تو س کی گھٹی حرکت
 پ ق پر نمودار نسبت میں یہی ہوگی جو خط پ ق کے کسی اور نقطہ
 خلا س کی ہے۔ کیونکہ اگر س کے استوں کے متنظر اجزاء مفہ
 مفہ ہوں نہیں اور کی طبع نایا گیا ہے تو


مف ثه - مف ثه = ثه مف طا

جہاں ترس کے شعل تقاضات کے وہ میان زاویہ مفہم ہے۔ اسلئے

$$\text{کف ثه} = \text{کف ثه} + \text{سر ص} \text{ کف طه} = \text{کف ثه} \dots (۲)$$

کیونکہ مفروضہ حالات کے ماتحت $\int \text{مف طہ} = 0$.

* بالصوم یہ ہی بات انہیں ہے جو سہا کے راستہ کا طول۔



آلہ کی حقیقی ساخت میں ایچ پی کی طرف خارج کئے ہوئے خط ق پ پر کے نقطہ س کی تکمیلی یا کملی حرکت، سلاخ کے عمود وار ایک چھوٹے پھیپہ کے ذریعہ درج (Record) کی جاتی ہے جہاں پھیپہ کا محور پ ق کی سمت میں ہوتا ہے جیسے ق کوئی انجنی مرستم کرتا ہے پھیپہ کا غڈ کی سطح میں جس پر انجنی کھنچا ہوا ہے تھوڑا لڑکتا ہے اور تھوڑا پھسلتا ہے اور پھیپہ کا گھومنا س کے عمودی ہٹاؤ کے عین متناسب ہے۔ پہلے پر زور دے لگتے ہوئے ہیں اور جزوی گردشوں کے ریکارڈ کے لئے ایک ثابت نمائندہ ہوتا ہے۔ پوری گردشیں ایک Dial and counter کی مدد سے ناپی جاتی ہیں۔

طول پ ق کے کئے بدلنے کے لئے بھی انتظام ہوتا ہے۔ اس سے

محض اندراج کا پیمانہ بدلتا ہے۔

زیادہ جربہ ثبوت تحلیلی طریق پر ہے۔ و میں سے قائم محور لو، فرض کر دو کہ

و پ، پ ق محور لا کی مثبت سمت کے ساتھ بالترتیب زاوے طما اور قما بناتے ہیں، رکھو و پ = ل، پ ق = ل، ق ق کے محدود

سب ذیل ہیں

لا = (رجم طما + ل جم قما) = (رجب طما + ل جب قما)۔ (۳)
اسلئے لا مف ما = (رجم طما + ل جم قما) = (رجب طما + ل جب قما)
ل جم قما مف قما

(رجب طما + ل جب قما) = (رجب طما + ل جب قما) مف قما
= (مف طما + ل جم قما) = (مف طما + ل جم قما)

$$= \text{مف} \{ \text{ل} + \text{ط} + \text{ل} + \text{ف} + \text{ل} \text{ جب (ف۔ط) } \}$$

$$+ ۲ \text{ ل جم (ف۔ط) مف ط} \dots (۴)$$

پ ق میں کسی قطر کا صغاری ہٹاؤ مف ث، جسے پ ق پر عمود وار نایا جائے دو ہٹاؤں سے مرکب ہوگا، ایک ہٹاؤ پ کے لحاظ سے دوسرا خود پ کا ہٹاؤ جسے پ ق کی عمود وار سمت میں تحلیل کیا جائے۔ اسلئے اگر پ س = ب تو

$$\text{مف ث} = \text{ب مف ف} + \text{مف ط} \times \text{جم (ف۔ط)} \dots (۵)$$

اس لئے $\frac{1}{4} \text{ (لا مف ما۔ ما مف لا)}$

$$= \frac{1}{4} \text{ مف} \{ \text{ل} + \text{ط} + \text{ل} + \text{ب} + \text{ف} + \text{ل} \text{ جب (ف۔ط) } \}$$

$$+ \text{ل مف ث} \dots (۶)$$

اس سے ماہل ہوتا ہے کہ اگر ق اس طور پر پور اعلقہ منقسم کرے کہ ط اور ف واپس اپنی ابتدا فی قیمتوں پر عود کریں تو

$$\frac{1}{4} \text{ (لا مف ما۔ ما مف لا)} = \text{ل مف ث} \dots (۷)$$

دائیں جانب کا جملہ دفعہ ۱۰۱ کی رو سے اس رقبہ کے مساوی ہے جو طلقہ سے گھرا ہوا ہے۔

۱۰۵۔ مجسموں کے حجم۔ ایسے مجسم کے ”حجم“ کی بھی عام تعریف

کرنا جو بالتمام مستوی سطحوں سے گھرا ہوا ہو کسی نہ کسی شکل میں ”انتہائی قیمت“ کے تخیل کو داخل کئے بغیر ناممکن ہے۔

آقلیدسی طریقوں سے یہ ضرور ثابت ہو سکتا ہے کہ دو قائم تنواری السطوحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ ان نسبتوں سے مرکب ہوتی ہے جو ایک کے تین متساوی کناروں کو ایک ایک کر کے دوسرے کے تین متساوی کناروں کے ساتھ (نسبتیں) ہوں۔ اور زیادہ عام طور پر دو مشنوروں

کو ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ ان کے ارتفاعوں کی نسبت اور ان کے قاعدوں کی نسبت سے مرکب ہوتی ہے۔ اس طریق پر کسی منشور اور اکائی مکعب کی باہمی نسبت کی تعریف کی جاسکتی ہے۔

لیکن ایک دے ہوئے کثیر السطوح کو منشوروں کی محدود تعداد میں کاٹنا عام طور پر ممکن نہیں۔ سادہ اور عام طریقہ یہ ہے کہ اس کو مصلع مخروطوں (میناروں) میں کاٹا جائے جن کے مشترک راس اندر کے کسی نقطہ پر لیں اور کثیر السطوح کے چہرے ان کے قاعدے ہوں۔ لیکن مینار اور منشور کے مجموں کا مقابلہ بغیر انتہائی قیمت کے تحلیل کو داخل کرنے کے نہیں ہو سکتا۔ مثلثی منشور کو البتہ مساوی ارتفاع اور مساوی قاعدوں والے تین میناروں میں کاٹا جاسکتا ہے (اقلیدس ۱۴ م، ۱۲ ش) ۳۳۳

لیکن صفاری عناصر کے تحلیل کو شامل کئے بغیر ان میناروں کو آپس میں مساوی نہایت نہیں کیا جاسکتا۔

ایسے مجسم کے حجم کی عام تعریف جو کسی طرح کی سطحوں مستوی یا منحنی سے گھرا ہوا ہو ایسی ہی مرتب ہو سکتی ہے جیسے مستوی شکل کے رقبہ کی صورت میں (شکل ۹۹)۔ ہمیشہ دو شکلیں بنانا ممکن ہوگا جو منشوروں سے بنی ہوئی ہوں، ان میں سے ایک دے ہوئے مجسمہ کو گھیرے اور دوسری مجسم سے گھری ہوئی ہو اور ان کے مجسموں کا فرق اتنا کم ہو جتنا ہم چاہیں۔ ان میں سے کسی ایک شکل کے حجم کی انتہائی قیمت کو جب ان شکلوں کا فرق لا انتہا کم ہو جائے بطور تعریف کے اختیار کر لیا جاتا ہے کہ یہ دے ہوئے مجسمہ کا ”حجم“ ہے۔ پہلے کی طرح ہم اس امر کا اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ انتہائی قیمت یگانہ ہے۔

مستوی متوازی سروں والے کسی اسطوانہ (قائم یا مائل) کا حجم کسی سرے کے رقبہ اور سروں کے درمیان کے عمودی فاصلہ کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتا ہے۔ کیونکہ عاظم اور نیز محیط منشوری شکلیں بنائی جاسکتی ہیں جنکے قاعدے ایسے کثیر الاضلاع ہیں جو اسطوانہ کے قاعدہ کا احاطہ کرتے ہیں اور اس سے محیط ہو جاتے ہیں۔ اوپر کا بیان ان میں سے ہر شکل کے لئے درست ہے۔ اسلئے انتہائی قیمت اسطوانہ کے لئے بھی درست ہے۔ دائری اسطوانہ کا حجم اسلئے $\pi r^2 h$ ہے

جہاں ارتفاع کا نصف قطر ہے اور ف اس کا ارتفاع۔ اس طرح متوازی مستوی سطحوں والے اسطوانہ کا حجم معلوم ہو گیا۔ اب اگر ہم چاہیں تو بطور ضمنی اشکال کے جو اوپر عام تعریف میں استعمال کی گئی ہیں منشوروں کی بجائے ایسے اسطوانے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی طریقہ سے بھی آخری انتہا لازماً وہی رہنی چاہئے۔

۱۰۶۔ کسی مجسم کے حجم کے لئے عام جملہ۔

محور کا کو کسی مناسب سمت میں اکھنچ لیا جائے۔ مبدأ سے فاصلہ لا پر ایک سطح مستوی لیکر جو محور پر عمود ہو اگر مجسم کو تراشا جائے تو فرض کرو کہ اس تراش کا رقبہ (لا) ہے۔ اگر وقفہ صف لا پر محور کا عمود دار مستوی سطحوں کا نظام کھینچا جائے تو ظاہر ہے کہ حجم مطلوبہ ذیل کے مجموعہ کی انتہا ہوگی

ح (ف (لا) صف لا) (۱)

کیونکہ اس مجموعہ کا ہر جزو ایک اسطوانہ کے حجم کو تعبیر کرتا ہے جس کا ارتفاع صف لا ہے اور قاعدہ ف (لا)۔ اسلئے حجم مطلوبہ حاصل ہوگا اس ضابطہ سے

ف (لا) فرلا (۲)

جہاں لا کو مناسب حدود کے اندر لیا جانا چاہئے۔


مثال ۱۔ مخروط (یا مینار) کی صورت میں جو قائم یا مائل ہو اور کسی قاعدہ پر کھڑا ہو مبدأ و اس پر لو اور محور کا قاعدہ پر عمود دار۔ فرض کرو کہ قاعدہ کا رقبہ (اے) اور ارتفاع ف تو مبدأ و سے فاصلہ لا پر تراش کا رقبہ

$$ف (لا) = \left(\frac{لا}{ا} \right)^2 (۳)$$

کیونکہ متشابہ رقبے متناظر اضلاع کے مربعوں کے متناسب ہوتے ہیں۔ اس لئے حجم

$$= \frac{ا}{ف} \int لا فرلا یا \frac{۱}{۳} ف لا^۳ (۴)$$

یعنی قاعدہ کے رقبہ اور ارتفاع کے حاصل ضرب کے ایک تہائی کے مساوی ہے۔
 مثال ۲۔ چار سطحی کا حجم ہے $\frac{1}{3}$ ص Δ جب ص (۵)
 جہاں Δ کے مقابل کے کناروں کے طول ہیں، ص ان کے درمیان کم سے کم
 فاصلہ ہے اور ص انکی سمتوں کے درمیان زاویہ ہے۔



شکل (۶)

چار سطحی کو سروں Δ کے متوازی سطحوں سے تراش کر باریک پتروں یا چادروں میں
 تقسیم کرو۔ یہ تراشیں کم سے کم فاصلہ ص پر عمود وار ہوں گی۔ شکل (۶) کے حوالہ سے ظاہر
 ہے کہ نظام کے اس مستوی کی تراشیں جو سرے Δ سے فاصلہ Δ پر واقع ہے ایک
 متوازی الاضلاع شکل ہوں گی جس کے اضلاع ہیں

$$\frac{\Delta}{\text{ص}} \times \Delta \quad \text{اور} \quad \frac{\text{ص}}{\Delta} \times \Delta$$

۳۳۵

اور اس کا رقبہ ہے $\frac{\Delta}{\text{ص}} (\text{ص} - \Delta)$ جب ص

اس لئے چار سطحی کا حجم ہے $= \frac{\Delta}{\text{ص}} \text{ جب ص } \Delta (\text{ص} - \Delta) \text{ فرلا}$

جودی ہوئی قیمت میں تحویل ہو جاتا ہے۔

۱۰۷۔ گردشی مجسم - فرض کرو کہ تکوینی منحنی

$$\text{ما} = \text{فنا} (لا) \dots\dots\dots (۱)$$

ہے، محور کا تشاکل کا محور ہے اور مجسم مستوی سیدوں سے گھرا ہوا ہے جو محور کا پر عمود ہیں۔ اس صورت میں رقبہ ف (لا) اس دائرہ کا رقبہ ہے جس کا نیم قطر ما ہے اور یہ π ما ہوگا۔ اس لئے مطلوبہ حجم ہے

$$\pi \text{ ما}^2 \text{ فرلا} \dots\dots\dots (۲)$$

جبکہ اسے مناسب حدود کے درمیان لیا جائے۔ دراصل اس مجموعہ کا ہر عنصر جسکی انتہا اوپر کا ٹکڑہ ہے ایک گول تختی کے حجم کو تعبیر کرتا ہے جس کی موٹائی صفت لا ہے اور رقبہ π ما^۲۔

مثال ۱۔ دائرہ کی مساوات جبکہ مبدأ اس کے محیط پر کا کوئی نقطہ ہو یہ ہے

$$\text{ما} = لا (۱۲ - لا) \dots\dots\dots (۳)$$

اس لئے نقطہ کرہ کا حجم جس کا ارتفاع ف ہو یہ ہے

$$\pi \int_{لا}^{لا} لا (۱۲ - لا) \text{ فرلا} = \pi \left[لا^2 - \frac{لا^3}{۳} \right] \dots\dots\dots$$

$$\pi \text{ ف} (۱ - \frac{\text{ف}}{۳}) \dots\dots\dots (۴)$$

جہاں کرہ کا نیم قطر ہے۔ پورے کرہ کے لئے ف = ۲ اور حجم ہے $\frac{۴}{۳} \pi$

یا مائٹ مستدیر اسطوانہ کے حجم $(\pi \times ۱۲)$ کا دو تہائی۔

$$\text{مثال ۲۔ منحنی} \text{ ما} = لا^۴ \dots\dots\dots (۵)$$

کو محور لا کے گرد گھمانے سے جو مکافی نمایدا ہوتا ہے اس کے قطعہ یا حصے کا حجم جس کا ارتفاع ف ہو یہ ہے

$$\pi \text{ مافرلا} = \pi \text{ ۱۴} = \left[\frac{\pi}{2} \right] \pi \text{ ۲} = \pi \text{ ۲} \text{ رف} \dots (۶)$$

اگر قاعدہ کا نیم قطر ب ہو تو ب' = ۴ ۱ رف - اس لئے حجم ہے ۱۴ ب' رف
یا اسی قاعدہ اور اسی بلندی کے اسطوانہ کے حجم کا آدھا -
مثال ۳ - لنگر پچھلے کا حجم دریافت کرو جو دائرہ

۲۴۶

$$\pi \text{ ۲} = \pi \text{ ۲} \text{ (ما) ۱} = \pi \text{ ۲} \text{ ب} \dots (۷)$$

کو محور لا کے گرد پھرانے سے پیدا ہوا ہے جہاں ۱ < ب' دیکھو شکل ۶۲ -
= ب کے درمیان لاکہ ہر ایک قیمت کے لئے ماکہ دوہتیں ہیں فرض کرو ما' ما' یعنی

$$\pi \text{ ۲} = \pi \text{ ۲} \text{ (ما) ۱} = \pi \text{ ۲} \text{ ب} \dots (۸)$$

پچھلے کی تراش کا رقبہ جبکہ اسے محور لا پر عمود وار ستوی سے کاٹ جائے ہوگا

$$\pi \text{ ۲} - \pi \text{ ۲} = \pi \text{ ۲} \text{ (ما) ۱} = \pi \text{ ۲} \text{ ب} \dots (۹)$$

اور مطلوبہ حجم ہے $\pi \text{ ۲} \text{ ۱} \text{ ب} \text{ (ما) ۱} = \pi \text{ ۲} \text{ ب} \dots (۱۰)$
دفعہ ۹۲ مثال ۵ کی رو سے -

یہ حجم اس اسطوانہ کے حجم کے مساوی ہے جس کی تراش (ب' ب) چھلے کی تراش کے
مساوی ہو اور جس کا طول (۱۲۲) اس دائرہ کے محیط کے مساوی ہو جو کوئی دائرہ کامرکز مرکز ہے

۱۰۸ - بعض متعلق صورتیں - دفعہ ۱۰۶ کے عام ضابطہ (۲)

کی اور مثالیں درج کی جاتی ہیں -

مثال ۱ - ناقص مکافی نما

$$\pi \text{ ۲} = \frac{\pi \text{ ۲}}{\pi} + \frac{\pi \text{ ۲}}{\pi} \dots (۱)$$

کی تراش ستوی (۱) = مستقل سے ایک ناقص ہے جس کے نیم محور ۲ پ' لا اور

۲۱۲ ق لا ہیں اور اس لئے اس کا رقبہ ۲۱۲ پ ق لا ہے۔

اس لئے مستوی لا = ف مجسم سے جو قطعہ کاٹا ہے اس کا حجم ہے

$$۲۱۲ پ ق \int (لا فر لا) = ۲۱۲ پ ق ف \dots (۲)$$

یہ اس اسطوانہ کے نصف حجم کے مساوی ہے جس کا ارتفاع وہی ف ہو اور وہ یہی ناقصی قاعدہ پر قائم ہو۔

$$\text{شال ۲۔ ناقص نما} \quad \frac{لا}{۱} + \frac{ب}{۲} + \frac{ج}{۳} = ۱ \dots (۳)$$

میں مستوی لا = مستقل سے تراش ایک ناقص ہے جس کے نیم محور ہیں

$$ب \sqrt{۱ - \frac{لا}{۱}} \text{ اور } ج \sqrt{۱ - \frac{لا}{۱}} \dots (۴)$$

اور جس کا رقبہ ہے

$$۲۱۲ ب ج (۱ - \frac{لا}{۱}) \dots (۵)$$

کسی دو ستویوں کے درمیان کے حصہ کا حجم جبکہ یہ مستوی محور لا پر عمود وار ہوں یہ ہے

$$۲۱۲ ب ج \int (۱ - \frac{لا}{۱}) \text{ فر لا} \dots (۶)$$

جسے لا کے مناسب حدود کے درمیان لیا جائے۔ کل حجم کے لئے لا کے حدود ± ۱ ہیں اور کل حجم ہے $\frac{۲}{۳} ۲۱۲ ب ج$ ۔

۱۰۹۔ سپین کا قاعدہ۔ اوپر کے اکثر نتائج دراصل ایک عام

ضابطہ میں شال ہیں جو ایسی تمام صورتوں میں لگ سکتا ہے جہاں محور لا پر

عمود وار مستوی تراش کا رقبہ لا کا دوسرے درجہ کا تفاعل ہو۔

ایسی صورت میں دو متوازی ستویوں کے درمیان کا حجم، محض ان تراش


کے رقبوں اور ان کے عین درمیان کی تراش کے رقبے اور سروں کے مستویوں کے درمیان کے وقفے (۲ ف) کی رقوم میں حاصل ہو سکتا ہے۔ چونکہ دو درجہ تفاعل کی صورت لا میں ایک استقل جمع کرنے سے نہیں بدلتی، ہم مبداء کو باسانی وسطی تراش میں لے سکتے ہیں۔ رکھو

ف (لا) = (ا + ب لا + ج لا) (ا)

اس طرح


$$f^n = f^{(n)} = f + f^2 + f^3 + \dots + f^n$$

احاطہ کرنے والی تراشیں صدری محور پر عمود وار ہوں۔ جو طالب علم درجہ دوم کی سطحوں کے نظریہ سے واقف ہے وہ آسانی سے دیکھ لے گا کہ یہ آخری شرط ضروری نہیں ہے ایسے مجسم کی صورت بھی موجودہ قاعدہ کے تحت آتی ہے جہاں مجسم



شکل (۶۲)

دو متوازی مستوی کشیداری
رخون اور اطراف میں مستوی
رخوں سے جو شملت ہوں
یا منحرف گھرا ہوا ہو۔ اس میں
ہم وہ صورت بھی شامل کر سکتے
ہیں جہاں بعض اسب طرزی پہلو
ایسی متوجہ ہیں ہوں (زرا اندی
مکانی نام) جن کی نگویں خطوط
مستقیم سے ہوتی ہے جو کثیر الاضلاعوں کے مستویوں کے متوازی حرکت کرتے
ہیں اور جن میں سے ہر ایک خط دو ایسے خطوط متقوم کو قطع کرتا ہے جن میں سے
ہر ایک ایک کثیر الاضلاع کے ایک دائرے کو دوسرے کثیر الاضلاع کے ایک دائرے سے
ساتھ ملتا ہے۔



شکل (۶۳)

اور چونکہ ہر کثیر الاضلاعی سطح میں اضلاع کی تعداد لا انتہا بڑھائی جاسکتی ہے یہ قاعدہ اس مجسم کی صورت میں بھی لگایا جودوستوی متوازی رخوں سے اور ایک ایسی منحنی سطح سے گھرا ہوا ہو جو ایک خط مستقیم کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے اور یہ خط ہمیشہ ان رخوں کے محیطوں سے ملتا ہے۔

مثال ۱۔ نامکمل قائم مستدیر مخروط کا حجم دریافت کرو۔
فرض کرو کہ مستوی سروں کے نصف قطر 'ا' ہے اور وسطی تراش کا نصف قطر $\frac{1}{2}$ ('ا' + 'ب') ہے۔ پس

$$س_۱ = \pi ر_۱^۲ = \pi ('ا' + 'ب')^۲ = س_۲ = \pi ر_۲^۲$$

اس لئے حجم ہے $\frac{1}{3} \pi ر_۱^۲ ('ا' + 'ب' + 'ا') \dots \dots (۶)$
جہاں نامکمل کا ارتفاع 'ف' ہے۔

مثال ۲۔ نصف قطر 'ا' کے مجسم کرہ میں نصف قطر 'ب' کا ایک اسطوانی سوراخ مرکز میں سے برمایا گیا ہے۔ باقی ماندہ حجم دریافت کرو۔

یہاں $س_۱ = س_۲ = \pi ر_۱^۲ = \pi ر_۲^۲$ ('ا' - 'ب') ہے۔
اسلئے وسطی تراش $\frac{1}{2} \pi ر_۱^۲ ('ا' - 'ب')^۲$ ہے۔ سوراخ کا طول 'ا' - 'ب' ہے۔ مطلوبہ حجم اس لئے ہے $\frac{1}{3} \pi ر_۱^۲ ('ا' - 'ب')^۲ \dots \dots (۷)$

۱۱۔ منحنی خطوط کا طول معلوم کرنا۔ مستقیم الاضلاع شکل کا محیط

وہ طول ہے جو شکل کے مختلف اضلاع کے مساوی طول لیکر ان کو ترتیب وار ایک ہی خط مستقیم میں سروں پر سرے لکھنے سے حاصل ہو۔
چونکہ منحنی خط خواہ یہ کتنا ہی چھوٹا ہو خط مستقیم کے کسی حصہ پر یوں منطبق نہیں کیا جاسکتا، اس لئے اس امر کی تعریف مطلوب ہے کہ ایک منحنی کے "طول" سے کیا مراد ہے۔ عام طور پر یہ تعریف اختیار کی جاتی ہے کہ یہ طول ان

بنے ہوئے کثیر الاضلاع کے محیط کی انتہا ہے جبکہ اضلاع کا طول لا انتہا کم ہو جائے۔
یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ سوائے شاید تنہا نقطوں کے منحنی کا ڈھال مسلسل ہے یعنی کسی
دو متضکل نقطوں پ اور ق کے ماسوں کا باہمی میلان 'ق کو پ
کے کافی قریب لانے سے آنا کم کیا جاسکتا ہے جتنا ہم چاہیں۔ یہ معلوم ہو گا کہ تمام
قیود کے ماتحت مذکورہ بالا انتہا یگانہ ہے نیز یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ انتہا باہر
بنے ہوئے کثیر الاضلاع کی متناظر انتہا کے مساوی ہے۔

اگر منحنی کے دو متصل نقطوں پ اور ق کے کارٹیزی محدد (لا، ما) اور

(لا، مفا) + (ما، مفا) ہوں تو وتر پ ق کا طول ہے $\sqrt{(مفا - لا)^2 + (مفا - ما)^2}$

دفعہ ۶۰ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اگر ما اور $\frac{فرما}{فرلا}$ محدود اور مسلسل ہوں تو نسبت

$\frac{مفا - لا}{مفا - ما}$ پ اور ق کے درمیان منحنی کے کسی ایک نقطہ کے لئے مشتق
تفاعل $\frac{فرما}{فرلا}$ کی قیمت کے مساوی ہے۔ اسلئے $\frac{فرما}{فرلا}$ کی مناسب قیمت منتخب کرتے

$$پ ق = \sqrt{1 + \left(\frac{فرما}{فرلا}\right)^2} مفا - لا$$

اخر بے ہوئے کثیر الاضلاع کے محیط کی انتہائی قیمت اس لئے یہ ہے

$$\int \sqrt{1 + \left(\frac{فرما}{فرلا}\right)^2} فرلا \dots \dots \dots (۱)$$

جبکہ اس تکمیل کو لا کے مناسب محدد کے درمیان لیا جائے۔ اس امر کو کہ یہ انتہائی
قیمت یگانہ ہے دفعہ ۹۰ میں ثابت کیا گیا ہے۔

اگر لا کو ما کا تفاعل خیال کیا جائے تو متناظر ضابطہ ہو گا

$$\int \sqrt{1 + \left(\frac{فرلا}{فرما}\right)^2} فرما \dots \dots \dots (۲)$$

۲۵۰۔ منحنی کی قوس کو ms سے تعبیر کرو جبکہ قوس کو ایک اختیاری نقطہ (لا) سے ناپنا شروع کیا گیا ہے اور دفعہ ۶۰ کی مانند رکھو $\frac{فرلا}{س} = مس$ چہا تو $\frac{فرلا}{س}$ ہو جاتا ہے

(۳) $ms = \int \sqrt{1 + \left(\frac{فرلا}{س}\right)^2} ds$ قط پہا $\frac{فرلا}{س}$ (۳)
ضابطہ (۲) کے لئے مائل استعمال ہو جاتا ہے۔

مثال ۱۔ زنجیر $ما = ج$ جہن $\frac{فرلا}{س}$ (۴)
میں $\int \sqrt{1 + \left(\frac{فرلا}{س}\right)^2} ds = \int \sqrt{1 + ج^2} ds$

$= \int ج$ جہن $\frac{فرلا}{س} = ج$ جہن $\frac{فرلا}{س}$
چونکہ یہ لا کے ساتھ صفر ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے نقطہ سے اگر ms کو ناپا جائے تو

(۵) $ms = ج$ جہن $\frac{فرلا}{س}$
مثال ۲۔ مکانی $ما = ۴$ لا (۶)

میں $\int \sqrt{1 + \left(\frac{فرلا}{س}\right)^2} ds = \int \sqrt{1 + ۱۶} ds$
شمار کنندہ کو پہلے منطبق بنانے سے، دفعہ ۶ کے طریقہ سے اسے مکمل کیا جاسکتا ہے۔
رکھو $لا = ج$ جہن ۴ ، اس طرح مائل ہوتا ہے

۱۲ $\int ج$ جہن ۴ فرع ۱ $\int (۱ + جہن ۴) فرع ۱$ ۴ ۴ جہن ۴ (۸)
چونکہ ۴ لا کے ساتھ صفر ہوتا ہے اس سے قوس کا طویل ملتا ہے جبکہ قوس کو ms سے ملایا جائے۔

دفعہ سابق کے (۳) کو بلحاظ مکمل کی اوپر کی مد (لا) کے تفریق کرنے سے اس کی
بآسانی تصدیق ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\text{ہا} = \frac{\text{مف س}}{\text{مف لا}} = \text{قط پہا} \dots\dots\dots (۴)$$

چونکہ جب 'ق کو پ کے لا انتہا قریب لایا جاتا ہے تو ر پ ق کی
مف لا کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی انتہائی قیمت قط پہا ہے اسلئے آنتہا میں

$$\text{ہا} = \frac{\text{مف س}}{\text{پ ق}} = ۱ \dots\dots\dots (۵)$$

اوپر کے اصول سے کئی ضروری ضابطے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر
نخی کے کسی نقطہ پ کے محدد لا، فاقوس میں کے تفاعل خیال کے جائیں تو
شکل ۱۹ دفعہ ۲۴ کے بموجب

$$\text{جم ق پ ر} = \frac{\text{پ ر}}{\text{پ ق}} = \frac{\text{مف لا}}{\text{مف س}} \times \frac{\text{مف س}}{\text{پ ق}}$$

$$\text{جب ق پ ر} = \frac{\text{ق ر}}{\text{پ ق}} = \frac{\text{مف فا}}{\text{مف س}} \times \frac{\text{مف س}}{\text{پ ق}}$$

$$\text{اس لئے جم پہا} = \frac{\text{فر لا}}{\text{فر س}} \text{، جب پہا} = \frac{\text{فر فا}}{\text{فر س}} \dots\dots\dots (۶)$$

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

$$\left(\frac{\text{فر لا}}{\text{فر س}} \right) + \left(\frac{\text{فر فا}}{\text{فر س}} \right) = ۱ \dots\dots\dots (۷)$$

نیز اگر لا، فاقوس اور تغیرت کے تفاعل ہوں تو

$$\text{پ ق} = \left[\left(\frac{\text{مف لا}}{\text{مف ت}} \right) + \left(\frac{\text{مف فا}}{\text{مف ت}} \right) \right] \times \text{مف ت}$$

$$\text{اس لئے ہا} = \frac{\text{پ ق}}{\text{مف ت}} = \left[\left(\frac{\text{فر لا}}{\text{فر ت}} \right) + \left(\frac{\text{فر فا}}{\text{فر ت}} \right) \right]$$

$$\text{یا } \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}} = \sqrt{\left(\frac{\text{فرلا}}{\text{فرت}}\right)^2 + \left(\frac{\text{فرما}}{\text{فرت}}\right)^2} \dots\dots\dots (۸)$$

$$\text{اس لئے } \text{س} = \sqrt{\left(\frac{\text{فرلا}}{\text{فرت}}\right)^2 + \left(\frac{\text{فرما}}{\text{فرت}}\right)^2} \dots\dots\dots (۹)$$

اسے دفعہ ۱۱۰ (۱) کی تعمیم خیال کیا جاسکتا ہے۔ وہ ضابطہ اس مفروضہ کی بنا پر حاصل کیا گیا تھا کہ قوس زیر بحث کے اندر لا کی ہر قیمت کے لئے ما کی صرف ایک قیمت (نتیجہ ۹) اس قید سے آزاد ہے۔ صرف اتنا ضروری ہے کہ جیسے تا بڑے نقطہ پ منحنی کو مسلسل طور پر متسم کرے۔

اسی طرح ضابطہ (۶) کسی قابل تخطیط منحنی کا طول معلوم کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بشرطیکہ چہا سے وہ زاویہ مراد لیا جائے جو س کے بڑھنے کی سمت میں کیچنچا ہوا ماس محور کا کی مثبت سمت کے ساتھ بنائے۔

صریحاً ضابطوں (۸) اور (۹) کی علم حرکت میں تعمیم بن مل سکتی ہیں۔ اگر ایک متحرک نقطہ کے کارٹیشی محوروں لا، ما کو وقت تا کے تغا عل خیال کیا جائے تو

$$\frac{\text{فرلا}}{\text{فرت}}، \frac{\text{فرما}}{\text{فرت}} \text{ محدودوں کے محوروں کی سمت میں ترکیبی رفتاریں ہیں اور اگر ع حقیقی رفتار ہو تو}$$

$$= ۶ = \sqrt{\left(\frac{\text{فرلا}}{\text{فرت}}\right)^2 + \left(\frac{\text{فرما}}{\text{فرت}}\right)^2} \dots\dots\dots (۱۰)$$

ضابطہ (۸) اور (۹) اس طرح ذیل کے ضابطوں کے معادل ہیں

$$\frac{\text{فرس}}{\text{فرت}} = ۶، \text{س} = \sqrt{۶ \text{ فرت}} \dots\dots\dots (۱۱)$$

مثال۔ قطع ناقص لا = ا جب فما، ما = ب جم فما..... (۱۲)

$$\text{میں } \left(\frac{\text{فرس}}{\text{فرقما}}\right)^2 = \left(\frac{\text{فرلا}}{\text{فرقما}}\right)^2 + \left(\frac{\text{فرما}}{\text{فرقما}}\right)^2 = \text{ا}^2 \text{ جم فما} + \text{ب}^2 \text{ جب فما}$$

$$= \text{ا}^2 (۱ - \text{ا}^2 \text{ جب فما}) \text{ جہاں ز خروج المکرز ہے۔}$$

پس اگر قوس کو محور اصغر کے سرے سے ناپا جائے تو قوس

$$س = 1 \int_0^{\pi} 1 - ز^2 \cos^2 \theta \, d\theta \quad \text{فرما} \dots \dots \dots (13)$$

یہ مکمل ریاضی کے معمولی تغا علون کی رقوم میں (محدود صورت میں) نہیں بیان ہو سکتا۔ اسے ”دوسری قسم کا ناقصی تکملہ“ کہا جاتا ہے اسے ہم ن (ز، ف) [E (e, φ)] سے تعبیر کریں گے۔ یہ ایک معلوم تغا عل خیال کیا جاسکتا ہے لیشراند نے اسکی جدولیں مرتب کی ہیں۔ اس لئے ناقص کا کل محیط اس طرح بیان ہو سکتا ہے

$$12 \int_0^{\pi} 1 - ز^2 \cos^2 \theta \, d\theta \quad \text{فرما} \dots \dots \dots (14)$$

اس جملہ کے تکملہ کو اس طرح ن (ز، ف) بیان کیا جائیگا یا زیادہ اختصار کے طور پر ن (ز) سے۔ یہ دوسری قسم کا ”پورا ناقصی تکملہ“ کہلاتا ہے۔ مقدار ز تکملہ کا ”مقیاس“ کہلاتی ہے۔

سلسلوں کے ذریعہ تکملہ (14) کی قیمت معلوم کریں گے متعلق دیکھو دفعہ ۱۸۰۔

۱۱۲۔ قطبی محدودوں کے لحاظ سے قوسیں۔

فرض کرو کہ منحنی کے دو متصل نیم قطروپ، وپ ہیں اور پ ن، وپ پر عمود کھینچا گیا ہے لگو وپ = ر، وپ = ر + مف ر، پ وپ = مف طہ تب دفعہ ۶۳ کے بموجب پ ن تفاوت ہوگا ر مف طہ سے اور ن پ تفاوت ہوگا مف ر سے بقدر ایسی مقداروں کے جو بالترتیب پ ن، ن پ کے مقابلہ میں لا انتہا چھوٹی ہوں گی۔ اسلئے پ پ یا پ ن + ن پ

Traite des Fonctions Elliptiques (1826)

‡

+ ”پہلی قسم کا ناقصی تکملہ ہے $\int_0^{\pi} 1 - ز^2 \cos^2 \theta \, d\theta$ فرما اور اسے ہم ق (ز، ف) [F (e, φ)] سے تعبیر کریں گے۔ متناظر ”پورا“ تکملہ [جکی اوپرکی حد $\frac{\pi}{2}$ ہے] ق، (ز) سے تعبیر ہوگا۔


انتہائیں r^2 (مف طما) $+^2$ (مف ر) کے ساتھ مساوات کی نسبت رکھیں۔
اس سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر طما متبوع متغیر ہو تو

$$\frac{\text{فرس}}{\text{فرطما}} = \text{ہما} \frac{\text{پ پ}}{\text{مف طما}} = \left[r^2 + \left(\frac{\text{فر ر}}{\text{فرطما}} \right)^2 \right] \dots (۱)$$

اور اس لئے $\text{مس} = \int \left[r^2 + \left(\frac{\text{فر ر}}{\text{فرطما}} \right)^2 \right] \text{فرطما} \dots (۲)$
بشرطیکہ تکملہ کو طما کے مناسب حدود کے اندر لیا جائے۔
اگر ر اور طما متغیر متبوعات کے تفاعل ہوں تو

$$\frac{\text{فرس}}{\text{فرت}} = \text{ہما} \frac{\text{پ پ}}{\text{مف فرت}} = \left[r^2 + \left(\frac{\text{فرت ر}}{\text{فرت}} \right)^2 \right] \dots (۳)$$

اس لئے $\text{مس} = \int \left[r^2 + \left(\frac{\text{فرت ر}}{\text{فرت}} \right)^2 \right] \text{فرت} \dots (۴)$
جس میں (۲) بلور خاص صورت کے شامل ہے۔



شکل (۶۴)

اگر ر طما کو قوس مس کے تفاعل خیال کیا جائے اور فنا سے وہ زاویہ
مراد ہو جو منحنی کا مماس جسے مس کے بڑھنے کی سمت میں کھینچا جائے سمتی نیم قطر
کی مثبت سمت کے ساتھ بنائے تو

$$\text{جمن پ پ} = \frac{\text{ن پ}}{\text{پ پ}}, \text{جب ن پ پ} = \frac{\text{پ ن}}{\text{پ پ}}$$

اس لئے انتہائیں جمن فہ = $\frac{\text{فر}}{\text{فرس}}$ ، جب فہ = $\frac{\text{فرطہ}}{\text{فرس}}$ (۵)

ان نتائج کی حرکیاتی توضیح ہو سکتی ہے۔ اگر ایک متحرک نقطہ کی رفتار ع سے تعبیر ہو تو سمتی نیم قطر کی سمت میں اور اس کے علی القواہم رفتاریں بالترتیب ہوں گی

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ع جمن فہ} = \frac{\text{فر}}{\text{فرس}} \times \frac{\text{فر}}{\text{فرت}} = \frac{\text{فر}}{\text{فرت}} \\ \text{ع جب فہ} = \frac{\text{فرطہ}}{\text{فرس}} \times \frac{\text{فرطہ}}{\text{فرت}} = \frac{\text{فرطہ}}{\text{فرت}} \end{array} \right. \dots\dots\dots (۶)$$

اور ضابطہ (۴) پہلے کی طرح اس کے معادل ہے

$$\text{س} = \text{ل ع فرت} \dots\dots\dots (۷)$$


۱۱۳۔ گردشی سطحوں کے رقبہ۔ منحنی سطح کے رقبہ کی عام تعریف

مربع کرنا اور پھر یہ ثابت کرنا کہ اس رقبہ کی ایک معین قیمت ہے یہ امور ایک حد تک نفاہست طلب ہیں۔ اس جگہ ہم ایسی گردشی سطح کو بحث میں لائیں گے جو محور پر علی القواہم ۲۵۵ مستوی سطحوں سے محدود ہو (محدود ہونا ضروری نہیں)۔

دائری اسطوانے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اسکی منحنی سطح کی یہ تعریف ہو سکتی ہے کہ یہ اندر بنے ہوئے منشور کے طرفی رخوں کے رقبوں کے مجموعہ کی انتہائی قیمت ہے۔ ان سب رخوں کا ایک ہی طول ہے اور ان کا مجموعہ اس مشترک طول اور منشور کی چوڑی تراش کے محیط کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔ انتہائیں یہ محیط اسطوانہ کا محیط ہو جاتا ہے۔ اس لئے قائم اسطوانہ کی منحنی سطح جس کا نیم قطر r اور ارتفاع h ہو $\pi r h$ ہے۔

اس کے بعد مخروط کی سطح کو جو محور پر عمود وارد مستویوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔

اس کے اندر ناقص مخروط مضلع بنایا جاسکتا ہے جس کے قاعدے متشابه اور متشابه الوضع منتظم کثیر الاضلاع ہیں جو احاطہ کرنے والے دو دائروں کے اندر بنائے گئے ہیں زیر بحث منحنی سطح اس ناقص مخروط مضلع کے طرفی رقبہ کی انتہا خیال کیجا سکتی ہے




شکل (۶۵)

یہ رقبہ منحرفوں کی ایک تعداد پر مشتمل ہے جن سب کا ارتفاع مشترک ہے یعنی ان کے متوازی اضلاع کے درمیان عمودی فاصلہ۔ اس لئے یہ رقبہ اس مشترک ارتفاع اور ان دو کثیر الاضلاعوں کے محیطوں کے اوسط حسابی کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔ انتہائیں یہ محیط حائط دائروں کے محیط بن جاتے ہیں اور یہ مشترک ارتفاع دائروں سے گھرے ہوئے مخروط کا مکون خط بن جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خط مستقیم پ ق کے ایک ایسے محور کے گرد گھومنے سے جو اس کی مستوی میں واقع ہے جو منحنی سطح پیدا ہوتی ہے اس کا رقبہ پ ق اور پ اور ق کے مرتمہ دائروں کے محیطوں کے اوسط حسابی کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ یہ رقبہ پ ق اور اس کے وسطی نقطہ کے مرتمہ دائرہ کے محیط کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔

اس کے بعد درجہ سطح کو جو منحنی مابعد = فصا (لا) (۱)

پس πr کا فرس = πr ب (۱۔ ب جم طہ) فرطہ (۷)



شکل (۶۶)

طہ کے حدود ہیں۔ اور πr سطح حاصل ہوتی ہے πr ب $\times \pi r$ اور جو ب
تقر کے قائم اسطوانہ کی مشنئی سطح کے مساوی ہے جس کا طول (πr) ہو اور یہ طول
اس دائرہ کے محیط کے مساوی ہے جو کمون دائرہ کا مرکز م قسم کرتا ہے۔

مثال ۳۔ ناقص لا = ا جب فہا = ب جم فہا کو محورا اعظم کے
گرد پھرنے سے جو مجسم حاصل ہوتا ہے اسکی سطح دریافت کرو۔

$$\pi r \text{ کا فرس} = \pi r \text{ ب} \times \frac{\text{فرس}}{\text{فرطہ}}$$

$$\pi r \text{ ب} \times \frac{\text{ا} - \text{ز} \text{ جب فہا}}{\text{فر (جب فہا)}} \dots (۹)$$

دفعہ ۱۱ کی رو سے۔ اب رکھو ز جب فہا = جب طہ (۱۰)

$$\text{پس تکرار (۹) = } \frac{\pi r \text{ ب}}{ز} \times \text{جم طہ فرطہ} = \frac{\pi r \text{ ب} (\text{طہ} + \text{جب طہ جم طہ})}{ز}$$

..... (۱۱)

کل سطح دریافت کرنیکے لئے اسے فہا = $\frac{\pi}{4}$ کے درمیان یا

$$\text{طہ} = \frac{\pi^2}{z} \left\{ \text{جب } z + \frac{1}{z} - z^2 \right\}$$

$$\text{یا } \pi^2 \text{ ب} + \frac{\pi^2}{z} \text{ جب } z \dots \dots \dots (۱۲)$$

اسی طریقہ سے محور (صغریٰ) کے گرد ناقص کی گردش سے جو مجسم پیدا ہوتا ہے اسکی سطح ہے $\frac{\pi^2}{z} \left\{ \text{جب } z + \frac{1}{z} + z^2 \right\}$ جہاں $z = \frac{a-b}{b}$

$$\text{یا } \pi^2 \text{ ب} + \frac{\pi^2}{z} \text{ جب } z \dots \dots \dots (۱۳)$$

اسے اس صورت میں بھی رکھا جاسکتا ہے

$$\pi^2 \text{ ب} + \frac{\pi^2}{z} \times \frac{1}{z} \text{ لوک } \frac{1}{z} \dots \dots \dots (۱۴)$$

۱۱۴۔ تقریبی شکل۔ ایک عدد تکمیل کی تقریبی قیمت دریافت کرنے کے لئے طریقے ایجاد کئے گئے ہیں جبکہ اس میں کے تفاعل کا نام عدد تکمیل حاصل ہو سکے۔ اختصار بیان کی خاطر اس مسئلہ کی صرف ہندسی شکل پر غور کیا جائیگا یعنی اس رقبہ کی صرف تقریبی قیمت مطلوب ہے جو ایک دے ہوئے تختی، محور کا اور دو معلومہ معینوں کے درمیان واقع ہے۔

جن طریقوں کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے ان سب میں دے ہوئے حقیقی تختی کی بجائے ۲۵۸ ایک اور تختی رکھنا مقصود ہوتا ہے جو قریب قریب وہی راستہ رکھتا ہو جو پہلی تختی کا ہے لیکن یہ آسانی سے تکمیل ہونے والے تفاعل سے تعبیر ہو سکے۔ سب سے آسان اور نائزائیدہ طریقہ وہ ہے جس میں مساوی فاصلوں پر تختی کے ن معین کھینچے جاتے ہیں اور ان کے سروں کو خطوط مستقیم کے ذریعہ ملایا جاتا ہے اس طرح منحرفوں کے ایک سلسلہ کا رقبہ مطلوبہ رقبہ کی ایک ضمیمہ کر لیتا ہے۔ اگر متصل معینوں کے درمیان فاصلہ h ہو اور معینوں کے طول $a, a, \dots, a$ ہوں


ہوں تو منحرفوں کا مجموعہ ہے

$$\frac{1}{2} (a_1 + a_2) h + \frac{1}{2} (a_2 + a_3) h + \dots + \frac{1}{2} (a_{n-1} + a_n) h$$

$$= h \left\{ \frac{1}{2} a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + \frac{1}{2} a_n \right\} \dots (1)$$

یعنی پہلے اور آخری معین کے اوسط حسابی میں درمیانی معینوں کا مجموعہ جمع کرو اور
نتیجہ کو مشترک وقفہ سے ضرب دو۔

اس طرح سے جو قیمت حاصل ہوگی وہ صرفاً اصلی رقبہ سے زیادہ ہوگی
اگر منفی محور کا ۱ کی جانب محذب ہو اور کم ہوگی اگر منقصر ہو۔



شکل (۶۴)

ایک اور طریقہ جو ابتدا میں نیوٹن اور گوٹس نے دیا وہ یہ ہے کہ ما کے لئے
(ن-۱) دیں درجہ کا منطق تکمیلی جملہ اختیار کیا جائے یعنی

$$ما = ا + ا + ا + ا + ا + \dots + ا_{1-5} \dots (۲)$$

۲۵۹ اور پھر سروس 'ا' 'ا' 'ا' کے لئے قیمتیں دریافت کی جائیں کہ
لا کی ن تساوی افضل قیمتوں کے لئے ما کی معلومہ اور معینہ قیمتیں ما' ما' ما
ہوں۔ تب رقبہ حاصل ہوتا ہے

$$ما فرلا = ا + ا + ا + ا + ا + \dots + ا_{1-5} \dots (۳)$$

جسے لا کے مناسب حدود کے درمیان لیا جائے۔
مثلاً تین تساوی افضل معینوں کی صورت میں بعد اوسطی معین کے پایہ پر لو۔
ہم تسلیم کرتے ہیں

$$ما = ا + ا + ا + \dots + ا_{1-5} \dots (۴)$$

ترتیب وار ذیل کی شرائط کے تابع

$$(۵) \dots \dots \dots \left[\begin{array}{ccc} ما & ما & ما \\ ھ & ھ & ھ \end{array} \right]$$

ان سے حاصل ہوتا ہے

$$(۶) \dots \dots \dots ا - ا + ا = ما' ا = ما' ا + ا + ا = ما' \dots (۶)$$

$$پس ا = ما' ا = ا + ا = ا + ا + ا + ا + ا + \dots + ا_{1-5} \dots (۷)$$

$$اس لئے 'ا' ما فرلا = ۲ (ا + ا + ا + ا + ا + \dots + ا_{1-5} \dots) = ۲ (ا + ا + ا + ا + ا + \dots + ا_{1-5} \dots) \dots (۸)$$

مقابلہ کرو دفعہ ۱۰۹ کے ساتھ۔

اور یہ طریقہ اس کے مرادف ہے کہ حقیقی منحنی کی بجائے مکانی کی قوس رکھ دیا جائے
جس کا محور انتہائی ہے۔ اور نتیجہ (۸) منحرف $\frac{۱}{۲} (ما + ما)$ ۲ ھ اور مکانی قطعہ

مثال - ضابطہ $\frac{1}{n} = \pi \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx$ فرلا (۱۲)
 سے π کی قیمت محسوب کرو۔

تکمیل کی وسعت کو دس مساوی وقفوں میں تقسیم کرو، یعنی $h = 1$ تو

$$x_0 = 1, x_1 = 1.1, x_2 = 1.2, \dots, x_{10} = 2.0$$

$$f_0 = 1, f_1 = 0.909, f_2 = 0.833, \dots, f_{10} = 0.5$$

$$f_1 = 0.909, f_2 = 0.833, \dots, f_{10} = 0.5$$

$$f_2 = 0.833, f_3 = 0.769, \dots, f_{10} = 0.5$$

$$f_3 = 0.769, f_4 = 0.714, \dots, f_{10} = 0.5$$

$$\text{اس لئے } \pi = \frac{1}{10} (f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_{10}) = \frac{1}{10} (1 + 0.909 + 0.833 + \dots + 0.5)$$

$$= \frac{1}{10} (10.5) = 1.05$$

ضابطہ (۱۱) سے حاصل ہوتا ہے

$$\pi = \frac{1}{10} (1.05 + 0.909 + 0.833 + \dots + 0.5) = 1.05$$

$$= 1.05$$

صرف سات ہندسے رکھنے سے $\pi = 3.141592$

یہ نتیجہ آخری ہندسہ تک درست ہے۔

$$\text{ضابطہ (۱) سے حاصل ہوتا ہے } \pi = \frac{1}{10} (1.05 + 0.909 + 0.833 + \dots + 0.5)$$

یعنی $\pi = 3.141592$ جو تقریباً ۲۰۰ میں بقدر ایک حصہ کے چھوٹا ہے۔

۱۱۵ - اوسط قیمتیں - فرض کرو کہ وسعت (ب-ا) کے اندر لاکھ

ن متساوی انفصل قیمتوں کے جواب میں ایک تفاعل فاصلہ (لا) کی قیمتیں

مثلاً فرض کرو کہ تفاعل کی قیمتیں لا کی ان قیمتوں کے جواب میں ہیں جو

ن مساوی وقفوں (ھ) کے وسطی نقاط کو تعبیر کرتے ہیں جن میں وسعت تقسیم کی گئی

ہے۔ جس انتہائی قیمت کی طرف یہ اوسط حسابی

$$\frac{1}{n} (p_1 + p_2 + \dots + p_n) \dots (1)$$

مائل ہوتی ہے جبکہ n لا انتہا بڑھتا ہے اس کو تفاعل کی ”اوسط قیمت“ کہتے ہیں سعت (ب-۱) پر۔

چونکہ $h = \frac{1}{n}$ ، جملہ (۱) اس طرح لکھا جاسکتا ہے

$$p_1 h + p_2 h + \dots + p_n h$$

ب-۱

اور اسکی انتہائی قیمت جبکہ $n \rightarrow \infty$ ، $h \rightarrow 0$ یہ ہے

$$\int_0^1 p \, dx$$

$$\dots (2) \quad \text{ب-۱}$$

ہندسی تعبیر کے موافق اوسط قیمت اس مستطیل کا ارتفاع ہے جس کا قاعدہ ب-۱ ہے اور جس کا رقبہ اس رقبہ کے مساوی ہے جو منحنی $p = f(x)$ ، اطراف کے معینوں اور محور x سے گھرا ہوا ہو۔ دیکھو شکل ۴۹ دفعہ ۹۱۔
دفعہ ۹۱ (۳) کا سلسلہ اب یوں بیان ہو سکتا ہے۔ متغیر متبوع کی کسی وسعت پر ایک مسلسل تفاعل کی اوسط قیمت، اسی سعت کے اندر متغیر متبوع کی ایکٹ ایک قیمت کے لئے تفاعل کی قیمت کے مساوی ہے۔

دفعہ ۱۱۴ کے مختلف ضابطوں کی اب یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ ان سے ایک معلوم سعت میں تفاعل کی اوسط قیمت کے لئے تقریبی جملے تفاعل کی ایسی قیمتوں کے سلسلہ کی رقوم میں معلوم ہوتے ہیں جو سعت بھی ہیں متساوی الفضل و فصول پر لگائی ہیں۔ مثلاً تین یا چار ایسی قیمتوں کی رقوم میں اوسط قیمتیں کو لکھ کے طریقہ سے بالترتیب یہ معلوم ہوتی ہیں

$$\frac{1}{4} (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) \quad \frac{1}{8} (p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8)$$

$$(۵) \dots\dots\dots \sqrt{1 - \frac{r}{r_0}}$$

اس لئے مطلوب نسبت ہے

$$(۶) \dots\dots\dots \frac{1}{\pi} \sqrt{1 - \frac{r}{r_0}} \quad \pi r_0 r = \frac{r}{\pi}$$

مثال ۳۔ اگر کہ کی کثافت θ مرکز سے فاصلہ r کا تعامل ہو تو حجم کا جزو
مفح = مف ($\frac{r}{\pi} - \pi$) = $\pi r_0 r$ مف

اوسط کثافت ہے $\theta = \pi r_0 r \div \pi r_0 r = \frac{r}{\pi}$

$$(۷) \dots\dots\dots \frac{3}{4} \theta = \theta r_0 r$$

اگر r بیرونی نصف قطر ہو۔
مثلاً اگر θ کثافت تو اوسط کثافت سطح پر کی کثافت کا $\frac{3}{4}$ ہے۔
غیر تسلیم کرنے سے کہ زمین کے اندر

$$(۸) \dots\dots\dots \theta = \theta (1 - \frac{r}{r_0})$$

حاصل ہوتا ہے

$$(۹) \dots\dots\dots \theta = \theta (1 - \frac{r}{r_0}) = \frac{1}{\theta} (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \dots\dots\dots$$

جہاں θ سطح پر ($r = r_0$) کی کثافت ہے۔ اگر کثافت کا اوپر کا قانون زمین
کی صورت میں لگ سکے تب چونکہ $\theta = \theta_1$ (تقریباً) ہیں حاصل ہوتا ہے
 $\theta = \frac{1}{\theta} \theta_1$ یا مرکز پر کی کثافت سطح پر کی کثافت کا $\frac{1}{\theta}$ گنا ہے۔

۱۱۶۔ ہندسی اشکال کے اوسط مرکز۔ ہندسی نقاط

$$(۱) \dots\dots\dots (لا، ما)، (لا، ما)، (لا، ما)، (لا، ما) \dots\dots\dots (لا، ما)$$

کے نظام کے اوسط مرکز (ط) کی یہ تعریف ہو سکتی ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جسے خط

$$(۲) \quad \left\{ \begin{aligned} \bar{ل} &= \frac{۱}{ن} (ل_۱ + ل_۲ + \dots + ل_n) = \frac{\sum (ل_i)}{ن} \\ \bar{م} &= \frac{۱}{ن} (م_۱ + م_۲ + \dots + م_n) = \frac{\sum (م_i)}{ن} \end{aligned} \right.$$

چونکہ یہ ارتباط خطی ہیں اور کارٹیزی محدودوں کے استحصائے خطی مضابطوں سے عمل میں لائے جاتے ہیں اس لئے یہ آسانی معلوم ہوتا ہے کہ کسی خط سے ط کا فاصلہ اسی خط سے دئے ہوئے نقطوں کے فاصلوں کے اوسط حسابی کے مساوی ہے۔ البتہ ان فاصلوں کو مناسب علامتوں کے ساتھ لیا جائے ہو جب اس کے کہ خط کے ایک جانب واقع ہوں یا دوسری جانب۔ اسی طریقہ سے، ایک مستوی منحنی کا یا مستوی رقبہ کا ایک اوسط مرکز ہوتا ہے جس کا فاصلہ اس مستوی میں کے کسی خط سے منحنی یا رقبہ کے صفاری اجزاء کے فاصلوں کے اوسط (ذمنہ ۱۵ کے معنی میں) کے مساوی ہوتا ہے۔ پس منحنی کے لئے

$$(۳) \quad \bar{ل} = \frac{\sum (ل \text{ مف س})}{\sum \text{مف س}}, \quad \bar{م} = \frac{\sum (م \text{ مف س})}{\sum \text{مف س}} \dots$$

اور رقبہ کی صورت میں

$$(۴) \quad \bar{ل} = \frac{\sum (ل \text{ مف ق})}{\sum \text{مف ق}}, \quad \bar{م} = \frac{\sum (م \text{ مف ق})}{\sum \text{مف ق}} \dots$$

جہاں مف ق رقبہ کا جزو یا عنصر ہے۔ انتہا میں یہ مجموعہ نگہوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

مثال ۱۔ دائری قوس کی صورت میں اگر مبدأ کو مرکز، محور کو وسطی خط پر لیا جائے تو $\bar{م} = ۰$ ۔ اذیوے تشاکی۔ لکھو لا = $\frac{۱}{۲} \text{جم} \text{ط} \text{مف س} = \frac{۱}{۲} \text{مف ط} \text{م}$ ، اس طرح

$$\bar{ل} = \frac{۱}{۲} \text{رعم} \text{ل} \text{جم} \text{ط} \text{مف س} = \frac{۱}{۲} \text{جم} \text{ط} \text{مف س} \dots (۵)$$

اگر ۲ عم وہ زاویہ ہو جو کل قوس کے سامنے مرکز پر پڑتا ہے۔

جیسے عہد بڑھتا ہے اتنا ہی چھوٹی قیمت سے نکلا گھٹتا ہے اسے مقرر تک۔

$$\text{نصف دائرہ کے لئے عہد} = \frac{\pi}{4} \text{ اور لا} = \frac{\pi}{4} = 0.7854$$

مثال ۲۔ مکانی ما' = ۴ لا لا (۶)
کے قطعہ کے رقبہ کے لئے جو دوہرے عین لا = ف سے گھرا ہوا ہو

$$\text{لا} = \frac{\pi}{4} \text{ لا ما فر لا} = \frac{\pi}{4} \text{ لا آفر لا} = \frac{\pi}{4} \text{ ف (۷)}$$

اوسط مرکز کے تخیل کی سرکایتیں ابعادی شکلوں کی صورت میں کی جاسکتی ہے،
لیکن یہاں خط سے فاصلوں کی بجائے سطح مستوی سے فاصلے لئے جانے چاہئیں۔
مثلاً سطح تختی کی صورت میں

$$\text{لا} = \text{ہا} \frac{\pi}{4} \text{ لا مفا} \text{، ما} = \text{ہا} \frac{\pi}{4} \text{ ما مفا} \text{، ہی} = \text{ہا} \frac{\pi}{4} \text{ ہی مفا}$$

(۸)

جہاں مفا سطح کا جزو ہے۔ اسی طرح حجم کے لئے

$$\text{لا} = \text{ہا} \frac{\pi}{4} \text{ لا مفا ح} \text{، ما} = \text{ہا} \frac{\pi}{4} \text{ ما مفا ح} \text{، ہی} = \text{ہا} \frac{\pi}{4} \text{ ہی مفا ح}$$

(۹)

جہاں مفا ح حجم کا جزو ہے۔
گردشی سطح یا مجسمہ کی صورت میں اوسط مرکز تشاکل کے محور پر ہوتا ہے، اگر اس کو
محور لا مانا جائے تو صرف لا کی قیمت محسوب کرنا باقی رہ جاتا ہے۔ اگر مکوں مغنی
کامین ما ہو تو (۸) میں رکھو مفا ح = ۲ ما مفا ح سطح کے طے نا
جزو کا رقبہ ہوگا جسکے سب نقطے مستوی لا سے مساوی فاصلہ پر ہیں۔

اس لئے

$$(۱۰) \dots\dots\dots \frac{\text{لا} \times \pi \text{ مافرس}}{\text{لا مافرس}} = \frac{\text{لا مافرس}}{\text{لا مافرس}}$$

اسی طرح (۹) میں رکھو مف ح = π ماف لا تو حاصل ہوگا

$$(۱۱) \dots\dots\dots \frac{\text{لا} \times \pi \text{ مافرا}}{\text{لا مافرا}} = \frac{\text{لا مافرا}}{\text{لا مافرا}}$$

مثال ۳۔ کروی سطح کے منقطع کے لئے رکھو

$$(۱۲) \dots\dots\dots \text{لا} = \text{اجم طہ} \text{ ماف} = \text{اجب طہ} \text{ ماف س د ماف طہ} \dots\dots\dots (۱۲)$$

$$\text{تولا} = \frac{\text{اجم طہ جب طہ فرطہ}}{\text{لا جب طہ فرطہ}} = \frac{1}{2} \text{ اجم صا - جم با}$$

$$(۱۳) \dots\dots\dots \frac{1}{4} \text{ اجم صا + جم با} = \frac{1}{4} (\text{لا} + \text{لا}) \dots\dots\dots (۱۳)$$

اگر صا با زاویہ طہ کے حدود ہوں اور لا حاطہ دائروں کے فصلے ہوں۔ اس لئے منقطع کا اوسط مرکز محور پر حاطہ دائروں کے استویوں کے عین وسط میں واقع ہوتا۔ مثلاً نیم کروی سطح کا اوسط مرکز عمودی نصف قطر کی تنصیف کرتا ہے۔

یہ نتائج گروہ اور لغافی اسطوانہ کے متناظر منطوقوں کے رقبوں کے مساوی ہونے سے حاصل ہو سکتے تھے (دفعہ ۱۱۳ مثال ۱)۔

مثال ۴۔ مجسم مستدیر مخروط کی صورت میں جبکہ مبدأ رأس پر ہو تراش کا رقبہ ایسے بدلتا جیسے لا پس

$$(۱۴) \dots\dots\dots \frac{\text{لا} \times \pi \text{ مافرا}}{\text{لا مافرا}} = \frac{3}{4} \text{ ف} \dots\dots\dots (۱۴)$$

اگر ف ارتفاع ہو۔

مثال ۵۔ ناقصی مکانی نا

$$(۱۵) \dots\dots\dots \frac{م^۲}{ب} + \frac{ی^۲}{ق} = ۲$$

کے قطعہ کے لئے جو لا = ف سے کٹتا ہے چونکہ تراش کا رقبہ ایسے بدلتا ہے جیسے لا اس لئے جیسا کہ دفعہ ۱۰۸ مثال میں

$$(۱۶) \dots\dots\dots \frac{ف^۲}{۳} = \frac{لا^۲ (لا - لا^۲) (لا - لا^۲)}{لا^۲ (لا - لا^۲) (لا - لا^۲)}$$

مثال ۶ - نصف قطر کے نصف کرہ کے لئے رکھو ما = لا - لا^۲ (سطح

$$(۱۷) \dots\dots\dots \frac{۳}{۸} = \frac{لا^۲ (لا - لا^۲) (لا - لا^۲)}{لا^۲ (لا - لا^۲) (لا - لا^۲)}$$

اسی ضابطہ سے ناقص نما

$$(۱۸) \dots\dots\dots ۱ = \frac{ی^۲}{ج} + \frac{م^۲}{ب} + \frac{لا^۲}{ا}$$

کے اس نصف کے اوسط مرکز کا مقام معلوم ہوتا ہے جو مستوی مای کے دائیں جانب واقع ہے کیونکہ اس صورت میں ف (لا) ایسے بدلتا ہے جیسے لا - لا^۲ دیکھو دفعہ ۱۰۸ مثال ۲ -

۱۱۷ - پاپس (PAPUS) کے مسئلے -

(۱) اگر ایک مستوی منحنی کی قوس اپنی سطح میں کے ایک محور کے گرد گھومے مگر اسکو کاٹے نہیں تو سطح جو اس طرح پیدا ہوتی ہے وہ قوس کے طول اور اوسط مرکز کے راستہ کے طول کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔
فرض کرو کہ محور لا گھاؤ کے محور پر منطبق ہوتا ہے اور کون منحنی کا معین ما ہے۔ دفعہ ۱۱۳ کی رو سے پوری گردش میں جو سطح پیدا ہوتی ہے وہ $\pi ۲$ لا مافریس کے مساوی ہے جہاں تکملہ کل قوس پر لیا جائے۔

اگر قوس کا وسط مرکز مآ ہو تو مآ = $\frac{ل مافرس}{ل فرس}$ دفعہ ۱۱۶ کی رو سے۔

اس لئے $\pi ۲$ ل مافرس = $\pi ۲$ مآ $\times$ ل فرس (۱)
جو مسئلہ مذکورہ ہے۔

(۲) اگر ایک مستوی رقبہ کو اپنی سطح میں کے ایک محور کے گرد پھرایا جائے جو اسے کاٹے نہیں تو حجم جو اس طرح پیدا ہوتا ہے وہ رقبہ اور اس کے اوسط مرکز کا راستہ کے طول کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔

فرض کرو کہ مف ق رقبہ کا عنصر ہے۔ پوری گردش میں جو حجم پیدا ہوتا ہے وہ ہے

ہذا $\pi ۲$ مآ $\times$ مف ق
اگر رقبہ کی کمیت کا مرکز مآ ہو تو

مآ = ہذا $\frac{\pi ۲ مآ \times مف ق}{\pi ۲ مف ق}$ ، دفعہ ۱۱۶ کی رو سے

اس لئے ہذا $\pi ۲$ مآ $\times$ مف ق = $\pi ۲$ مآ $\times$ ہذا مف ق (۲) ۲۶۶
جو مسئلہ مطلوبہ ہے۔*

گردشوں کو پورا خیال کیا گیا ہے لیکن صریحاً یہ قید ضروری نہیں۔
ان مسائل کے عکس مستوی قوس، مستوی رقبہ کے اوسط مرکز دریافت کر نیکے لئے
استعمال ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی گردش سے پیدا شدہ سطح اور حجم بلا واسطہ طریقہ معلوم
ہوں۔ دیکھو مثال ۳ آگے۔

* یہ سائل پیمپس کے رسالہ علم حیل میں موجود ہیں۔ سپیس سے مشہور ریاضی دان
تھا۔ نئے سرے سے گلڈن (Guilidinus) ان مائل کو بیان کیا۔ دیکھو

(De centro gravitatis (1635—1642).

(Ball, History of Mathematics)

مثال ۱۔ دائرہ نصف قطر ب، اپنی سطح میں کے ایک خط کے گرد گھوم کر جھلا پیدا کرتا ہے۔ دائرہ کے مرکز کا فاصلہ خط سے ۱ ہے۔ سطح اور حجم دریافت کرو۔

$$\text{سطح ہے } \pi \times \pi \times 1 = \pi^2 \text{ ا ب}$$

حجم ہے $\pi \times \pi \times 1 = \pi^2 \text{ ا ب}$ ۔ مقابلہ کرو دفعہ ۱۰، مثال ۳ اور دفعہ ۱۱، مثال ۲ کے ساتھ۔

مثال ۲۔ مکانی فاصلہ ۱۷ لاکھ جو دوہرے معین لا = ف سے گھرا ہوا ہے اس معین کے گرد گھومتا ہے۔

اگر دوہرے معین کا طول ۲ ک ہو تو قطعہ کا رقبہ $\frac{1}{2} \times \text{ف ک}$ ہے (دفعہ ۱) اور اس کے اوپر مرکز کا فاصلہ معین سے $\frac{1}{2} \times \text{ف}$ ہے (دفعہ ۱۲، مثال ۲) اس لئے حجم جو پوری گردش سے پیدا ہوتا ہے یہ ہے

$$\frac{1}{2} \times \text{ف ک} \times \pi \times \frac{1}{2} \times \text{ف} = \frac{1}{4} \pi \times \text{ف ک}$$

مثال ۳۔ نیم دائری قوس جو اس کے سروں کے ملائیوں قطر کے گرد گھومتی ہے اسکے لئے

$\pi \times \pi \times 1 = \pi^2 \text{ ا ب}$ جس سے فاصلہ $\frac{1}{2} \times \text{ا ب}$ نیم دائری رقبہ جو اپنے احاطہ کرنے والے قطر کے گرد گھومتا ہے اسکی صورت میں

$\frac{1}{2} \times \pi \times \pi \times 1 = \frac{1}{4} \pi^2 \text{ ا ب}$ یعنی فاصلہ $\frac{1}{4} \times \text{ا ب}$ اسی طرح کے حساب سے (کسی عمودی نراش کے) منشور یا اسطوانہ کے حجم کے لئے جو مستوی سروں سے گھرا ہوا ہو سادہ صاف شکل سکتا ہے۔

پہلے ہم یہ فرض کریں گے کہ ایک سر جسے قاعدہ کہا جائیگا طول پر عمود ہے۔ فرض کرو کہ قاعدہ کا کوئی نقطہ پ ہے اور فرض کرو کہ معین پ پ کا طول ی ہے جہاں پ پ طول کے متوازی کھینچا گیا ہے اور یہ مقابل کے سرے سے پ پر ملتا ہے۔ نیز فرض کرو کہ مائل سرے کے مرکز کا معین جی ہے۔

اگر پ اور پ پر رقبہ کے متناظر اجزاء م ق اور م ق ہوں تو

$$\frac{\text{جی} = \text{نا}}{\frac{\text{جی} \text{ مفق}}{\text{جی} \text{ مفق}}} = \frac{\text{نا}}{\frac{\text{جی} \text{ مفق}}{\text{جی} \text{ مفق}}}$$

کیونکہ مفق، مفق کا قائم ظل ہے، اس لئے اٹنی باہمی نسبت مستقل ہے۔

اسلئے مجسم کا حجم = (جی × مفق) = جی جی مفق ... (۳)

یعنی حجم قاعدہ کے رقبہ اور مقابل کے رقبہ کے اوسط مرکز کے معین کے حامل ضرب کے مساوی ہے۔

جس منشور یا اسطوانہ کے دونوں سرے مائل ہوں اس کو دو ایسے منشوروں یا اسطوانوں کا مجموعہ یا فرق تصور کیا جاسکتا ہے جن میں سے ہر ایک کا ایک سر طویل کے علی القوائم ہو۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام صورتوں میں حجم، چھپی تراش اور دو سروں کے اوسط مرکزوں کے درمیانی فاصلہ کے حامل ضرب کے مساوی ہے۔

مثال ۴۔ فائدہ کی شکل کے مجسم کا حجم جو ایک قائم مستدیر اسطوانہ سے قاعدہ کے مرکز میں سے گزرنے والے مستوی سے کاٹا جائے اور قاعدہ کی سطح کے ساتھ زاویہ عماد بنائے یہ ہے

$$\frac{1}{4} \pi \times \frac{4}{3} \text{ اس عماد} = \frac{2}{3} \text{ اس عماد متقابلہ کردہ نصفہ ۱۸۰ مثال کے متغیر}$$

پیس کے مسئلوں کی کوئی طرح سے تعمیم ہو سکتی ہے لیکن دوسرے مسئلوں کی حسب ذیل توسیع کا یہاں کر دینا کافی ہوگا۔

اگر کوئی 'مستوی رقبہ' جو مستقل ہو یا سلسلہ طور پر بدلنے والا، فضا میں کسی طور پر حرکت کرے لیکن اس طرح کہ مستوی کے متصل محل ایک دوسرے کو رقبہ کے اندر نہ قطع کریں تو حجم تلویں شدہ مساوی ہے

جس میں فرضہ (۴)

کے جہاں میں رقبہ ہے اور فرضہ ظل ہے مستوی پر کے عماد پر، رقبہ کے اوسط مرکز کے طریق (لوکس) کے چھوٹے جزو کا۔ اگر اس طے بنی کا جزو فرس ہو اور فرس

اور مستوی کے عماد کے درمیان زاویہ طما ہو تو یہ ضابطہ یوں لکھا جاسکتا ہے

۱) میں جم طما فرس (۵)
پہلے تین ابعادی جواب ہے مسئلہ دفعہ ۳۰ کا جو اس امر سے متعلق ہے کہ ایک
متحرک خط اپنی حرکت میں کتنا رقبہ عبور کرتا ہے۔ مسئلہ زیر بحث اوپر کے ثابت شدہ مسئلہ کا
نتیجہ صریح ہے۔

۱۱۸ - ضعیفی تکملے - اس کتاب کی بحث زیادہ تر ایک متغیر کے تفاعلوں

۲۶۹

تک محدود ہے اور اس لئے جہاں تک تکملی احصا کا تعلق ہے یہ ایسے مسائل پر
بحث کرتی ہے جو ایک متکمل پر منحصر ہیں یا ایک متکمل پر لا کے منحصر کئے جاسکتے ہیں
لیکن ضعیفی تکملے مضمون کے طبعی استعمال میں ترقیم وغیرہ کے طور پر اس کثرت سے
استعمال ہوتے ہیں کہ ان کے متعلق چند تشریحات کا یہاں دیدنا سودمند ہو گا۔ نظری
امور پر صرف سرسری توجہ کی جائے گی۔ باضابطہ بحث کے لئے دفعہ ۹۰ کے طریقہ کی
مناسب ترقیم کی جاسکتی ہے۔

فرض کرو کہ 'ی' متبوع متغیروں 'لا' 'ما' کا مسلسل اور وحیدانہ قیمت تفاعل ہے

ی = ف (ما، لا) (۱)

اسکی ہندسی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک سطح کی مسافات ہے (دفعہ ۳۴)۔ حوالہ
کے مستوی 'لا' 'ما' میں کوئی محدود طبقہ 'س' اور فرض کرو کہ ایک اسطوانی سطح ایک خط
مستقیم کے ذریعہ پیدا کی جاتی ہے جو ہمیشہ 'س' کے محیط سے ملتا ہے اور 'ی' کے مجموعہ
متوازی رہتا ہے۔ اس حجم 'ح' پر غور کرو جو اس اسطوانہ 'مستوی' 'لا' 'ما' اور سطح (۱)
کے درمیان گھرا ہے۔ دیکھو شکل ۶۸ صفحہ ۳۶۹۔

اگر طبقہ 'س' کو رقبہ کے اجزاء 'مف' 'مف' 'مف' 'مف'
میں تقسیم کیا جائے اور ان اجزاء کے اندر کسی اختیاری نقطوں سے چھپے ہوئے

سطح (۱) کے معین 'ی' 'ی' 'ی' ہوں تو محور 'س' کو علی القوائم فرض

کر کے مجموعہ 'ی' 'مف' 'ی' 'مف' 'ی' 'مف' (۲)

سے تعبیر ہو سکیگا جہاں $\int$ دوبار آتا ہے کیونکہ مجموعہ دو ابعاد میں لیا جاتا ہے۔
اس مجموعہ کی انتہائی قیمت ذیل کی علامت سے تعبیر ہوگی۔

$$\int \int f(x,y) dx dy \quad (۴) \quad \dots \dots \dots \int \int$$

اور حجم کے لئے ضابطہ ہوگا $\int \int f(x,y) dx dy =$ (۵).....
بائیں جانب کا جملہ ”دوہرہ تکملہ“ کہلاتا ہے۔ اسکی قیمت کی تعیین نہیں ہو سکتی جب
کہ تغیروں (۱) (۲) (۳) کی وسعت جسکی طرف کے محیط سے حد بندی ہوئی ہے، تعیین
نہ ہو سکے۔

حجم $\int \int$ ایک اور طرح سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر $f(x,y)$ سطح
کی ایک تراش کا رقبہ ہو جو ماحی کے متوازی ایک مستوی سے کٹی ہے جس کا
فصلہ (۱) ہے تو دفعہ ۱۰۶ کی رو سے

$$\int \int f(x,y) dx dy = \int f(x,y) dy \quad (۶) \quad \dots \dots \dots$$

جہاں رقبہ (۱) سے متعلق (۱) کے حدود درج ہیں۔ لیکن دفعہ ۱۰۶
کی رو سے

$$\int \int f(x,y) dx dy = \int f(x,y) dx \quad (۷) \quad \dots \dots \dots$$

جہاں رقبہ (۲) تراش (۱) میں ماحی کے حدود ہیں جو بالعموم (۱) کے
تفاعل ہونگے۔ اس لئے

$$\int \int f(x,y) dx dy = \int \int f(x,y) dy dx \quad (۸) \quad \dots \dots \dots$$

یا جیسے اسکو بالعموم لکھا جاتا ہے۔

$$\int \int f(x,y) dx dy = \int \int f(x,y) dy dx \quad (۹) \quad \dots \dots \dots$$

+ چلا تکملہ فرلا سے متعلق ہے اور دوسرا فرنا سے۔ اس امر کے متعلق کوئی پورے طہ پر
یہاں قرار داد نہیں ہے۔

متواری ستوی کھینچنے سے قائم عناصر صف لا صف مامف ی میں تقسیم کرو۔ اگر ان عنصروں میں سے ہر ایک کے حجم کو ان میں سے کسی اختیاری طور پر منتخب کئے ہوئے نقطہ پر جو متفاعل (لا، ما، ای) کی قیمت ہے اس کے ساتھ ضرب دیا جائے تو جملہ (۱۳) سے ایسے حاصل ضربوں کے مجموعہ کی انتہائی قیمت (بعض شرائط کے تابع) تعبیر ہوگی جبکہ ان عنصروں کے ابعاد کو لا انتہا کم کیا جائے یہی انتہائی قیمت تین سادہ مکملوں کے تواتر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلاً

[illegible]

مثال کے طور پر ایک مجسم کی کمیت معلوم کرنے کے سوال پر غور کرو جہاں کثافت (ρ) مادی کا تفاعل ہے۔

مثال ۱۔ اس فائدہ کا حجم دریافت کرو جو گھر ہوا ہے مستوی می = . اسطوانہ

اور ستوی می = لاس عدا کے اس حصہ کے درمیان جس کے لئے می
 مثبت ہے۔

$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$

بہانہ مانگے کس سے مائل ہوتا ہے $\left[\frac{a - \frac{a^2}{b}}{a - \frac{a^2}{b}} \right] = 1$

$$\text{تب } \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \arcsin x \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$$

مطلوبہ حجم اس لئے ہے $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$ مس ص (۱۷)

مثال ۲۔ حجم جو کرہ $\sqrt{1-x^2}$ کا $y = \sqrt{1-x^2}$ (۱۸)

اور اسطوانہ $\sqrt{1-x^2}$ کا $y = \sqrt{1-x^2}$ (۱۹)
کے درمیان گھرا ہوا ہے اسے دریافت کرو۔

(اسطوانہ کا نیم قطر کرہ کے نیم قطر سے آدھا ہے اور اس کا محور کرہ کے ایک نصف قطر کی علی القوائیم تنصیف کرتا ہے)۔

اگر مستوی z مابین قطبی محدود شامل کئے جائیں تو مساوات (۱۹) یہ شکل اختیار کرتی ہے

اور (۱۸) سے ماہل ہوتا ہے $y = \sqrt{1-x^2}$ (۲۱)

مطلوبہ حجم اس لئے ہے

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \arcsin x \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$$

..... (۲۲)

$$\text{اب } \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \arcsin x \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \quad (\text{جب } \sqrt{1-x^2})$$

$$\text{اور } \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \quad (\text{جب } \sqrt{1-x^2})$$

بالآخر نتیجہ ہے $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$ (۲۳)

امثلہ ۳۶*

۲۷۳

۱۔ اگر ایک منحنی ایسا ہو کہ Δ لات تو ثابت کرو کہ جو سطح محوروں سے

اور منحنی کے کسی نقطہ میں سے محدودوں کے متوازی خط کھینچنے سے بنتا ہے منحنی اسکو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے جنکے رقبے نسبت $m : n$ میں ہوتے ہیں۔

۲۔ محور Δ اور منحنی Δ = ب جب Δ کی نیم موج کی درمیان جو رقبہ گھرا ہوا ہے وہ Δ ب ہے۔

۳۔ زنجیر Δ = ج جنر Δ ، محور Δ ، اور خطوط Δ = Δ ، Δ = Δ کے درمیان جو رقبہ گھرا ہوا ہے وہ ج جنر Δ ہے۔

۴۔ منحنی Δ = Δ (۱ + Δ)، محور Δ کی ساتھ ملے Δ رقبہ گیر ہے۔

۵۔ محور Δ اور منحنی Δ = Δ جب Δ کے متوازی غم موجوں کے درمیان جو رقبے ہیں ثابت کرو کہ وہ نزولی ہندسی سلسلہ بناتے ہیں جن کی نسبت مشترک Δ ہے۔

۶۔ محور Δ اور مکانی ج Δ = Δ (۱ - Δ) کے درمیان رقبہ Δ = Δ ہے۔

۷۔ منحنیوں Δ = Δ ، Δ = Δ ، Δ = Δ کے درمیان کا رقبہ دریافت کرو۔ $\left[\frac{9}{4} \right]$

۸۔ مکانیوں Δ = Δ ، Δ = Δ ، Δ = Δ کے درمیان کا رقبہ دریافت کرو۔ $\left[\frac{25}{2} \right]$

* مشق کے لئے اور مثالیں "نامہ نعتیات" کے نوں باب کے ختم پر ملینگی۔

۹۔ مکافی $\text{ما} = \text{لا}^۲ + \text{لا} + ۹$ کا قطعہ جو خط مستقیم $\text{ما} = ۳ - ۲\text{لا}$ سے
کٹتا ہے اس کا رقبہ دریافت کرو۔ $\left[\frac{1}{4}\right]$

۱۰۔ مکافیون $\text{ما}^۲ = ۴(۱ + \text{لا})$ $\text{ما} = ۲$ ب (ب۔ لا) کے درمیان کا
رقبہ $\frac{۱}{۲}(۱ + \text{ب})$ یا ب ہے۔

۱۱۔ ثابت کرو کہ کل رقبہ (جیکہ یہ محدود ہو) جو محور لا اور منحنی $\text{ما} = \frac{1}{۵۵} \text{فہ} (\frac{\text{لا}}{۵۵})$ ۲۶۴

کے درمیان گھرا ہوا ہے وہ عما کی قیمت پر منحصر نہیں۔

۱۲۔ منحنی $\text{ما} = \text{ب}$ منحنی $\frac{\text{لا}}{۲}$ کی مثبت شاخ اس کے متقارب اور محور ما کے
درمیان کا رقبہ ب لوگ ۲ ہے۔ [دیکھو شکل ۲۶ صفحہ ۱۱۵]

۱۳۔ دو ناقصوں $\frac{\text{لا}}{۲} + \frac{\text{ما}^۲}{\text{ب}} = ۱$ ، $\frac{\text{لا}}{۲} + \frac{\text{ما}^۲}{\text{ب}} = ۱$
کا مشترک رقبہ $\frac{۱}{۲} \text{ب}$ ہے۔

۱۴۔ رقبہ جو محدودوں کے محوروں اور مکافی $\left(\frac{\text{لا}}{۲}\right) + \left(\frac{\text{ما}}{\text{ب}}\right) = ۱$ کے

درمیان گھرا ہوا ہے وہ $\frac{۱}{۲} \text{ب}$ جب سہ ہے جہاں محوروں کے درمیان کا زاویہ
 سہ ہے [دیکھو لا = ب جب طہ ، $\text{ما} = \text{ب}$ جب طہ]

۱۵۔ مکافی $۲ \text{ج} = \text{ما} = \text{لا} + ۱$ اور اس کے دو ماسوں کے درمیان
جو مبدأ سے کھینچے جائیں رقبہ $\frac{۱}{۳} \text{ج}$ ہے۔

۱۶۔ مکافیون $\text{ما}^۲ = ۴(۱ + \text{لا})$ ، $\text{ما} = ۲$ کا مشترک رقبہ $\frac{۱۴}{۳}$ ہے۔

۱۷۔ مکمل سے ثابت کرو کہ ناقص کا رقبہ ہے π عما جب سہ جہاں
عما، بہ مزدوج نیم قطروں کے کسی جوڑے کے طول ہیں اور سہ ان کے
درمیان زاویہ ہے۔

۱۸۔ مکمل بالخصوص کا ضابطہ [صفحہ ۸۰ (۲)] اس طرح لکھا جاسکتا ہے

$\text{ع} \text{ع} \text{فرو} = \text{ع} \text{و} - \text{ع} \text{و} \text{فرع}$

ہندسی طور پر رقبوں کی رقوم میں اسکی نتیجہ بیان کرو۔
۱۹۔ باریک پتر پر ایک منحنی (ح) بنایا گیا ہے اور پتر اپنی سطح میں
ثابت نقطہ کے گرد زادیہ طہ میں سے گھومتا ہے۔ ثابت کرو کہ منحنی جو رقبہ جمو کر کرتا
ہے وہ ہے

۲۰۔ منحنی $(= ۲ + ۳)$ جم طہ کو مر شتم کرو اور اس کا رقبہ دریافت کرو۔
 $(\pi 11)$

۲۱۔ منحنی $(= ۲ + ۱)$ جم طہ کے اس حصہ کا رقبہ دریافت کرو جو
۲۴۵

مکانی $(= ۱۲ + ۱)$ جم طہ کے باہر واقع ہوتا ہے۔ $[۳ \pi ۱ + \frac{۱۶}{۳}]$
۲۲۔ قطبی محدودں میں تحویل کرنے سے ثابت کرو کہ ناقص

$(۱ + ۲) ۲$ ھ لا ما + ح با = ا کا رقبہ $\frac{۲}{۳}$ ھ لا ب ہے۔

۲۳۔ ایک بے وزن رسی کا طول l ہے، یہ ایک ثابت نقطہ سے بندھی
ہے اور ایک چھوٹے پھلے میں سے گذرتی ہے جو (جملہ) ایک افقی سلاخ
ح ب پر پھسل سکتا ہے سلاخ ح میں کی انتصابی سطح میں واقع ہے۔ رسی کا پچھلا
حصہ انتصابی نیچے لٹکتا ہے اور اس سرے کے ساتھ ایک چھوٹا وزن چ ب بندھا ہے۔
چ کا طریق دریافت کرو اور ثابت کرو کہ اس طریق اور ح ب کے درمیان
رقبہ l با ۲ ۔ گ۔ گ۔ جتنا l ہے جان گ گہرائی ہے
ح ب کی نقطہ سے۔

۲۴۔ ہندسی تجلیات کی بنا پر ثابت کرو کہ مکانی کے دو اسکی نیم قطروں اور
منحنی کے درمیان رقبہ اس رقبہ کا نصف ہے جو منحنی مرتب پر کے متناظر عمودوں اور
مرتب کے درمیان گھل ہوا ہے۔

۲۵۔ (نقل ۵۹) بتاؤ کہ ایسلسر کے سطح پیا میں پیہیہ کے درجوں سے کیا ظاہر

ہوگا جبکہ سلاح پ ق ایک پورا چکر لگاتی ہے اور نقطہ ق ایک بند مخنی مرسم کرتا ہے۔

۲۶۔ ایک سطح پیا ایسی شکل کا ہے کہ اس کے جس بازو کے ساتھ مرسم نقطہ لگا ہوا ہے اس کا دوسرا سر ایک انتصابی محور پر چل کی صورت میں لگا ہوا ہے۔ انتصابی محور کو ایک چھوٹی گاڑی اٹھائے پھرتی ہے جو کا غنڈہ (بغیر پھسلنے کے) آگے پیچھے لٹک سکتی ہے اور اس کے ساتھ ایک درجہ وار پھیلا ہوا ہے جو کل لڑکنے کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ جب مرسم نقطہ ایک بند مخنی مرسم کرتا ہے تو پھیلا کے نشانات سے کسی خاص پیمانہ پر رقبہ حاصل ہوتا ہے۔

۲۷۔ ایک سلاح پتیریں نقطے ا ب ج ہیں یہ سلاح اپنے مستوی میں حرکت کرتی ہے اور یہ نقطے بند مخنی مرسم کرتے ہیں جن کے رقبے س، س، س، س، س، س، س، س، س، س ہیں، سلاح بغیر پورا چکر لگانے کے اپنے اصلی مقام پر پھر آجاتی ہے، ثابت کرو کہ

$$ج \times س + ج \times ا + س \times ب + ا \times س \times ج =$$

جہاں خطوط ب ج، ح ا، ا ب کی علامات انہی سمتوں کے مطابق ہیں اور

س، س، س، س، س، س، س، س، س، س کی علامتیں دفعہ ۱۰ کے قاعدہ سے متعین ہوتی ہیں۔

۲۸۔ سلاح ا ب پر ایک نقطہ پ ہے یہ سلاح ایک ہی مستوی میں حرکت کرتی ہے اور ایک گردش پوری کرنے کے بعد اپنے اصلی مقام پر واپس آجاتی ہے۔

$$ثابت کرو کہ س = \frac{ا \times س + ب \times س}{ا + ب} - \pi \times ا$$

۲۹ جہاں ا = (ا ب) = پ ب اور س، س، س، س، س، س، س، س، س، س کا مفہوم وہی ہے جو اوپر کے سوال میں۔

اس لئے ثابت کرو کہ اگر سلاح کے سرے ا، ب ایک بند بیضوی مخنی پر حرکت کریں تو س، س، س، س، س، س، س، س، س، س

[ہولڈج]

کریں تو س، س، س، س، س، س، س، س، س، س

۲۹۔ مستقل طول کا ایک خط مستقیم Δ ب اس طرح حرکت کرتا ہے کہ اسکے سرے دو ثابت متقاطع خطوط مستقیم پر ہمیشہ واقع ہوتے ہیں ثابت کرو کہ اس پر کا کوئی نقطہ پ ایک ناقص مرتبہ کرتا ہے جس کا رقبہ $\pi \times \Delta$ پ $\times$ پ ب ہے۔

امثلہ ۳

جسم

۱۔ مخفی ما = ب جب $\frac{1}{r}$ کی نسیم موج کو محور لا کے

گرد پھرانے سے جو حجم پیدا ہوتا ہے ثابت کرو کہ وہ مائٹ اسطوانہ کا نصف ہے۔

۲۔ ثابت کرو کہ ایک مخروط ناقص کا حجم جس کے سرے متوازی ہیں

$$\frac{1}{4} \{ f + (f_1 + f_2) + f_3 \}$$

ہے جہاں f_1, f_2, f_3 اسکے سروں

کے رقبے ہیں اور f ان کے درمیان عمودی فاصلہ ہے۔

۳۔ محور لا کے گرد قائم زائد لا۔ ما = $\frac{1}{r}$ کی گردش سے جو جسم پیدا

ہوتا ہے اس کے ایک قطعہ کا حجم جسکی اونچائی r ہو جسے رأس سے ناپا جائے

ایک کرہ کے حجم کے مساوی ہوگا جس کا نیم قطر r ہو۔

۴۔ ایک قطعہ کرہ دو متوازی مستویوں سے گھرا ہوا ہے جن کا درمیانی

عمودی فاصلہ f ہے۔

ثابت کرو کہ اس کا حجم، اس اسطوانہ کے حجم سے جس کا ارتفاع f ہے

اور جسکی عمودی تراش کا رقبہ مستوی سروں کے رقبوں کا اوسط حسابی ہے بقدر اس

کرہ کے حجم کے زیادہ ہے جس کا قطر f ہے۔

۵۔ ایک نیم کرہ کا نیم قطر r ہے، اس کے قاعدہ سے فاصلہ $2r$ جب $\frac{1}{r}$

پر قاعدہ کے متوازی ایک مستوی کھینچا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ یہ نیم کرہ کے حجم کی

تصنیف کرتا ہے۔

۶۔ نیم قطر ۱ کے ایک ٹھوس کرہ کا جو حصہ نیم قطر ب (۱۲ >) کی کرہی سطح کے اندر شامل ہے جس کا مرکز ٹھوس کرہ کی سطح پر واقع ہے اس حصہ کو نکال دیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ اس کے خلا کا حجم نیم قطر ب کے نیم کرہ کے حجم سے بقدر $\frac{2}{3} \pi b^3$ کے کم ہے۔

۷۔ جو رقبہ مکانی ج ما = (لا - ۱) (لا - ب) اور محور لا کے درمیان گھرا ہوا ہے اس کو محور لا کے گرد گھمانے سے جو حجم پیدا ہوتا ہے وہ ہے۔

$$\frac{1}{3} \pi (لا - ب)^3 / ج$$

۸۔ اگر ایک قطعہ مکانی معین کے گرد گھومے تو حجم پیدا شدہ ماٹا اسطوانہ کے $\frac{1}{15}$ کے مساوی ہوگا۔

۹۔ ایسے مجسم کا حجم جو مکانی کو رائس پر کے ماس کے گرد پھرنے سے پیدا ہوتا ہے ماٹا اسطوانہ کا $\frac{1}{8}$ ہے۔

۱۰۔ مکانی ما = ۴ لا کا وہ حصہ جو در خاص سے کٹتا ہے مرتب کے گرد گردش کرتا ہے ثابت کرو کہ پیدائندہ حلقہ نما مجسم کا حجم $\frac{1}{15} \pi لا^3$ ہے۔

۱۱۔ وتر لا = ف منحنی لا ما = لا اسے جو حصہ کاٹتا ہے اسے محور لا کے گرد پھرایا گیا ہے، ثابت کرو کہ حجم پیدائندہ اس اسطوانہ کے حجم کا ایک چوتھائی ہے جس کا ارتفاع ف ہے اور جو اسی قاعدہ پر قائم ہے۔

۱۲۔ مثلثی منشور کے ایسے مقطوعہ کا حجم جس کو کوئی دوستوی قطع کریں

$$\frac{1}{3} (ف + ف + ف) ق$$

تین متوازی کناروں کے طول ہیں اور ان کناروں پر عمود دار تراش کا رقبہ ق ہے۔

۱۳۔ ایک پیپے کی وسطی تراش کا نیم قطر ب ہے اور ہر سرے کا نیم قطر ۱ ہے۔ ثابت کرو کہ پیپے کا حجم $\frac{1}{15} \pi (۱۳ + ۴ لا + ۸ ب + ف)$ ہے

جہاں ف پیسے کا طول ہے۔ یہ بان لیا گیا ہے کہ پیسے کا کمون نہی مکانی کی ایک قوس ہے۔
۱۴۔ دائرہ کی ایک قوس اپنے وتر کے گرد گردش کرتی ہے۔ ثابت کرو کہ حجم کا حجم ہے

$$\frac{2}{3} \pi \text{ راجب عا} + \frac{2}{3} \pi \text{ راجب عا حجم عا} - \frac{2}{3} \pi \text{ راجب عا حجم عا}$$

جہاں راجب عا ہے اور ۲ عا قوس کی زاوی بیانش ہے۔

۱۵۔ وہ شکل جو نیم قطر کے دائرہ کے ربع اور اس کے سروں کے ماسوں سے گھری ہوئی ہے ان ماسوں میں سے ایک کے گرد گردش کرتی ہے۔ ثابت کرو کہ اس طرح جو حجم پیدا ہوتا ہے اس کا حجم ہے

$$\left(\frac{5}{3} - \frac{\pi}{2} \right) \pi \text{ راجب عا}$$

۱۶۔ دو مساوی نیم قطر کے قائم مستدیر اسطوانے ایک دوسرے کو علی القوائم قطع کرتے ہیں۔ ثابت کرو کہ ان دونوں سے گھرا ہوا حجم $\frac{1}{2} \pi \text{ راجب عا}$ ہے۔
اگر ان کے محور زاویہ عا پر قطع کریں تو حجم $\frac{1}{2} \pi \text{ راجب عا}$ قائم عا ہے۔

$$۱۷۔ \text{اگر قطع زائد} \frac{1}{2} \pi \text{ راجب عا} - \frac{1}{2} \pi \text{ راجب عا} = ۱ \text{ محور لا کے گرد گھومے تو وہ حجم}$$

جو اس سطح، متقاربوں سے تشکیل شدہ مخروط اور محور کا کے علی القوائم دو مستویوں کے درمیان گھرجاتا ہے جہاں مستویوں کا فصل ف ہے اس مستدیر اسطوانہ کے حجم کے مساوی ہے جس کا ارتفاع ف ہے اور نیم قطر ب۔

۱۸۔ ایک قائم مستدیر مخروط کا نصف زاویہ عا ہے اس کا راس نیم قطر کے ایک کرہ کی سطح پر ہے اور اس کا محور مرکز میں سے گذرتا ہے۔ ثابت کرو کہ کرہ کے اس حصہ کا حجم جو مخروط سے باہر ہے $\frac{2}{3} \pi \text{ راجب عا}$ ہے۔

۱۹۔ المرفہ ۱۰۹ کے سمپسن کے طریقہ میں جہاں دو متوازی تراشوں میں سے ایک کے درمیان جو حجم شامل ہے وہ معلوم کیا گیا ہے، درمیان کی تراش میں تراشوں

میں سے بالترتیب فاصلوں h_1, h_2, h_3 پر ہو تو ضابطہ ہوگا

$$\frac{5+6}{6} \{ (2-5) (ک) (ک) (س) + (5+6) (ک) (س) + (2-5) (ک) (س) \}$$

* امثلہ ۲۸ منحنی خط اور سطحیں

۱۔ جیب کے منحنی ما = ب جب لا، کی پوری موج (Undulation)

کا طول ایک ناقص کے محیط کے مساوی ہے جبکہ نیم محور $\frac{1}{2} (ا + ب)$ اور $\frac{1}{2} (ا - ب)$ ۔
۲۔ کسی منحنی میں بدا سے اسکے کسی ماس پر جو عمود (ع) کھینچ سکتا ہے اسکے طول کے لئے یہ مضابطہ مائل کرو۔

$$ع = لا \frac{فرسا}{فرس} - ما \frac{فرلا}{فرس}$$

نیز ثابت کرو کہ مستی نیم قطر کا ماس پر قائم مثل ہے

$$لا \frac{فرلا}{فرس} + ما \frac{فرسا}{فرس} = یا \frac{فرسا}{فرس}$$

۳۔ زنجیرہ (Catenary) ما = ج جہاں $\frac{لا}{ج}$ کی کسی قوس کے

جواؤں سے شروع ہوتی ہے، مرتب کے گرد گھمانے سے جو مجسم پیدا ہوتا ہے اسکی منحنی سطح $\frac{1}{2} (ج لا + ما س)$ ہے جہاں لا، ما، س اس قوس کے دوسرے سرے سے متعلق ہیں۔

۴۔ گردشی رکافی ناسے محور پر علی التوائم مستوی سے منحنی سطح کا جو صدر کشا ہے وہ ہے

$$\frac{1}{4} \frac{ب}{ف} \{ (۴ ف + ۲ ب) (ب) - ۲ (ب) \}$$

* صفحہ ۴۷۴ کے نیچے نوٹ دیکھو۔

جہاں محور کا طول ϕ ہے اور اعاطہ کرنے والے دائرہ کا نیم قطر b ۔

۵۔ مکانی $\phi = ۴۷^\circ$ کی قوس کو جو مبدأ اور معین $\phi = ۳۰^\circ$ کے درمیان

سے محور ϕ کے گرد گھمانے سے جو نغنی سطح پیدا ہوتی ہے وہ $\frac{۵۶}{۲۲}$ ϕ ہے۔

۶۔ مکانی کی قوس کا وہ حصہ جو رأس اور وتر خاص کے درمیان واقع ہے

محور کے گرد پھیرا گیا ہے، ثنابت کرو کہ جسم کی نغنی سطح کا عہدہ کے رقبہ کی ۱۲۱۹ اگنا ہے۔

۷۔ دائرہ کی قوس اپنے وتر کے گرد گھومتی ہے، ثنابت کرو کہ سطح جو پیدا ہوتی ہے

وہ ہے $\frac{۲۲}{۱۷}$ ϕ (جب ϕ - عجم ϕ) جہاں ϕ نیم قطر ہے اور قوس کا زاوی

ناپ ۲۷° ہے۔

۸۔ نیم قطر ϕ کے دائرہ کا ربع اپنے سرے پر کے قوس کے گرد گھومتا ہے ثنابت

کرو کہ نغنی سطح کا رقبہ $\frac{۲۲}{۲۲} (۲ - \frac{۲}{۲})$ ϕ ہے۔

۹۔ نیم قطر ϕ کا ایک ثنابت کرہ ہے۔ اسکی سطح پر کے کسی نقطہ کو مرکز مان کر نیم قطر

ر کا ایک متغیر سرہ بنایا گیا ہے ثنابت کرو کہ اسکی سطح کا رقبہ جو ثنابت کرہ کے حامل ہونے

سے قطع ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے جبکہ $\phi = \frac{۲}{۲}$ ϕ ۔

۱۰۔ کرہ کا ایک قاسمی مخروط کھینچا گیا ہے اور مخروط کے رأس کو مرکز مان کر دو

کروی سطحیں کھینچی گئی ہیں جو کرہ اور مخروط دونوں کو قطع کرتی ہیں۔ ثنابت کرو کہ کرہ اور

مخروط پر جو منطقے قطع ہوتے ہیں ان کے رقبے مساوی ہیں۔

امثلہ ۳۹

تقریبی تربیع۔ اوسط قیمتیں

۱۔ لوک ϕ کو مضابطہ لوک $\phi = ۲$ ϕ فرلا سے حاصل کر نیلے لے

مہسن کا قاعدہ لگاؤ۔ [ٹیک قیمت ہے لوک $\phi = ۲$ ϕ ۶۹۳۱۳۰۰۰۰]

۲۔ $\frac{۲}{۲} = \frac{۲}{۲}$ ϕ فرلا سے حاصل کرو۔

۳۔ (دفعہ ۱۱۴) تین معین والے سمت کے طریقہ میں 'درمیانی معین' یا 'معیّن' یا 'مکمل' سے غیر مساوی فاصلوں 'ھ' 'گ' پر ہے، اس صورت میں ضابطہ ہے

$$\frac{1}{4} (ھ + گ) (۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲) = \frac{1}{4} (ھ - گ) (۱ - ۲ + ۳ - ۴ + ۵ - ۶ + ۷ - ۸ + ۹ - ۱۰ + ۱۱ - ۱۲)$$

۴۔ قطع ناقص کے قطر مساوی زاوی وقفوں پر کھینچے گئے ہیں، ثابت کرو کہ ان قطروں کے مربعوں کا اوسط 'اعظم' اور اصغر محوروں کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔

۵۔ طول 'ا' کے خط مستقیم پر ایسے ہی کوئی نقطہ لے لیا گیا ہے، ثابت کرو کہ دو حصوں کی سطح کا اوسط تقریباً $\frac{1}{4}$ 'ا' ہے اور دو حصوں کے مربعوں کے مجموعہ کی اوسط قیمت $\frac{1}{2}$ 'ا' ہے۔

۶۔ اگر ایک نقطہ مستقل اسراع کے ساتھ حرکت کرے تو وقت کے مساوی اور لا متناہی چھوٹے وقفوں پر کی رفتاروں کا اوسط مربع

$$\frac{1}{n} (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_n^2)$$

اور آخری رفتاریں ہیں۔

۷۔ سادہ ہوائی حرکت میں ثابت کرو کہ اوسط توانائی بالحرکت 'زیادہ سے زیادہ توانائی' بالحرکت کا نصف ہے۔

۸۔ ایک ذرہ 'دی ہوئی رفتار' اگر اختیاری زاویہ ارتفاع سے پھینکا گیا ہے، ثابت کرو کہ اوسط افقی 'Range' زیادہ سے زیادہ $\frac{1}{2} \times 42.4$ ہے۔

۹۔ ناقص کے ماسکی نیم قطر مساوی زاوی وقفوں پر کھینچے گئے ہیں ثابت کرو کہ ان ماسکی نیم قطروں کا اوسط 'نیم محور اصغر' کے مساوی ہے۔

۱۰۔ نیم کرہ کی تختی سطح پر کے نقطوں کا اوسط فاصلہ قاعدہ کے مستوی سے نیم قطر کے نصف کے مساوی ہے۔

۱۱۔ نیم کرہ کے قطب سے کروی سطح کے نقطوں کا اوسط فاصلہ $4\pi r$ ہے جہاں کرہ کا نیم قطر 'ا' ہے۔

۱۲۔ دائری رقبہ کا نیم قطر $\frac{1}{2}$ ہے، مرکز سے 'نیز محیط پر کے کسی نقطہ سے اس رقبہ پر کے نقطوں کے فاصلوں کے متکافینوں کی اوسط قیمتیں دریافت کرو۔

$$\left[\frac{2}{1} , \frac{4}{\pi} \right]$$

۱۳۔ ایک ڈنڈے کی شکل گردشیں لمبو تر سے ناقص نما کی ہے جو بہت لمبا ہے۔ ثابت کرو کہ اس کا اوسط تراشی رقبہ مرکز پر کی تراش کے رقبہ کا دو تہائی ہے۔

۱۴۔ برقائی ہونی گول کیا پر سطحی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے $(\frac{1}{r} - \frac{1}{R})^2$ جہاں $\frac{1}{r}$ کیا کا نیم قطر $\frac{1}{2}$ ہے اور $\frac{1}{R}$ مرکز سے نقطہ کا فاصلہ ہے۔ اوسط کثافت کی نسبت مرکز پر کی کثافت کے ساتھ دریافت کرو۔

۱۵۔ اگر شہابوں (Comets) کے مدار فضائیں یکساں طور پر منقسم ہوتے تو طریق الشمس کے ساتھ ان کا اوسط میلان نیم قطری (545×297) ہوتا۔

۱۶۔ نیم قطر $\frac{1}{2}$ کی کروی سطح کے نقطوں کا اوسط فاصلہ ایک ایسے نقطہ

پ سے جو مرکز سے فاصلہ ج پر ہے $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ ہے اگر پ کرہ کے باہر ہو اور $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ ہے اگر پ کرہ کے اندر ہو۔

۱۷۔ ایک دائرہ کا نیم قطر $\frac{1}{2}$ ہے، اس کے محیط پر کے نقطوں کا اوسط فاصلہ محیط پر کے ایک ثابت نقطہ سے $1.624 \frac{1}{2}$ ہے۔

۱۸۔ ایک دائری رقبہ کا نیم قطر $\frac{1}{2}$ ہے۔ اس پر کے نقطوں کا اوسط فاصلہ محیط پر کے ایک ثابت نقطہ سے $1.6132 \frac{1}{2}$ ہے۔

۱۹۔ کرہ کے اندر کے نقطوں کا اوسط فاصلہ سطح پر کے ایک دے ہوئے نقطہ سے $1 \frac{7}{8}$ ہے۔

۲۰۔ اگر زمین کے مرکز سے فاصلہ $\frac{1}{2}$ پر کثافت اس ضابطہ $\frac{1}{r^2}$ سے حاصل ہو جہاں $\frac{1}{r}$ مستقل ہے تو ثابت کرو کہ

اوسط کثافت ہوگی ۳ ث جب ۱۴ - ۱۴ حجم ۱۴ جہاں ۱

زمین کا نیم قطر ہے -
۲۱ - اگر دی شکل کی کچھ کمیت ہے جس کی کثافت مرکز سے فاصلہ ۱ پر ۱
ہے، اگر نیم قطر د کے ہم مرکز گروہ کے مادہ کی اوسط کثافت ۳ ہو تو ثابت کر دو کہ

$$ث = ۱ + \frac{۱}{۳} د فرٹ$$

امثلہ ۲۰

اوسط مرکز

۱ - مکمل سے ثابت کر دو کہ مخروط کا اوسط مرکز متوازی اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والے خط کی اس نسبت ۱ + ۱ : ۲ + ۱ ب سے تقسیم کرتا ہے جہاں ۱ ب متوازی اضلاع کے طول ہیں -

۲ - منحنی ۱ = ۱ ب جب ۱ کی ایک نیم موج اور محور ۱ کے درمیان جو رقبہ ہے اس کا اوسط مرکز اس محور سے فاصلہ ۱ ب پر ہے -

۳ - منحنی ۱ = ۱ ب اور محور ۱ کے درمیان جو رقبہ ہے اس کا

اوسط مرکز (۰، ۱) ہے -

۴ - ربع دائرہ کے سروں پر ماس کینٹے سے قوس اور ان ماسوں میں جو رقبہ گھرجاتا ہے اس کا اوسط مرکز ہر ماس سے ۱ + ۱ ب جہاں دائرہ کا نیم قطر ۱ ہے -

۵ - جو رقبہ مکانی (۱، ۱) + (۱، ۱) = ۱ اور عددوں کے خوردوں درمیان گھرا

ہوا ہے اس کا اوسط مرکز نقطہ (۱، ۱) پر ہے - رکھو ۱ = ۱ ب ۱
۱ = ۱ ب حجم ۱ -

۶۔ نیم قطر ۱ کے کرہ کو ایک ستوی کے ذریعہ جو مرکز سے فاصلہ ج پر ہے دو قطعوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ثابت کرو کہ ان قطعوں کے اوسط مرکوزوں کا فاصلہ

$$\text{کرہ کے مرکز سے } \frac{3}{4} \times \frac{(ج \pm ۱)}{ج \pm ۱۲} \text{ ہے۔}$$

۷۔ نیم قطر کا ربع دائرہ ہے، اسکی قوس اور سروں کے ماسوں سے جو شکل بنتی ہے اسکو ایک ماس کے گرد پھرانے سے مجسم بنایا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ اس مجسم کے اوسط مرکز کا فاصلہ رأس سے ۵.۰۸۶۹ ہے۔

۸۔ نوکہ از محراب کی شکل کا ٹھوس چھروں مکانی رقبہ اپن کو پ ن کے گرد پھرانے سے بنایا گیا ہے جہاں ا ر رأس ہے اور پ ن عین ہے ثابت کرو کہ اس کا اوسط مرکز محور کو نسبت ۵ : ۱۱ میں تقسیم کرتا ہے۔

۹۔ رأس سے شروع ہو کر مکانی کی ایک قوس اپن سے اور پ ن راس پر کے ماس پر نمود ہے۔ ثابت کرو کہ شکل اپن کو ا ر ن کے گرد گھمانے سے جو مجسم پیدا ہوتا ہے اس کے اوسط مرکز کا فاصلہ ا ر سے ۵/۴ ا ر ن کے مساوی ہے۔

۱۰۔ دو مساوی مستدیر اسطوانے ایک دوسرے کو علی القوائم قطع کرتے ہیں، ثابت کرو کہ اس حجم کا اوسط مرکز جو ان اسطوانوں اور ان کے محوروں کے مستوی کے درمیان ہے اس مستوی سے ۳/۴ کے فاصلہ پر ہے جہاں ا مشترک نیم قطر ہے۔

۱۱۔ ربع دائرہ اپنے ایک سرے پر کے ماس کے گرد گھماتا ہے، اس طرح سے جو حجم پیدا ہوتا ہے اسکی منحنی سطح کا اوسط مرکز رأس سے ۵.۸۷۶ کے فاصلہ پر ہے۔

۱۲۔ انگڑ چھلے کو استوائی مستوی سے تراشنے سے جو دو مساوی حصے ہو جاتے ہیں ان میں سے کسی حصہ کی منحنی سطح کے اوسط مرکز کا فاصلہ اس استوائی

مستوی سے ۲۲/۳ ہے جہاں ب تکونی دائرہ کا نیم قطر ہے۔

۱۳۔ لنگر چھلے کو استوائی مستوی سے تراشنے سے اس کے جو دو مساوی

حصے ہو جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے حجم کا اوسط مرکز استوائی مستوی سے فاصلہ ۲۷/۳۳

پر ہے جہاں ب تکوینی دائرہ کا نیم قطر ہے۔

۱۴۔ ناقص $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ کو محور ما د مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے کسی ایک حصہ کو محور لا کے گرد پھرانے سے جو مجسم پیدا ہوتا ہے اسکی منحنی سطح کا اوسط مرکز، مرکز سے فاصلہ

$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ پر واقع ہے جہاں ز خروج مرکز ہے۔ یہ مان لیا گیا ہے کہ $b > 1$ ۔ متناظر نتیجہ مائل کردیکہ $b < 1$ ۔

۱۵۔ بیسیں کے مسئلہ لگانے سے قائم مستدیر مخروط اور قائم مستدیر مخروط ناقص کا حجم اور اسکی منحنی سطح دریافت کرو۔

۱۶۔ انیم قطر $\frac{1}{2}$ کے ایک اسطوانہ کے گرد ایک نالی کالی گئی ہے جس کی عمودی تراش نیم قطر $\frac{1}{2}$ والا ایک نصف دائرہ ہے ثابت کرو کہ حجم جو نکال دیا گیا ہے وہ ہے $\frac{1}{2} \pi - \frac{1}{2} \pi^2$ ۔

نیز نالی کی سطح ہے $\frac{1}{2} \pi - \frac{1}{2} \pi^2$ ۔

۱۷۔ ایک مستدیر اسطوانہ کا نیم قطر $\frac{1}{2}$ ہے اس کی سطح پر مستطیلی تراش کا

ایک پہنچ تاگا کاٹا گیا ہے ثابت کرو کہ ساگے کے ایک پھیر کا حجم $\frac{1}{2} \pi - \frac{1}{2} \pi^2$ ہے جہاں $\frac{1}{2}$ ب مستطیل کے ضلع ہیں اور $\frac{1}{2}$ وہ ضلع ہے جو اسطوانہ کی سطح پر عمود دار ہے۔

۱۸۔ ایک بند منحنی کے محیط کے اوسط مرکز میں سے ایک خط مستقیم کھینچا گیا ہے اور یہ محیط کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ ان حصوں کو اس خط سے گرد گھمائے سے جو مجسم پیدا ہوتے ہیں ان کی منحنی سطحیں مساوی ہیں۔

۱۹۔ رقبہ ق محاور لا اور ما کے گرد گھومنے سے حجم ع اور بالترتیب پیدا کرتا ہے۔ بتاؤ کہ کیا رقبہ پیدا ہوگا اگر یہ خط

لا حجم ع + ما جب ع = ع کے گرد گھومے۔ اس میں مان لیا جائے کہ

خط رقبہ کو نہیں کاٹتا۔

امثلہ ۴۴

ضعفی متکملے

۱۔ متکملات $\frac{1}{2} (لا + ما)$ فلا فرما $\frac{1}{2} (لا + ما) - \frac{1}{2} (لا) - \frac{1}{2} (ما)$ فلا فرما

کی قیمتیں دریافت کرو جبکہ انہیں ناقص $\frac{1}{2} (لا) + \frac{1}{2} (ما) =$ ا کے رقبہ پر لیا جائے


۷۔ ثابت کرو کہ اسطوانوں $لا + ما = ۲ لا$ ، $ما = ۲ لا$

کے درمیان کا حجم $\frac{128}{18}$ ہے۔

۳۔ نیم قطر ۲ کا ایک کرہ بنایا گیا ہے جبکہ اس کا مرکز نیم قطر کے اسطوانہ کی سطح پر واقع ہے۔ ثابت کرو کہ اسطوانہ کی سطح کا جو حصہ کرہ کے اندر ہے اس کا رقبہ ۱۶ ہے۔

۴۔ حجم جو ناقصی سکائی نا $ما = \frac{1}{2} (لا) + \frac{1}{2} (ما)$ ، اسطوانہ $لا + ما = ۲ لا$

اور استوی $ما =$ کے درمیان گھرا ہوا ہے وہ ہے $\frac{\pi (پ + ق)}{۸ پ ق}$



نواں باب

خاص منحنی

۱۱۹۔ جبریہ منحنی جو ایک تشاگل کا محور کہتے ہیں۔

6 = f (a) (1)

کے نمونہ کے جبریں مخفیات کو مرتسم کر نیکی طریقوں کی توضیح اس کتاب کے مختلف حصوں میں کی گئی ہے جہاں ف (لا) منطق تفاعل تھا اور ان تریسی طریقوں میں متعارفوں، اعظم اقل معینوں اور نقاط انعطاف کا دریافت کرنا بھی شامل تھا۔ (دیکھو دفعات ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶)

عام طور پر جبریہ منجھنیاں کا مطالعہ اس کتاب کے حدود سے باہر ہے لیکن

الم = ف (١٦) (٢)

نمونہ کے تنقیدات کی بحث میں کچھ حکم و قیافہ کر دینا سودمند ہو گا۔

اس مساوات سے Δ کی کسی قیمت کے جواب میں Δ کی دو مساوی
لیکن مختلف علامت قیمتیں ملتی ہیں، اس لئے Δ کی ان قیمتوں کے اندر (اگر ایسی
نیز چونکہ Δ لازماً مثبت ہے اس لئے Δ کی ان قیمتوں کے اندر (اگر ایسی
موجود ہوں) جن کے لئے $F(\Delta)$ منفی ہے Δ کی کوئی حقیقی قیمتیں ہو سکتا۔
مثلاً اگر $F(\Delta)$ میں ایک سادہ جزو ضربی $\Delta - \Delta_0$ شامل
ہوتا ہے اور اس لئے مساوات یہ شکل اختیار کرتی ہے

ما = لا - لا (لا) فتا (لا) (٣)

تو بائیں جانب کا رکن علامت بدلتا ہے میسے لا، لا کی قیمت میں سے گزرتا ہے۔ اس لئے (لا، لا) کے ایک جانب معین خیالی ہے۔

$$\text{نیز اس نقطہ پر } \left(\frac{\text{مف لا}}{\text{مف لا}} \right)^2 = \frac{\text{ما}^2}{(\text{لا} - \text{لا})^2} = \frac{\text{فد لا}}{\text{لا} - \text{لا}}$$

اور اس لئے $\frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} = \infty$ ، اس لئے حماس ولا پر عمود وار ہے۔

اگر برعکس اسکے ف (لا) دوا جزو ضربی رکھتا ہو مثلاً

$$\text{ما}^2 = (\text{لا} - \text{لا})^2 \text{ فد لا} \dots \dots \dots (۴)$$

تو بائیں جانب کا جملہ علامت نہیں بدلتا جبکہ لا قیمت لا میں سے گزرتا ہے۔

۲۸۵

اس لئے معین نقطہ (لا، لا) کے دونوں جانب حقیقی ہے یا دونوں جانب خیالی۔

پہلی صورت میں نقطہ زیر بحث میں سے نغنی کی دو شاخیں ہیں جو ایک زاویہ پر

قطع کرتی ہیں اور ایک ”عقدہ“ بناتی ہیں۔ دوسری صورت میں (لا، لا) طریق پر

اکیلایا ”فروج“ نقطہ ہے۔ عقدہ پر ماسی خطوط کی سمتیں حسب ذیل مائل

ہوتی ہیں

$$\left(\frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} \right)^2 = \frac{\text{نہا}}{\text{لا - لا}} = \frac{\text{ما}^2}{(\text{لا} - \text{لا})^2} = \text{فد لا} \dots \dots \dots (۵)$$

اگر ف (لا) تھرا جزو ضربی رکھتا ہو مثلاً

$$\text{ما}^2 = (\text{لا} - \text{لا})^2 \text{ فد لا} \dots \dots \dots (۵)$$

تو بائیں جانب کا جملہ نقطہ (لا، لا) پر علامت بدلتا ہے۔ پس اس نقطہ کے

ایک جانب نغنی خیالی ہے۔ نیز چونکہ $\frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}}$ اس صورت میں صفر ہے نغنی

عمود کو سس کرتا ہے۔

یہاں چند مثالیں دی جاتی ہیں۔ ابتدا میں ایسی صورتیں ہیں جن میں ف (لا) صبیح اور نطق بھی ہے۔

مثال ۱۔ جس صورت میں ف (لا) پہلے یا دوسرے درجہ کا ہے مثلاً

$$مأ = ا + ب' \quad مأ' = ا + ب + ج \dots \dots (٦)$$

تو نسخی ایک مغرو ملی ہے جس کا محور لا صدری محور ہے۔

مثال ۲۔ - کعبی نغمیات

$$6^{\circ} = 1^{\circ} + 2^{\circ} + 3^{\circ} + \dots + n^{\circ} \quad (4)$$

میں بعض دلچسپ صورتیں شامل ہوتی ہیں۔

(۱) اگر مائیں جانب کے خلی اجزاء سے ضرری تحقیق اور الگ الگ ہوں تو اس مساوا

کوئیوں لکھا جاسکتا ہے

أما = (لا - عا) (لا - با) (لا - حا) (أ)

اور یہ فرض کر لینے سے عمومیت کم نہیں ہو جاتی کہ اثبات ہے اور علم بہ اجاب

لا > حد کے لئے اور بہار > لا > حد کے لئے معین خیالی میں۔ (عبدالغفور)

اور (بہ!) کے درمیان ما کی اعظم قیمت ہے۔ اسلئے منحنی ایک بند طبقہ اور ایک


لا انتہا شلخ پر مشتمل ہے۔ لاکھوں بڑی مہنتوں کے لئے

$$\left(\frac{ج}{ن} - 1\right)\left(\frac{ب}{ن} - 1\right)\left(\frac{ع}{ن} - 1\right)\frac{ن}{1} = \frac{6}{1 \times 1}$$

یہاں Δ $\leq$ Δ کے لئے مآخیالی ہے اور $\Delta < \Delta$ کے لئے حقیقی ہے لیکن $\Delta = \Delta$ کے لئے یہ صفر ہوتا ہے۔ نقطہ Δ ، یہاں عقدہ ہے۔ اسے یوں خیال کیا جاسکتا ہے کہ پہلی صورت کے حلقہ اور لامتناہی شاخ کے ملنے سے یہ پیدا ہوا ہے۔ (۵) اگر Δ ، Δ ، Δ میں سے درجہ اولیٰ قیمتیں مل جائیں تو

$$\Delta = \Delta = (\Delta - \Delta) = (\Delta - \Delta) \dots \dots \dots (۱۱)$$


$\Delta > \Delta$ کے لئے مآخیالی ہوگا سوائے $\Delta = \Delta$ کے جبکہ یہ صفر ہوگا اس صورت میں نقطہ Δ ، اکیلا نقطہ ہے۔ ایسا خیال کیا جاسکتا ہے کہ صورت اول کے حلقہ کے معدوم ہو جانے سے یہ شکل پیدا ہوتی ہے۔



شکل (۶۹)

ان تمام صورتوں کی شکل (۶۹) میں توضیح کی گئی ہے۔ دائیں جانب سے شروع ہو کر نمونہ (۶۹) کا ایک منحنی ملتا ہے جو ایک اکیلا لامتناہی شاخ پر مشتمل ہے۔

۲۸۷ اس کے بعد وہ صورت جس میں لامتناہی شاخ ہے اور اسکے ساتھ اکیلا نقطہ (۱۰) لگا ہوا ہے، اس کی مساوات نمونہ (۱۱) کی ہے۔ اس ترتیب میں اگلی صورت یہ ہے لامتناہی شاخ اور نقطہ کے گرد بیضوی حلقہ، یعنی نمونہ (۸) کی مساوات ہے۔ اس سے بعد کی منزل میں بیضوی حلقہ اور لامتناہی شاخ مل گئے ہیں اور ملنے سے عقدہ مع ایک حلقہ کے پیدا کرتے ہیں، مماثل نمونہ کی مساوات (۱۰) ہے۔ آخر میں ایک اکیلی شاخ ہے جو حلقہ کے باہر سے گزرتی ہے اس کے لئے نمونہ (۹) کی مساوات ہے۔*



شکل (۷۰)

* شکل کے نمونی مساوات

$$y^2 = \frac{1}{x} (x^3 - 3x^2 + 2x + 1)$$

سے ترسم کئے گئے ہیں، جبکہ $x = 2, 4, 6, 8, 10$ ۔ ان کا باہمی ربط آسانی سے ذہن میں آسکتا ہے اگر انہیں ایک سطح (نمونہ ۳) کے متواتر گھیر خطوط خیال کیا جائے مثلاً سطح پہاڑی دامن میں کسی چوٹی کے قریب وجوہ کی نمونی سطح ہو سکتی ہے۔

©

Contour lines


(ع) نہایت ہی خاص صورت میں جبکہ تینوں مقداریں $ع$ ، $ب$ ، $ج$ مساوی ہو جائیں تو

لے $ما = (لا - ع)$ (۱۳)
 اس صورت میں منحنی "نیم گھمبیری" کہلاتا ہے۔ اسکے ($ع$) پر ایک قرن ہے۔
 اسے عقدہ کی انتہائی شکل خیال کیا جاسکتا ہے جو عقدہ کے معدوم ہو جانے سے پیدا
 ہو سکتی ہے۔ دیکھو شکل ۷۰ جہاں $ع = ۰$ ۔


اگر مساوات (۲) میں $ف (لا)$ منطبق ہو کر صحیح نہ ہو تو نسب $ن$ کی حقیقی اصول
 سے (اگر کوئی ہوں) متقارب ملیں گے جو محور $ما$ کے متوازی ہونگے بشرطیکہ $لا$ کی
 ایسی قیمتوں کے لئے جو ان اصولوں سے بہت کم تفاوت ہوں $ما$ مثبت ہو۔

مثال ۳۔ $\frac{ما}{لا} = \frac{لا - ۱}{لا}$ (۱۳)

محور $ما$ متقارب ہے، نیز $لا$ کی بڑی قیمتوں کے لئے $ما = \pm لا$ تقریباً $لا = ۰$ ۔
 اور $لا = ۱$ کے درمیان منحنی کا کوئی حصہ حقیقی نہیں۔ دیکھو شکل ۷۱۔



شکل (۷۰)



شکل (۷۱)

مثال ۴ - $\frac{a^2}{b^2} = \frac{a-b}{a}$ (۱۴)

لا منفی کے لئے اور لا < ا کے لئے ما خیالی ہے۔ دیکھو شکل ۲۔

اس منحنی کو اگنسی کی ڈائن (Witch of Agnesi) کہتے ہیں۔

مثال ۵ - $a^2 = \frac{a+b}{b-a}$ (۱۵)

مبدأ پر عقدہ ہے اور منحنی محور کا کو دو بارہ (ا۔) (ا۔) پر کاٹتا ہے۔ اگر

لا < ب یا لا > ا تو ما خیالی ہوتا ہے۔ خط لا = ب

تقارب ہے۔ دیکھو شکل ۳۔


مثال ۶ - $a^2 = \frac{a^2}{b-a}$ (۱۶)

یہ مسادات (۱۵) میں ا کو صفر کے مساوی رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔


حلقہ اس صورت میں قرن ہو جاتا ہے شکل ۴۔ اس کو بسلابی خط

(Cisoid) کہا جائے گا۔


اشکال ۳ و ۴
 اگلے صفحہ
 پر
 ہیں۔



شکل (۴۳)



شکل (۴۴)



شکل (۴۵)

۲۹۰۔ مثال ۷۔
$$MA = \frac{1 + \frac{1}{\lambda}}{1 - \frac{1}{\lambda}} \dots \dots \dots (14)$$

چونکہ ما خیالی ہے جبکہ $\lambda < 1$ ۔ λ سوائے اس صورت کے جبکہ $\lambda = 1$ ۔ مبداء اکیلا نقطہ ہے۔ مائل متقارب دریافت کر نیچے لے

$$\frac{1}{\lambda} - \left(\frac{1}{\lambda} - 1 \right) \left(\frac{1}{\lambda} + 1 \right) \pm = \left(\frac{\frac{1}{\lambda} + 1}{\frac{1}{\lambda} - 1} \right) \pm = \frac{MA}{\lambda}$$

(18)
$$\dots \dots \dots \left(\dots \dots + \frac{1}{\lambda} \right) \frac{1}{2} + \frac{1}{\lambda} + 1 \pm =$$

(19)
$$\dots \dots \dots (1 + \lambda) \pm = MA$$
 اس لئے خطوط متقارب ہیں۔ شکل ۷۵۔

۱۲۰۔ ماورائی منحنی - زنجیرہ - خط بجزری (Tractrix)

اب چند مشہور منحنیات پر بحث کی جائے گی جو اکثر ماورائی ہیں اور جن کی تعریف اس نمونہ کی مساواتوں سے کی جاتی ہے جن کا α درجہ ۶۱ میں دیا گیا ہے۔
یعنی $\lambda = 1$ (فنا (ت)؛ $MA =$ خصا (ت)

جہاں ت بدلنے والا متبدل ہے۔
جو شکل ایک یکساں زنجیرہ یا ذبہ ارض کے ماتحت آزادانہ طور پر لٹکنے سے اختیار کرتی ہے اسے ہم زنجیرہ (Catenary) کہتے ہیں۔

سکونیات کے ابتدائی اصولوں کی مدد سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر سب سے نیچے نقطہ (ل) سے شروع ہو کر زنجیرہ پر گئے کسی نقطہ پ تک کا قوسی طول ہی ہو اور پ پر گئے ماس کا افق کے ساتھ میلان مسا ہو تو

مس = λ سبسا $\dots \dots \dots (2)$

جہاں λ مستقل ہے۔ اس لئے اگر $\lambda = 1$ ، MA افقی اور اتصالی محدود ہوں تو


$$\left[\begin{aligned} \frac{\text{فرلا}}{\text{فرسا}} &= \frac{\text{فرلا}}{\text{فرس}} \times \frac{\text{فرس}}{\text{فرسا}} = \text{جم سا} \times \text{وقط سا} = \text{وقط سا} \\ \frac{\text{فرما}}{\text{فرسا}} &= \frac{\text{فرما}}{\text{فرس}} \times \frac{\text{فرس}}{\text{فرسا}} = \text{جب سا} \times \text{وقط سا} = \text{امس سا قط سا} \end{aligned} \right]$$

(۳)

تکمل کرنے سے (۱) = ولوک مس $\left(\frac{۲}{۳} + \frac{۲}{۳} \right)$ کا = وقط سا (۴)

مستقل حذف کر دینے سے یہ مراد ہے کہ مبدأ کو کسی خاص نقطہ پر لیا گیا ہے جس کا اہمک تعین نہیں کیا گیا تھا۔ چونکہ ضابطہ (۴) سے (۱) = اور (۱) = جبکہ سا =۔ اس لئے ظاہر ہے کہ مبدأ نقطہ (۱) کے انتصا یا نیچے فاصلہ (۱) پر واقع ہے۔ (۴) سے کارٹیزی مساوات باسانی حاصل ہو سکتی ہے۔

۲۹۱



شکل (۶)

$$\frac{لا}{ر} = \text{لوگ مس} \left(\frac{سا}{ر} + \frac{سا}{ر} \right) = \text{لوگ} (\text{قط سا} + \text{مس سا})$$

$$(۵) \dots \dots \dots \left\{ \begin{array}{l} \text{جس سے قط سا} + \text{مس سا} = \text{فو} \frac{لا}{ر} \\ \text{قط سا} - \text{مس سا} = \text{فو} \frac{لا}{ر} \end{array} \right.$$

اس لئے جمع اور تفریق سے


$$(۶) \dots \dots \dots \left\{ \begin{array}{l} \text{ما} = \text{ر قط سا} = \frac{لا}{ر} (\text{فو} \frac{لا}{ر} + \text{فو} \frac{لا}{ر}) = \text{راجمن} \frac{لا}{ر} \\ \text{مس} = \text{ر مس سا} = \frac{لا}{ر} (\text{فو} \frac{لا}{ر} - \text{فو} \frac{لا}{ر}) = \text{راجمن} \frac{لا}{ر} \end{array} \right.$$

بعض اور خاصیتیں شکل سے باسانی حاصل ہوتی ہیں۔ اگر پان میں ہو،

پان کا مس، پان کا غاد اور ن سے پایہ سے ماس پر مبنی تو
ن سے = ماسم سا = ر پان سے = ر مس سا = مس

چونکہ پان سے زنجیر کی قوس کے مساوی ہے، اس لئے یہ ظاہر ہے کہ
ن سے کا اگلا متصل مقام سے ن کے اندر ہے، دوسرے الفاظ میں ن سے
۲۹۲ کے طریق کا ماس ہے۔ اس لئے اس طریق یا نمونی کی خصوصیت یہ ہے کہ

اس کا ماس سے ن مستقل ہوتا ہے۔ اس نمونی کو خط جستی کہتے ہیں۔
اور وہ اس لئے کہ یہ ایک ذریعہ کا لاسہ یا کوس ہے جسکو ری کے ذریعہ ایک کھدور سے
افقی ستوی پر کھینچا جائے جبکہ اسی کا دوسرا سران ایک خط مستقیم (۷۶) مترسم کرے۔



منحنی کے نقطہ Δ پر ایک قرن ہے اور محور Δ اس کا متقارب ہے۔
 اس منحنی کی اور خاصیتیں اس کے حماس کے (طول میں) مستقل ہونے کی
 بنا پر حاصل ہو سکتی ہیں۔ مثلاً چونکہ اس کے دو متصل حماس ایک دوسرے کے ساتھ
 زاویہ صاف مسا بناتے ہیں اس لئے حماس جو رقبہ عبور کرتا ہے وہ اس تکملہ
 $\frac{1}{2} \pi$ و فرسائے حامل ہوتا ہے جبکہ اسے مناسب حدود کے درمیان
 لیا جائے۔ اس طرح منحنی اور متقارب کے درمیان کا کل رقبہ $\frac{1}{2} \pi$ اس کے
 مساوی ہے۔

۱۲۱۔ لیسازو کے منحنی (Lissajous' Curves)۔ یہ منحنی

علم آواز میں خاص اہمیت رکھتے ہیں اور دوسراہ موسیقی حرکتوں کے ترکیب
 دینے سے جو علی القواہم سمتوں میں ہوں یہ منحنی پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں اس طرح
 تعبیر کیا جاسکتا ہے

$\Delta = \text{اجم (ن ت + صہ)}$ ، $\text{ما} = \text{ب جم (ن ت + صہ)}$ ۔ (۱)
 نیز یہ ظاہر ہے کہ مقداروں صہ، صہ میں سے ایک کو کوئی مناسب
 قیمت دیدی جاسکتی ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وقت کے بعد ا کا خاص انتخاب
 کیا گیا ہے۔

جس صورت میں دور $\frac{\pi_2}{\pi}$ ، $\frac{\pi_2}{\pi}$ متوافق ہوں تو ت کے انقطاع سے
 Δ ، ما میں جبریہ ربط مل سکتا ہے۔

مثال ۱۔ جس صورت میں $\pi = \pi$ تو ہم لکھ سکتے ہیں

$\Delta = \text{اجم (ن ت + صہ)}$ ، $\text{ما} = \text{ب جم ن ت}$ ۔ (۲)

جس سے $\frac{\Delta}{\pi} = \frac{\text{ما}}{\pi} = \text{جم صہ} = \text{ب ج ن ت جب صہ}$ ،
 $\frac{\Delta}{\pi} = \text{ب ج صہ} = \text{جم ن ت جب صہ}$

مربع اٹھانے اور جمع کرنے سے ملتا ہے


$$\frac{a^2}{a^2} - \frac{2ab}{ab} + \frac{b^2}{b^2} = \text{جب } ص = \frac{a^2}{b^2} \dots (۳)$$

یہ قطع ناقص ہے۔ خاص صورت میں جبکہ $ص = ۰$ یا $ص = ۱$ قطع ناقص بگڑ کر ایک خط مستقیم

$$\frac{a}{b} \pm \frac{b}{a} = ۰ \dots (۴)$$

بن جاتا ہے۔

اگر ورٹیکل طر پر مساوی نہ ہوں تو شکل مرتسمہ کو قطع ناقص خیال کیا جاسکتا ہے جو دو ترکیبی مرکزوں کی اضافی اریٹ۔ صعدہ کے مسلسل بدلنے سے بتدریج اپنی شکل بدلتا ہے۔



شکل (۷۸)

جب قطع ناقص (۲) کو اسکے صعدی محوروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو متحرک نقطہ کے محدود شکل اختیار کرتے ہیں

لا = (بجم) (ن ت + صہ) ، ما = ب جب (ن ت + صہ) ... (۵)
 ن ت + صہ کی تطبیق ہم خروج المکرز زاویہ کے ساتھ کرتے ہیں اور چونکہ ن ت + صہ
 وقت کے ساتھ یکساں طور پر بڑھتا ہے یہ ظاہر ہے کہ نقطہ (لا) ایک ایسے نقطہ کے
 قائم ظل کی طرح حرکت کرتا ہے جو ہم قطر کا دائرہ مستقل زقارن لار کے ساتھ مترم
 کرے۔ چونکہ دائرہ سے ناقص میں بدلنے کے لئے کوئی لامتناہی چھوٹا و تراشی نسبت سے
 ہوتا ہے جس نسبت سے کہ متوازی نیم قطر اسطے معلوم ہوتا ہے کہ ناقصی حرکت میں کسی
 نقطہ پر یہی زقارن $\times$ ج ک ہوگی جہاں ج د ج جپ کا مزدون نیم
 قطر ہے اور ج مرکز ہے۔

اسس کو "ناقصی موسیقی" کہتے ہیں۔

مثال ۲۔ اگر $n = 2$ تو لکھو

(لا = (بجم) (ن ت + صہ) ، ما = ب جم (۲ ن ت + صہ) (۶)
 اس صورت میں ما اپنے دور میں سے دگنی تیز زقار سے گزرتا ہے اور نقطہ
 (۱۔ بجم صہ) دوم تب عبور ہوتا ہے جیسے ن ت بقدر ۲۲ کے بڑھتا ہے۔
 اسطے نامنہنی بالعموم دو علقوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

جبکہ صہ $= \pm \frac{n}{2}$ تو نامنہنی دونوں محوروں کے لحاظ سے متشاکل ہوتا ہے (دیر جبرئ
 مساوات یہ ہوتی ہے

$$\frac{ما}{ب} = \frac{لا}{ب} (1 - \frac{لا}{ب}) \dots \dots \dots (۷)$$

جب صہ ۰ یا π تو نامنہنی بکر کر مکافی کی ایک توس بن جاتا ہے


$$\frac{ما}{ب} = \pm (2 - \frac{لا}{ب}) (1 - \frac{لا}{ب}) \dots \dots \dots (۸)$$

جب دوروں کا باہمی رابطہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا تو نامنہنی ان دو مکافی توسوں کے
 درمیان بطور انتہائی شکلوں کے امتزاج کرتا ہے۔

* شکل ۸ میں لیسازوس کے جسمی بنانے کے طریقہ کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اس میں استعاباتی اور جسمی خطوط
 ہیں جو مختلف مساوی دائروں کے مساوی افضل نقطوں میں سے کیچنے کے ہیں اور ان سے وقت کے
 مساوی وقفے تعمیر ہوتے ہیں۔

ان نتیجہات کو کھینچنے کی کئی مناظری ادیتیں ترکیبیں ہیں ان کے بیان اور دیگر مختلف نمونوں کے
 متعلق تجربی علم و ادراک کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۲۲۔ خط تدویر۔ خط تدویر وہ منحنی ہے جو ایک دائرہ کے محیط پر کا کوئی نقطہ مرتسم کرتا ہے جبکہ دائرہ ایک ثابت خط مستقیم پر لڑکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ منحنی بیشمار حصوں پر مشتمل ہو گا جو ایک دوسرے کے بالکل متماثل ہونگے اور جن میں سے ہر ایک حصہ دائرہ کے ایک پورے دور کو تعبیر کریگا۔ شکل ذیل میں ۱ جیسے نقطے جہاں منحنی ثابت خط مستقیم یا قاعدہ ب د سے دور سے دور ہے راس کہلاتے ہیں، متواتر راسوں کے درمیان کے نقاط جیسے د جہاں منحنی قاعدہ سے ملتا ہے ”قرن“ (Cusp) کہلاتے ہیں، خط ۱ ب کو جو ایک راس میں سے گذرتا ہے اور قاعدہ پر عمود وار ہے منحنی کا محور کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خط اشکال کا محور ہے۔



شکل (۹۹)

محور ۱ ب کو قطر مان کر جو دائرہ بنایا جائے اسکو حوالہ کا دائرہ ماننا مناسب ہوگا۔ ۲۹۵ فرض کرو کہ لڑکنے والے دائرہ کا کوئی اور مقام سے پ ت ہے قاعدہ کے ساتھ نقطہ تماس ہے، مرکز ج ہے، میں سے گذرنیوالے

قطر کا مقابل کا سرایت ہے اور مرسم نقطہ کا مقام پ ہے۔ پ مرمن کو قاعدہ کے متوازی کھینچو کہ یہ ت سے سے مر پ، ا ب سے ن پر اور حوالہ کے دائرہ سے ق پر ملے۔ اگر ا ب اور ا ب کو بالترتیب لا اور ما کے محور مانا جائے تو پ کے محدد ہونگے

لا = ن پ = پ بے + مر پ، ما = لن = ج ت - ج مر
فرض کرو کہ لڑکنے والے دائرہ کا نیم قطر ا ہے اور طہ وہ زاویہ (پ ج ت) ہے جس میں سے یہ دائرہ گھومتا ہے جیسے مرسم نقطہ (سے پ تک سفر کرتا ہے۔ اس طرح ب بے = ا طہ، پ بے = ا ج ب طہ = ا ج ب طہ، ج مر = ا ج ب طہ اس لئے

لا = ا (طہ + ج ب طہ) ما = ا (ا - ج ب طہ) (۱)
ان مساواتوں سے نمونی کے تمام خواص حاصل ہوتے ہیں۔

اگر ماس کا میلان ا ب کے ساتھ یا عماد کا ب ا کے ساتھ مساوی

$$\text{تو مس مسا} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{ج ب طہ}}{\text{ا ج ب طہ}} = \text{مس} \frac{\text{طہ}}{۲}$$

جس سے مسا = $\frac{\text{طہ}}{۲}$ (۲)

چونکہ زاویہ ت بے پ نصف ہے زاویہ ج ت ج پ کا اسلئے
بے پ نمونی کے نقطہ پ پر عماد ہے اور پ ت ماس - مقابلہ کرو
دفعہ ۶۴ کے ساتھ بھیجے۔

نمونی کی قوس (س) معلوم کرنے کے لئے

$$\left(\frac{\text{فرلا}}{\text{فرطہ}} \right) + \left(\frac{\text{فرما}}{\text{فرطہ}} \right) = \text{ا} [\text{ا ج ب طہ} + \text{ج ب طہ}] = \text{ا ج ب طہ} \frac{۲}{۲}$$

اس لئے دفعہ ۱۱ کی مدد سے مس = ا ج ب طہ $\frac{۲}{۲}$ فرطہ = ا ج ب طہ $\frac{۲}{۲}$

یا سا کی رقوم میں $س = ۴$ جب سا (۳)
کوئی مستقل جمع کرنے کی ضرورت نہیں اگر س کا مبدأ ۱ پر لیا جائے۔
علم حرکت میں یہ رشتہ ضروری ہے۔

چونکہ $ت پ = ت$ جب سا اس لئے

نوس $ا پ = ۲$ $ت پ = ۲$ و $ا ق$ (۴)
بالخصوص ایک قرن سے دوسرے قرن تک قوس کا طول ۱۸ ہے۔

اگر رکھا جائے $ما = ۷$ $م = ۱$ $(۱ + جم ط)$ (۵)
تہ منحنی اور فائدہ کے درمیان رقبہ


$$= \int_0^1 (1 + جم ط) دز ط = ۴ \int_0^1 جم ط دز ط$$

$$= ۱۸ \int_0^1 جم ط دز سا$$

۲۹۶ اس تکملہ کو عدد $\frac{\pi}{4}$ کے درمیان لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رقبہ
جو فائدہ اور منحنی کے ایک محراب کے درمیان گھرا ہوا ہے وہ کون دائرہ
کے رقبہ کا تین گنا ہے۔

اگر ایک دائرہ ایک خط مستقیم پر لڑ کے تو کوئی نقطہ جو بلحاظ دائرہ
کے ثابت ہو اثناء حرکت میں ایک منحنی طے کرے گا جسے ہم استدار

خط یا منحنی استداری (Trochoid) کہیں گے۔



شکل (۸۰)


شکل ۹ میں اگر ہم نقطہ ج پ کے اندر مرکز سے فاصلہ گ پر ہو تو اس کے محدود ہونے

(۶) $\Delta = \Delta ط + \Delta گ$ جب $\Delta ط = \Delta گ$ کی جم ط (۶).....

جب $\Delta گ < \Delta ط$ تو حلقے پیدا ہوتے ہیں جو (۶) کی خاص صورت میں بگڑ کر قرن ہو جاتے ہیں۔ جب $\Delta گ > \Delta ط$ تو منحنی قاعدہ سے نہیں ملتا۔

شکل ۸۰ میں صورتیں گ = $\frac{1}{2}$ اگ = $\frac{1}{3}$ اگ = $\frac{1}{4}$ دکھائی گئی ہیں۔
 (۶) سے یہ آسانی ثابت ہوتا ہے کہ استدار کے کسی نقطہ پر کاغذ لڑکے
 والے دائرہ کے نقطہ تماس کے متناظر محل میں سے گزرتا ہے مثلاً اگر وہ $\frac{1}{4}$ کے سا۔
 ۱۲۳۔ برتدویر اور درتدویر۔ ایک ثابت دائرہ پر ایک دائرہ لڑکے
 سو خزانہ کر کے محیط پر کا کوئی نقطہ آتا ہے حرکت میں جو طوق فرسٹ کرتا ہے اسے ہم
 برتدویر (Epicycloid) کہتے ہیں اگر حرکت دائرہ ثابت دائرہ کے باہر واقع ہو اور
 درتدویر (Hypocycloid) کہتے ہیں اگر یہ اندر واقع ہو۔ جن برتدویروں میں
 لڑکے والا دائرہ ثابت دائرہ کے پورا گرد آجاتا ہے انہیں استیاری خطا طر گریو
 تدویر (Pericycloid) کہا جاسکتا ہے۔

فرض کرو کہ ثابت دائرہ کا مرکز O ہے اور لڑکے والے دائرہ کا مرکز کسی مقام میں
 ج ہے نقطہ تماس P ہے اور مرکز نقطہ C ہے۔ نیز فرض کرو کہ قطرب CP
 کا دوسرا سر اپ ابتدائیں نقطہ A پر تھا۔ ہم عیاری صورت وہ لیتے جس میں لڑکے
 والا دائرہ ثابت دائرہ کے باہر ہے۔ فرض کرو کہ
 $OA = \frac{1}{2} CP = \frac{1}{3} CP = \frac{1}{4} CP$



شکل (۸۱)

ج ب کا میلان و ا کے ساتھ طہ + فہا ہے اگر د کو محور دں کا مبدأ اور و ا کو محور لا مانا جائے تو قائم ظل سے ج ب کے محدود حاصل ہوتے ہیں

$$\left\{ \begin{array}{l} لا = (ا + ب) جم طہ + ب جم (طہ + فہا) \\ ما = (ا + ب) جب طہ + ب جب (طہ + فہا) \end{array} \right. \dots (۱)$$

یا چونکہ ا طہ = قوس (ا سے = قوس ج ب سے = ب ذہا (۲)

$$\left\{ \begin{array}{l} لا = (ا + ب) جم طہ + ب جم \frac{ا + ب}{ب} طہ \\ ما = (ا + ب) جب طہ + ب جب \frac{ا + ب}{ب} طہ \end{array} \right. \dots (۳)$$

نقطہ ج ب جس بر تدویر کو قسم قسم کرتا ہے وہ (دوسری رقموں کے مساوی و ن میں ج ب کی علامت بدلنے سے مائل ہوتا ہے یعنی

$$\left\{ \begin{array}{l} لا = (ا + ب) جم طہ - ب جم \frac{ا + ب}{ب} طہ \\ ما = (ا + ب) جب طہ - ب جب \frac{ا + ب}{ب} طہ \end{array} \right. \dots (۴)$$


نقطہ ا پر اس کا ایک قرین ہے۔

اور یہی مستند صورتیں دائرہ اے پر کے تماس کے مقابل جانبوں میں واقع ہوتی ہیں۔ اگر یہ ایک ہی طرف واقع ہوں جیسا کہ گرد تدویر اور در تدویر کی صورت میں تو فقط ج ب کی علامت کو تمام ضابطہ میں بدل دینا چاہئے۔ اس طرح (۳) کے مائل ضابطہ ملتا ہے

$$\left\{ \begin{array}{l} لا = (ا - ب) جم طہ - ب جم \frac{ا - ب}{ب} طہ \\ ما = (ا - ب) جب طہ + ب جب \frac{ا - ب}{ب} طہ \end{array} \right. \dots (۵)$$

اسکی تصدیق طالب علم خود کرے۔ دیکھو شکل ۸۲۔ در تدویر میں

ا < ب اور گرد تدویریں ا > ب



شکل (۸۲)

۲۹۹

اسی طرح پ کے طریق کے لئے حاصل ہوتا ہے

$$(۶) \dots \dots \dots \left\{ \begin{array}{l} (۱) = (ب - ا) \cdot \text{جم ط} + ب \cdot \text{جم } \frac{ا - ب}{ب} \cdot \text{ط} \\ (۲) = (ب - ا) \cdot \text{جب ط} - ب \cdot \text{جب } \frac{ا - ب}{ب} \cdot \text{ط} \end{array} \right.$$

بر تدویر کے کسی نقطہ پر ماس معلوم کر نیکی کے لئے (۱) سے حاصل ہوتا ہے چونکہ $\frac{ف}{ب} = \frac{ا}{ب}$

$$\frac{\text{فر} = \frac{\text{جم ط} + \text{جم} (ط + ف)}{\text{جب ط} + \text{جب} (ط + ف)} = \frac{\text{جم} (ط + ف)}{\text{جب ط} + \text{جب} (ط + ف)} \dots (۷)$$

شکل ۸۲ کے حوالہ سے معلوم ہو گا کہ ط + ف سے پ کا میلان ہے


و ا کے ساتھ۔ اس لئے سے پ بر تدویر کا پ پر عا د ہے۔ اسی طرح کا نتیجہ گرد تدویر اور در تدویر کے لئے مساواتوں (۵) سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مقابلہ کرد دفعہ ۴۶ کے ساتھ۔

خط کہا جائیگا بموجب اسکے کہ نقطہ باہر ہو یا اندر۔ اگر مرتسم نقطہ کا فاصلہ لڑکنے والے دائرہ کے مرکز سے کم ہو تو مختلف صورتوں میں محدود یا لا، ما کے لئے چلے دوسری رقوم کے (صرف) سروں میں ب کی بجائے گ لکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۴۔ خاص صورتیں۔ (۱) اگر ثابت دائرہ کا نیم قطر لا انتہا بڑا ہو تو

واپس تدویر کی صورت پر ہم آجاتے ہیں۔ دفعہ ۱۲۳ (۱) سے متناظر مساواتیں باسانی حاصل ہوتی ہیں اگر لا کی بجائے لا + ر اور ر طہ = ب فہ اور (آخر الامر) طہ = لکھا جائے۔

(۲) اس کے بعد لڑکنے والے دائرہ کے نیم قطر کو لا انتہا بڑا بنانے سے ایک ایسے خط مستقیم کے کسی نقطہ کا طریق ملتا ہے جو ایک ثابت دائرہ پر لڑکتا ہے اس تعریف کے مطابق جو منحنی ملتا ہے اسے ہم دائرہ کا درجیدہ (Involute) کہیں گے۔ دیکھو دفعہ ۱۲۴۔ اسکی مساواتیں دفعہ ۱۲۳ (۴) کی انتہائی صورت کے طور پر معلوم ہو سکتی ہیں یا بلا واسطہ شکل سے فوراً لکھی جاسکتی ہیں۔



شکل (۸۳)

ہمیں شکل سے یہ حاصل ہوتا ہے

$$\left\{ \begin{array}{l} لا = رجم طہ + ر طہ جب طہ \\ ما = رجم طہ - ر طہ جب طہ \end{array} \right. \dots \dots \dots (۱)$$


اس کے متناظر استدارنی مخنی ہے

$$\begin{aligned} \text{لا} &= (۱+۵) \text{ جم طہ} + (۱ \text{ طہ جب طہ}) \\ \text{نا} &= (۱+۵) \text{ جب طہ} + (۱ \text{ طہ جم طہ}) \end{aligned} \quad \dots (۲)$$


جہاں شکل میں ۵ = پ ق اور ق مرسم نقطہ ہے۔ خاص صورت ۵ = ۱۔
سے اڑ شمیدیں کا لولب حاصل ہوتا ہے دیکھو دفعہ ۱۲۶۔

(۳) اگر نیم قطر ۱ ب متوافق ہوں تو گردشوں کی کسی پورچی۔ خداو کے بعد
مرسم نقطہ اپنے ابتدائی مقام پر واپس آئے گا اور اس کے بعد اس کا راستہ اس کے
پرانے طریق پر منطبق ہوگا۔ ایسی صورت میں مخنی جبریہ ہوتا ہے کیونکہ لا، ما کے
لئے جو حلقے حاصل ہوتے ہیں ان سے مثلثی تفاعل ساقط ہو سکتے ہیں۔ بعض
صورتوں میں مساوات کی قطبی شکل زیادہ سہولت بخش ہوتی ہے۔


۳۰۱



شکل (۱۵)



شکل (۱۶)



شکل (۱۷)


اشکال ۸۴، ۸۵، ۸۶ میں "بر" اور "مرد" تدویریں دکھائی گئی ہیں جن میں لکے گئے

دائرہ کا نیم قطر ثابت دائرہ کے نیم قطر کے ساتھ بالترتیب نسبت $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ رکھتا ہے۔
ایک دو صورتیں خاص طور پر مشہور خاصیتیں رکھتی ہیں، ان کا ہم تفصیلی
معائنہ کرتے ہیں۔

مثال ۱۔ خط صوبری (Cardioid)۔

اگر دفعہ ۱۲۳ (۳) میں $ب = ا$ رکھا جائے تو حاصل ہوتا ہے
 $لا = ۲$ رجم طما + رجم ۲ طما، ما = ۲ رجب طما + رجب ۲ طما
جس سے $لا + ا = ۲$ ر (ا + رجم طما) رجم طما، ما = ۲ ر (ا + رجم طما) رجم طما... (۳)
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ (۱، ۰) کو قطب مان کر جو سمتی نیم قطر کھینچا جائے وہ اس
مساوات سے حاصل ہوتا ہے

۲ = ر (ا + رجم طما) (۴)
یہ اور طرح سے بھی شکل ۸۷ سے ظاہر ہے جہاں
(آپ) ۲ = ر (ا + رجم طما) (وے + آما)



شکل (۸۷)

متناظر استدار خط این مساواتوں سے حاصل ہوتے ہیں
 $لا = ۲$ رجم طما + رجم ۲ طما، ما = ۲ رجب طما + رجب ۲ طما

۳۲

نقطہ (گ۔) کو قطب ماننے سے یہ ضابطے اس مساوات کے معادل ہیں

$$r = (1 + k \text{ جم طما}) \dots \dots \dots (5)$$

 جو گہونگا منجی (Limapon) کی قطبی مساوات ہے (دفعہ ۱۲)۔ یہ مساوات بھی
 باسانی ہندسی طریق پر حاصل ہو سکتی ہے۔
 مثال ۲۔ ایک دائرہ اپنے سے دگنے نصف قطر والے دائرہ کے اندر لٹکتا ہے۔
 ۱۲۳ (۶) میں رکھو۔ جب $\frac{1}{4}$ ا تو حاصل ہوگا

لا = رجم طما ' ما = ... (۶)
 یعنی لڑکنے والے دائرہ کے محیط پر کا مرسم نقطہ ثابت دائرہ کا ایک قطر مرسم کرتا ہے۔
 نیز متناظر استدارائی نمبر ان مساواتوں سے حاصل ہوتا ہے

لا = (ب + گ) رجم طما ' ما = (ب - گ) جب طما (۷)
 اور یہ قطع ناقص ہے جس کے نیم محور ب + گ ہیں۔ نیز اگر لڑکنے والے دائرہ
 کی زاویہ رفتار مستقل ہو تو مرسم نقطہ کی حرکت ناقصی موسیقی ہوگی۔

ہندسی تجلیات کی بنا پر بھی یہ نتائج باسانی حاصل ہوتے ہیں۔ لڑکنے والا دائرہ
 ہمیشہ ثابت دائرہ کے مرکز و میں سے گزرتا ہے اور اگر لڑکنے والے دائرہ کا نقطہ
 جب ابتدا میں نقطہ ا پر منطبق ہو تو قوس سے پ = قوس سے ا۔ اب چونکہ نصف

قطروں کی باہمی نسبت ۱:۲ ہے اس لئے قوس سے پ کے سامنے اس کے
 محیط پر جو زاویہ بنتا ہے وہ اس زاویہ کے مساوی ہونا چاہئے جو قوس سے ا کے سامنے
 اس کے اپنے دائرہ کے مرکز پر بنتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ و پ اور و ا سمت میں

منطبق ہوتے ہیں اور پ ثابت قطر و ا کو مرسم کرتا ہے۔ نیز چونکہ زاویہ پ و پ
 زاویہ قائمہ ہے اس لئے لڑکنے والے دائرہ کے قطر پ پ کا دوسرا سر ثابت
 دائرہ کا وہ قطر مرسم کرتا ہے جو و ا پر علی القوائم ہے۔ اس لئے پ پ مستقل

طول کا ایک خط مستقیم ہے جس کے سرے دو علی القوائم خطوط مستقیم پر واقع ہوتے
 ہیں جو باہم علی القوائم ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ان حالات کے ماتحت پ پ پر کا
 کوئی اور نقطہ قطع ناقص مرسم کرتا ہے۔ مقابلہ کرو دفعہ ۵۴ مثال اس کے ساتھ۔


۳۳

$$(۱۰) \dots \dots \dots \begin{cases} ۱۰ = \frac{۳}{۴} \text{ رجب طہ} + \frac{۱}{۴} \text{ جم ۳ طہ} = \text{رجم طہ} \\ ۱۰ = \frac{۳}{۴} \text{ رجب طہ} - \frac{۱}{۴} \text{ جب ۲ طہ} = \text{رجب طہ} \end{cases}$$

جس سے نغنی یا آسانی تر سمجھ سکتا ہے اسکی کارٹیری صورت یہ ہے

$$(۱۱) \dots \dots \dots ۱۰ = \frac{۳}{۴} + \frac{۱}{۴}$$

بعض اوقات اس نغنی کو ”ستارہ نما“ کہا جاتا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایسے
ماس کا طول جو محدودوں کے محوروں کے درمیان کٹتا ہے مستقل ہوتا ہے۔ اگر شکل ۸۹
میں مرسم نقطہ پ ہو اور ت پ ماس ہو تو یہ آسانی سے دیکھا جائیگا کہ زاویہ
ج ت پ زاویہ ا و ج کا دو چند ہے اس لئے ج ک = ۱ و ت = ۱
نیز دیکھو شکل ۱۲۵ دفعہ ۱۴۵۔



شکل (۸۹)

۱۲۵۔ دائری حرکتوں کا ایک دوسرے پر انطباق۔ بر دور

تدویری اور استدارائی نغنی جنکا ذکر دفعات ۱۲۲ تا ۱۲۴
میں کیا گیا ہے ایک اور طرح سے بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ایسے نقطوں کے طریق
میں مبنی حرکت دو کیساں دائری حرکتوں سے مرکب ہو۔

ایک بازو وق ایک ثابت نقطہ کے گرد مستقل زاوی رفتار
ن کے ساتھ حرکت کرتا ہے، مبداء میں سے گزرنیوالے قائم محدود پر
اس کے ظل ہونگے

لا = ج جمن ت 'ما = ج جبن ت (۱)
جہاں ج = وق بشرطیکہ ت کے مبداء کا مناسب طور پر انتخاب کیا جائے
اگر ایک اور بازو وق نقطہ کے گرد مستقل زاوی رفتار ن کے ساتھ
گردش کرے اور ایک ہی وقت میں وق کے ساتھ ابتدا محور لا سے
گھومنا شروع کرے تو محوروں پر وق کے ظل ہونگے


لا = ج جمن ت 'ما = ج جبن ت (۲)
جہاں وق = ج - اگر متوازی الاضلاع وق پ ق کی تکمیل کی جائے
تو وب سے وق اور وق کا ہندسی مجموعہ تعمیر ہوگا اور پ کے محدود
ہونگے

لا = ج جمن ت + ج جمن ت 'ما = ج جبن ت + ج جبن ت
(۳)


چونکہ ق پ ہمیشہ وق کے مساوی اور متوازی رہتا ہے اس لئے
پ کا راستہ ایک ایسے نقطہ کا طریق ہے جو بیجا با ایک نقطہ ق کے دائری
مدار میں تقسیم کرتا ہے جبکہ ق خود نقطہ کے گرد بیجاں طور پر دائرے میں
حرکت کرتا ہے۔

ۛ اگر متوازی الاضلاع وق پ ق چار ڈنڈوں کو چولوں کے ذریعہ وصل کرنے سے
بنایا گیا ہو اور اگر وق 'وق کو کے گرد مناسب شجی نے گھمایا جائے تو
و میں سے گزرنے والے کسی ثابت خط سے پ کا فاصلہ دو سادہ موسیقی حرکتوں کو
تعمیر کرے گا جنکے دور $\frac{2\pi}{N}$ ہونگے۔ لارڈ کیلون کی موج گھڑی (Tidal clock) کا یہی اصول
ہے اسکی مدد سے میلی طور پر ہمیشی اور قمری جوا بجا کا انطباق ایک دوسرے پر عمل میں آتا ہے۔


اس طور پر جو نمونی مترسم کئے جاتے ہیں، انہیں بر دورے (Epicycles) کہتے ہیں۔ اگر زاویہ رقعہ داروں 'ن' کی ایک ہی علامت ہو تو یہ بر دورے "راست" کہلاتے ہیں اور اگر علامتیں مختلف ہوں تو "الٹے" یا "رجعی"۔ ۳۰۵




شکل (۹۰)




شکل (۹۱)



شکل (۹۲)



شکل (۹۳)



شکل (۹۴)

اشکال ۹۴۸ میں سید ہے اور اٹھ بردویریں کے چند نمونے دکھائے گئے ہیں* بالکل اسی طرح سے پ کے راستہ کی یہ تعریف ہو سکتی ہے یہ ایک نقطہ کا طریق ہے جو نقطہ ق کے لحاظ سے دائری مدار میں حرکت کرتا ہے جبکہ خود نقطہ ق کے گرد یکساں دائری حرکت رکھتا ہے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہر بردویر کی دو جدا گانہ طریقوں سے نکوین ہو سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر بردویر (زیادہ عام طور پر) ہر براور در استدار سب کے سب بردویر ہیں کیونکہ اگر لڑکنے والے دائرہ کی زاوی رقتاریکساں ہو تو اس کا مرکز ج ثابت دائرہ کے مرکز و کے گرد یکساں طور پر ایک دائرہ مہرم کرتا ہے جبکہ نیم قطر ج پ جس کے اندر مہرم نقطہ پ واقع ہے ج کے گرد یکساں گھاؤں رکھتا ہے۔ دیکھو اشکال ۸۱۸۲۔

بخلاف اس کے ہر ایک بردویر یا براستدار یہ ہے یا در استدار یہ اور بالخصوص ہر ایک سیدھا بردویر یا براستدار یہ ہے اور ہر اٹھ بردویر در استدار یہ ہے۔ اس امر کو ہم اوپر کی مساوات (۳) کا دفعہ ۱۲۳ کے نتائج کے ساتھ مقابلہ کرنے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے (دفعہ ۱۵۰) میں "فوری مرکز" کے نظریہ کی ضمن میں اس امر کا ایک سادہ ہندسی ثبوت دیا جائیگا۔

اشکال ۹۴۹ میں سید ہے اور اٹھ بردویریوں کا تعلق چار قروں والی براور درتدویریوں کے ساتھ واضح ہو گا۔

قدیم ہیئت میں بردویر کے کثرت سے استعمال ہوئے۔ اگر سیاروں کے مداروں کے خروج المرکز اور میلان نظر انداز کر دئے جائیں تو سوچ زمین کے گرد ایک دائرہ مہرم کرنا خیال کیا جاسکتا ہے اور کوئی اور سیارہ اسی مستوی سطح میں

* ایسی مختلف شکلیں بے شمار ہو سکتی ہیں بردویر کے جلی طور پر ایک لاٹھی کے ذریعہ آسانی سے مہرم ہو سکتے ہیں کئی دیکھ سکتیں جو اس طور پر حاصل کی گئی ہیں پبلکٹر کے رسالہ میں جس کا قبل حوالہ دیا گیا ہے دکھائی گئی ہیں رسالہ کا صفحہ ۲۹ دیکھو۔

سورج کے گرد ایک دائرہ مشتم کرتا ہے، اس لئے بلحاظ زمین کے سیارہ کا مدار ایک بر دور یہ ہے۔ بطلیوس کے وقت سے سو لھویں صدی عیسوی تک اس امر کے متعلق یہی نظریہ قابل قبول رہا، اس کے بعد اس منظر کے متعلق کاپرنیکی کی سادہ تشریح اور توجید تدریج غالب آئی گئی۔

ستاروں کے اضافی مداروں میں حلقے ہیں (شکل ۹۱) جو ساکن یا چل نقاط اور "جمع حرکتوں" کا باعث ہوئے ہیں۔ دراصل یہی نقاط اور انہی حرکتیں بطلیوس کے ہاتھوں بر دوریوں کی ایجاد کا باعث ہوئیں۔ برعکس اس کے بلحاظ سورج کے جو چاند کا مدار ہے اس میں حلقے نہیں ہیں اگرچہ یہ بر دور یہ ہے، علاوہ اس کے ہر مقام پر چاند کا مدار اندر کی طرف مقعور ہے۔

مثال ۱۔ اگر ترکیبی دائری حرکتوں کی زاوی رفتاریں سادی اور مختلف الحلات (ن = ن) ہوں تو لا = (ج + ج) جم ن ت کا = (ج - ج) جب ن ت

یعنی محصلہ حرکت ناقصی موسیقی ہے۔ خاص صورت میں جبکہ ج = ج، ناقص لگژر خط مستقیم رہ جاتا ہے۔
یہ مثال طبیعی علم مناظر میں اہمیت رکھتی ہے۔
مثال ۲۔ بر دور یہ جو خاص صورت اختیار کرتا ہے جبکہ ج = ج قابل توجہ ہے۔
ساواتیں (۳) ہو جاتی ہیں

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{لا} = ۲ ج \text{ جم } \left(\frac{ن + ن}{۲} \right) \text{ ت جم } \left(\frac{ن - ن}{۲} \right) \text{ ت} \\ \text{ما} = ۲ ج \text{ جب } \left(\frac{ن + ن}{۲} \right) \text{ ت جم } \left(\frac{ن - ن}{۲} \right) \text{ ت} \end{array} \right. \quad (۵)$$

یا لا = (جم طما) ما = (جب طما) (۶)

جہاں طما = $\frac{ن + ن}{۲}$ ت، ر = $۲ ج \text{ جم } \frac{ن - ن}{ن + ن}$ (۷)

اس لئے منحنی کی قطبی مساوات اس شکل کی ہے


ر = راجم م طما (۸)
جس میں اگر $m > 1$ تو بر دوریہ راست ہے اور اگر $m < 1$ تو یہ الٹا یا جہی ہے
دفعہ ۲۵ کی شکلوں ۹۲، ۹۴ میں بالترتیب $m = \frac{1}{2}$ ، $m = 2$

۱۲۶۔ قطبی محدودوں کے لحاظ سے منحنی۔ لولبی خطوط۔

کئی دلچسپ منحنی ہیں جنکی مساواتیں قطبی محدودوں میں زیادہ موزوں طور پر بیان ہو سکتی
ہیں، پہلے ہم ”لولبوں“ (Spirals) کو لیتے۔
(آ) ”مساوی الزاویہ لولبی“ یہ خاصیت رکھتا ہے کہ منحنی ہر نقطہ پر سمتی
نیچ قطر کے ساتھ مستقل زاویہ بناتا ہے۔ اگر اس زاویہ کو α سے تعبیر کیا
جائے تو دفعہ ۶۳ کی رود سے

$$\frac{r}{r_0} = e^{m\alpha} \quad (۱)$$

اس کا حل ہے (دفعہ ۳۸)
 $r = r_0 e^{m\alpha} \quad (۲)$



شکل (۹۵)


جیسے طہ۔ ∞ سے ∞ تک بدلتا ہے 'ر' صفر سے ∞ تک بدلتا ہے
 شکل ۹۵ چونکہ دفعہ ۱۱۲ کی رو سے $\frac{فر}{فرس} = \text{جم}$ عہا اس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ منحنی کا طول نیم قطروں 'ر' کے درمیان ہے

۳۰۸

فرس فر = (ر - ر) (ر - ر) (۳)

(۲) "اڑمیدس کالولب" ایک ایسے نقطہ کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے
 جو ایک خط مستقیم پر مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے جبکہ یہ خط مستقیم خود اپنے
 ایک ثابت نقطہ کے گرد یکساں زاویہ رفتار سے گھومتا ہے۔

علامات میں ر = عت، طہ = ن ت جس سے
 ر = طہ (۴) اگر $\frac{ر}{ع} = ۱$ ۔



شکل (۹۶)

شکل ۹۶ میں منحنی دکھایا گیا ہے، نقطہ دار شاخ طہ کی منحنی قیمتوں کے جواب
 میں ہے۔ اس منحنی کی تکوین کا ایک اور طریقہ دفعہ ۲۴ میں بیان کیا گیا ہے۔

(۳) مستطانی لولب کی تعین اس مساوات سے ہوتی ہے


$$r = \frac{1}{\cos \theta} \dots (5)$$

اگر مامعین ہو جو ابتدائی خط پر کھینچا گیا ہے تو

$$ma = r \cos \theta = \frac{r}{\cos \theta}$$

جیسے θ صفر کے قریب پہنچا ہے ر لا متناہی ہو جاتا ہے مگر ma محدود
انتہا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسلئے خط $ma = r$ متقارب ہے۔
شکل ۹۰ میں نقطہ دار نغنی θ کی منفی قیمتوں سے متعلق ہے۔

۳۰۹




شکل (۹۰)

۱۲۷- گہونگا نغنی (Limaçon) اور خط صنوبری-

قطر a پر ایک ثابت دائرہ بنایا گیا ہے جس کے محیط پر ایک

نقطہ ولایا گیا ہے، اگر وہیں سے گزرنے والے قطر کو ابتدائی خط
لیا جائے تو محیط پر کے کسی نقطہ Q کا سمتی نیم قطر ہے

$$r = \text{اجم } \theta \dots (1)$$



شکل (۴۸)

اگر اس نیم قطر پر پ سے مساوی مستقل فاصلوں ج پر دو نقاط
پ، پ لے جائیں تو ان نقطوں کا طریق کہوں گا نمونی کیلایا گیا۔ اس کی مساوات
ہوگی

۳۱۰

ر = اجم طما + ج (۲)
اس میں ہر دو نقاط پ اور پ کے راستے شامل ہیں جبکہ طما صفر سے
۲۲ تک بدلتا ہے۔ اگر ج > و تو نمونی و میں سے گزرتا ہے جبکہ
طما = ج - (ج/ر) اور اس صورت میں حلقہ پیدا ہوتا ہے۔ شکل ۹۸
میں پ اور پ سے جو نمونی مرتب ہوتا ہے وہ دیکھو۔ اگر ج < و تو ر
صفر نہیں ہو سکتا، پ، پ کا مرکز نمونی شکل میں دیکھو۔
اس خاص صورت میں جبکہ ج = و حلقہ بزرگ کر قرن بن جانا ہے، اس صورت میں طریق

”قلب کی شکل کا“ یا منوبری شکل کا منحنی بن جاتا ہے، اس کی مساوات ہے
 $r = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)$ (۳)
 شکل میں پ، پ سے ترسم شدہ منحنی دیکھو۔ نیز دیکھو شکل ۸۴ دفعہ ۱۲۴۔
 ۱۲۸۔ منحنی $r = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)$ - کئی مشہور منحنی اس نمونہ کے

اندر شامل ہوتے ہیں

$r = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)$ (۱)
 ن کی مساوی مگر مختلف علامت قیمتوں کے لئے جو منحنی پیدا ہوتے ہیں وہ
 ایک دوسرے کے منقلب ہیں۔ دیکھو دفعہ ۱۳۰۔
 مثلاً اگر $n = \pm 1$ تو دائرہ $r = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)$ (۲)
 اور خط مستقیم $r = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta)$ (۳)
 حاصل ہوتے ہیں۔

اگر $n = \pm 2$ تو بیرونی کا چشمہ منحنی $r = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$ (۴)
 اور قائم زائد $r = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$ (۵)
 حاصل ہوتے ہیں۔

مساوات (۴) سے ر کی حقیقی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں طہ کی ان قیمتوں
 کے لئے جو $\pm \frac{\pi}{2}$ کے درمیان ہیں اور خیالی قیمتیں ملتی ہیں ان قیمتوں کے

جو $\frac{\pi}{2}$ اور $\frac{3\pi}{2}$ کے درمیان ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نیز $\frac{\pi}{2}$ غلط ہے۔

طہ = ۰ اور طہ = π کے لئے وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چشمہ منحنی
 دو منقطعوں پر مشتمل ہے اور مبدأ پر اس کا ایک عقدہ ہے۔

اگر $n = \pm \frac{1}{2}$ تو خط منوبری $r = \frac{1}{2}(1 + \cos \frac{\theta}{2})$ یا $r = \frac{1}{2}(1 + \cos \frac{\theta}{2})$ (۶)

اور مکافی $r = \frac{1}{2}(1 - \cos \frac{\theta}{2})$ یا $r = \frac{1}{2}(1 - \cos \frac{\theta}{2})$ (۷)

بالترتیب حاصل ہوتے ہیں۔
اگر (۱) کالو کا رتی تفرق لیا جائے اور ماس اور سستی نیم قطر کے درمیان زاوۃ
فہا ہو تو

$$\text{مہم فہا} = \frac{1}{r} \frac{فر}{فرطہ} = \text{سس ن طہا} \dots\dots (۸)$$

$$\text{یا فہا} = \frac{۱۲}{۲} + \text{ن طہا} \dots\dots (۹)$$

طالب علم اوپر کی مختلف صورتوں میں اس نتیجہ کے مفہوم کا معائنہ کرے۔

۱۲۹۔ ماسی قطبی مساوات۔ اگر کسی نمونی کے کسی ماس پر

عمود ع کھینچا جائے اور نقطہ ماس کا سستی نیم قطر ہو تو بالعموم ع، ر کا تقابل
ہوگا۔ جو مساوات اس تعلق کو بیان کرتی ہے اسے ہم نمونی کی ”ماسی قطبی“
مساوات کہیں گے۔

اگر معمولی قطبی مساوات معلوم ہو تو ماسی قطبی مساوات ان ضابطوں

$$\text{ع} = \text{رجب فہا}، \frac{1}{r} \frac{فر}{فرطہ} = \text{مہم فہا} \dots\dots (۱)$$

اور نمونی کی دی ہوئی مساوات سے طہا، فہا کو ساقط کرنے سے حاصل
ہوگی (ضابطوں (۱) کے متعلق دیکھو دفعہ ۶۳)۔

(۱) سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r} (۱ + \text{مہم فہا}) = \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \left(\frac{فر}{فرطہ} \right) \dots\dots (۲)$$

بعض اوقات سستی نیم قطر کی بجائے اس کے شکافی یا الٹ کو استعمال کرنا
زیادہ سہولت بخش ہوتا ہے۔ اگر لکھا جائے

$$\text{ع} = \frac{1}{r} \text{ تو } \frac{فر}{فرطہ} = - \frac{1}{r} \frac{فر}{فرطہ} \dots\dots (۳)$$

اور ضابطہ (۲) ہو جاتا ہے

$$(۴) \dots\dots\dots \frac{1}{\text{ع}} = \text{ع} + \left(\frac{\text{ع}}{\text{قط}} \right)^2$$

حرکات میں استعمال کرنے کے نقطہ نظر سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر منحنی کی ماسی قطبی مساوات دی گئی ہو مثلاً

$$(۵) \dots\dots\dots \text{ع} = \text{ف} (ر) \dots\dots\dots$$

تو منحنی قابل تعیین ہے سو اب لمحاظ تشریق کے کیونکہ

$$(۶) \dots\dots\dots \frac{ر}{\text{فر}} = \text{مس ف} = \frac{\text{ع}}{\text{ر} \frac{\text{ر}}{\text{ع}}}$$

$$(۷) \dots\dots\dots \text{جس سے } \text{ط} - \text{ع} = \int \frac{\text{ع فر}}{\text{ر} \frac{\text{ر}}{\text{ع}}}$$

اضافہ شدہ مستقل ع کے تغیر کا اثر صرف اتنا ہے کہ یہ منحنی کو با تمام و کے گرد ایک زاویہ میں سے گما دیتا ہے۔

مثال ۱ - مساوی الزاویہ لولبی میں

$$(۸) \dots\dots\dots \text{ع} = \text{رجب ع}$$

مثال ۲ - دائرہ میں $\text{ر} = ۲$ رجب ط (دفعہ ۶۳) اور $\text{ف} = \text{ط}$

$$(۱۰) \dots\dots\dots \frac{\text{ع}}{\text{ر}} = \frac{\text{ر}}{\text{ر}} \text{ یعنی } \text{ع} = \frac{\text{ر}}{\text{ر}}$$

$$(۱۱) \dots\dots\dots \text{ر} = \text{قط}^2 \text{ ط}$$

جہاں ماسکہ قطب ہے، اس میں مال ہوگا $\text{ف} = \frac{\pi}{۲} - \frac{\pi}{۲} = \text{ع}$ ، رجب ط، جس سے

$$(۱۲) \dots\dots\dots \text{ع} = \text{ر}$$

اس نمونی کی پیشہور خاصیت ہے۔

یہ مثال اور اوپر کی مثال دونوں ایک عام نتیجہ کے اندر شامل ہیں اور یہ نتیجہ اس نمونہ
(۱۳) $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ رجم ن طما}$ کے تمام تخمینات کے متعلق صادق آتا ہے۔

دفعہ ۱۲۸ (۹) کی رو سے $\text{ع} = \text{رجب فہ} = \text{رجم ن طما}$ (۱۴)

اور طما سا نظ کرنے سے $\text{ع} = \frac{1+2}{2}$ (۱۵)

مثلاً صوبری (ن = $\frac{1}{4}$) کی صورت میں $\text{ع} = \frac{2}{4}$ (۱۶)

مثال ۴ - مرکز دار مخروطوں کی محاسسی قطبی مساوات یہاں دی جاتی ہے کیونکہ بعض اوقات حرکیات میں یہ استعمال ہوتے ہیں اگرچہ ثبوت میں احصا کے استعمال کی ضرورت نہیں۔

فرض کرو کہ مبدا مرکز پر ہے۔ مخروطی کی کارٹیزی مساوات یہ ہے

$$(۱۷) \quad \frac{r^2}{a^2} \pm \frac{r^2}{b^2} = 1$$

اگر جہا مزدوج نیم قطر ہو تو مرکز دار مخروطیوں کے معلومہ خواص کی بنا پر

$$(۱۸) \quad \text{ع جہا} = \text{ا ب} \cdot \text{بہا} \pm \text{ر} = \text{ب} \pm \text{ر} \cdot \text{ا}$$

$$(۱۹) \quad \text{اسٹے} \quad \frac{\text{ا ب}^2}{\text{ع}} = \text{ب} \pm \text{ر} \cdot \text{ا} \mp \text{ر} \cdot \text{ا}$$

قائم قطع زائد کی خاص صورت میں $\text{ع} = \text{ر} = \text{ا}$ (۲۰) کیونکہ جہا = ر۔
یہی نتیجہ اوپر (۱۵) میں ن = ۲ کہنے سے حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۵ - اس کے بعد ایک ماسک کو قطب مانکر دوسرے ماسک کے لحاظ سے عمود اور سمتی نیم قطر کو بالترتیب ع اور ر سے تعبیر کر دے۔ چونکہ ماس دو ماسکی نیم قطروں سے مساوی زاویے بنا آتا ہے اسٹے

$$\frac{\text{ع}}{\text{ر}} = \frac{\text{ع}}{\text{ا}} \text{ اور اس لئے } \frac{\text{ع}}{\text{ر}} = \frac{\text{ع}}{\text{ا}}$$

اب $ع = ب$ قطع ناقص میں $ر = ر = ۲$ اس لئے قطع ناقص کے لئے $\frac{ع}{ر} = \frac{ب}{ر} = \frac{۱}{۲}$ یا اگر نیم دایرہ خاص ($\frac{ب}{ر}$) کے طول کو ۱ سے تعبیر کیا جائے تو

$$(۲۱) \dots\dots\dots \frac{۱}{ر} - \frac{۲}{ر} = \frac{۱}{ع}$$

قطع ناقص میں $ع$ حاصل ہوتا ہے $\frac{۱}{ع} = \frac{۲}{ر} + \frac{۱}{ر}$ (۲۲)
اوپر کی علامت اس شاخ سے متعلق ہے جو بدا کے پاس ہے اور نیچے کی دور کی شاخ سے۔

مثال ۶۔ وہ منحنی دریافت کرو جس کے لئے $ع = \frac{۳}{ر}$ (۳)
(۶) میں درج کرنے اور مکمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے


$$ط - ع = ۱ = \int \frac{ر}{ر^2 - ۱} = \frac{۱}{۲} \log \frac{ر-۱}{ر+۱} \text{ جب } \frac{۱}{ر} = \frac{۳}{ر}$$

یا $ر = ۱ = \log (ط - ع)$ (۲۴)
جو چشمہ منحنی ہے۔

۳۰۔ مربوط منحنی۔ تقلیب۔ کئی ہندی نظریہ ہیں جن میں



ایک منحنی ایک اور منحنی کے ساتھ ایک خاص رشتہ کے ذریعہ متعلق ہوتا ہے۔
اسی سادہ مثال تقلیب (Inversion) کی ہے جسے
اگر ایک ثابت بدا سے کسی معلوم منحنی کا مستقیم قطر و پ تعین کیا جائے
اور و پ پر ایک نقطہ پکا ایسا لیا جائے کہ

و پ $\times$ و پ = $م$ (۱)
جہاں $م$ ایک دیا ہوا مستقل ہے تو پ کے طریق کو ہم پ کے طریق کا معکوس
کھینٹے۔ ابتدا کو مرکز کہا جاتا ہے اور $م$ کو تقلیب کا ”مستقل“



وتروں کا نقطہ تقاطع ن ہو تو

وپ $\times$ وق = ون نہ پ ن = و ا نہ اپا = مستقل ... (۱)




ن شکل (۱۰۰) سے کوئی ایک منحنی مرتبہ کرایا جائے تو ق (یا پ) اس لئے اگر پ (یا ق) کے مقلوب منحنی مرتبہ کریگا۔

خاص طور پر اگر پ کو ایک ثابت چول سے کے ساتھ کر دیں گے ذریعہ منسلک کر دیا جائے اور و = س پ تو پ کا طریق نقطہ و میں سے ایک دائرہ ہوگا اور اس لئے ق کا طریق و س پر علی القوا اعم ایک خط مستقیم ہوگا۔

اس سے اس ضروری حیل مسئلہ کا صحیح حل حاصل ہوتا ہے کہ دائری حرکت کو حرکت مستقیم میں رابطہ کاری کے ذریعہ کس طرح تبدیل کیا جائے۔

۲۱۵



ن شکل (۱۰۱)

(۲) ہارٹ (Hart) کا رابطہ۔

اس میں ایک ”جلیبی“ متوازی الاضلاع اب ج د ہوتا ہے جو چار سلاخوں کے سروں کو چوکوں کے ذریعہ جوڑنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے متبادل اضلاع مساوی ہوتے ہیں۔ دیکھو شکل (۱۰) صفحہ ۳۱۳۔

نقطہ و کو ایک ضلع اب میں ایک ثابت چول قرار دیا جاتا ہے اور نقاط پ، ق، بالترتیب اضلاع اد اور ب ج میں نقاط ہیں ایسے کہ اپ: پ د = ج ق: ق ب = او: و ب = م: ن (فرض کرو)۔ صریحاً واپ: ق ایک خط مستقیم پ واقع ہیں جو ا ج اور ب د کے متوازی ہے۔

اگر ا اور ج کے قائم ظل ب د پر ل اور گ ہوں اور ب د کا نقطہ وسطی ہو تو ا ج $\times$ ب د = ن ل $\times$ ب د = دل - ب ل = اد - اب

اب و پ: ب د = او: اب = م: م + ن

وق: ا ج = ب ق: اب = ن: م + ن

اس لئے و پ $\times$ وق = $\frac{ن م}{(م + ن)}$ (اد - اب) = مستقل (۲)

اس لئے ب اور ق بلحاظ و کے مغلوب نمونی ترسم کرتے ہیں۔ پہلے کی طرح اگر پ کو کڑی پ میں کے ذریعہ جو میں و کے مساوی ہے ایک ثابت چول میں کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو دائری حرکت خط مستقیم میں تبدیل ہو سکے گی۔

۱۳۱۔ پائیں نمونی، متکافی قطبی۔ اگر ایک ثابت نقطہ و سے نمونی کے

کسی محاس پر عمود وے کھینچا جائے تو اس عمود کے پایہ وے کے طریق کو بلحاظ مبدأ وے پہلی نمونی کا ”پائیں نمونی“ کہتے ہیں۔

مثلاً مکانی کا پائیں نمونی بلحاظ ماسکہ کے رائس پر کا محاس ہے۔ قطع ناقص

اور ع' غمزد ہووے پائیں کے ماس پر تو بالآخر

$$(۲) \dots\dots\dots \frac{۱۴}{۷} = ۲ \quad \frac{۴}{۷} = \frac{۴}{۷}$$

نیز اگر دے، پے سے ن پرے تو ہم کہہ سکتے

دوسرے اتبہ کی جھولی سفداروں سے قطع نظر کرنے سے

اس کے انتہا لینے سے جبکہ پ ہے پ کے مطابق ہو ہیں مخفی کے
ماس پرستی نیم قطر کے ظل کے لئے یہ جملہ حاصل ہوتا ہے

پاے = $\frac{\text{فرع}}{\text{فرصا}}$ (۳)

اس نتیجہ کی مدد سے مددنی پائیں محنتیوں کا سوال حل ہو جاتا ہے یعنی اسکی مدد سے وہ مددنی مل جاتا ہے جس کا پائیں کوئی دیا ہو مددنی ہو۔ اگر وہ کو مدد اور دس کے ابتدائی خط کو غور کرنا جانا جائے تو نقطہ تماس پ کے مدد ہیں

لا = وے جم سا - ہے پ جب سا
ما = وے جب سا + ہے پ جم سا

$$(۴) \dots \left\{ \begin{array}{l} ۱ = ع. جم سا - فرع فرسا جب سا \\ ۶ = ع جب سا + فرع فرسا جم سا \end{array} \right.$$

مثال ۱۔ اگر مخروطی $\frac{r}{a} = \pm \frac{r_0}{b} = 1 \dots \dots \dots (5)$
 کے مرکز پر مبداء ہو اور لکسا وہ زاویہ جو 'ع' و 'لا' کے ساتھ بناتا ہے تو مخروطی
 تراشوں کی کتابوں میں یہ دکھایا گیا ہے کہ

ع = وجم سا ± ب جب سا (۶)

اس لئے پائیں منحنی کی قطبی مساوات ہے

$$(۷) \quad r = r_0 \cos \theta \pm b \quad \text{جب } \theta = 0 \dots \dots (۷)$$

$$(۸) \quad r = r_0 \sin \theta \pm b \quad \text{قائم زائد} \dots \dots (۸)$$

کی صورت میں پائیں منحنی ہے $r = r_0 \cos \theta \pm b$ مثال ۲۔ نیم قطر r_0 کے دائرے میں جہاں قطب و مرکز ج سے فاصلہ ج پر واقع ہو اگر خط و ج کو مسا کا مبدأ مانا جائے تو شکل سے ظاہر ہے کہ

$$(۹) \quad r = r_0 \cos \theta \pm b \quad \text{اس لئے پائیں منحنی کہوں گا منحنی ہے}$$

$$(۱۰) \quad r = r_0 \sin \theta \pm b \quad \text{اگر و محیط پر ہو جس صورت میں ج = ر تو پائیں منحنی خط صنوبری ہوگا}$$

$$(۱۱) \quad r = r_0 \cos \theta \pm b \quad \text{مثال ۳۔ وہ منحنی دریافت کرو جس کا پائیں صنوبری}$$

$$(۱۲) \quad r = r_0 \sin \theta \pm b \quad \text{ہے۔ اس مساوات کو اس طرح لکھنے سے}$$

$$(۱۳) \quad r = r_0 \cos \theta \pm b \quad \text{ضابطون (۴) سے حاصل ہوتا ہے}$$

$$r = r_0 \cos \theta \pm b \quad \text{جس سے}$$

$$(۱۴) \quad r = r_0 \sin \theta \pm b \quad \text{جو مبدأ میں سے گزرنے والا ایک دائرہ ہے۔}$$

کسی منحنی $r = r_0 \cos \theta \pm b$ کے ماس کے قطب کا طریق بلحاظ ایک ثابت مخروطی کے "شکافی قطبی" کہلاتا ہے "مخروطات کی کتابوں میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اگر r کے ماسوں کے قطبوں کا طریق $r = r_0 \cos \theta \pm b$ ہو تو r کے ماسوں کے قطبوں کا طریق $r = r_0 \sin \theta \pm b$ کے استعمال کی یہی وجہ ہے۔

ہم اس صورت کا یہاں محض سرسری ذکر کر دینگے جبکہ ثابت مخروطی دائرہ ہو۔ اگر اس دائرہ کا مرکز و ہو اور نیم قطر r_0 تو منحنی $r = r_0 \cos \theta \pm b$ کے کسی ماس کا قطب پ

سہا کی بجائے طہ اور ح کے لئے $\frac{۲۴}{۲}$ لکھنے سے ہیں قطبی شکافی کی مساوات
اس شکل میں حاصل ہوتی ہے

$$\frac{۲۴}{۲} = ۱ + ج + جم + طہ \dots \dots \dots (۱۹)$$

جو ایک مخروطی تراش ہے، جس کا ماسکہ بدآپ ہے اور جس کا خروج مرکز $\frac{ج}{۲}$ ہے۔
اس لئے مخروطی قطع ناقص شکافی یا زائد ہے بموجب اس کے کہ مبداء دائرہ کے اندر
اوپر یا باہر ہے۔

$$\text{مثال ۵۔ مخروطی } \frac{لا}{۲} \pm \frac{فا}{ب} = ۱ \dots \dots \dots (۲۰)$$

کاپائیں یعنی الجناظہ بدآ کے یہ ہے
ح = ر + جم + سہا = ب + جب + سہا \dots \dots \dots (۲۱)
اس سے قطبی شکافی ہے

$$\frac{۲۴}{۲} = ر + جم + طہ \pm ب + جب + طہ \dots \dots \dots (۲۲)$$

یا
ر + لا = ب + فا = ۴ \dots \dots \dots (۲۳)
جو ایک ہم مرکز مخروطی تراش ہے۔

۱۳۲۔ دو قطبی محدود۔ اگر کسی نمونی پر کوئی نقطہ پ ہو


اور دو ثابت نقطہ یا ماسکوں میں 'س' سے اس نقطہ کے فاصلے
(ر + ر) ہوں تو ان فاصلوں کے درمیان جو اس نمونی کے لئے رشتہ ہے
اس کے ذریعہ اس نمونی کی تعریف ہو سکتی ہے۔ مثلاً

ف (ر + ر) = ۰ \dots \dots \dots (۱)
اگر زاویوں پ میں سہا، پ میں سہا، پ میں کو بالترتیب طہ، طہ
سے تعبیر کیا جائے اور جو زاویے نیم قطر ر + ر ماس کے ساتھ بنائے ہیں وہ
فہا، فہا ہوں تو دفعہ ۱۱۲ کی مانند

$$(۲) \dots \dots \dots \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{فرس}}{\text{فرس}} = \text{جم فہا} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{فرس}} = \text{جم فہا} \\ \frac{\text{رفطہ}}{\text{فرس}} = \text{جب فہا} \quad \frac{\text{رفطہ}}{\text{فرس}} = \text{جب فہا} \end{array} \right.$$

علاوہ مانکے ذیل کے رشتے ہیں

$$(۳) \dots \dots \dots \text{رجب طہا} = \text{رجب طہا} + \text{رجم طہا} = \text{ج} + \frac{۱}{۲} \text{س س}$$



شکل (۱۰۴)

مثال ۱۔ ناقص میں $ر + ر = ۱۲$ (۴)

$$\text{اس لئے } \frac{\text{فرس}}{\text{فرس}} + \frac{\text{فرس}}{\text{فرس}} = \text{یعنی جم فہا} + \text{جم فہا} = \text{یا فہا} = ۱۱ \dots \dots (۵)$$

اس لئے ماسکی فاصلے نغنی کے ساتھ مکمل زاوے بناتے ہیں۔

اسی طرح سے قطع زائے میں $ر = ۱۲$ (۶)

$$\text{جم فہا} = \text{جم فہا} \dots \dots (۷)$$

یعنی ماسکی فاصلے نغنی کے ساتھ متقابل جانبوں میں مساوی زاوے بناتے ہیں۔

مثال ۲۔ ایک انعکاسی یا انعطانی سطح کی شکل دریافت کرو کہ تمام ایسی شعاعیں جو ایک ثابت نقطہ میں سے گزرتی ہیں اور اس پر گرتی ہیں انعکاس اور انعطا

کے بعد بھی ایک ثابت نقطہ میں سے گزریں۔

۸ انعکاس کی صورت مثال (۱) کا عکس ہوگی سطح ایسی ہونا چاہئے جو ناقص یا زاہد کر، باسکوں (س، س) کے ملانے والے خط کے گرد پھرنے سے حاصل ہو۔
۹ انعطاف کی صورت میں اگر دو واسطوں کے انعطاف نما مہ اور مہا ہوں


تو مہا جب صہر = مہا جب صہر (۸)
جہاں صہر = $\pm (\frac{\pi}{4} - \text{فما})$ ، صہر = $\pm (\frac{\pi}{4} - \text{فما})$ (۹)
اس لئے مہا جم فما $\pm$ مہا جم فما = ... (۱۰)

یا فرس (مہا $\pm$ مہا ر) = ... (۱۱)

تکس سے مہا ر $\pm$ مہا ر = مستقل (۱۲)
ایسے منحنیات جن میں دو نیم قطروں کے معلومہ ضلعوں کا مجموعہ (یا فرق) مستقل ہو
کارٹینیری بیضہ کہلاتے ہیں کیونکہ ای کارٹ نے ہی ابتدا میں علم مناظر کے اس مسئلہ پر بحث کی۔ جب (۱۲) میں قطبی علامت لیا جاتی ہے تو اس قبیل کے اندر دائرہ

$$(۱۳) \quad \frac{\text{مہا}}{\text{مہا}} = \frac{r}{r}$$

شامل ہو جاتا ہے دیکھو شکل ۱۰۵۔



شکل (۱۰۵)

مثال ۳۔ کیسینی (Cassini) کے بیضوی انحنیات کی یہ تقریف ہے۔

جہاں م مستقل ہے چونکہ ایک ایسے نقطہ پ کے لئے جو خط میں کسی نقطہ
 میں کے درمیان واقع ہو ر کی بڑی سے بڑی قیمت ج ہے اس لئے
 معنی دو الگ الگ بیضوں پر مشتمل ہوگا جو بالترتیب میں سے کے گرد بنے ہوں گے
 اگر $m > j$ اور صرف ایک بیضہ پر مشتمل ہوگا جو دونوں نقاط کو گھیرے ہو
 ہوگا جبکہ $m < j$ ۔

ہوگا جبکہ 2π ۔
 اس خاص صورت میں جبکہ $m = j$ ، منحنی کی عینک بیسی شکل ہوگی۔ اسے ہم
 برنولی کا پشتہ منحنی (Lemniscate) کہیں گے۔ یہ منحنی متعدد مسائل ریاضی میں
 آتا ہے۔ اگر اس سے کے وسطی نقطہ کو قطب مانا جائے اور W اس کو ابتدا لے
 خط اور ان کے لحاظ سے محدودوں کا ایک نظام (م، ط) ہو تو

$$r = r_1 + j_1 - j_2 + j_3 = r_1 + j_1 + j_2 + j_3 = r_1 + j_1 + j_2 + j_3$$


اس لئے چشمہ منہی کی مساوات ہے

(ج + ج) - ج = ج

جو تحویل کے بعد ہو جاتی ہے۔

(15) ج ٢ جم ٢ ط ٢

مقابلہ کر دفعہ ۱۲۸ کے ساتھ۔



شکل (۱۰۶)

مثال ۴۔ متناطیسی منحنی۔ اگر $\frac{ص}{ر}$ ایک متناطیسی کے شمالی اور جنوبی قطب ہوں تو کسی نقطہ $\frac{ص}{ر}$ پر تو میں ہوں گی $\frac{ص}{ر}$ سمت میں ہے جو نقطہ نقطہ میں اور $\frac{ص}{ر}$ سمت میں ہے۔ "قوت کا خط" ایسا خط ہے جو نقطہ نقطہ حاصل قوت کی سمت میں کھینچا جائے۔ اس امر کو بیان کرنے سے کہ کل قوت اس خط کی عمود وار سمت میں صفر ہے ہیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{ص}{ر} \text{ جب فاصلہ } + \frac{ص}{ر} \text{ جب فاصلہ } = 0$$

$$\text{یا } \frac{1}{ر} \frac{فصلہ}{فرس} + \frac{1}{ر} \frac{فصلہ}{فرس} = 0 \dots (۱۶)$$

اب چونکہ رجب طہ = رجب طہ اس لئے

$$\text{جب طہ } \frac{فصلہ}{فرس} + \text{جب طہ } \frac{فصلہ}{فرس} = 0$$

یا جم طہ + جم طہ = مستقل (۱۷)

"سادہ قوت کا خط" وہ ہے کہ ایک متناطیسی قطب پر جو اسے مرسم کرے کوئی کام نہ ہو۔ اس امر کو بیان کرنے سے کہ کل قوت اس خط کی سمت میں صفر ہے ہیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{ص}{ر} \text{ جم فاصلہ } - \frac{ص}{ر} \text{ جم فاصلہ } = 0$$

$$\text{یا } \frac{1}{ر} \frac{فر}{فرس} - \frac{1}{ر} \frac{فر}{فرس} = 0 \dots (۱۸)$$

$$\text{جس سے } \frac{1}{ر} - \frac{1}{ر} = \text{مستقل} \dots (۱۹)$$

سادہ قوت کے خط لازماً قوت کے خطوط پر علی التوائم ہوں گے۔

امثلہ ۴۲

جبریمینی

- ۱- ان منحنیات کو مترسم کرو $\text{ما}^2 = \text{لا}^2 (۱-۱) (۱-۱)$ ، $\text{ما}^2 = \text{لا}^2 + \text{لا}^2 + ۱$
 ۲- منحنی $\text{لا}^2 = \text{ما}^2$ (۱-۱) کو مترسم کرو اور ثابت کرو کہ اسکے حلقہ کا رقبہ $\frac{1}{2}$ ہے۔ یہ معلوم کرو کہ قطعہ کا عرض کہاں بڑے سے بڑا ہے۔ $[\text{لا} = \frac{1}{2}]$
 ۳- منحنی $\text{لا}^2 = \text{ما}^2$ (۱-۱) کو مترسم کرو اور ثابت کرو کہ اس کے دو قطعے ہیں اور ہر ایک کا رقبہ $\frac{1}{2}$ ہے۔

- ۴- منحنیات $\text{ما}^2 = \text{لا}^2 (۱-۱)$ ، $\text{ما}^2 = \text{لا}^2 (۱-۱)$ کو مترسم کرو۔
 ۵- منحنی $\text{لا}^2 = \text{ما}^2$ (۱-۱) کو مترسم کرو اور ثابت کرو کہ اس کا رقبہ $\frac{1}{2}$ ہے۔
 ۶- منحنی $\text{لا}^2 = \text{ما}^2$ (۱-۱) کو مترسم کرو اور ثابت کرو کہ اس کا رقبہ $\frac{1}{2}$ ہے۔
 ۷- ثابت کرو کہ منحنی $\text{لا}^2 = \text{ما}^2$ (۱-۱) کی قوس کا طول 'رأس' سے اس

- نقطہ تک جس کا فصلہ لا ہے، ہے $\frac{1}{2} (۱+۱) (۱-۱) - \frac{1}{2}$ ۔
 ۸- منحنی $\text{لا}^2 = \text{ما}^2$ اور خط $\text{لا} = \text{ما}$ کے درمیان جو رقبہ گھرا ہوا ہے اس کا اوسط مرکز $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ہے۔

- ۹- منحنی $\text{لا}^2 = \text{ما}^2$ (۱-۱) محور لا کے گرد گھومتا ہے، ثابت کرو کہ وہ حجم جو سطح مکونہ اور محور پر عمود دار ایک مستوی کے درمیان گھرا ہوا ہے وہ اس مستوی پر اسطوانہ کے حجم کا ایک چوتھائی ہے جس کا طول اور دائری قاعدہ دونوں وہی ہیں جو سطح مقطوعہ کے ہیں۔

- ۱۰- ان منحنیات کو مترسم کرو $\text{ما}^2 = \frac{1}{\text{لا}}$ ، $\text{ما}^2 = \frac{1}{\text{لا} (۱-۱)}$
 ۱۱- رقبہ جو منحنی $\frac{1}{\text{لا}} = \frac{1}{\text{لا} (۱-۱)}$ (شکل ۲) اور اس کے مقابل کے درمیان

گھرا ہوا ہے وہ $\frac{1}{2}$ ہے۔
اگر یہی منحنی اپنے متقارب کے گرد گھومے تو جو مجسم پیدا ہوگا اس کا حجم $\frac{1}{4}\pi^2$ ہوا ہوگا۔

$$12- \text{ان منحنیات کو مرسم کرو} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$13- \text{ان منحنیات کو مرسم کرو} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$14- \text{ان منحنیات کو مرسم کرو} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

اعظم اور اقل معین (اگر کوئی ہوں) اور نقاط العطف دریافت کرو۔

$$15- \text{منحنی} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad (\text{شکل ۷۴}) \text{ اور اس کے متقارب کے} \quad 322$$

درمیان جو رقبہ گھرا ہوا ہے وہ $\frac{1}{4}\pi^2$ ہے۔ اگر یہ منحنی اپنے متقارب کے گرد گھومتے تو جو مجسم پیدا ہوگا اس کا حجم $\frac{1}{4}\pi^2$ ہوا ہوگا۔

$$16- \text{منحنی} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad \text{کو مرسم کرو اور ثابت کرو کہ اس کا رقبہ اسکی دو شاخوں اور کسی ایک متقارب کے درمیان} \quad \frac{1}{2} \text{ ہے۔}$$

$$17- \text{ثابت کرو کہ منحنی} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad (\text{شکل ۷۵}) \text{ اور اس کے متقارب کے درمیان کا رقبہ} \quad \frac{1}{4}(\pi + \pi) \text{ ہے۔}$$

$$18- \text{منحنی} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad \text{کو مرسم کرو اور ثابت کرو کہ منحنی اور کسی ایک متقارب کے درمیان رقبہ} \quad \frac{1}{4}\pi^2 \text{ ہے۔}$$

$$19- \text{منحنی} \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad \text{کو مرسم کرو اور ثابت کرو کہ اس کے قطعہ کا رقبہ} \quad \frac{1}{4}(\pi - \pi) \text{ ہے۔}$$

۲۰۔ منحنی $MA = \frac{2}{3} (لا - لا - لا)$ کو مرسم کرو اور ثابت کرو کہ یہ رقبہ $\frac{3}{2} \pi$ لا گھیرتا ہے۔

۲۱۔ منحنی $MA = \frac{2}{3} (لا - ب) + ج$ کو مرسم کرو۔

۲۲۔ منحنی $لا = ت - ت' = ما = ا - ت$ کو ت کی متقی قیمتوں کے لئے مرسم کرو۔ اور ثابت کرو کہ یہ ایک قطعہ پیدا کرتا ہے جس کا رقبہ $\frac{17}{8} \pi$ ہے۔

امثلہ ۵۳

(زنجیرہ، خط تدویر وغیرہ)

۱۔ ثابت کرو کہ زنجیرہ $MA = ج$ جنم لے میں $س = ما - ج$

۲۔ ثابت کرو کہ زنجیرہ ہی ایک منحنی ہے جس میں سین کے پایہ سے ماس پر عمود مستقل طول کا ہوتا ہے۔

۳۔ ایک ہی اونچائی پر دو معلومہ نقطے ہیں، ثابت کرو کہ ان تمام زنجیرہ خطوط میں سے جو ان نقطوں میں سے گزرتے ہیں اور جن کے محور انتصابی میں ایک زنجیرہ ایسا ہے جس میں ان نقاط کے نیچے مرتب کی گہرائی کم سے کم ہے۔ نیز ثابت کرو کہ اس زنجیرہ میں مذکورہ نقطوں پر کے ماس ایک دوسرے سے مرتب بدلتے ہیں۔

اگر ان نقطوں کے درمیان فاصلہ ۲ ب ہو تو مرتب کی گہرائی ب جبنا ع

ہے انحنی کی قوس $\frac{ب جنم ع}{ع}$ ہے اور دے ہوئے نقاط پر منحنی کا میلان

افق کے ساتھ جسم (قطر ع) ہے جہاں ع مسامات ع منحنی ع = ا کی مثبت اصل ہے۔

۴- خط جبری (Tractrix) کے کسی نقطہ کے محدد ان شکلوں میں بیان ہو سکتے ہیں $\text{لا} = \text{را} - \text{ع}$ (منہ ع)، $\text{ما} = \text{را}$ قطر ع جہاں ع تغیر بتدل (parameter) ہے۔

۵- ثابت کردہ خط جبری میں $\text{ما} = \text{را}$ فوق ہے۔

جہاں قوس میں قرن سے ناپی گئی ہے۔

۶- اس مجسم کا حجم جو خط جبری کو اس کے تقارب کے گرد گھمانے سے پیدا ہو $\frac{2}{3}\pi \text{را}^3$ ہے۔

اسی مجسم کی سطح $\pi \text{را}^2$ ہے۔

۷- اگر ایک متحرک نقطہ کے محدد $\text{لا} = \text{راجہن ن ت}$ ، $\text{ما} = \text{ب جہن ن ت}$ ہوں جہاں ت وقت ہے تو اس کا راستہ قطع زائد ہو گا اور اس کی رفتار مزدوج نیم قطر کے طول کے متناسب ہوگی جو مزدوج زائد کے ساتھ اسکے تقاطع تک ناپا گیا ہے۔ نیز ثابت کردہ سمتی نیم قطر جو رقبہ جو کرتا ہے وہ وقت کے ساتھ یکساں طور پر بڑھتا ہے۔

۸- لیسازو کے منحنی $\text{لا} = \text{راجہن ت}$ (ن ت - صہ) $\text{ما} = \text{ب جہن ت}$ کے کسی حلقہ کا رقبہ $\frac{\pi}{2}$ ب جہن ت ہے۔

۹- ثابت کردہ لیسازو کا منحنی $\text{لا} = \text{ب جہن ت}$ ، $\text{ما} = \text{ب جہن ت}$ $\frac{3}{4}\pi$

منحنی $\frac{\text{ما}}{\text{ب}} = \frac{\text{لا}}{\text{ا}}$ $(\frac{2}{3}\pi - \frac{\text{لا}}{\text{ا}})$ کے کچھ حصہ پر مشتمل ہے۔ اس منحنی کو مرکبہ

۱۰- اگر خط تدویر میں لڑنے والے دائرہ کی زاوی رفتار مستقل ہو تو مرکبہ نقطہ پ کی رفتار عماد ہے پ (مثل ۱) کے متناسب ہوگی۔

۱۱- خط تدویر کو اس کے قاعدہ کے گرد گردش دینے سے جو مجسم پیدا ہوتا ہے اسکا حجم $\frac{5}{2}\pi \text{را}^3$ ہے جہاں کون دائرہ کا نیم قطر را ہے۔

اسی مجسم کی سطح $\frac{6}{3}\pi \text{را}^2$ ہے۔

۱۲- خط تدویر کا وہ حصہ جو دو متوازی قرون کے درمیان ہے اس پر کے ماس کے گرد گھومتا ہے۔ ثابت کردہ سطح گھونکا رقبہ $\frac{3}{4}\pi \text{را}^2$ ہے۔

نیز ثابت کر دے کہ مذکورہ بالا سطح اور اُن دائروں کے مستویوں کے درمیان جنہیں قرن پیدا کرتے ہیں گھرا ہوا حجم $\frac{1}{2}\pi r^2$ ہے۔

۱۳۔ خط تدویر اپنے محور کے گرد گھومنے سے جو حجم پیدا کرتا ہے وہ ہے $\frac{1}{4}\pi(4r^2 - 16r^2)$ ہے۔

۱۴۔ اسی مجسم کی سطح $\frac{1}{2}\pi(4r^2 - 16r^2)$ ہے۔

۱۵۔ ایک قرن سے دوسرے قرن تک خط تدویر کی قوس ہے اس کا اوسط مرکز قاعدہ سے $\frac{5}{12}r$ فاصلہ پر ہے۔

۱۶۔ خط تدویر اور اس کے قاعدہ کے درمیان جو رقبہ ہے اس کا اوسط مرکز قاعدہ سے فاصلہ $\frac{5}{4}r$ ہے۔

۱۷۔ ثابت کر دے کہ منحنی $لا + ما = ر$ میں کسی نقطہ پر کا ماس محدودوں کے

محوروں پر جو مقطوع کا ماس ہے وہ بالترتیب $لا$ اور $ما$ ہیں۔

اس طرح اس کی تصدیق کر دے کہ محوروں کے درمیان ماس کا طول مستقل ہے۔

۱۸۔ مساواتوں $لا = رجم طما$ ، $ما = رجب طما$ سے ثابت کر دے کہ ستارہ نما

(Astroid) میں $فرطما = ۳ رجب طما$ اور اسے منحنی کا کل

طول $۶ر$ ہے۔

۱۹۔ ثابت کر دے کہ ستارہ نما کا کل رقبہ $\frac{3}{8}\pi r^2$ ہے۔

۲۰۔ دو مقابل کے قروں کو طانے والے خط کے گرد ستارہ نما کو گھمانے سے

جو مجسم پیدا ہوتا ہے اس کا حجم $\frac{3}{10}\pi r^2$ ہے۔

۲۱۔ منحنی $لا = رجم طما$ ، $ما = رجب طما$ کے رقبہ کا طول $\frac{لا + ما}{۲}$ ہے۔

اور رقبہ جو منحنی گھیرتا ہے وہ $\frac{3}{8}\pi ر$ ہے۔

۲۲۔ 'ن' قروں والے بریادہ تدویر کا کل محیط $\frac{۸(ن+۱)}{ن}$ ہے جہاں 'ن'

- ثابت دائرہ کا نیم قطر ہے۔
 ۲۳۔ اس شخص کا خاکہ کیچن جو دو یکساں دائری حرکتوں کو ترکیب دینے سے پیدا ہو
 جبکہ دائروں کے نیم قطر مساوی ہوں لیکن دور ذرا مختلف ہوں (۱) جبکہ گھماؤ
 ایک ہی سمت میں ہوں اور (۲) جبکہ گھماؤ متقابل سمتوں میں ہوں۔
 ۲۴۔ ثابت کرو کہ بردوریہ میں ماس مرکز میں سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ

$$N > \frac{J}{J_0} \text{ جہاں دو مقداروں } J \text{ 'ج' میں سے } J_0 \text{ بڑا ہے (صفحہ ۱۱۵)}$$

 ۲۵۔ ثابت کرو کہ استدار $\Delta = \Delta_{\text{طما}} + \Delta_{\text{ک}}$ جب $\Delta_{\text{طما}} = \Delta_{\text{ک}}$ جم طما کی
 پوری سوچ کا طول ایک قطع ناقص کے محیط کے مساوی ہے جس کے نیم محور $\Delta_{\text{ک}}$
 اور $\Delta_{\text{ک}}$ ہیں۔

امثلہ ۴۴

قطبی محدود

- ۱۔ ثابت کرو کہ ایک ہی زاویہ والے تمام مساوی الزاویہ لولبی متماثلًا مساوی
 ہوتے ہیں۔
 ۲۔ زاویہ Δ والے مساوی الزاویہ لولبی میں سمتی نیم قطر (د) جو رقبہ عبور کرتا
 ہے وہ ہے $\frac{1}{4} (\Delta_1 - \Delta_2)$ جس Δ جہاں Δ_1 و Δ_2 اطراف میں رکی
 قیمتیں ہیں۔
 ۳۔ ثابت کرو کہ اٹمیدس کے لولب میں زاویہ (ف) جو ماس اور سمتی نیم قطر کے درمیان
 بنتا ہے وہ اس مساوات سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{جم ف} = \frac{1}{\sqrt{2 + \frac{J}{J_0}}}$$

 ۴۔ ثابت کرو کہ متکافی لولب میں نیم قطر جو رقبہ عبور کرتا ہے اس کا اضافہ نیم قطر کے متناسب ہے۔
 ۵۔ ثابت کرو کہ خط منویری کے قطب میں سے گزرنے والے تمام ذرات ایک ہی طول کے

ہوتے ہیں۔ کیا یہی بات درست ہے کہونگا منحنی کے لئے۔

- ۶۔ خط صنوبری $\text{ر} = ۱ + ۱ \text{ جم طما}$ کا رقبہ $\frac{۳}{۲} \text{ ر}$ ہے۔
 ۷۔ منحنی $\text{ر} = ۱ + ۲ \text{ جم طما}$ کو مرسم کر د اور ثابت کرو کہ اندرونی حلقہ کا رقبہ ۵۴۳۵ ر ہے۔

۸۔ ثابت کرو کہ خط صنوبری میں $\frac{\text{فرس}}{\text{فرطما}} = \frac{۲ \text{ جم طما}}{۲}$ اور اس طرح

دکھاؤ کہ کل محیط ۸ ر ہے۔

- ۹۔ خط صنوبری کو اس کے محور کے گرد گھمانے سے جو حجم پیدا ہوتا ہے وہ $\frac{۳}{۲} \text{ ر}$ ہے۔
 ۱۰۔ خط صنوبری میں ثابت کرو کہ بڑے سے بڑا عرض (محور پر عمود وار) $\frac{۳}{۲} \text{ ر}$ ہے اور دوسرا عماس محور کو قطب سے فاصلہ $\frac{۱}{۲} \text{ ر}$ پر ملتا ہے۔

۱۱۔ کہونگا منحنی $\text{ر} = ۱ \text{ جم طما} + \text{ج}$ میں اعظم معین اور اقل فصلہ معلوم کرو۔
 ۱۲۔ کہونگا منحنی $\text{ر} = ۱ \text{ جم طما} + \text{ج}$ کا رقبہ جبکہ $\text{ج} < ۱$ ہے $\frac{۳}{۲} (\text{ج} + \frac{۱}{۲})$

۱۳۔ ہندی طریق پر ثابت کرو کہ اگر دو خطوط مستقیم دو ثابت دائروں کو مس کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مستقل زاویہ بنائیں تو ان کے تقاطع کا طریق کہو۔ مگا منحنی ہے۔

۱۴۔ کل رقبہ چشمہ منحنی $\text{ر} = ۱ \text{ جم} ۲ \text{ طما}$ کا $\frac{۱}{۲} \text{ ر}$ ہے۔

۱۵۔ نیز اس منحنی کے ہر حلقہ کا محیط ۱۲ ر ہے۔
 کیا $\frac{\text{فرطما}}{\text{فرطما}}$ جب ۲ طما ۔

ثابت کرو کہ ناقصی تکملوں (دفعہ ۱۱۱) کی تزئیم میں یہ مکملہ مساوی ہے

$\frac{۱}{۲} \text{ ر}, \frac{۱}{۲} \text{ ر}, \frac{۱}{۲} \text{ ر}$ کے۔

۱۶۔ چشمہ منحنی کے کسی حلقہ کے رقبہ کا واسطہ مرکز قطب سے فاصلہ

$\frac{۱}{۲} \text{ ر}$ پر ہے۔

۱۷۔ بر دوریہ $\text{ر} = ۱ \text{ جب م طما}$ کے ایک حلقہ کا رقبہ ہے $\frac{۳}{۲} \text{ ر}$ ۔

۱۸۔ منحنی $\text{ر} = ۱ \text{ جم طما}$ کو مرسم کر د۔

۱۹- "زیادہ سے زیادہ تجاذب والے مجسم کے لئے" یعنی اس شکل کے لئے جو منحنی
 $r =$ حجم ρ کو ابتدائی نقطہ کے گرد گھمانے سے پیدا ہوتی ہے ذیل کے خواص ثابت کرو
 (۱) اس کا حجم $\frac{4}{15} \pi r^2$ ہے۔

(۲) زیادہ سے زیادہ عرض $2r$ اور ہے مبداء سے $2r$ اور فاصلہ ہے۔

(۳) حجم کا اوسط مرکز قطب سے $\frac{15}{32} r$ فاصلہ پر ہے۔

۲۰- کسی منحنی کا "قطبی زیر ماس" وہ طول ہے جو قطب میں سے گزرنے والے
 خط پر جو سمتی نیم قطر پر عمود وار ہو، ماس کا ثابہ ثابت کرو کہ اس کا طول $\frac{2}{3} r$ فاصلہ ہے۔
 ثابت کرو کہ شکافی لولب میں قطبی زیر ماس مستقل ہوتا ہے۔

۲۱- نیم قطر r کا دائرہ ہے۔ ثابت کرو کہ اسکے درپچہ کی ماسی قطبی مسادات ہے
 $E = r$ ۔ جہاں مرکز قطب ہے۔

۲۲- ارض میدس کے لولب (شکل ۱۱۱) میں ثابت کرو کہ $E = \frac{r^2}{r_1 + r_2}$

۲۳- شکافی لولب (شکل ۹۴) میں ثابت کرو کہ $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r}$

۲۴- منحنی $r =$ حجم ρ میں ثابت کرو کہ $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r}$

۲۵- ان منحنیات $r =$ حجم ρ میں ثابت کرو کہ $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r}$

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r}$$

۲۶- برتدویر (دفعہ ۱۲۳) میں ثابت کرو کہ $r = \frac{r^2}{r_1 + r_2}$

درتدویر کے لئے متناظر ضابطہ کیا ہے۔

۲۷- کارٹیزی مسادات اس منحنی کی دریافت کرو جس میں $E =$ وجہ سا جہ مسا $[r_1, r_2, r_3]$

- ۲۸۔ اس منحنی کی قطبی مساوات دریافت کرو جس میں $\frac{r^2}{a^2 + b^2} = e$
- ۲۹۔ ایک منحنی کی جاسی قطبی مساوات دی ہوئی ہے، اسکی توس کے لئے ضابطہ

$$r = \frac{r^2}{\frac{r^2}{a^2 + b^2} - e} \text{ ثابت کرو۔}$$

- ۳۰۔ ضابطہ $e = \frac{r^2}{a^2 + b^2}$ ثابت کرو اور اسکی ہندی تعبیر بیان کرو۔
اس لئے ثابت کرو کہ اگر وہ رقبہ جو کسی متحرک نقطہ کا سمتی نیم قطر عبور کرتا ہے وقت کے ساتھ یکجہان طور پر بڑھے تو نقطہ کی رفتار اس عمود کے بالعکس متناسب ہوگی جو مبدأ سے راستہ کے ماس پر کھینچا جائے۔

امثلہ ۴۵

مربوط منحنی۔ دو بی محلو

- ۱۔ مساوی الزاویہ لولب کا مقلوب بلحاظ قطب کے ایک مساوی لولب ہے۔
- ۲۔ قطع زائد کا مقلوب بلحاظ مرکز کے مرکز پر ایک نقطہ رکھا ہے۔
- ۳۔ قائم زاہد کا مقلوب بلحاظ مرکز کے بیرونی کا چشمہ منحنی ہے۔
- ۴۔ قطبی مساواتوں کے ذریعہ ثابت کرو کہ خط مستقیم کا مقلوب ایک دائرہ ہے جو قطب کے قطب میں سے گزرتا ہے اور برعکس اسکے۔
- ۵۔ قطبی مساوات کے مدد سے ثابت کرو کہ دائرہ کا مقلوب دائرہ ہے۔
- ۶۔ قطع مکانی کا مقلوب بلحاظ ماسک کے خط صنوبری ہے۔
- کسی مخروطی کا مقلوب بلحاظ ماسک کے گہونگا منحنی ہے۔

۷۔ ناقص $\frac{r^2}{a^2} + \frac{r^2}{b^2} = 1$ کا مقلوب بلحاظ مرکز کے منحنی

$$(r^2 + a^2) = m^2 \left(\frac{r^2}{a^2} + \frac{r^2}{b^2} \right) \text{ ہے۔}$$

نیز ثابت کرو کہ جہاں منحنی محور کا کوئی نقطہ ہے وہاں پر منحنی مبدأ کی جانب مقعر یا محدب ہو گا جو جب اسکے کہ $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ -

۸ - خط منوبری قطع مکانی کا متغلب ہے بلحاظ ماسک کے۔ اس امر کو استعمال کرنے سے یا کسی اور طرح سے ثابت کرو کہ قرن میں سے گزرنے والے کسی وتر کے سروں پر کے عماد ایک دوسرے سے زاویہ قائمہ بناتے ہیں اور ان کے تقاطع کو قرن کے ساتھ ملائیو لا خط وتر پر عمود وار ہوتا ہے۔

۹ - تغلیب سے یا کسی اور طرح سے ثابت کرو کہ منوبری خطوط $\frac{1}{2} (1 + \text{جم طہ})$ ، $\frac{1}{2} (1 - \text{جم طہ})$ ایک دوسرے کو علی القوام کاٹتے ہیں۔

۱۰ - منحنی اور اسکے متغلب کے متناظر عنصر فرس، فرس ہیں، ثابت کرو کہ فرس، فرس = $\frac{1}{2} \text{م}^2$ ، $\frac{1}{2} \text{م}^2$ جہاں $\frac{1}{2} \text{م}^2$ سستی نیم قطر ہیں۔

۱۱ - قطع مکانی کا پائیں منحنی بلحاظ راس کے بلحاظی خط (Cissoid)

[دفعہ ۱۱۹ (۱۶) ہے۔]

۱۲ - اگر ایک منحنی کے دو تماس ایک دوسرے سے مستقل زاویہ بنائیں تو ان کے نقطہ تقاطع (چ) کا طریق پ اور دو نقاط تماس میں سے گزرنے والے دائرہ کو کس کرتا ہے۔

۱۳ - ثابت کرو کہ پائیں منحنی کا رقبہ اس ضابطہ $\frac{1}{2} \text{ع}^2$ فرس سے حاصل ہوتا ہے

۱۴ - ثابت کرو کہ پائیں کی قوس اس ضابطہ $\frac{1}{2} \text{ع}^2$ فرس سے حاصل ہوتی ہے۔

۱۵ - قطع ناقص کے پائیں منحنی کا رقبہ ہے $\frac{1}{2} \pi (a^2 + b^2)$ جبکہ مرکز قطب ہو اور $\frac{1}{2} \pi b^2$ نیم محور ہوں۔

۱۶ - قطع زائد $\frac{1}{2} \frac{a^2}{b^2} - \frac{1}{2} \frac{b^2}{a^2}$ کا پائیں منحنی بلحاظ مرکز کے دو طوقوں پر

مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک کا رقبہ $\frac{1}{2} \pi b^2 + \frac{1}{2} \pi a^2$ (ب) مس $\frac{1}{2} \pi$ ہے۔

۱۷ - اگر دائرہ $\frac{1}{2} \pi$ محدود کے مبدأ سے اور نقطہ (لام، مام) سے منحنی کے تماس پر عمود ع اور ع کیچے جائیں تو ثابت کرو کہ

ع = ج - لا، جم سا۔ واجب سا

جہاں سا عودوں کا میلان ہے محور کا کے ساتھ۔

۱۸۔ ایک بند بیضوی منحنی کے دو پائیں منحنی بلحاظ مبدأ و اور ایک نقطہ (لا، ما) کے ہیں جبکہ یہ دونوں نقطے منحنی کے اندر واقع ہیں۔ ان پائیں منحنیوں کے رقبے (ب، لا، ما) میں ثابت کر دو

۱۹۔ (ب، لا، ما) جم سا فرسا۔ ما، ج جب سا فرسا، + (لا، ما) جم سا

۱۹۔ ایک نقطہ کو قطب مانکر اگر ایک بند بیضوی منحنی کا پائیں منحنی لیا جائے تو اس کا رقبہ مستقل ہوتا ہے، ثابت کر دو کہ نقطہ مذکورہ کا طریق دائرہ ہے۔ اور مستقل کی مختلف قیمتوں کے جواب میں جو دائرے حاصل ہوتے ہیں وہ ہم مرکز ہیں۔

نیز اگر مشترک مرکز ہو تو بلحاظ کسی اور نقطہ پ کے جو پائیں منحنی حاصل ہوتا ہے اس کا رقبہ اس پائیں منحنی کے رقبہ سے جو بلحاظ و کے لیا جائے بقدر دائرہ (نیم قطر دپ) کے رقبہ کے زیادہ ہوتا ہے۔

۲۰۔ مکمل ما = ۲۰ لا کا منحنی پائیں بلحاظ اس کے منحنی ۲۰ لا ما = (۲۰ - لا) ہے۔

۲۱۔ کس صورت میں ع = لا، جم سا ۹۔

۲۲۔ ثابت کر دو کہ جس منحنی کی صورت میں ع = لا، جم سا وہ متوازن سا

لا + ما = لا ہے۔

۲۳۔ بتاؤ کہ مساوات لا + لا = م (مستقل) کو بلحاظ قوس (س) کے تقاطع کرنے سے کیا خاصیت حاصل ہوتی ہے اور نتیجہ کی ہندی طریق پر تصدیق کرو۔

۲۴۔ گیسینینی کے بیضوی کے کسی نقطہ پ پر عماد کھینچنے کا یہ عمل ثابت کرو۔

پ، س اور پ، س میں بالترتیب نقطے ق اور ق، لوائے کہ پ ق = پ س اور پ ق = پ س۔ جو خط پ کو ق ق کے وسطی نقطہ کے ساتھ ملاتا ہے وہ مطلوبہ عماد ہے۔

۲۵ - متوازی شعاعوں کا ایک نظام اس طور پر منعکس ہونا مطلوب ہے کہ یہ ایک ثابت نقطہ میں سے گزیرے، ثابت کرو کہ انوکھا کسی منحنی قطع مکانی ہے۔


۲۶ - متوازی شعاعوں کا ایک نظام اس طور پر منعطف ہونا مقصود ہے کہ انقطاع کے بعد شعاعیں ایک ثابت نقطہ میں سے گزیریں۔ ثابت کرو کہ انقطاعی منحنی ایک مخروطی تراش ہے اور مخروطی کا مخروط المرکز انقطاع نماؤں کی نسبت کے مساوی ہے۔

۲۷ - ثابت کرو کہ کارٹیزی بیضوی کی مسادات اس شکل کی ہے

$$r^2 - 2r + 1 = 0 \quad (b + 1 + b \text{ جم طہا}) \quad (r + 1 = 0)$$

جہاں کسی ماسکہ کو قطب مانا گیا ہے۔

۲۸ - ثابت کرو کہ کارٹیزی بیضوی لازماً ایک بند منحنی ہوگا اگر اس صورت کو جس میں منحنی قطع زائد کی ایک شاخ ہے مستثنیٰ کر دیا جائے۔



دوان باب

انحنا

۳۳۳

۳۳۱۔ انحنا کا ناپ - مستوی منحنیات کے نظریہ میں احصا کا

جو استعمال ہے اس کے متعلق اب تک ہمیں منحنی کے مختلف نقاط پر ماس کی سمت کے ساتھ ہی سرورکار رہا ہے، ابھی خاص طور پر ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ کس طرح نقطہ بہ نقطہ سمت منحنی پر بدلتی ہے۔

انحنا کا مضمون کسی غیر متعلق پہلوؤں سے بحث میں لایا جاسکتا ہے اور اگرچہ تمام طریقوں سے بالکل وہی ضابطے حاصل ہوتے ہیں تاہم طالب علم کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اساسی طور پر استدلال میں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

پہلے طریقہ میں ہم منحنی کی کسی قوس کے ”پورے“ یا ”مکمل“ انحنا کی تعریف سے ابتدا کرتے ہیں، پورا انحنا وہ زاویہ ممف ہوا ہے جس میں سے ماس گھوم جاتا ہے جبکہ اس کا نقطہ ماس قوس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرتا ہے۔

اور قوس کا ”اوسط انحنا“ اس نسبت سے متعین ہوتا ہے جو پورے انحنا کو قوس کے طول (ممف ہوا) کے ساتھ ہو پس اس تعریف کے مطابق اوسط انحنا $\frac{\text{ممف ہوا}}{\text{ممف ہوا}}$ ہے۔

۳۳۲۔ اور طریقہ دفعات ۱۳۶، ۱۳۷ میں بیان کئے گئے ہیں۔

اور تعریف کے طور پر منحنی کے ”کسی نقطہ پ پر کا انحنا“ اس لا انتہا چھوٹی قوس کا اوسط انحنا خیال کیا جاتا ہے جو اس نقطہ پر منتہی ہوتی ہے۔ پس احصا کی ترقیم کے مطابق کسی نقطہ پر کا انحنا

فرسا
فرس (۱) سے تعبیر ہوگا۔

ایک دائرہ کی جس کا نیم قطر رہو مف مس = رمف سا اور اس لئے $\frac{\text{فرسا}}{\text{فرس}} = \frac{1}{r}$ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دائرہ کا انحنا اس کے نیم قطر کے شکافی سے ناپا جاتا ہے۔ پس اگر ایک دائرہ کا نیم قطر مس ہو جس کا انحنا وہی ہے جو کسی دے ہوئے منحنی کا نقطہ پ پر ہے تو

فرسا
فرس (۲)

۳۲۴ اس نیم قطر (مس) کے دائرہ کو جس کا مماس نقطہ پ پر رہی ہو اور جس کا قطر اسی سمت میں ہو جو مماس منحنی کا ہے ہم ”دائرہ انحنا“ کہیں گے، اس کے نیم قطر کو ”نیم قطر انحنا“ کہا جائیگا اور اس کے مرکز کو ”انحنا کا مرکز“۔ اگر منحنی کے نقطہ پ سے کسی خاص سمت میں ایک خط مستقیم کھینچا جائے تو اس خط پر جو طول دائرہ قطع کرتا ہے اسے اس سمت میں کے ”موترا انحنا“ آتے موسوم کیا جائیگا۔ اگر وتر کی سمت عماد کے ساتھ زاویہ طہ بناے تو وتر کا طول ل اس مساوات سے حاصل ہوگا

ل = ۲ مس جم طہ (۳)

اگر انحنا کے مرکز کے قائم محدد (ضبا) عماد ہوں تو قائم ظل ڈالنے سے ضبا = لا۔ ہر جب سنا، جا، فا + مس جم سا (۴)


بشرطیکہ سنا کا مفر اس مقام سے شرع ہو جہاں مماس لا کے محور کے متوازی ہوتا ہے۔ انحنا کا مرکز منحنی کے دو متصل عمادوں کا نقطہ تقاطع ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ

منحنی کے دو متصل نقاط پر پ ج، پ کے ج دو عماد ہیں اور ان کے درمیان زاویہ
مف سا ہے اور توس پ پ کے مف س ہے تب وتر پ پ
کھینچنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ (شکل ۱۰۷)

$$\frac{\text{ج پ}}{\text{پ پ}} = \frac{\text{جب ج پ پ}}{\text{جب مف سا}}$$

یا ج پ = جب ج پ پ $\times$ $\frac{\text{پ پ}}{\text{مف س}}$ $\times$ $\frac{\text{جب مف سا}}{\text{مف سا}}$ $\times$ مف س
جب پ کو پ کے لانا تھا قریب لیا جائے تو بائیں جانب کے ہر جزو ضربی
کی انتہا ایک ہوتی ہے سوائے $\frac{\text{مف س}}{\text{مف سا}}$ کی انتہا کے۔ پس آخر الامر

$$\text{ج پ} = \frac{\text{فرس}}{\text{فرسا}} = r$$



شکل (۱۰۷)

جدید ہندسہ میں ہم یوں خیال کرتے ہیں کہ منحنی کی تکوین دو طرح سے عمل میں
آتی ہے ایک تو یہ ایک نقطہ کا طرئی ہو سکتا ہے دوسرے یہ ایک خط مستقیم کا
لفاف ہو سکتا ہے (دفعہ ۱۴۱)۔ حرکت کے ان متعلق عنصر اول کے کسی مسلسل

تو اثر پر غور کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خط مستقیم کسی آن میں نقطہ کے گرد حرکت کر رہا ہے اور یہ نقطہ خط مستقیم پر سفر کر رہا ہے اور انحنا $\frac{\text{فرسہ}}{\text{قرسہ}}$ ان دو حرکتوں کے باہمی رشتہ کو بیان کرتا ہے۔

اگر کسی نقطہ پر انحنا صفر ہے تو ماس کا گھاؤ ایک لمحہ کے لئے رک جاتا ہے اور ساکن یا اہل تماس کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اسکی سادہ ترین مثال ”نقطہ اشکاف“ کی ہے (صفحہ ۶۷) جہاں پر ماس کے گھاؤ کی سمت رکنے کے بعد الٹ جاتی ہے۔

اگر کسی نقطہ پر نیم قطر انحنا $\left(\frac{\text{فرسہ}}{\text{فرسہ}}\right)$ صفر ہو جائے تو نقطہ کی حرکت ۳۲۵

خط مستقیم پر ایک لمحہ کے لئے رک جاتی ہے اور ”ساکن یا اہل نقطہ“ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی سادہ مثال ایک ”قرن“ ہے جیسا ہم نے اشکاف ۷۴، ۸۳، ۸۹ وغیرہ میں دیکھا ہے۔ ایسی صورتوں میں نقطہ کی حرکت کی سمت رکنے کے بعد الٹ جاتی ہے۔ دفعہ ۱۱۹ کی مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرن ایک حلقہ کے معدوم ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس امر کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ نصف قطر انحنا کو بیان پر کیوں صفر ہونا چاہئے۔ علم حرکت اور طبیعیات کے مسائل میں انحنا کا تخیل بہت اہمیت رکھتا ہے، مثلاً علم حرکت میں اگر ایک متحرک ذرہ پر عمل کرنے والی قوت کو بالترتیب دو اجزاء میں تحلیل کیا جائے ایک ماس کی سمت میں اور دوسرے عماد کی سمت میں تو پہلا جزو رفتار پر اثر رکھتا ہے اور دوسرا حرکت کی سمت پر۔ اگر ایک ثابت مبدا سے وحن سمتی (Vector) کھینچا جائے جو کسی آن میں ذرہ کی رفتار کو تعبیر کرے تو وحن کے قطبی محدود اور مساے لئے جاسکتے ہیں جہاں $\epsilon = \frac{\text{فرسہ}}{\text{قرسہ}}$ اس طرح وحن کی قطری اور عمودی رفتاریں بالترتیب

ہونگی (صفحہ ۱۱۲ (۶))

$\frac{\text{فرسہ}}{\text{قرسہ}}$ اور $\epsilon \frac{\text{فرسہ}}{\text{قرسہ}}$ (۵)

مثال ۳- برتدور (Epicycloid.) دفعہ ۱۲۳ (۱۱) میں

مس = $\frac{۲(ب+۱)ب}{۱}$ جب $\frac{۱}{ب+۱}$ سا (۷)

اور اس لئے ک = $\frac{۲(ب+۱)ب}{ب+۱}$ جم $\frac{۱}{ب+۱}$ سا

(۸) $\frac{۲(ب+۱)ب}{ب+۱}$ جم $\frac{۱}{۲}$ فسا =

اس لئے شکل ۸۱ (دفعہ ۱۲۳) کے حوالہ سے ظاہر ہے کہ

(۹) $\frac{۲(ب+۱)ب}{ب+۱}$ پ ے =

جہاں پ ے عماد کا طول ہے مرکز نقطہ اور ثابت دائرہ کے درمیان۔

مثال ۴- مکانی م = $\frac{۱}{۲}$ (۱۱) میں م = $\frac{۱}{۲}$ م سا (۱۰)

جس ے جب سا = $\frac{۱۲}{فسا}$ = - جب سا $\frac{۱۲}{فسا}$

یا ک = - $\frac{۱۲}{جب سا}$ (۱۱)

منفی علامت کا یہ مفہوم ہے کہ لسا گھٹتا ہے جیسے م بڑھتا ہے۔

مثال ۵- اگر قطع ناقص (۱۲) = $\frac{۱}{۲}$ جم فسا م = ب جب فسا (۱۲)

کو دائرہ (۱۳) = $\frac{۱}{۲}$ جم فسا م = ب جب فسا (۱۳)

کا قائم ظل تصور کیا جائے تو $\frac{فسا}{فسا} = ب$ (۱۴)

۳۳ جہاں بسا فردیج نیم قطر ہے کیونکہ توس کا عنصر و مف فسا سے بدگر مف م

ہو جاتا ہے اور توازی نیم قطر سے بدگر بسا ہو جاتا ہے۔ نیز چونکہ $\frac{۱}{۲}$ بسا مف سا

اور $\frac{۱}{۲}$ و مف فسا رقبہ کے متناظر عنصر ہیں اس لئے

بسا مف سا = $\frac{ب}{۱}$ و مف فسا

$$(۱۵) \dots\dots\dots \frac{بہا}{اب} = \frac{فرقا}{فرسا} \quad یا$$

$$(۱۶) \dots\dots\dots \frac{بہا}{اب} = \frac{فرسا}{فرقا} \times \frac{فرسا}{فرقا} = \frac{فرسا}{فرقا} = \frac{فرسا}{فرقا}$$

اگر ماسی خط پر مرکز سے عمود ع ہو تو ع بہا = اب اور اوپر کا نتیجہ اس طور پر لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۷) \dots\dots\dots \frac{بہا}{ع} = \frac{بہا}{ع} \quad یا \quad \frac{اب}{ع} = \frac{اب}{ع}$$

چونکہ ع = اجم سا + ب جب سا = ا (۱- ز جب سا)

موزالہ ذکر صورت اس شکل کے معادل ہے (ز خروج مرکز ہے)

$$(۱۸) \dots\dots\dots \frac{ا-ز}{ا-ز جب سا} = \frac{ا-ز}{ا-ز جب سا}$$

اس ضابطہ سے ارضیات (Geodesy) میں ایک مشہور نتیجہ حاصل ہوتا ہے اگر زمین کی شکل کو گردش کا ناقص نا خیال کیا جائے تو ز کو نظر انداز کرنے سے عرض بلد سا کی قوم میں نیم قطر انحناء کے لئے جملہ حاصل ہوتا ہے

$$\frac{فرسا}{فرسا} = \frac{ا-ز}{ا-ز جب سا} = \frac{ا-ز}{ا-ز جب سا} = \frac{ا-ز}{ا-ز جب سا}$$

جہاں صہ = $\frac{ا-ب}{ا} = \frac{ا}{ا} = ۱$ یعنی صہ سے نصف النہار کی ناقصیت

(Ellipticity) تعبیر ہوتی ہے (۱۹) کو تکمیل کرنے سے نصف النہار کی ناقصیت کا طول استواء سے عرض بلد سا تک حاصل ہوتا ہے

$$(۲۰) \dots\dots\dots \frac{ا-ب}{ا-ب جب سا} = \frac{ا-ب}{ا-ب جب سا} = \frac{ا-ب}{ا-ب جب سا}$$

مثال ۶ - مساوی الزاویہ لوبی (دفعہ ۱۲۶) میں

(۲۱) $سا = ط + ع$
 اس سے $\frac{فرسا}{فرس} = \frac{فرط}{فرس} = \frac{جب ع}{ر}$

(۲۲) $\frac{ل}{جب ع} =$ یا (۱)
 پس نیم نظر انحن کے سامنے مبدأ پر زاویہ قائمہ بنتا ہے۔
 ۱۳۵۔ نیم قطر انحن کے لئے ضابطے۔ انحن کا ضابطہ $\frac{فرسا}{فرس}$
 آسانی سے کئی اور صورتوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔
 (۱) قائم کارٹیزی محدود میں

(۱) $س سا = \frac{فرما}{فرلا}$

۳۳۸ اس کے قطر سا $\frac{فرسا}{فرس} = \frac{فر (فرما)}{فرس (فرلا)} = \frac{فرما}{فرلا} = \frac{جم سا}{فرلا}$

(۲) $\frac{\frac{فرما}{فرلا}}{\left\{ 1 + \left(\frac{فرما}{فرلا} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{س}$ جس سے

اس شکل سے پھر ظاہر ہے کہ نقطہ العطف پر، جہاں $\frac{فرما}{فرلا} =$ (دفعہ ۶) انحن صفر ہوتا ہے۔


جب، $\frac{فرما}{فرلا}$ ایک چھوٹی مقدار ہو تو ضابطہ (۴) سے حاصل ہوتا ہے تقریباً

(۳) $\frac{فرما}{فرلا} = \frac{1}{س}$

اور تناسبی خطا ہمیں دوسرے رتبہ کی ہوگی۔ سر کیا یہ ضابطہ $\frac{\text{فرسا}}{\text{فرس}}$ کی نقل ہے کیونکہ جب 'سا' چھوٹا ہو تو 'سا' کی بجائے $\frac{\text{فرسا}}{\text{فرلا}}$ (مس سا) لکھا جاسکتا ہے اور $\frac{\text{فرس}}{\text{فرس}}$ کی بجائے $\frac{\text{فرس}}{\text{فرلا}}$ ۔ سلاخوں کی غمیدگی کے نظریہ میں اس ضابطہ کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے۔
(۲) دفعہ ۱۳۱ میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ نیم قطر کا ظل (ص) ماس پر حاصل ہوتا ہے

$$\text{ص} = \frac{\text{فرع}}{\text{فرسا}} \dots \dots \dots (۳)$$

اگر مبداء سے دو متصل عمادوں پ ج پ ج پر عمود و ع و ع ہوں اور اگر و ع پ ج سے ن پر ملے تو بالآخر
و ع - و ع = ع ن = ج ن م ف سا یا م ف ص = ج ن م ف سا



شکل (۱۰۸)

۳۳۹ اس لئے ج ع یا ج ن کی انتہائی قیمت $\frac{\text{فرص}}{\text{فرسا}}$ ہے جس سے

$$\frac{ؤب}{ع} = ب' ± ل' = ر' \dots\dots\dots (۱۲)$$


$$\frac{ؤب}{ع} = ص' ± \dots\dots\dots (۱۳)$$

مقابلہ کرد دفعہ ۱۳۴ مثال ۵۔

۱۳۶۔ نیوٹن کا طریقہ۔ انحنایہ بحث کرنے کا ایک اور طریقہ

ہے جسے نیوٹن نے استعمال کیا۔ اس میں ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے جو
معنی کو پ پر کزتا ہے اور ایک پاس کے نقطہ ق میں سے گذرتا
ہے۔ اس کے بعد اس دائرہ کے نیم قطری انتہائی قیمت معلوم کی جاتی ہے
جبکہ ق پ کے لا انتہا قریب آجائے۔

یہ آسانی ثابت ہو سکتا ہے کہ انتہائیں یہ دائرہ بالکل وہی ہے جو پ پر کا
انحنایہ کا دائرہ ہے اور جس کی تعریف دفعہ ۱۳۳ میں کی گئی ہے۔



نخل (۱۰۹)

کیونکہ اگر ج مرکز ہو تو ج پ = ج ق اور اس لئے پ اور ق کے

درمیان کوئی نقطہ پ ایسا ضرور ہوگا کہ اس کا فاصلہ ج سے اعظم یا اقل ہو اور اسلئے ایسا کہ ج پ مغنی کا عماد ہو۔ اتہا میں پ پ کے آلتہا قریب آجاتا ہے اور ج متصل عمادوں کا نقطہ تقاطع "مرکز انحناء" پر منطبق ہوتا ہے نیوٹن کے طریقہ سے نیم قطر انحناء کے لئے ایک نہایت سادہ ضابطہ حاصل ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ پ پر کے ماس پر ق ق م ایک عمود کھینچا گیا ہے جو دائرہ سے پھر ق پر اور ماس سے م پر ملتا ہے۔ چونکہ

$$م پ' = م ق \times م ق' \text{ اس لئے}$$

$$۷۲ = ۷۵ م ق' = ۷۵ \frac{م پ'}{م ق} \dots (۱)$$

اگر ق ق م کو اس طور پر کھینچا جائے کہ یہ پ پر کے عماد کے متوازی ہونے کی بجائے اس عماد کے ساتھ ایک معلومہ میلان رکھے تو کسر (۱) کی انتہائی قیمت سے مماثل سمت میں وتر انحناء حاصل ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص سمت میں وتر انحناء خاص بہولت کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے اس کے بعد نیم قطر انحناء ضابطہ (۲) دفعہ ۱۳۳ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

مثلاً کارٹیزری محدودوں میں نیم قطر انحناء کے لئے ضابطہ مستطیل ہو سکتا ہے بحوالہ شکل ۴۲ صفحہ (۲۱۲) محور ماس کے متوازی وتر انحناء کو ق سے تعبیر کرو

$$تو \frac{۱}{ق} = ۷۵ \frac{ق}{پ} = ۷۵ \frac{ق}{ج} \text{ جم' سا}$$

$$= \frac{۱}{۴} \text{ فٹا (۱) جم' سا} \dots (۲)$$


جہاں سا پ پر کے ماس کا میلان محور کا کے ساتھ ہے۔
چونکہ ق = ۷۵ جم' سا ماس سا = فٹا (۱)
اس لئے حاصل ہوتا ہے کہ

$$\frac{1}{r} = \text{فم} (1) \text{ جم}^2 \text{ سا} = \frac{\text{فم} (1)}{\frac{1}{r} [2 \{ \text{فم} (1) \} + 1]} \dots (3)$$

اور یہ ضابطہ (۲) دفعہ ۱۲۵ کے بالکل مطابق ہے، صرف ترتیم کا فرق ہے۔

مثال ۱۔ قطع ناقص میں فرض کر دو کہ وتر ق ط، پ پر کے ماس کے متوازی ہے اور پ میں سے گزرنے والے قطر سے ص پر ملتا ہے (شکل ۱۱۰)۔ نیچے کے ہندسکی رو سے

$$\text{ق ص} = \text{م س پ} \times \text{پ ص}$$



شکل (۱۱۰)

جہاں م س ماسکہ ہے۔ اس لئے محور کے متوازی وتر انحنایق کے لئے

$$\text{ق} = \text{نسا} = \frac{\text{ق ص}}{\text{پ ص}} = \text{م س پ} \dots (4)$$

اگر پ پر کا ماد محور کے ساتھ زاویہ طہا بنائے تو جم طہا = $\frac{\text{م س}}{\text{پ ص}}$ جہاں م س ماسکہ ہے پ پر کے ماس پر محور ہے اسلئے

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\text{ق ق طہا}} = \frac{\text{م س پ}}{\text{م س}} = \frac{\text{م س پ}}{\frac{1}{r} [2 \{ \text{م س پ} \} + 1]} \dots (5)$$

باتتے ہیں کہ $\text{جم طہ} = \frac{\text{ج}^2}{\text{ج}}$ جہاں Δ محور اعظم کا سر ہے۔ اس لئے کسی ایک اسکر میں سے گزرنے والا ذرا انخا (ق) حاصل ہوتا ہے

$$\text{ق} = ۲ \text{ جم طہ} = ۲ \frac{\text{ج}^2}{\text{ج}} \dots \dots \dots (۸)$$

مثال ۳۔ خط تدویر لا = Δ (طہ + جب طہ) ما = Δ (۱ + جم طہ) (۹) کے راس پر نیم قطر انخا (س) دریافت کرو۔

$$\frac{\Delta}{\text{ما}} = \Delta (طہ + جب طہ) \div ۲ جب طہ = \frac{\Delta}{۲} (۱ + جب طہ) \div \left(\frac{جب طہ}{۲} \right)$$

$$\text{اس سے مباح} = طہ = \frac{\Delta}{۲} = ۲ \dots \dots \dots (۱۰)$$


۱۳۷۔ لشمی دائرہ (Osculating circle)۔

انخا پر بحث کرنے کا ذرا مختلف طریقہ ”لشمی دائرہ“ کے تحصیل پر مبنی ہے۔ اگر منحنی پ کے ق کے قریب دو نقطے ق اور ط ہوں جہاں ایک نقطہ پ کے ایک طرف واقع ہے اور دوسرا دوسری طرف تو دائرہ پ ق ط کے نیم قطری انتہائی قیمت پر ہم غور کرتے ہیں جبکہ ق اور ط دونوں پ کے لا انتہا قریب آ جاتے ہیں۔

اگر منحنی زیر بحث کا انخا پ پر مناسل ہو تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دائرہ انتہا میں ”دائرہ انخا“ پر منطبق ہونا ہے کیونکہ اگر دائرہ پ ق ط کا مرکز ج ہو تو پ اور ق کے درمیان ایسا نقطہ پ ضرور ہوگا کہ ج پ معلومہ منحنی پر عماد ہو اور اسی طرح ایک نقطہ پ قاط پ اور ط کے درمیان ایسا ہوگا کہ ج پ منحنی پر عماد ہو۔ فرض کرو کہ پ ج اور پ ج


یہ شرط ضروری نہیں لیکن اس ثبوت میں سہولت پیدا ہوتی ہے اور حلہ عمومی فرمیں اس سے بڑی ہوتی ہیں۔

نقطہ پ کے عماد سے بالترتیب ج اور ج پر ملتے ہیں۔ شرط مذکورہ بالا کی رو سے



استعمال ہو سکتا ہے۔
۱۳۸۔ لفاف۔ فرض کرو کہ منحنیات کا ایک واحد لاتناہی نظام یا قبیل ہے اور اس قبیل کے الگ الگ منحنی ایک مستقل کو جو قبیل کی تخصیص کرتا ہے مختلف قیمتیں دینے سے حاصل ہوتے ہیں۔

نظام کے کوئی دو منحنی بالعموم ایک دوسرے کو قطع کرینگے لیکن یہاں ہم بالخصوص نقاط تقاطع کے انتہائی مقامات پر بحث کرینگے جبکہ مستقل (یا جسے نظام کا متبدل (parameter) بھی کہتے ہیں) میں تبدیلی لا انتہا کم ہو جب ہم ایک منحنی سے دوسرے منحنی تک جائیں۔ اس طرح عام طور پر ایک یا زیادہ انتہائی نقاط تقاطع ہر ایک منحنی پر ہونگے جہاں پر یہ ساتھ ساتھ منحنی کو کاٹتا ہے۔ ان انتہائی نقاط تقاطع کا طریق نظام کا "لفاف" کہلاتا ہے۔ مثال ۱۔ معلوم نصف قطر کے دائروں کا ایک نظام ہے، ان کے مرکز ایک دے ہوئے خط مستقیم پر واقع ہیں۔ اس جگہ متبدل مرکز کا محدود ہے۔




شکل (۱۱۳)

اگر نظام کے دو دائروں کے مرکز ج، ج' ہوں تو ان کے نقاط تقاطع کو ملانے والا خط ج ج' علی القواہم تصنیف کرتا ہے۔ اس لئے کسی دائرہ کے انتہائی نقاط تقاطع ساتھ کے دائرہ کے ساتھ اس قطر کے سرے ہیں جو مرکزوں کے ملانے والے خط پر علی القواہم ہے۔ اس لئے لفاف دو خطوط مستقیم پر مشتمل ہے جو مرکزوں کے ملانے والے خط کے متوازی ہیں اور اس سے معلوم نہیم قطر کے فاصلہ پر واقع ہیں۔

۲۴۳

مثال ۲۔ ایک خط مستقیم ہے جو محور کے ساتھ ملے مستقل رقبہ (م) کا مثلث بناتا ہے۔ خط کے دو محل ا، ب، ا' ب' ہوں جو ب پر قطع کرتے ہیں۔

ثالث Δ پ Δ پ پ Δ مساوی ہیں اس لئے
 Δ پ Δ پ Δ = Δ پ Δ پ Δ پ
 اس لئے آخر الامر جب Δ (ا) لا انتہا چھوٹا ہو تو پ Δ پ کا وسطی نقطہ ہو گا۔ اگر (لا' ما')
 نقطہ پ کے عدد ہوں اور محوروں کا درمیانی زاویہ بسہ ہو تو
 Δ و Δ = Δ لا' و Δ = Δ ما' اس لئے
 Δ لا' واجب بسہ = Δ م'
 اس لئے لفاف قطع زائد ہے جس کے تقارب حوالہ کے محوریوں۔ شکل ۱۱۴ سے اس
 صورت کی توضیح ہوتی ہے جس میں بسہ = $\frac{11}{4}$



۱۳۵۴۔ لفاف دریافت کرنیکا عام طریقہ۔

فرض کرو کہ نظام کے کسی منحنی کی مساوات ہے

(۱) = فدا (لا' ما' عدا)

جہاں عدا متبدل ہے۔ جن نقطوں پر یہ نظام کے دوسرے منحنی

(۲) = فدا (لا' ما' عدا)

کو قطع کرتا ہے ان نقاط پر صریحاً

فدا (لا' ما' عدا) - فدا (لا' ما' عدا)

(۳) = عدا - عدا

جب تغیر عہ ۔ عہ لا انتہا کم ہو تو یہ آخری مساوات یہ شکل اختیار کرتی ہے

$$\frac{\text{جف}}{\text{جف عہ}} = \text{فہ} (\text{لا} \text{ 'ما' عہ}) = 0 \dots (۴)$$

۳۴۵ جہاں $\frac{\text{جف}}{\text{جف عہ}}$ بلحاظ عہ کے جزوی تفرق کی علامت ہے دیکھو دفعہ

۱۔ انتہائی تقاطع کے نقطہ یا نقاط کے محدود (۱) اور (۴) کو بطور ہمزاد مساواتوں کے مل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور انتہائی نقاط تقاطع کا طریق ان مساواتوں سے عہ کو ساقط کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۱۔ دفعہ ۳۸ مثال ۱ کے دائرے اس مساوات سے تغیر ہوتے ہیں

$$(\text{لا} - \text{عہ}) + \text{ما} = \text{لا} \dots (۵)$$

بلحاظ عہ کے تفرق کرنے سے

$$\text{لا} - \text{عہ} = 0 \dots (۶)$$

(۵) اور (۶) کے درمیان عہ ساقط کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{ما} = \text{لا} \dots (۷)$$

جو مطلوبہ لغاف ہے۔

مثال ۲۔ اگر ذرہ مبدأ سے زاوی ارتفاع طہ پر ایسی رفتار سے پھینکا جائے

جو بلندی ب "کی وجہ" سے ہے تو مکانی راستہ کی مساوات ہے

$$\text{ما} = \text{لا} \text{ مس طہ} - \frac{1}{4} \frac{\text{لا}^2}{\text{ب}} \text{قط طہ} \dots (۸)$$

جہاں لا 'ما' کے محور بالترتیب افقی اور انتہائی ہیں۔ مس طہ کی بجائے عہ کہنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{ما} = \text{عہ} - \frac{1}{4} \frac{\text{لا}^2}{\text{ب}} (۱ + \text{عہ}) \dots (۹)$$

خلف ارتفاع یعنی عہ کی مختلف قیمتوں کے لئے راستوں کا لغاف معلوم کرنے کے لئے ہم بلحاظ عہ کے (۹) کو تفرق کرتے ہیں اور ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\text{لا} - \frac{1}{p} = \frac{\text{علا}}{b} = \dots \dots \dots (10)$$

یہ مساوات پوری ہوتی ہے لا = ۱ یا علا = ۲ ب سے پہلی مساوات سے حاصل ہوتا ہے ما = اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مبدأ طریق کا ایک حصہ ہے اور یہ ایسے بھی ظاہر ہے۔ دوسرے نتیجہ سے 'علا' ساظ کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{لا} = ۲ ب (ب - ما) \dots \dots \dots (11)$$

یہ ایک قطع مکانی ہے جس کا محور انتصابی ہے اس کا اسکہ مبدأ پر ہے اور اس کا رأس بلندی ب پر ہے۔

۱۴۰۔ جبر یہ طریقہ۔ اگر مساوات

$$\text{فہ} (لا، ما، علا) = \dots \dots \dots (1)$$

۳۴۶ میں فہ، علا کا منطق صحیح تفاعل ہو تو گزشتہ دفعہ کے قاعدہ کی اور طرح سے بھی تحقیق ہو سکتی ہے۔ اگر لا، ما کو کوئی خاص قیمتیں دیا جائیں تو مساوات سے علا معلوم ہوتا ہے، یعنی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ نظام کے کونسے منحنی دئے ہوئے نقطہ (لا، ما) میں سے گزرتے ہیں۔ اگر مساوات بلحاظ علا کے ن ویں درجہ کی ہو تو ان منحنیات (حقیقی یا خیالی) کی تعداد ن ہوگی اور بالعموم یہ ن منحنی مختلف ہوں گے۔ لیکن اگر نقطہ زیر بحث دو متصل منحنیوں کا انتہائی نقطہ تقاطع ہو تو علا کی دو قیمتیں منطبق ہوں گی۔ دفعہ ۵۰ میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ علا میں مساوات کی دوہری اصل کے لئے شرط یہ ہے

$$\text{جف} \frac{\text{جف}}{\text{علا}} \text{فہ} (لا، ما، علا) = \dots \dots \dots (2)$$

تاریخی نقطہ نظر سے یہ مسئلہ دلچسپ ہے کیونکہ یہ پہلی مثال ہے جس میں منحنی خطوط کے قبیل کا لفاف حاصل کیا گیا (برنولی) لفاف دریافت کرنے کا عام طریقہ لبب نہیں کی ایجاد معلوم ہوتا ہے۔

اس لئے حسب سابق انتہائی تقاطع (۱) اور (۲) کو ہزار مساواتوں کے طور پر حل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور لفاف ان مساواتوں سے حل کو ساقط کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر مساوات (۱) حل میں درجہ اول کی مساوات ہو تو نظام کا صر ایک منحنی نقطہ معلومہ میں سے گذرتا ہے اور اس صورت میں لفاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثالیں متوازی خطوط اور ہم مرکز دائرے ہیں۔ مثلاً

لی لا + م ما = عا (۳)

لا' + ما' = عا (۴)

اگر (۱) درجہ دوم کی مساوات ہو مثلاً

پ عا + ۲ ق عا + ر = ... (۵)

جہاں پ، ق، ر متغیروں لا، ما کے معلومہ تفاعل ہیں تو مساوی اصولوں کے لئے شرط ہے

پ ل = ق (۶)

اس لئے یہ لفاف کی مساوات ہے۔

مثال ۱۔ خود مستقیم لا عا + ما عا = ۱ (۷)

حوالہ کے محور کے ساتھ ملکر مستقل رقبہ (م) کا شلٹ قطع کرتا ہے۔ اس لئے

عا جب سہ = ۲ م (۸)

جہاں سہ محوروں کا میلان ہے۔ بہا کو ساقط کرنے سے متغیر خط کی مساوات حاصل ہوتی ہے

عا واجب سہ = ۲ م (۹)

اس امر کو بیان کرنے سے کہ یہ مساوات بلحاظ عا کے مساوی اصلیں رکھتی ہے ہمیں لفاف کی مساوات یہ حاصل ہوتی ہے

۲ لا واجب سہ = ۲ م (۱۰)

جیسا کہ دفعہ ۱۳ مثال ۲ میں حاصل کیا گیا۔

مثال ۲ - زاویہ قائمہ کی ایک ٹانگ ایک ثابت نقطہ میں سے گذرتی ہے اور ۳۴
 رأس ایک ثابت خط مستقیم پر متحرک رہتا ہے دوسری ٹانگ کا لفاف مطلوب ہے۔
 اگر ثابت خط مستقیم محور صا ہو اور ثابت نقطہ (۱) تو دوسری ٹانگ کی مساوات
 باسانی حاصل ہوتی ہے

$$ما = م لا + \frac{1}{م} \dots (۱۱)$$

جہاں م محور لا کے ساتھ زاویہ میلان کا ماس ہے۔ اس مساوات کو اس شکل میں
 لکھتے ہیں
 ہم دیکھتے ہیں کہ لفاف قطع مکانی ہے

$$ما' = م لا \dots (۱۲)$$

۱۴۱۔ لفافوں کی تقاسمی خاصیت۔ اوپر کی مثالوں سے

طالب علم ذیل کے مسئلہ کے ادراک کے لئے تیار ہو چکا ہوگا۔
 منحنیات کے کسی نظام کا لفاف (بالعموم) اپنے ہر نقطہ پر نظام کے متناظر
 منحنی کو مس کرتا ہے۔

$$مساواتوں \quad ف (لا، ما، عا) = \dots (۱)$$

$$اور \quad \frac{جف}{جف عا} \quad ف (لا، ما، عا) = \dots (۲)$$

سے لا، ما بطور عا کے تفاعل کے حاصل ہوتے ہیں فرض کر دو کہ

$$لا = ف (عا، ما) = ف (عا) \dots (۳)$$

اور مساواتوں (۳) سے لفاف کی تعیین ہوتی ہے۔ اگر (۳) سے لا، ما کی
 قیمتیں مساوات (۱) کے دائیں رکن میں درج کی جائیں تو عا کا ایک تفاعل
 حاصل ہوگا جو شمالاً صفر ہوگا اور اس تفاعل کو لمباظ عا کے تفرق کرنے سے
 جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ بھی صفر ہوگا اس لئے دفعہ ۵۹ (۱) کے قاعدہ کی
 رو سے لازم

$$(۴) \quad \frac{\text{جف فہ فرلا}}{\text{جف لا فرعہ}} = \frac{\text{جف فہ فرما}}{\text{جف ما فرعہ}} + \frac{\text{جف فہ فرما}}{\text{جف فہ فرعہ}} \times \frac{\text{جف فہ فرعہ}}{\text{جف فہ فرعہ}}$$

اور (۴) کی رو سے یہ ربط ہو جاتا ہے

$$(۵) \quad \dots = \frac{\text{جف فہ فرلا}}{\text{جف لا فرعہ}} + \frac{\text{جف فہ فرما}}{\text{جف ما فرعہ}}$$

$$(۶) \quad \dots = \frac{\frac{\text{جف فہ فرما}}{\text{جف لا فرعہ}}}{\frac{\text{جف فہ فرما}}{\text{جف ما فرعہ}}} = \frac{\text{فرما فرعہ}}{\text{فرلا فرعہ}}$$

دفعہ ۶۱ کی رو سے اس مساوات کا دایاں رکن لفاف کے لئے فرما کی


قیمت ہے اور دفعہ ۵۹ (۱۰) کی رو سے بایاں رکن منحنی (۱) کے لئے فرما کی

قیمت کو تعبیر کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انتہائی نقطہ تقاطع پر منحنی (۱) اور لفاف کا تماس وہی ہے۔

۳۴۸

اس مسئلہ کا ہندی پہلو یوں واضح ہو سکتا ہے۔

فرض کرو کہ شکل میں متبادل عہد کی قیمتوں عہد کے جواب میں نظام کے دو منحنیات کے کچھ حصے دکھائے گئے ہیں اور یہ منحنی ایک دوسرے کو پیر قطع کرتے ہیں۔



فرض کرو کہ 'پ' لفاف پر کے متناظر نقطے ہیں یعنی 'پ' کا انتہائی مقام ہے جبکہ 'ع' کو قائم رکھ کے 'ع' کو 'ع' کے لانا انتہا قریب لیا جاتا ہے اور 'پ' کا انتہائی مقام ہے جبکہ 'ع' کو ثابت بلکہ 'ع' کو 'ع' کے لانا انتہا قریب لیا جاتا ہے۔ چونکہ 'ع' کے یہ تفسیر متقابل رنوں میں ہیں اور چونکہ 'پ' کے محدود عام طور پر 'ع' کے متشاکل تفاعل ہوتے ہیں اس لئے 'پ' کے متناظر ٹھاؤ 'پ' اور 'پ' عام طور پر تقریباً متقابل سمتوں میں ہونگے (جبکہ | عہ - عہا بہت چھوٹا ہو) اور 'پ' 'پ' بڑے منفرجہ زاویہ والا شلٹ ہوگا۔ اس لئے آخر الامر جب | عہ - عہا | لانا چھوٹا ہو تو وتر 'پ' اور 'پ' سمت میں منطبق ہوں گے یعنی لفاف کا ماس منحنی کے ماس پر منطبق ہوگا۔ بعض صورتوں میں اوپر کی تحقیق درست نہیں رہتی۔ جہاں تک تحلیل ثبوت کا تعلق ہے یہ ظاہر ہے کہ (۵) سے کوئی نتیجہ مستنبط نہیں ہو سکتا جبکہ نقطہ زیچٹ پر ایک ساتھ

$$\frac{\text{جف فہ}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{جف فہ}}{\text{جف ما}} = \dots \dots \dots (۷)$$

یعنی جبکہ منحنی (۱) کے لئے $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$ کی قیمت یگانہ طور پر معین نہ ہو سکے۔ یہ خصوصیت ایک "نادر نقطہ" پر پیدا ہوتی ہے خواہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ عقدہ ہو یا قرن یا اکیلا نقطہ (دیکھو دفعہ ۱۱۹)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیل کے نادر نقطوں کا طریق اگر ایسے طریق کا وجود ہو (۱) اور (۲) کے درمیان 'ع' کے حامل استقاط میں شریک ہو گا لیکن یہ طریق عام طور پر دئے ہوئے معنیوں کو صحیح معنوں میں "مس" نہیں کرتا۔ اس امر کی پوری تحقیق اس کتاب کے حدود سے باہر ہے لیکن ایک سادہ سی مثال یہاں دی جاتی ہے

تفرق سادات کی کتابوں میں یہ بحث "نادر مل" کے باب کی ضمن میں ملے گی۔

ذیل کے قبیل پر غور کرو۔

(۸) (ا۔ ما۔ عا) = لا (لا + ب) (۸)
دفعہ ۱۱۹ سے ظاہر ہے کہ نقطہ (ا۔ عا) پر عقدہ ہے، قرن ہے یا اکیلا نقطہ
ہے بموجب اسکے کہ ب مثبت ہے، صفر ہے یا منفی۔ لہذا معلوم کریں گے
عمل سے حاصل ہوتا ہے ما۔ عا = ۱، اس لئے

(۹) لا (لا + ب) = ...
خط لا = سے نادر نقطوں کا طریق حاصل ہوتا ہے جو اصلی منحنیوں کو مس
نہیں کرتا۔ بخلاف اس کے خط لا = ب مس کرتا ہے (اگر ب صفر نہ ہو)
ہندسی بحث میں یہ مان لیا گیا تھا کہ پ کے عین پڑوس میں منحنیات
عبا، عا، کوئی اور تقاطع نہیں ہے۔ عقدہ کی صورت میں عام طور پر دو
متصل تقاطع ہونگے جن کے (لا، محد) (مثلاً) بالترتیب ان شکلوں کے
ہونگے ف (عبا، عا) اور ف (عبا، عا) لیکن ف (عبا، عا)
متبدلوں عبا، عا کا متشاکل تفاعل نہیں ہے اس لئے یہ استدلال
عقدوں کے طریق پر عائد نہیں ہوتا۔ نیز قرن کی صورت میں عبا یا عا
کلا انتہا چھوٹے تغیر کی وجہ سے نقطہ پ کا ہٹاؤ شکل ۱۱۵ میں رتبہ اول کا
نہیں ہوگا اور عام طور پر نقطے پ اور ب دونوں پ کے ایک ہی
جانب ہونے میں۔ اکیلے نقطہ کی پڑوس میں متصل منحنیات کا کوئی حقیقی تقاطع
نہیں ہوتا۔

۱۲۲۔ برہمچ۔ منحنی کا برہمچ (Evolute) اس کے

مرکز انحناء کا طریق ہوتا ہے اور چونکہ مرکز انحناء (دفعہ ۱۳۳) دو متصل عمادوں کا
نقطہ تقاطع ہے اس لئے برہمچ دئے ہوئے منحنی کے عمادوں کا لہاف ہے۔
اسلئے ابتدائی منحنی کے عماد برہمچ کے تماس ہوتے ہیں۔

* ظاہر ہے کہ دفعہ ۱۲۱ کے آخر کی مستثنی صورتیں خط مستقیم کے لہاف میں پیدا نہیں ہوتیں۔

- مثال ۱- قطع مکانی $\Gamma^2 = 12$ اور $\Delta^2 = 12$ (۱)
 میں $\Delta^2 = 12$ اور $\Gamma^2 = 12$ (۲)
 اور (دفعہ ۱۴ مثال ۲) سے

(۳) $\Gamma^2 = 12$ جب $\Delta^2 = 12$


اس لئے انہما کے مرکز کے محدود ہیں

(۴)
$$\begin{cases} \Delta^2 = 12 - \Gamma^2 \text{ جب } \Delta^2 = 12 \\ \Gamma^2 = 12 - \Delta^2 \text{ جب } \Gamma^2 = 12 \end{cases}$$

اس لئے $\Delta^2 = 12 - \Gamma^2 = 12 - 12 = 0$ اور $\Gamma^2 = 12 - \Delta^2 = 12 - 12 = 0$

- پس پریم نیٹیم کسی مکانی ہے $\Delta^2 = 12$ اور $\Gamma^2 = 12$ (۵)

۲۵۰



شکل (۱۱۶)

بطرز دیگر۔ مخروطات کی کتابوں میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عماد کی مساوات کی یہ شکل

$$ما = م (لا - ۱۲) - ۱ م \quad (۶) \dots \dots \dots$$

اس کا لفاف معلوم کر نیکے لئے بلحاظ م کے جزوی تفرق لو اور حاصل کرو

$$لا - ۱۲ = ۱۲ - ۱ م = ۱۲ - ۱ م \quad (۷) \dots \dots \dots$$

م کے ساقط کرنے سے نتیجہ (۵) حاصل ہوتا ہے۔ منحنی شکل ۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۲۔ ناقص لا = ۱۲ جم فدا، ما = ۱۲ جب فدا۔ (۸)
کے کسی نقطہ پر عماد ہے


$$۱۲ - ۱۲ = \frac{۱۲ - ۱۲}{۱۲ - ۱۲} = ۱ - ۱ \quad (۹) \dots \dots \dots$$

بلحاظ فدا کے تفرق کرنے سے

$$۱۲ - ۱۲ = \frac{۱۲ - ۱۲}{۱۲ - ۱۲} = ۱ - ۱ \quad (۱۰) \dots \dots \dots$$

(۹) میں درج کرنے سے لا = ۱۲ - ۱۲ = ۱۲ - ۱۲ (۱۱)
اس لئے مرکز انحناء کے محدویں

$$لا = ۱۲ - ۱۲ = \frac{۱۲ - ۱۲}{۱۲ - ۱۲} = ۱ - ۱ \quad (۱۲) \dots \dots \dots$$



شکل (۱۱۷)

اور بوجہ ہے (۱۱۸) + (ب ما) = (و - ب) (۱۳) (۱۴)

پہنچی جو ستارہ نما سے قائم ظل کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے شکل ۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔ نقاط 'ا' ب' 'ا' ب' پر انحناء کے مرکز بالترتیب ہیں

ع، ف، ع، ف

مثال ۳۔ خط تدویر کا بوجہ دریافت کرو۔

خط تدویر 'ا' پ' د (شکل ۱۱۸) کے کسی نقطہ 'پ' پر دفعہ ۱۳۴ مثال ۲ کی رو سے

۳ = ۲ پ سے (۱۴)

محور 'ا' ب' کو دیکھ کر اتنا بڑھاؤ کہ 'ب' = 'ا' اور 'ت' سے کو بڑھاؤ کہ یہ 'د' میں سے گزرنیوالے 'ب' سے کے متوازی خط سے 'ت' پر ملے۔

'ت' کے قطر پر دائرہ کھینچو اور 'پ' سے کو اتنا بڑھاؤ کہ دائرہ کے محیط سے یہ 'پ' پر ملے تو 'پ' سے = 'پ' سے 'پ' خط تدویر کے نقطہ 'پ' پر مرکز انحناء ہے۔ چونکہ قوس 'پ' سے قوس 'ت' 'پ' کے مساوی ہے اور اس لئے 'ب' سے اور 'د' سے کے مساوی ہے اس لئے 'پ' کا طریق صریحاً ایک خط تدویر ہے جس کا کون دائرہ 'ت' سے 'پ' سے ہے جو 'د' سے کے نچلے پہلو پر لوگتا ہے اور مرسم نقطہ 'د' سے لڑکنا شروع ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خط تدویر کا بوجہ ایک مساوی خط تدویر ہے اور اس کا قرن 'د' پر ہے۔

نیز دفعہ ۱۲۲ (۴) سے ظاہر ہے کہ تدویری قوس

پ' د = ۲ پ سے = پ' پ

اس لئے قوس 'د' پ' + پ' پ = مستقل (۱۵)

اس لئے شکل ۱۱۸ کی نچلی تدویر اوپر کی تدویر کا بوجہ (دفعہ ۱۴۴) ہے


جب بھی ایک منحنی کی مساوات ع اور مسا کے رشتہ سے متعین ہو سکے مثلاً

* مثال تدویری رفاص کے نظریہ کی ضمن میں تاریخی نقطہ نظر سے شہر ہے۔ یہ نتائج ہائیگن (Huyghens ۱۶۴۳) کے ساتھ منسوب ہیں۔

ع = ف (سا) (۱۶)

تو برہمچہ اس مساوات

ع = ف (سا) (۱۷)



شکل (۱۸)

سے حاصل ہوگا بشرطیکہ (۱۷) میں یہ فرض کر لیا جائے کہ مسا کا مبدأ ایک قائمہ میں سے آگے کو ہٹا دیا گیا ہے۔ شکل ۱۰۸ صفحہ (۴۶۲) کے حوالہ سے یہ بالکل واضح

ہوگا کیونکہ برہمچہ کے ماس پر بد اسے عمود و ع = پ = ع = فرع جبکہ اصلی منحنی کے رموز استعمال کئے جائیں۔

مثال ۴۔ بریادہ تدویر کا برہمچہ دریافت کرو۔

شکل ۸ صفحہ (۴۰۷) میں اگر و سے ت پ پر جو برتد ویر کا نقطہ پ پر ماس ہے عمود ع نکالا جائے تو

$$ع = و ت جم پ = ج = (۱ + ب) جم \frac{ف}{۲}$$

یا $e = (b + 2) \text{ جم} \frac{1}{b+2} \text{ مسا} \dots\dots\dots (18)$

اگر مسا کا مبدأ رائس کی بجائے قرن کے جواب میں ہو تو زاویہ کی جیب التمام کی بجائے جیب رکننا ہوگی۔
اس لئے پرچہ کی صورت میں

$e = - \text{رجب} \frac{1}{b+2} \text{ مسا} \dots\dots\dots (19)$

جسے مسا کے مبدأ کی درستی سے (۱۸) کی شکل میں لایا جاسکتا ہے۔ اس لئے ۳۵۳
معلوم ہوا کہ پرچہ متشاکل برتدویر ہے جس کے ابعاد اس نسبت $\frac{1}{b+2}$ سے
کم کر دئے گئے ہیں۔

درتدویر کے لئے صرف ب کی علامت کو بدل دینا ہے۔

۱۴۳۔ پرچہ کی قوس۔ کسی منحنی کے کسی دو نقطوں پر
انحنائے نیم قطروں کا فرق پرچہ کے متناظر نقطوں کے درمیان کی قوس
کے مساوی ہے۔

اس کے ثابت کر نیکے لئے فرض کرو کہ منحنی کے دو متصل نقطوں ب اور
ب کے عماد ایک دوسرے سے ج پر ملتے ہیں اور ج اور ج متناظر

۳۳ معائنہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مسافات $e = \text{جم م} \text{ مسا یا } e = \text{ج جب م} \text{ مسا}$
بالترتیب مدبر یا درتدویر کو تعبیر کرتی ہے۔ بموجب اسکے کہ $m > 1$ بشرطیکہ دفعہ ۲۳ کی
تعریف کے مطابق گردتدویروں کو برتدویروں میں شامل کر لیا جائے۔


بمطابق مرکز کے مدبر یا درتدویر کا پائیں منحنی خاص طرز کا برتدویر ہے

جس کی طرف دفعہ ۱۲۵ مثال ۲ میں اشارہ کیا گیا ہے شکل ۹۲ چار

انحنا کے مرکز ہیں۔

دفعہ ۴۱ کی رو سے ج ج ج بالعموم منفرجہ زاویہ والا مثلث ہے اور جب پ کو پ کے لائنہا قریب لیا جائے تو ج ج + ج ج آخر الامر ج ج کے ساتھ نسبت تساوی رکھتا ہے۔

نیز چونکہ ج سے منحنی پر کے متحرک نقطہ کا فاصلہ نقطہ پ پر اعلیٰ قیمت رکھتا ہے اس لئے ج ج پ اور ج ج پ کے درمیان فرق آخر الامر دوسرے رتبہ کی چھوٹی مقدار ہے اور اس لئے نظر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لئے ج پ - ج ج پ = ج ج + ج ج = ج ج۔



اس سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر ابتدائی منحنی کا نیم قطر انحنا ہو اور برجیہ کی قوس صہ تو آخر الامر صف س = صف صہ یا

$$(۱) \dots\dots\dots ۱ = \frac{\text{فرس}}{\text{قرصہ}}$$

پس بحمل سے س = صہ + صہ (۲)
جہاں صہ اختیاری مستقل ہے جو صہ کی پیمائش کے سبباً پر منحصر ہے۔
بطور ذیل اگر دفعہ ۳۲ کی مساواتوں
صہا = لا - س جب سہا ، عا = ما + س جم سہا (۳)

قرون دسے بردوریہ کے پائیں منحنی کو تعبیر کرتی اور شکل ۹۴ چار قرون والے درتدیکہ پائیں کو

کے تفرق سے

$$\text{فرضا} = \frac{\text{فرس}}{\text{فرس}} = \frac{\text{فرس جب سا}}{\text{فرس}} = \frac{\text{فرس}}{\text{فرس}} \text{ جم سا} \dots (۴)$$

۳۵۲

$$\text{کیونکہ } \frac{\text{فرلا}}{\text{فرس}} = \text{جم سا} = \frac{\text{فرسا}}{\text{فرس}} = \text{جب سا} = \frac{\text{فرسا}}{\text{فرس}} = \frac{۱}{۳}$$

$$\text{اس لئے } \frac{\text{فرعا}}{\text{فرضا}} = \text{مم سا} \dots (۵)$$

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برہمچہ کا ماس ابتدائی منحنی کا عماد ہے اور

$$\text{فرصہ} = \left\{ \left(\frac{\text{فرضا}}{\text{فرس}} \right)^2 + \left(\frac{\text{فرعا}}{\text{فرس}} \right)^2 \right\} = \frac{\text{فرسا}}{\text{فرس}} \dots (۶)$$

تمکمل کرنے پر اس سے نتیجہ (۲) حاصل ہوتا ہے۔

خط تدویر کی صورت میں یہ خاصیت اس سے قبل دفعہ ۱۴۲ (۱۵) میں حاصل کی گئی ہے۔

اوپر کے مسئلے سے یہ ایک عجیب نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ منحنی کے متصل نقطوں کے انحنائے دائرے عام طور پر ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے۔ اسکی وجہ یہ ہے۔ مرکزوں کے درمیان کا فاصلہ برہمچہ کا وتر ہے اور اسلئے عام طور پر متناظر قوس سے کم ہوتا ہے یعنی نیم قطروں کے فرق سے کم رہتا ہے۔ نیز اگر منحنی کی ذاتی مساوات یہ ہو

$$\text{مس} = \text{ف (سا)} \dots (۷)$$

تو صہ = س + م = ف + (سا) + م = م + م = ۲م۔ (۸) اگر مسا کا مبدأ بقدر ایک قائمہ کے بدل دیا جائے تو یہ برہمچہ کی ذاتی مسا ہوگی۔ جمع کیا ہوا مستقل حذف کر دیا جاسکتا ہے اگر صہ کے مبدأ کا مناسب انتخاب کیا جائے۔

مثال ۱۔ قطع ناقص کے محور را'ب ہیں۔ ان محوروں کے سروں پر نیم قطر انحناء بالترتیب ب' اور ج' ہیں اس لئے جن چار حصوں میں برہمچہ کے قرن

اسے تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۱۷) ان میں سے کسی ایک کا طول ہے

$$\frac{a}{b} - \frac{b}{a} = \frac{a^2 - b^2}{ab}$$

مثال ۲۔ خط دور کی ذاتی مساوات ہے

مس = گ جب مسا (۹)

اور دریچہ کی مساوات ہے

صہ = گ جم مسا (۱۰)

اس لئے دریچہ مساوی خط دور ہے جیسا کہ پہلے ثابت کیا گیا۔

۱۴۴۔ دریچے اور متوازی منحنی۔ اگر منحنی 'ا' ایک منحنی ب کا دریچہ

ہو تو ب 'ا' کا ایک دریچہ (Involute) ہوگا۔

ایک دریچہ اس لئے کہ کسی ایک منحنی کے بیٹھار دریچے ہوتے ہیں۔ کسی منحنی کا دریچہ اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ منحنی پر ثابت نقطہ و لو اور اس کے کسی متغیر نقطہ پ پر کے تماس کی سمت میں و سے پرے طول پ ق اتنا لیں کہ

قوس و پ + پ ق = مستقل (۱)

دفعہ ۱۴۳ کے استدلال کو اٹھنے سے یہ باسانی ثابت ہو سکتا ہے کہ دے

ہوئے منحنی کے تماس ق کے طریق کے عماد ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ

یہ طریق دریچہ کی تعریف بالا کو بورا کرتا ہے۔ "مستقل" کو بد لئے سے ایک

ہی منحنی کے نئی دریچے حاصل ہوتے ہیں۔

عملی مثال کے طور پر ایسا خیال کر دو کہ معلومہ شکل کی کسی مادی قوس پر ایک

سنگا لپیٹ دیا گیا ہے اور اسی کا ایک سر منحنی کے ایک ثابت نقطہ سے

بندھا ہوا ہے۔ رسی کے آزاد حصہ پر کا کوئی نقطہ جو منحنی منقسم کرتا ہے وہ

دریچہ منحنی ہے۔ دراصل اس نام کی یہی وجہ تسمیہ ہے۔

مثال ۱۔ خط خستہ ری زنجیر کا دریچہ ہے۔ دفعہ ۱۲۰۔

مشال ۲۔ نیم قطر کا دائرہ ہے، اس کے دریچہ میں صریحا


$$\text{فرس} = \text{س} = \frac{1}{2} \text{سا} \dots \dots \dots (۲)$$

اگر سا کے مبداء کا مناسب طور پر انتخاب کیا جائے۔ اسلئے مکمل کرنے سے

$$\text{مس} = \frac{1}{4} \text{سا} \dots \dots \dots (۳)$$

کبھی مستقل کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مس کو قرن (سا = ۰) سے
ناپنا شروع کیا جائے۔

(دائرہ کی) اس خاص صورت میں ظاہر ہے کہ تمام دریچے متطابق طور پر مساوی
اس لئے عام ذکر میں محض دائرہ کا دریچہ کہتے ہیں۔ یہ منحنی شکل ۱۲۰ میں دکھایا گیا ہے




شکل (۱۲۰)

اگر کسی معلومہ منحنی کے عماد پر منحنی سے شروع ہو کر ایک مستقل طول نایا جائے تو
اس طرح جو نقطہ ملے گا اس کا طریق معلومہ منحنی کا ”موازی“ کہلاتا ہے۔

اگر ج پ ج پ منحنی کے متصل عماد ہوں اور متوازی منحنی کے متناظر

نقطے ق اور ق ہوں تو پ ق = پ ق

چونکہ ج پ اور ج پ کا فرق دوسرے رتبہ کی چھوٹی مقدار ہے اس لئے




شکل (۱۲۱)

معلوم ہوتا ہے کہ ج ق اور ج ق کا فرق بھی ایسے ہی دوسرے رتبہ کی پھولٹی مقدار ہے اور اس لئے مثلث ج ق ق کے زاوے ق اور ق آخر الامر زاوے قائم ہیں۔ اس لئے ج ق اور ج ق متوازی منحنی کے عماد ہیں۔ اس لئے دو متوازی منحنیات کے وہی عماد ہوتے ہیں اور وہی برجیہ دوسرے الفاظ میں متوازی منحنی ایک ہی منحنی کے درجے ہوتے ہیں۔
برعکس اسکے یہ ظاہر ہے کہ کسی منحنی کے مختلف درجے متوازی منحنیات کا ایک نظام بناتے ہیں۔

۱۲۵۔ متحرک شکل کا فوری مرکز۔ کوئی شکل ہے جسکی بناوٹ

میں تغیر واقع نہیں ہوتا، اپنی سطح میں ایسی شکل کی انتقائیت یا (ہٹاؤ) کا نظریہ ٹھیک طور پر حرکیات سے متعلق ہے، لیکن اسکے چند ہندسی استعمال دلچسپ ہیں۔

اس نظریہ کا پہلا مسئلہ یہ ہے۔ ایسا کوئی ہٹاؤ ایک ایسے گھماؤ کے



شکل (۱۲۲)

معا دل ہے جو کسی محدود یا محدود فاصلہ پر کے ایک نقطہ کے گرد وقوع پذیر ہوتا ہے۔
ذیل میں اس کا ایک ثبوت درج ہے۔ پہلے محل میں شکل کے کوئی دو نقطے (ا ب) ہیں دوسرے محل میں وہی دو نقطے

اے ب پر ہیں کسی تیسرے نقطہ کا یا مقام پ جو ابتدا میں پ پر تھا
مثلاً اے ب بنانے سے معلوم ہوتا ہے جو مثلث اے ب کے
بالکل متطابق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متحرک شکل کا مقام معین
کرنیکے لئے صرف دو نقطوں کے مقامات کا تعین کافی ہے۔
اب شکل کے کوئی سے نقطہ پر غور کرو فرض کرو کہ پ اس کا ابتدائی
اور ق آخری مقام ہے اور شکل کے اس نقطہ کا مقام ط ہے جو ابتدا میں
ق پر تھا۔ چونکہ پ ق اور ق ط ایک ہی خط کے دو محل ہیں اسلئے
وہ باہم مساوی ہیں۔ اگر دائرہ پ ق ط کا مرکز سے ہو تو مثلث
پ سے ط ق سے ط متطابق ہیں یعنی نقطہ سے دونوں محلوں
میں وہی نقطہ ہے۔ اس لئے ہٹاؤ سے کے گرد گھماؤ کے معادل ہے
اس نقطہ کو ”گھماؤ کا مرکز“ کہتے ہیں۔

۳۵۷

ایسا ہو سکتا ہے کہ پ ق اور ق ط ایک ہی خط مستقیم میں ہوں
ہٹاؤ ایسی صورت میں بغیر گھماؤ کے شکل کے محض نقل مکان کے معادل ہو
یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ گھماؤ کا مرکز لائن ہی پر ہے۔
اس کے بعد کسی مستوی شکل کی مسلسل حرکت پر غور کرو جو صرف اس کے
اپنے مستوی میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ شکل کے صرف دو متصل محلوں پر اپنی
توجہ محدود رکھو۔ پہلے محل سے دوسرے محل میں شکل کسی خاص مرکز سے گزرتی
گھماؤ کے ذریعہ لائی جاسکتی ہے۔ اس نقطہ کا انتہائی محل جبکہ شکل کے دو مقام
یا محل ایک دوسرے سے لائن ہٹاؤ قریب ہوں ”فوری مرکز“ کہلاتا ہے۔
اگر شکل کے ایک ہی نقطہ کے دو متصل محل پ، ق ہوں اور
گھماؤ کا متناظر زاویہ صف ط ہو تو گھماؤ کا مرکز (دے) ایسے خط مستقیم
پر واقع ہوگا جو پ کی علی القواہم تقصیف کرتا ہے اور زاویہ
پ سے پ، صف ط کے مساوی ہوگا۔ اس لئے اگر سے سے
محدود فاصلہ پر کوئی نقطہ پ ہو تو اس کا لائن ہٹاؤ جو ہٹاؤ آخر الامر سے پ
کی علی القواہم ہوگا اور سے پ، صف ط کے مساوی ہوگا۔

اگر وقت کا عنصر بھی شریک کر لیا جائے اور شکل کے دو محلوں کے درمیان
جو وقت کا وقفہ گزرتا ہے وہ صفات سے تعبیر کیا جائے تو مفط
مف مف

کی انتہائی قیمت یعنی فرط ”زاویٰ رفتار“ کہلاتی ہے۔ شکل
کے اس نقطہ کی رفتار جو فوری مرکز سے مطبق ہوتا ہے صفر ہے اور شکل کے
کسی اور نقطہ پ کی رفتار سے پ پر علی القوائم ہے اور سے پ فرط
فر

کے مساوی ہے۔
کسی مستوی شکل کی حرکت میں (جبکی وضع یا بنادٹ میں فرق نہیں آتا)
مختلف نقطوں کے راستوں پر کے عماد سب کے سب فوری مرکز میں
سے گزرتے ہیں۔ یہ امر ہندسی سوالات میں اکثر سودمند ثابت ہوتا ہے
اگر شکل کے کسی دو نقطوں کے ہٹاؤں کی سمتیں معلوم ہوں تو فوری مرکز
معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ان عمادوں کا نقطہ تقاطع ہے جو ان نقطوں
کی حرکت کی سمتوں پر پھینچے جائیں۔ اس کے بعد باقی تمام نقطوں کے
جو ہٹاؤ ہیں ان کی سمتیں اور اضافی مقداریں متعین ہو سکتی ہیں۔


بعد ازیں متحرک شکل میں اگر کوئی خط (سیدھا یا ٹیڑھا) ہو تو ظاہر ہے کہ
اس خط کے انتہائی تقاطع کا نقطہ یا نقاط اس کے متصل محل کے ساتھ صرف
ان عمادوں کے پائے ہو سکتے ہیں جو فوری مرکز سے خط پر پھینچے جائیں
کیونکہ خط کا کوئی اور نقطہ ایسی سمت میں حرکت کر رہا ہے جو اس کے ساتھ
محدود زاویہ بناتی ہے۔

مثال ۱۔ مستقل طول کا سیدھا خط (ب) ہے، اس کے سرے ”سیدھے“
مطابق القوائم خط ولا، و ما رستم کرتے ہیں۔


ہم جانتے ہیں کہ خط کا کوئی نقطہ پ قطع ناقص مرسوم کرتا ہے جس کے صدی
محور ولا اور و ما کی سمتوں میں ہیں۔ اوپر کے مسئلہ سے اس قطع ناقص کے

نقطہ پ پر عماد کھینچنے کا عمل مائل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے۔ و لا اور و ما پر
بالترتیب عمود لےئے 'ب' سے کھینچو' سے فوری مرکز ہے اور سے پ مطلوبہ
عماد ہے۔ دیکھو شکل ۱۲۳۔

۳۵۸



شکل (۱۲۳)



شکل (۱۲۳)

مثال ۲۔ گزشتہ مثال میں متحرک خط 'اب' کا انتہائی تقاطع اس کے متصل مقام
کے ساتھ نقطہ 'د' ہے (شکل ۱۲۳) جو فوری مرکز سے سے خط 'اب' پر عمود
کا پایہ ہے۔ اب اگر

$$اب = ل' > و اب = فدا$$


تو د کے محل دیں

$$\begin{aligned} لا = ب د جم فدا = ب د جم فدا = ل جم فدا & \dots (۱) \\ ما = ل د جب فدا = ل د جب فدا = ل جم فدا & \dots (۲) \end{aligned}$$

اس لئے 'اب' کا یقین ستارہ بنا

$$لا + ما = ل' \dots \dots \dots (۲)$$


ہے 'مقابلہ کردہ' ۱۲۴ مثال ۴ کے ساتھ۔



شکل (۱۲۵)

مثال ۳۔ ایک بازو وق اپنے ایک سرے و کے گرد زاوی زقار سے کے ساتھ گومتا ہے 'ق پر ایک سلاخ چول کے ذریعہ وصل کردی گئی ہے جو ایک ثابت نقطہ ج میں سے لازماً گذرتی ہے۔ اس سلاخ کی رفتار اس کے طول کی سمت میں مطلوب ہے۔

۳۵۹



شکل (۱۲۶)


در اصل تنظیم اھتزازی اسطوانہ (Oscillating cylinder) والے بھاپ انجن کے کرنیک اور فشارہ میں پائی جاتی ہے جس میں نقطہ ج اسطوانہ کے چول خط پر واقع ہوگا۔

فوری مرکز وہ نقطہ ہے جہاں وقی مدودہ ج پر فشارہ کی سمت کے عمود
خط کو قطع کرتا ہے۔ اگر وہ ج ق (مدودہ بشرط ضرورت) پر عمود و ن
کھینچا جائے تو سلاخ کے اس نقطہ کی رفتار جو ج پر منطبق ہوتا ہے یہ ہوگی
سہ x وقی x ج = سہ x وقی x وقی = سہ x وقی x وقی ... (۳)

۱۴۶۔ لڑکنے والے منحنیات میں استعمال -

دو مستوی شکلیں ہیں فلوں کی بناوٹ غیر متغیر ہے۔ دونوں شکلوں میں
ایک ایک منحنی ثابت طور پر لگا ہوا ہے ایک شکل کا یہ منحنی دوسری شکل کے
منحنی پر بغیر پھسلنے کے لڑکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر شکل کا کوئی نقطہ بلحاظ
دوسری شکل کے ایک منحنی مرئسم کریمیا، منحنی جو اس طور پر مرئسم ہوا ہے گردونہ
کہتے ہیں۔

جن صورتوں میں لڑکنے والے منحنی دائرے ہیں وہ دفعات ۱۲۲ تا ۱۲۴



شکل (۱۲۴)

میں زیر بحث آچکی ہیں۔

گردونیوں کا عام نظریہ علم ہند

اور حرکیات میں سوچ سے اہمیت

رکھتا ہے کہ کسی شکل کی کوئی مسلسل

حرکت خود اپنی سطح مستوی میں اس

حرکت پر مشتمل خیال کیا جاسکتی ہے کہ

ایک خاص منحنی جو بلحاظ شکل

ثابت ہے دوسرے ایک

خاص منحنی پر جو بلحاظ سطح

مستوی کے ساکن ہے

لڑکتا ہے۔ دیکھو دفعہ ۱۴۹

جب ایک مستوی منحنی ایک

ایسے منحنی پر لڑکتا ہے جو ثابت خیال کیا جاسکتا ہے تو حرکت کا فوری مرکز نقطہ تماس ہے۔

صغولہ شدہ کی شکل میں فرض کیا جائیگا کہ نجلا منحنی ثابت ہے۔ فرض کرو کہ

۱) نقطہ تماس ہے اور لا انتہا چھوئی تو سنیں 'ا پ' 'ا پ' (= م ف م)

دو منحنیوں پر بنائی گئی ہیں۔ فرض کرو کہ پ اور پ کے عماد 'ا پ' کے

عماد سے نقاط و اور و پر ملتے ہیں۔ تب آخر الامر و = م اور

و = م جہاں م اور م دو منحنیوں کے نیم قطر انحنائیں نقطہ ا پ پر۔

لا انتہا چھوئے ہٹاؤ کے بعد پ و 'و پ' کے ساتھ ایک ہی خط مستقیم

میں آجائیگا اسوقت دونوں منحنی پ پر تماس میں ہونگے۔ اس لئے زاویہ

(م ف ط م) جس میں سے لڑکنے والا منحنی پھر گیا اور جو و پ اور

پ و کے درمیانی مادہ زاویہ کے مساوی ہے و اور و پر کے زاویوں

کے مجموعہ کے مساوی ہوگا، اسلئے آخر الامر

$$\text{م ف ط م} = \text{م ف م} + \text{م ف م} \dots \dots \dots (۱)$$

اب وتر 'ا پ' 'ا پ' آخر الامر مساوی ہیں اور ان کے درمیان

ا پ لا انتہا چھوٹا زاویہ بنتا ہے، اسلئے فاصلہ پ پ آخر الامر

م ف م میں دو بیسی سے زائد کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ جب 'م ف م' کو لا انتہا کم کیا جائے تو گھماؤ کے مرکز (دے) کا

انتہائی محل (پرنطبق ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ مرکز اس نقطہ سے محدود فاصلہ

پر ہو تو پ کا ہٹاؤ جو دفعہ ۴۵ کی رو سے مے پ م ف ط م کے

مساوی ہے م ف م میں صرف پلے زنبہ کا ہوگا۔


پس جب ایک منحنی ایک ثابت منحنی پر لڑکتا ہے تو ان سب نقطوں کے

راستوں کے عماد جو متحرک منحنی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نقطہ تماس میں سے

گذرتے ہیں۔ اس نتیجہ کی مثالیں اس سے قبل دفعات ۱۲۶، ۱۲۷ میں

تذویری اور استدار منحنیات کی ضمن میں آچکی ہیں۔ نیز اگر ایک خط مستقیم

کسی منحنی پر لڑکے تو اس کے کسی نقطہ کے راستہ پر یہ خط مستقیم عماد ہوگا (دفعہ ۱۴۴)



شکل (۱۳۸)

اس کے بعد اگر ایسے خط (سیدھے یا تیرے) پر غور کیا جائے جسے لڑکنے والا منحنی ساتھ اٹھائے پھرتا ہے تو اس سوار منحنی کے انتہائی نقاط تقاطع، اپنے متصل مقام کے ساتھ ان عمادوں کے پائے ہونگے جو نقطہ تماس سے سوار منحنی تک گھنچ سکتے ہیں۔ اور سوار خط کا لغاف ان پایوں کا طریق ہوگا۔

مثال ۱۔ ایک دائرہ ایک ثابت خط مستقیم پر لڑکتا ہو تو اس کا کوئی قطر خط عماد کو لٹ کرتا ہے۔

لڑکنے والے دائرہ کا مرکز ج ہے، اس کا نقطہ تماس ہے، 'س' د قطر پ ق پر عمود ہے۔ چونکہ د ایسے دائرہ پر واقع ہے جس کا قطر ج ہے اس لئے یہ دیکھنا آسان ہے کہ اگر چھوٹا دائرہ ہمیشہ بڑے دائرہ کی زاویہ رفتار کے دو چند سے لڑکتا فرض کیا جائے تو ثابت خط کے ساتھ اس کا نقطہ تماس وہی ہوگا اور نقطہ د اس طرح حرکت کریگا گویا چھوٹا دائرہ اسے اٹھائے ہوئے ہے۔

اس لئے اس کا طریق خط تدویر ہے۔

مثال ۲۔ اسی طرح اگر ایک دائرہ (ل) ایک ثابت دائرہ (ج) پر لڑکتا ہو تو ل کے کسی قطر پر کا لغاف ایسا "بر" یا در تدویر ہوگا جو ل کے نصف ناب کے دائرہ کو جب کے محیط پر لڑکانے سے پیدا ہو سکتا ہے۔

۱۴۷۔ نقطہ گرد و نیو کا انخفا۔ فرض کرو کہ کوئی نقطہ پ بلحاظ لڑکنے والے

$$= \text{مف صا} - \frac{\text{مف سی جم صا}}{\text{پ صا}}$$

$$= \text{مف سی} \left(\frac{1}{\text{پ صا}} + \frac{1}{\text{پ صا}} - \frac{1}{\text{پ صا}} \right) \dots (۳)$$

ذبحہ ۱۴۶ (۱) کی رو سے اگر میں اور میں ثابت اور لڑنے والے مخنیوں کے انخفا کے نیم قطر ہوں۔ (۲) اور (۳) کو مساوی رکھنے سے


$$\text{جم صا} \left(\frac{1}{\text{پ صا}} + \frac{1}{\text{پ صا}} \right) = \frac{1}{\text{پ صا}} + \frac{1}{\text{پ صا}} \dots (۴)$$

اس سے ج کا انتہائی مقام یعنی پ کے راستہ کا مرکز انخفا حاصل ہوتا ہے۔ نیم قطر انخفا اس کے بعد حاصل ہوگا

$$\text{غصا} = \text{ج پ} = \text{ج صا} + \text{پ صا} \dots (۵)$$

(۴) اور (۵) میں جو نتیجہ مشتمل ہے اسے سادہ ہندسی شکل میں یوں لکھا جاسکتا ہے۔۔۔ پ کے عماد پر طول سے ہ ایسا کاٹو کہ

$$\frac{1}{\text{پ صا}} + \frac{1}{\text{پ صا}} = \frac{1}{\text{پ صا}} \dots (۶)$$



شکل (۱۳۰)

اور پ کے قطر پر دائرہ کھینچو۔ فرض کرو کہ پ اس دائرہ کو

ق پر ملتا ہے۔ تب

$$\frac{1}{\text{ق}} = \frac{1}{\text{ج}} + \frac{1}{\text{غ}} = \frac{1}{\text{ق}} + \frac{1}{\text{غ}} \quad \text{اس لئے رشتہ (۳) یہ شکل اختیار کرتا ہے}$$

ج = $\frac{1}{\text{ق}} + \frac{1}{\text{غ}}$ (۴)
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 'ق' پر منطبق ہو جائے تو ج سے
لا متناہی ہوگا یعنی تحریک شکل کا کوئی نقطہ جو اس دائرہ پر واقع ہو جس کی
ابھی تعین کی گئی راستہ کے نقطہ انعطاف پر ہوگا۔ اس وجہ سے
دائرہ زیر بحث کو "انعطافوں کا دائرہ" کہتے ہیں۔
(۴) اور (۵) سے حاصل ہوتا ہے

ج = $\frac{\text{ق} \times \text{غ}}{\text{ق} + \text{غ}}$ (۸)
آخر کے نتیجہ سے ظاہر ہے کہ 'ق' کے ساتھ علامت ملتا
ہوئی تحریک شکل کے مختلف نقطوں کے راستے سے کی جانب متغیر
یا متذبذب ہیں۔ اور جب اس کے وہ انعطافوں کے دائرہ کے ایک جانب
واقع ہیں یا دوسری جانب۔ اور یہی معیاری صورت میں یہ راستے
کی طرف متغیر ہیں اگر پ دائرہ کے باہر ہو اور متذبذب ہیں اگر پ اندر ہو۔
استدلالی تخمینات سے جو دفعہ ۱۲۲ صفحہ (۲۰۳) پر دیے گئے ہیں
اسکی ایک مثال اس پر آتی ہے۔ اس صورت میں انعطافوں کا دائرہ
لڑکنے والے دائرہ کے ناپ کا آدھا ہے۔

ہم نے معیاری صورت وہ لی ہے جس میں دو منحنی بلحاظ ایک دوسرے
کے متذبذب ہیں دیکھو اشکال ۱۲۴، ۱۲۹۔ اور کوئی صورت میں اور اس کو
مناسب علامات دینے سے اوپر کے نتائج میں شریک کر لیا جاسکتی ہے۔
سکونیات میں "جھولنے والے پتھروں" کی حرکت میں اوپر کا نظریہ

استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک کھر در جسم فقط ایک نقطہ تماس کے ذریعہ
دوسرے جسم پر ساکن ہوتا ہے تو اس کا مرکز ثقل انتصاباً نقطہ تماس کے
اوپر واقع ہوتا ہے اور توازن کے قائم ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ
مرکز ثقل کا راستہ کسی لڑکنے کے ہٹاؤ کی صورت میں، اوپر کی جانب
منحرف ہو۔

مثال ۱۔ خط دوہریں اگر کمون دائرہ کا نیم قطر ہو تو
 $s = \infty$ 'س' = 'ل' = 'پ' = ۲ جم فضا
 (۴) میں درج کرنے سے

ج = ۲ جم فضا = 'پ' = ۲ جم فضا (۱۰)
 اس لئے فضا = ۲ جم فضا (۱۱)
 مثال ۲۔ برتن دوہریں (دفعہ ۱۲۳) میں

س = 'ل' = 'س' = 'ب' = 'پ' = ۲ جم فضا (۱۲)
 جس سے ج = ۲ جم فضا = $\frac{۲}{۲+۱}$ جم فضا = 'پ' (۱۳)

غما = $\frac{۲(۱+۱)}{۲+۱}$ جم فضا (۱۴)

یہ قابل توجہ ہے کہ اگر ب = $\frac{۱}{۲}$ تو غما = ∞ 'مقابلہ کردہ دفعہ ۱۲۴'
 مثال ۲ کے ساتھ۔

۱۴۸۔ خط گروونیہ (Line Roulette) کا انحن۔ خط گروونیہ

انحن یعنی ایک ایسے خط میں کے لفاف کا انحن جسے لڑکنے والا انحن اٹھائے پھرتا ہے
 زیادہ آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ خط کے دو متصل مقامات پر 'فوری
 مرکز کے قناطر مقامات سے (جو فضا میں ہیں) عمود سے دے دئے
 نکالے گئے ہیں، یہ لفاف کے عماد ہیں اور جو زاویہ یہ اپنے تقاطع (ج)
 پر ایک دوسرے سے بناتے ہیں وہ کھلاؤ کے زاویہ معطی کے مساوی

منحنی کے کسی معلوم مقام کے لئے تمام خط گردونیوں کے انحناء کے مرکزوں کا طاق ایک دائرہ ہے۔ اور جب برداشتہ خط گ میں سے گزرے تو د ج پر منطبق ہوگا اور ج لفاف پر ساکن نقطہ (دفعہ ۱۳۳) ہوگا۔ اوپر کے دائرہ کو اس لئے قرون کا دائرہ کہا جاتا ہے۔

مثال ۱۔ اگر خط تدبیر کو ایسے دائرہ کے ایک قطر کا لفاف خیال کیا جائے جو ایک ثابت خط مستقیم (دفعہ ۱۴۶ مثال ۱) پر لڑکتا ہے تو یہ مستطیل ہوتا ہے کہ نیم قطر انحناء عماد کا دو چند ہے۔

مثال ۲۔ ”بر تدبیر“ کو ایک ایسے دائرہ کے قطر کا لفاف سمجھ کر جو ایک اور ثابت دائرہ پر لڑکتا ہے تو کون کی گئی ہے تب دفعہ ۱۲۳ کی ترقیم کے مطابق $s = \frac{1}{r} s' = 2$ اور اسلئے (۲) سے

$$ج = \frac{1}{2} \frac{ب}{ب+1} \text{ جم فضا} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$$

جو دفعہ ۱۴۶ مثال ۲ کے مطابق ہے۔

۱۴۶۔ کسی شکل کی مسلسل حرکت اپنی مستوی سطح میں۔

کوئی مستوی شکل اپنی مستوی سطح میں متحرک ہے اس کے مختلف محلوں کے مسلسل سلسلہ پر غور کرو۔ فوری مرکز کا فضا میں ایک خاص طریق (لوکس) ہوگا اور شکل کے اندر بھی ایک خاص طریق ہوگا۔ ایسے منحنیوں کو جنکی اوپر تعریف ہوئی مرکز طریق کہتے ہیں، اول ان کو ہم فضائی مرکز طریق کہیں گے اور مومنہ ان کو جسی مرکز طریق۔ جس مسئلہ کا دفعہ ۱۴۶ میں حوالہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شکل کی کوئی معلومہ حرکت جسی مرکز طریق کے فضائی مرکز طریق پر بغیر پھسلنے کے لڑکنے سے پیدا ہو سکتی ہے۔


شکل کے کسی معلومہ محل پر غور کرو، فرض کرو کہ مے اس کا فوری مرکز اور مے، ڈ، بالترتیب متصل متناظر نقطے ہیں جسی مرکز طریق اور فضائی مرکز طریق پر۔

فرض کرو کہ جسم زیادہ مفطما میں سے گھومتا ہے جیسے فوری مرکز سے آکر پھیلا جاتا ہے۔

تب انتہائی صورت میں دفعہ ۱۴۵ کی رو سے

عے = عے ٹر اور عے ٹر = عے عے مفطہ

اس لئے زاویہ مئے ٹر انتہا میں معدوم ہو جاتا ہے اور مئے پر دونوں طریقوں کے حماسی خط ایک دوسرے پر منطبق ہو جاتے ہیں اور دونوں منحنيات کی متناظر عنصری قوسیں نسبت تساوی میں ہوتی ہیں۔



منگل (۱۳۲)

مثال - منقول طول کا خط مستقیم اب اس طرح حرکت کرتا ہے کہ اس کے سرے دو ثابت خطوط مستقیم ولا، و ما پر رہتے ہیں۔

فوری مرکز سے، وکلا، و ما پر کے عمودوں کا نقطہ تقاطع ہے جو بالترتیب
نقاط الہ اور ج پر کیجئے جائیں۔ نقاط الہ اور ج ایک دائرہ پر واقع
ہوتے ہیں جس کا قطر و ہے ہے اور چونکہ اس دائرہ میں دے ہوئے طول کا وتر
الہ ج محیط پر ایک مستقل زاویہ الہ و ج بناتا ہے اس کا قطر متعین ہو سکتا ہے
اسلئے دے کا فضائی طریق ایک دائرہ ہے جس کا مرکز و ہے۔ نیز چونکہ زاویہ
الہ ج مستقل ہے اسلئے دے کا طریق لمجاذ الہ ج کے ایک دائرہ
ہے جس کا قطر و ہے کی مستقل قیمت کے مساوی ہے۔ اس لئے حرکت زیر بحث

ایک دائرہ کے دوسرے ثابت دائرہ کے اندر جس کا ناپ دو چند ہے لڑکنے کے معادل ہے۔ ایسی حرکت بردفعہ ۱۲۴ مثال ۲ میں بحث کی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ کوئی نقطہ پ جو لمبا ۱۰ پ کے ثابت ہے قطع ناقص پر رسم کرتا ہے جو بعض صورتوں میں جبکہ پ لڑکنے والے دائرہ کے محیط پر واقع ہو ایک خط مستقیم میں بگڑ کر رہ جاتا ہے۔

۱۵۰۔ بردوریوں کی بطور گردنیوں کے دوہری نکوین۔


مزید مثال کے طور پر ہم یکساں دائری حرکتوں کو جو ردائرتوازی الاضلاع وق پ ق کے ذریعہ جس کا دفعہ ۱۲۵ میں حوالہ دیا گیا ہے ترکیب دینے کے حلی طریقہ کی طرف عود کرتے ہیں۔

تخصیص کی خاطر فرض کرو کہ سلاخوں وق، وق کی زاوی رفتاریں ن، ن ایک ہی علامت رکھتی ہیں۔
سلاخ ق پ کا فوری مرکز (ے) ایسا نقطہ ق و میں ہوگا

ن × ق = ے = ن × وق (۱)
کیونکہ کسی ایسے نقطہ کی رفتار جو ق پ کے ساتھ استوار طور پر لگا ہوا ہے مشتمل ہوگی انتقالیت ن × وق پر جو وق کے علی القواغم ہے اور ایسے کھانڈ پر جو ق کے لحاظ سے زاوی رفتار ن سے عمل میں آتا ہے۔ اس لئے شرط بالا کے تحت ایسے نقطہ کی رفتار جو ق پ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آن زیر بحث میں نقطہ ے پر ہے صفر ہوگی۔ اسلئے سلاخ ق پ کی حرکت کے لئے دو مرکز طریق ہیں جو و اور ق کو مرکز مان کر کھینچ جائیں اور ے میں سے گزریں۔

اسی طرح کے استدلال کی بنا پر سلاخ ق پ کا فوری مرکز (ے) ایسا نقطہ ق و میں ہوگا کہ

* ن × ق = ن × وق (۲)



شکل (۱۳۳)

پس سلاخ ق پ کی حرکت کے لئے دو مرکز طبعی دائرے ہونگے جنکے مرکز و اور ق ہونگے اور جو 'ع' میں سے گزریں گے۔ چونکہ نقطہ پ دونوں سلاخوں ق پ اور ق پ پر واقع ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سیدھا یا راستہ بردور یہ بطور براستہ ادی کے دو طرح سے مرتب ہو سکتا ہے۔


اس خاص صورت میں جبکہ ق پ = ق ع (۱) اور (۲) سے ماہل ہوتا ہے

ق پ : وق = ق ع : وق = ن : ن = وق : بق ع
ق پ : بق ع =

جس سے ق پ = وق = ق ع
پ کا راستہ اس صورت میں برتدویر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی برتدویر کی دو طرح سے نکوین ہو سکتی ہے یعنی دو معین دائروں میں سے

* شکل ۱۳۳ ایسی صورت کے لئے کھینچی گئی ہے جبکہ ن ع = ن۔ اگر ن > ن
زے ق و مدورہ پ واقع ہوگا اور 'ع' تقاطع ق اور و کے درمیان۔

کسی ایک کو ایک ہی ثابت دائرہ کے باہر لڑکانے سے * دیکھو شکل ۱۳۴۔
 ۳۶۶ مثال کے طور پر خط صنوبری (Cardioid) کی جس کا ذکر دفعہ ۱۲۴ مثال
 ۱۳۴ میں پہلے آیا ہے، دوہری تکوین دی جاتی ہے۔



جس صورت میں زاوی زقاروں ن، ن کی علامتیں مختلف ہوں
 اسے طالب علم کے معائنہ کے لئے چھوڑا جانا ہے۔ یہ معلوم ہوگا کہ کسی آٹے
 یا رجمی بروریہ کی بطور ایک دراستہ خط کے، دو الگ طریقوں سے
 تکوین ہو سکتی ہے اور بالخصوص کسی درتدویر کی تکوین دو قابل تعین دائروں
 میں سے کسی ایک کو ایک ہی ثابت دائرہ کے اندر لڑکانے سے
 عمل میں آسکتی ہے۔

امثلہ ۴۶

اشخنا

۱۔ ثابت کرو کہ دائرہ ہی ایک ایسا منحنی ہے جس کا اشخنا مستطیل ہے۔

* یہ یولر (۱۷۸۱ء) کا مسئلہ ہے۔

۲- ثابت کرو کہ منحنی کے کسی نقطہ (لا، ما) پر انحناء کے مرکز کے محدود اس شکل میں رکھے جاسکتے ہیں

$$لا - \frac{فرما}{فرسا} + \frac{ما}{فرسا}$$

۳- ثابت کرو کہ مساوی الزاویہ لولبی کی ذاتی مساوات اس شکل کی ہے

$$س = \frac{سا}{سا} = ۱$$

۴- ثابت کرو کہ خط جبری کی ذاتی مساوات اس شکل میں لکھی جاسکتی ہے

$$س = \frac{سا}{سا} = ۱$$

ثابت کرو کہ اس منحنی میں انحناء ایسے بدلتا ہے جیسے عماد۔

۵- ان ضابطوں $\frac{فرلا}{فرسا} = \frac{جمسا}{فرسا} = \frac{جبسا}{فرسا}$ ۳۶۸

کے تفرق سے ثابت کرو کہ $\frac{۱}{س} = \frac{فرلا}{فرسا} - \frac{فرما}{فرسا} = \frac{فرلا}{فرسا} - \frac{فرما}{فرسا}$

۱۱- $\frac{۱}{س} = \left(\frac{فرلا}{فرسا} \right) + \left(\frac{فرما}{فرسا} \right)$ جہاں سرنیم قطر انحناء ہے

۶- اگر ایک منحنی کا ان مساواتوں سے تعین ہو

$$لا = فارت، ما = ف (ت)$$

تو ثابت کرو کہ $\frac{۱}{س} = \frac{لا - ما}{لا + ما} = \frac{لا - ما}{لا + ما}$ جہاں زبروں سے تفرق بلجا ت کے تعبیر ہوتا ہے۔

۷- اوپر کا ضابطہ قطع ناقص لا = اجم فسا، ما = ب جب فسا اور قطع زائد لا = اجم ع، ما = ب جب ع کی صورت میں لگاؤ۔

۸- ایک منحنی کی کارٹیزی مساوات دی ہوئی ہے، بتاؤ کہ اسکے کسی نقطہ کے محدود (لا، ما) کس طرح اس کے میلان (سا) کی رقوم میں بیان ہو سکتے ہیں

اور ثابت کرو کہ

$$س = \sqrt{\left(\frac{فلا}{فزا}\right)^2 + \left(\frac{فما}{فزا}\right)^2}$$

- ۹- جس نمونی کی ذاتی مساوات س = م جب سا ہے ثابت کرو کہ وہ خط تدویر ہے (دفعہ ۱۲۰) (۳) کا طریقہ استعمال کرو)
- ۱۰- "مساوی مضبوطی کے زنجیرہ" کی صورت میں معلوم ہے

$$س = م \text{ قط سا (م مستقل)}$$

جہاں سا مماس کا میلان ہے افق کے ساتھ، ثابت کرو کہ اگر میدان سب نیچے نقطہ پر ہو تو $\angle = م$ سا، $\angle = م$ لوک قط سا جہاں محور کا اور مماس بالترتیب افقی اور انتصابی ہیں۔

- ۱۱- ایک نمونی کی ذاتی مساوات دی گئی ہے س = م جب سا (م مستقل) اس کی کارٹیری مساوات مائل کرو

$$\angle = م + \angle = م + \left(\frac{۱}{۳} م\right)$$

- ۱۲- اگر س = $\frac{۱}{۶}$ تو ثابت کرو کہ $\angle = م - ۲$ جم سا

- ۱۳- وہ نمونی دریافت کرو جس کی ذاتی مساوات ہے س = $\frac{۱}{۶}$ قط سا (سا = $\frac{۱}{۶}$ لا) ۳۶۹

- ۱۴- اگر نمونی پر کے کسی نقطہ کے محدود لا، ما تغیرت کے دے ہوں تفاعل ہوں تو ثابت کرو کہ

$$\frac{فزا}{فزا} = \frac{فزا}{فزا} \text{ جم سا} - \frac{۱}{س} \left(\frac{فزا}{فزا}\right) \text{ جب سا}$$

$$\frac{فزا}{فزا} = \frac{فزا}{فزا} \text{ جب سا} + \frac{۱}{س} \left(\frac{فزا}{فزا}\right) \text{ جم سا}$$

ان نتائج کی حرکتی تعبیر بیان کرو۔ اسلئے ثابت کرو کہ

$$\frac{1}{r} = \left\{ \left(\frac{r}{\text{فرت}} \right)^2 \times \left(\frac{r}{\text{فرت}} \right)^2 - \left(\frac{r}{\text{فرت}} \right)^2 \right\} \div \left(\frac{r}{\text{فرت}} \right)^2$$

۱۵- ستارہ نما لا = لاجم طہا = لاجب طہا میں ثابت کرو کہ

سا = ۳۳ - طہا اور اس سے ثابت کرو کہ س = ۳ لاجب طہا جم طہا

۱۶- اگر لا = لاجب طہا = ۲ لاجب طہا تو مرکز انکھانے محدودیں

$$\text{لا} = (۲ + ۳ \text{ لاجب طہا}) - ۲ \text{ لاجب طہا}$$

۱۷- دفعہ ۱۳۵ (۲) کے کارٹیزی روابط سے ثابت کرو کہ قائم قطع زائد

$$\frac{\text{لا} = \text{ما} = \text{م} \text{ میں } r = \frac{\text{لا} + \text{ما}}{2} = \frac{\text{لا} + \text{ما}}{2}$$

$$۱۸- \text{نیز قطع ناقص} \quad \frac{\text{لا}}{r} + \frac{\text{ما}}{r} = \text{م} \text{ میں } r = \frac{\text{لا} + \text{ما}}{2}$$

$$۱۹- \text{نیز قطع زائد} \quad \frac{\text{لا}}{r} - \frac{\text{ما}}{r} = \text{م} \text{ میں } r = \frac{\text{لا} - \text{ما}}{2}$$

$$۲۰- \text{نیز قطع مکانی} \quad \text{ما} = \text{لا} = \text{م} \text{ میں } r = \frac{\text{لا} + \text{ما}}{2}$$

$$۲۱- \text{نیز نیم کروی مکانی} \quad \text{لا} = \text{ما} = \text{م} \text{ میں } r = \frac{\text{لا} + \text{ما}}{2}$$

$$۲۲- \text{نیز کروی مکانی} \quad \text{لا} = \text{ما} = \text{م} \text{ میں } r = \frac{\text{لا} + \text{ما}}{2}$$

$$۲۳- \text{نیز ستارہ نما} \quad \text{لا} + \text{ما} = \text{م} \text{ میں } r = \frac{\text{لا} + \text{ما}}{2}$$

۲۴- ایک منحنی کے متغیر نقطہ (لا، ما) کے فاصلہ کا مربع ثابت نقطہ (ضہا، عا)

سے اس جملہ (لا - ضہا) + (ما - عا) سے تعبیر ہوتا ہے، اس جملہ کو

تفریق کرنے سے ثابت کرو کہ جب یہ فاصلہ اہل ہو تو نقطہ (لا، ما) کو لازماً اس

عماد کے پایہ پر واقع ہونا چاہئے جو (ضہا، عا) سے اس منحنی تک پہنچ سکتا ہے۔

نیز یہ فاصلہ اقل ہوگا اگر نقطہ (ضبا، حأ) مرکز انحنائی یہ نسبت منحنی سے زیادہ قریب ہو اور اعظم ہوگا اگر یہ نقطہ مرکز انحنائی یہ نسبت منحنی سے زیادہ بعید ہو۔

۲۵۔ اگر منحنی کو ابدال لا = عا لا، ما = بیما سے تحول کیا جائے تو کسی نقطہ

پر کا انحناء اس نسبت سے بدل جاتا ہے $\frac{عا\beta}{(ع\alpha\beta + \beta\alpha\beta)}$ جہاں سا ہے محور کا کے ساتھ اصلی منحنی کا میلان۔

۲۶۔ ثابت کرو کہ $\frac{فرس}{فرص} = \frac{ع\beta ق - (ع + ا)ر}{ق}$

جہاں $ع = \frac{فر\alpha}{فر\beta}$ ، $ق = \frac{فر\alpha}{فر\beta}$ ، $ر = \frac{فر\alpha}{فر\beta}$

۲۷۔ قطع ناقص کے کسی نقطہ پر انحناء $\frac{اجم\beta}{ر}$ ہے جہاں ر، راس کی فاصلہ میں اور فدا ان کا درمیانی زاویہ ہے۔

۲۸۔ قائم قطع زائد راجم ۲ طہ = ا میں ص = $\frac{ر}{ا}$

۲۹۔ چشمہ منحنی

$ر = اجم ۲ طہ میں ص = \frac{ا}{ر}$

۳۰۔ منحنی ر = اجم ۳ طہ میں ص = $\frac{ا}{ر} = \frac{ع(۱ + م)}{ع(۱ + م) - ا}$

۳۱۔ ضابطہ ص = $\frac{ر فرد}{فر ع}$ لگانے سے برتدیر کے کسی نقطہ پر کانیم قطر

انحناء دریافت کرو۔ (دیکھو مثال ۲۶ صفحہ ۲۳۹)

فائدہ کے درجہ کی صورت کا معائنہ کرو۔

۳۲۔ اگر منحنی تکی مسافات اس شکل ر = ف (ع) میں دی ہوئی ہو تو قطب میں

گذرنے والا وتر انخنا ہوگا $\frac{ع}{فر} ۲$

ثابت کرو کہ خط منوبری کے قطب میں سے گذرنیو والا وتر انخنا سمتی نیم قطر کا $\frac{۱}{۳}$ گنا ہوتا ہے۔

۳۳۔ ثابت کرو کہ قطب میں سے گذرنے والا منحنی $ر = ۱ + ۳م$ طہ کے کسی نقطہ پر کا وتر انخنا $\frac{۲}{۳}$ ہے۔

۳۴۔ ثابت کرو کہ منحنی $ر = ۱ + ۳ف$ (ع) کے پائین منحنی کا انخنا بلحاظ مبدأ کے $\frac{۲}{۳}$ ہے جہاں $ر = ۱ + ۳ع$ اصل منحنی سے متعلق ہیں۔

۳۵۔ ایک قطع ناقص کے نیم محور $ر$ ب ہیں، ثابت کرو کہ بلحاظ مرکز کے اسکے پائین منحنی کا انخنا $\frac{۳}{۲} - \frac{۱ + ۳ب}{۳}$ ہے جہاں $ر$ قطع ناقص کے متناظر نقطہ کا سمتی نیم قطر ہے۔

۳۶۔ ذیل کے مضابطہ کو ثابت کرو۔

$$\frac{۱}{ر} = \left\{ \frac{۱}{ر} - \frac{۱}{ر} \left(\frac{فر}{فرس} \right)^۲ \right\} \div \left\{ ۱ - \left(\frac{فر}{فرس} \right)^۲ \right\}$$

اور مثال ۲۲ کے نتائج حاصل کرنے میں اسے لگاؤ۔

۳۷۔ ثابت کرو کہ قطبی محدودوں میں اپل ماس کے لئے شرط ہے

$$\frac{فر}{فرطہ} + ۶ = ۰ \text{ جہاں } ۶ = \frac{۱}{ر}$$

۳۸۔ اس مضابطہ سے $سا = طہ + فہ = طہ + مم = \frac{۱}{ر} فرطہ$ سے

قطبی محدودوں میں انخنا کے لئے یہ مضابطہ حاصل کرو

$$\frac{۱}{ر} = \left\{ \frac{۱}{ر} - \frac{۱}{ر} \left(\frac{فر}{فرطہ} \right)^۲ \right\} \div \left\{ ۱ - \left(\frac{فر}{فرطہ} \right)^۲ \right\} + \frac{۱}{ر}$$

$$= \left(\frac{۶}{۶} + \frac{۶}{۶} \right) \div \left\{ \left(\frac{۱}{۶} \frac{۶}{۶} \right) + ۱ \right\} \frac{۲}{۳} \text{ جہاں } ۶ = \frac{۱}{۲}$$

۳۹۔ اس ترقیم کے موافق ثابت کرو کہ مبدا میں سے گزرنیوالا وتر انحناء ہے

$$۲ \left\{ \left(\frac{۱}{۶} \frac{۶}{۶} \right) + ۱ \right\} \div \left(\frac{۶}{۶} + \frac{۶}{۶} \right)$$

امثلہ ۴

نیوٹن کا طریقہ

۱۔ منحنی ۱ ماً = (۱-۱) (۱-۱) (۱-۱) کا نیم قطر انحناء نقطہ (ص) پر ہے

$$\frac{(۱-۱) (۱-۱) (۱-۱)}{۲}$$

۲۔ نیوٹن کے طریقہ سے ثابت کرو کہ زنجیرہ ماً = ۱ جنم ۱ کے راس پر نیم قطر انحناء کے مساوی ہے۔

۳۔ نقطہ (۱-۱) پر منحنی ماً = ۱ (۱-۱) (۱-۱) کا نیم قطر انحناء ۱ ہے۔

۴۔ دایم ماً = ۱ (۱-۱) (۱-۱) کا نیم قطر اس کے راس پر ۱ ہے۔

۵۔ نقطہ (۱-۱) پر منحنی ۱ ماً = ۱ (۱-۱) (۱-۱) کا نیم قطر انحناء دریافت کرو۔

۶۔ مکانی (۱-۱) ماً = ۱ (۱-۱) (۱-۱) کا نیم قطر انحناء ان نقطوں پر دریافت کرو جہاں پر یہ محوروں کو مس کرتا ہے۔

۷۔ نقطہ ۱ ماً = ۱ (۱-۱) (۱-۱) جب ۱-۱ جب ۱-۱ کا نیم قطر انحناء

دریافت کرو۔ [۲۶۹۵]

۸۔ مکانی ماً = ۱ (۱-۱) (۱-۱) میں 'مبدا' پر 'محور' ماً کے متوازی وتر انحناء ۳۷

کا طول (۱+۱) ماً ہے اور دائرہ انحناء کی مسادات ہے

۱ ماً + ۱ ماً = (۱+۱) ماً (۱-۱) ماً

۹۔ منحنی ماً = ۱ (۱-۱) (۱-۱) کا نیم قطر انحناء (۱-۱) ماً (۱-۱) ماً

دریافت کرو۔

$$\left[\frac{\frac{2}{3}(m+1)}{2(n-b)} \right]$$

۱۰۔ مبداء پر مخروطی ما = (لا + ۲ھ لا + ما + ب ما) کے دائرہ انحنائی مساوات معلوم کرو اور ثابت کرو کہ یہ منحنی سے دوبارہ خط مستقیم (ا-ب) ما = ۲ھ لا پر ملتا ہے۔

۱۱۔ اگر ایک منحنی کی قطبی مساوات $r = f(\theta)$ ہو جہاں $f(\theta)$ (طما)

طما کا جفت تفاعل ہے تو نقطہ طما = - پر انحنایے $\frac{f(\theta) - f''(\theta)}{2[f'(\theta)]^2}$

۱۲۔ زیادہ سے زیادہ کشش کے مجسم (دیکھو مثال ۱۹ صفحہ ۴۴۹) کے

نصف النہاری منحنی میں ثابت کرو کہ محور کے سروں پر نیم قطر انحنایا بالترتیب ۵ اور ۲/۳ اور ۱/۳ چشمہ منحنی $r = \frac{1}{a} \cos \theta$ کے کسی ایک سر پر نیم قطر انحنایا ۱/۳ ہے۔

۱۳۔ استدارى خط لا = لا طما + ک جب طما = ما = ا۔ ک جم طما کے نیم قطر انحنایا ان نقطوں پر جہاں یہ قاعدہ سے نزدیک ترین اور بعید ترین ہے $(\frac{1}{a} \pm k)$ ہیں۔

۱۵۔ نیوٹن کے طریقہ سے ثابت کرو کہ بردوریہ

لا = لا جم ن ت + لا جم ن ت، ما = لا جب ن ت + لا جب ن ت کے انحنایے نیم قطر ان نقاط پر جو مرکز سے قریب ترین اور بعید ترین ہیں یہ ہیں

$$(n, \frac{1}{a} \pm \frac{1}{n})$$

یہ شرط مستنبط کرو کہ مرکز سے قریب ترین نقاط پر بردوریہ کو مرکز کی جانب مقعر ہونا چاہئے (جیسے چاند کا مدار لگنا سورج کے)۔

۱۶۔ ایسا ڈرو کہ منحنی لا = لا جم ن ت، ما = لا جب ن ت کے نقطہ

نت ۲۰۔ پراخنا کا نیم قطر دریافت کرو۔

اس منحنی کا خاکہ کھینچو۔

[۲ب/۱]

۱۷۔ اگر ایک منحنی کی مساوات قطبی محدودوں (ر، ط) میں ہو اور قطب منحنی پر واقع ہو اور ابتدائی خط قطب پر کا ماس ہو تو ثابت کرو کہ قطب پراخنا کا قطر

$$= ۲ر \sin \frac{\phi}{۲}$$

منحنی (ر) = ر جیم م ط کے قطب پراخنا کا نیم قطر دریافت کرو۔

۱۸۔ اگر ایک منحنی پر نقطہ پ ایسا ہو کہ اس پر کا انحناء غیر مسلسل ہو لیکن ماس کی سمت غیر مسلسل نہ ہو اور پ کی متقابل جانبوں میں پاس کے نقطے ق، د

ہوں تو ثابت کرو کہ دائرہ پ ق ر کا انحناء آخر الامر ہوگا $\frac{۱۲}{۲ر} + \frac{۱۲}{۲ر}$ جہاں

ر، د کے ہونے منحنی کے انحناء کے نیم قطر ہیں پ کے دونوں جانب اور ۱۲

نسبتوں $\frac{پ ق}{ق ر}$ اور $\frac{پ د}{د ر}$ کی انتہائی قیمتیں ہیں۔

۱۹۔ حادہ زاویہ جو ایک منحنی کا ایک وتر پ ق پر کے ماس کے

ساتھ بناتا ہے جبکہ ق کو پ کے لانا تھا قریب لیا جاتا ہے آخر الامر $\frac{۱}{۲} \frac{مف}{مف}$

کے مساوی ہے جہاں مف قوس پ ق ہے اور ر، نیم قطر انحناء ہے پ پر

۲۰۔ اگر ایک لانا تھا چھوٹی قوس پ ق کے سروں پر کے ماس ہر پر لیں

تو آخر الامر ہر پ اور ہر ق نسبت تساوی میں ہونگے۔

یہ کیوں حاصل نہیں ہوتا کہ ہر کو پ ق کے وسطی نقطہ کے ساتھ لانیوالا

خط آخر الامر پ ق پر عمود وار ہوگا۔

۲۱۔ یہ تسلیم کر کے کہ مثلث (ج ج) کے بیرونی دائرہ کا نیم قطر $\frac{۱}{۲}$ جب

ہے ثابت کرو کہ مثال ۱۹ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ لشی دائرہ انحناء کے دائرہ پر مطبق ہوتا ہے۔

۲۲- ثابت کرو کہ جب ایک ذرہ پر مائل قوت حرکت کی سمت میں ہو تو راستہ کا ماس "اچل" ہوتا ہے۔

امثلہ ۴۸

(الفاف - برہیجی)

۱- مکانیات ما^۲ = عا (لا - عا) کالفاف خطوط مستقیم کا ایک جوڑا ہے جہاں عا متبدل ہے۔
۲- مکانی ما^۲ = لا کے کسی نقطہ پ سے محدودوں کے محوروں پر عمود پ م پ ن نکالے گئے ہیں م ن کالفاف دریافت کرو۔

[ما^۲ = ۱۶ لا]
۳- خط لاجم عا + حاجب عا = لقط عا کالفاف دریافت کرو اور نتیجہ کا ہندسی مجموعہ بیان کرو۔

۴- مکانیوں لا ما^۲ = عا (لا - عا) کالفاف جہاں عا متبدل ہے یہ منحنی ہے لا ما^۲ = لا^۳

۵- ایک منحنی کے سمتی نیم قطروں کو قطران کر دائرے کھینچے گئے ہیں ہندسی طریق پر ثابت کرو کہ ان کالفاف دے ہوئے منحنی کا پائین خط ہے بلحاظ مبدا کے۔

۶- مخروطی تراش کے ماسکی دتروں کو قطران کر دائرے کھینچے گئے ہیں ان کالفاف معلوم کرو۔

۷- ایک دائرہ کے محیط پر کے ثابت نقطہ میں سے دتر کھینچے گئے ہیں ان دتروں کو قطران کر دائرے کھینچے گئے ہیں ثابت کرو کہ دائروں کالفاف خط منوہری ہے۔

۸- قائم قطع زائد کے مرکزی نیم قطروں کو قطران کر دائرے بنائے گئے ہیں ثابت کرو کہ ان کالفاف بر فوئی کا چشمہ منحنی ہے۔

۹- ثابت کرو کہ منحنیات پ جم عا + ق جب عا = ط کالفاف جہاں پ ق ط متغیروں لا، ما کے دے ہوئے تفاعل ہیں اور عا متبدل ہے

پ' + ق' = ط' ہے۔

۱۰۔ دائروں لا' + ما' = ۲ لا' لا' جم = ۲ ما' واجب = ج' کا

لفاف دریافت کرو اور نتیجہ کی تعبیر بیان کرو۔

۱۱۔ ع اور ح کے درمیان رشتہ معلوم کرو کہ خط مستقیم

لا' جم = ح + واجب = ح دائروں (لا' - ا') + ما' = ب' اور (لا' + ح) + ما' = ج' سے مساوی طول کے وتر کاٹے۔ ثابت کرو کہ اس شرط کے ماتحت خط کالافات قطع مکانی ہے۔

۱۲۔ مستقل رقبہ کے ناقصوں کا ایک نظام ہے جن کا مرکز دی ہے اور جنکے مجموعیت میں ایک دوسرے پر منطبق ہیں، ثابت کرو کہ لفاف دو فرد وچ قائم الزاموں پر مشتمل ہے۔

۱۳۔ ایک خط مستقیم اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ثابت نقطوں (ط' ج' ح') سے اس پر کے عمودوں کا حاصل ضرب مستقل (= ب') ہے، ثابت کرو کہ لفاف ناقص ہے

ناقص ہے $ج' + \frac{لا'}{ب'} + \frac{ما'}{ب'} = ۱$ اگر عمود متحرک خط کے ایک ہی

جانب ہوں یا دائرہ ہے $ج' - \frac{لا'}{ب'} - \frac{ما'}{ب'} = ۱$ اگر عمود خط کی متقابل

جانبوں میں ہوں۔

۱۴۔ قطع مکانی ما' = ۴ لا' کے دوہرے سینوں کو قطر ان کردائر کیچنے گئے ہیں ثابت کرو کہ ان کالافات ما' = ۴ لا' (لا' + ا') ہے۔

۱۵۔ قطع ناقص $\frac{لا'}{ب'} + \frac{ما'}{ب'} = ۱$ کے دوہرے سینوں کو

قطر ان کردائر کیچنے گئے ہیں ثابت کرو کہ لفاف ناقص $\frac{لا'}{ب'} + \frac{ما'}{ب'} = ۱$ ہے

۱۶۔ ایک خط مستقیم اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ثابت نقطوں (ط' ج' ح') سے خط پر کے عمودوں کے مربعوں کا مجموعہ مستقل (= ۴) ہے، ثابت کرو کہ لفاف

مخروطی تراش $\frac{لا^2}{ج^2 م} + \frac{ما^2}{ب^2 م} = ۱$ ہے، مختلف صورتوں کا معائنہ کرو۔
 ۱۷۔ ایک خط مستقیم اس طرح حرکت کرتا ہے کہ دو ثابت نقطوں سے اس کے عمودوں کے مربعوں کا فرق مستقل ہے، ثابت کرو کہ لفاف قطع ناقص ہے۔
 ۱۸۔ ان ناقصوں $لا = لاجب (طما - صا)$ $ما = بجم طما$ کا لفاف معلوم کر جہاں $صا$ متبدل ہے۔

۱۹۔ متبدل ج کے لئے جوزنجیر $ما = ججمز (ج - لا)$ سے تعبیر ہوتے ہیں ان کا لفاف دو خطوط مستقیم پر مشتمل ہے۔

۲۰۔ ان ناقصوں $\frac{لا^2}{صا^2 م} + \frac{ما^2}{ب^2 م} = ۱$ کا لفاف جہاں $صا = ب + ص$ (مستقل) ستارہ نما $لا^2 + ما^2 = م^2$ ہے۔

۲۱۔ خط مستقیم کا لفاف جو محدودوں کے محوروں پر ایسے نقطوں کا بنا ہے جن کا مجموعہ $م$ ہے قطع مکانی $لا + ما = م$ ہے۔
 ۱۲۔ دو نقطے محدودوں کے محوروں پر مختلف، مستقل زقاروں سے حرکت کرتے ہیں ثابت کرو کہ ان کو ملانے والا خط ایک قطع مکانی کو مس کرتا ہے۔

۲۳۔ قطع ناقص $\frac{لا^2}{ب^2 م} + \frac{ما^2}{ب^2 م} = ۱$ کے کسی نقطہ سے محدودوں کے محوروں پر عمود کیسے گئے ہیں ثابت کرو کہ ان عمودوں کے قدموں کو ملانیوں لے خط مستقیم کا لفاف $(\frac{لا}{ب}) + (\frac{ما}{ب}) = ۱$ ہے۔

۲۴۔ انحنیات $صا = ما^2 = لا (لا + صا)$ کے انتہائی نقاط تقاطع کا طریق دریافت کرو جہاں $صا$ متبدل ہے۔ اور جو توجہ حاصل ہو اس کا معائنہ کرو۔
 ۲۵۔ مستقل نیم قطر کے ایک دائرہ کا مرکز ہمیشہ ایک دے ہوئے نغی پر واقع

ہوتا ہے ثابت کرو کہ دائرہ کالفاف دو متوازی منحنی ہیں۔

۲۶۔ دے ہوئے نیم قطر کا ایک دائرہ ایک دے ہوئے منحنی کو مس کرتا ہے ثابت کرو کہ دائرہ کالفاف دو متوازی منحنیات پر مشتمل ہے۔

۲۷۔ اگر ایک منحنی کی مسادات اس شکل (۲) = (ع) میں دی ہوئی ہو تو اس کے کسی متوازی منحنی کی مسادات اس شکل (۲) = (ع) + (ج) - (ج) میں ہوگی۔

۲۸۔ ثابت کرو کہ منفی پائیں منحنیات (دفعہ ۱۳۱) کا مسئلہ خط مستقیم لا جم مسا + حاجب مسا = ع کالفاف معلوم کر نیے معادل ہے جہاں ع متبادل مسا کا ایک دیا ہوا تفاعل ہے۔

اسکی تصدیق کرو کہ اسی سے دفعہ ۱۳۱ کا منابطہ (۴) حاصل ہوتا ہے۔

۲۹۔ ثابت کرو کہ مکانی ما^۱ = ۱۴ (۱) کا منفی پائیں منحنی بلحاظ اس کے یہ منحنی ہے ما^۱ = ۱/۳ (۱ - ۱۴)

۳۰۔ لافول کے طریقہ سے ثابت کرو کہ دائرہ کا منفی پائیں منحنی قطع ناقص ہوگا اگر قطب دائرہ کے اندر ہو اور قطع زاویہ ہوگا اگر قطب دائرہ کے باہر ہو

۳۱۔ ہر کسی طریق پر ثابت کرو کہ مساوی الزاویہ لولبی کے کسی نقطہ پر انحناء کے نیم قطر کے سامنے قطب پر زاویہ قائمہ بنتا ہے۔

۳۲۔ مساوی الزاویہ لولبی کا پرچہ اسی زاویہ کا مساوی الزاویہ لولبی ہوتا ہے۔

۳۳۔ قطع ناقص ما^۱ = ۱/۲ + ۱/۲ = ۱ کے پرچہ سے گھرا ہوا رقبہ

۳۴۔ (۱ - ب) / (۱ + ب) ہے۔

منحنی ما^۱ = ۱ کے کسی نقطہ پر کے مرکز انحناء کے عہد ہیں

ضربا = ۱ - ۱/۲ = ۱/۲، عا^۱ = ۱۴ + ۱/۳ = ۱/۳

ثابت کرو کہ مہد کے نزدیک پرچہ کی شکل مکانی ما^۱ = ۱/۹ = ۱/۹ کی ہے۔

۳۵۔ ثابت کرو کہ اگر ایک منحنی نقطہ انعطاف رکھتا ہو تو اس کا پرچہ

ایک متقارب رکھتا ہے۔
ثابت کرو کہ منحنی $\lambda^2 = \mu^2$ کے برہمچہ کا وہ حصہ جو منحنی کے اس حصہ کے جواب میں ہے جو مبدأ کی پڑوس میں ہے تقریباً قطع زائد $\lambda = \mu$ سے $\frac{1}{17}$ سے تعبیر ہو سکتا ہے۔

۳۶۔ قطع زائد $\lambda = \mu$ و جنہ $\mu = \lambda$ ب جنہ $\mu = \lambda$ کا برہمچہ
(λ) $\frac{1}{17}$ ۔ (μ) $\frac{1}{17}$ = ($\lambda + \mu$) $\frac{1}{17}$ ہے۔

۳۷۔ نقطہ و سے شعاعیں نکل کر ایک دے ہوئے منحنی سے منعکس ہوتی ہیں، ثابت کرو کہ منعکسہ شعاعیں سب کی سب ایسے منحنی پر عماد ہیں جو لمبا و کے معلومہ منحنی کے یا اُس منحنی کا مشابہ ہے لیکن دوسرے ابعاد والا ہے۔
۳۸۔ اس لئے ثابت کرو کہ دائرہ پر کے انعکاس سے جو آتش بناتا ہے وہ گھونکا منحنی کا برہمچہ ہے۔ اور اس خاص صورت میں جبکہ روشن نقطہ دے ہوئے دائرہ کے محیط پر واقع ہے آتش خط منوہری ہے۔

۳۹۔ ثابت کرو کہ کسی منحنی پر انعکاس سے جو آتش بناتا ہے وہ ایسے دائروں کے نظام کے لفاف کا برہمچہ ہے جو منحنی کے مختلف نقطوں کو مرکز مان کر کھینچے جائیں اور سب کی سب روشن نقطہ میں سے گزریں۔
انعطاف کی صورت میں متناظر مسئلہ کیا ہوگا۔

امثلہ ۴۹

(گرد و نئے وغیرہ)

- ۱۔ ایک پتر کسی طرح سے بھی اپنے مستوی میں حرکت کرتا ہے، ثابت کرو کہ پتر سے اس کے متوازی خطوط متوازی منحنیات کو لفت کرتے ہیں۔
- ۲۔ ایک خط مستقیم اس طرح حرکت کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ثابت نقطہ و میں سے گزرتا ہے اور اس پر کا ایک نقطہ قی ایک دائرہ کے محیط پر واقع ہوتا ہے جو و میں سے گزرتا ہے، ثابت کرو کہ فوری مرکز قی میں سے گزرنے والے

قطر کا دوسرا سرا ہے اور دو مرکز طریق دریافت کرو۔

گھونگنا منحنی کے عماد کھینچنے کا عمل دریافت کرو اور اس سے یہ نتیجہ حاصل کرو کہ خط صنوبری میں 'قرن' میں سے گزرنے والے وتر کے سروں پر کے عماد 'اس' خط پر علی القوانیم کاٹتے ہیں جو اس نقطہ (قرن) میں سے وتر پر عمود ہو۔

۳۔ ایک مستوی شکل اس طرح حرکت کرتی ہے کہ اس میں کے دو خطوط مستقیم و ثابت دائروں کو مس کرتے ہیں، دو مرکز طریق کو دریافت کرو۔

۴۔ اگر ایک دائرہ اپنے سے نصف ناپ کے ایک ثابت دائرہ پر لڑکے اور پورا اس کے گرد آجائے تو ہر ایک خط مستقیم جو لڑکے والے دائرہ پر سوار ہو ایک دائرہ کو لطف کر لگیا۔

۵۔ اگر ایک مستوی شکل اس طور پر حرکت کرے کہ اس میں کا ایک خط مستقیم ایک ثابت دائرہ پر لڑکے تو شکل میں کے کسی اور خط مستقیم کا لفاف دائرہ کا ایک درجہ ہے۔

۶۔ خط مستقیم $ح\delta$ لا + $ب\delta$ ما = ا کے لفاف کا نیم قطر انخا جہاں

$ح\delta$ ، $ب\delta$ متبدلات کے دئے ہوئے تفاعل ہیں $\pm$ $(ع\delta + ب\delta)$ $\frac{1}{2}$ $(ع\delta - ب\delta)$ $\frac{1}{2}$ $(ع\delta - ب\delta)$

ہے جہاں زیریں لمبائیات کے تفہقوں کو تعبیر کرتی ہیں۔

۷۔ اگر ایک منحنی جسکی تماس قطبی سادات $ر = ف$ (ع) ہے ایک ثابت

خط مستقیم پر لڑکے تو قطب کے راستہ کا انخا ہے۔ $فرع$ $(\frac{ع}{ر})$ جہاں $ر$ نقطہ

تماس کا سمتی نیم قطر ہے۔

۸۔ ثابت کرو کہ اگر قطع مکانی ایک ثابت خط مستقیم لڑکے تو ماسکہ کا راستہ زنجیرہ

۹۔ اگر ایک مخروطی تراش ایک ثابت خط مستقیم پر لڑکے تو کسی ایک ماسکہ کا

راستہ ایک منحنی ہے $\frac{1}{ر} + \frac{1}{د} = \frac{1}{ح}$ جہاں $ح$ نیم قطر انخا ہے، $د$ عماد

ہے اور $ج$ مستقل۔

۳۸۰

۱۰۔ اگر ایک مساوی الزویہ لولبی ایک ثابت خط مستقیم پر لڑکے تو قطب کا راستہ ایک خط مستقیم ہوگا۔

۱۱۔ اگر شکافی لولبی $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ایک خط مستقیم پر لڑکے تو قطب کا راستہ خط جبری ہوگا۔

۱۲۔ اگر گوش کے لولبیوں $\frac{1}{e} = \frac{1}{r} + b$ میں سے کوئی ایک ایک خط مستقیم پر لڑکے تو قطب ایک منحنی مرتسم کرے گا جس کا انحنائیسہ بدلیگا جیسے عماد۔

۱۳۔ ایک منحنی ایک ثابت خط مستقیم پر لڑتا ہے، ثابت کرو کہ اس گردونیہ کی قوس جسے کوئی برداشتہ نقطہ مرتسم کرتا ہے اس منحنی کی متناظر قوس کے مساوی ہے جو بلحاظ و کے دے ہوئے منحنی کا پائیں منحنی ہے۔ [Steiner]

۱۴۔ بند بیضوی منحنی ایک ثابت خط مستقیم پر لڑتا ہے، ثابت کرو کہ وہ متغیر خط جو نقطہ تماس کو اندرونی معمولہ نقطہ و سے ملاتا ہے ایک پوری گردش میں اتنا رقبہ عبور کرتا ہے جو بلحاظ نقطہ و دے ہوئے منحنی کے پائیں منحنی کے رقبہ کا درپندہ ہے۔ [Steiner]

۱۵۔ فوری مرکز کے نظریہ سے ثابت کرو کہ جب جوڑ دار دندلوں کے مستوی ذواربعۃ الاضلاع سے گھرا ہوا رقبہ اہل (ساکن) ہو تو ذواربعۃ الاضلاع ہم محیط ہوگا۔



اصطلاحات صغاری احصاء

جلد دوم

(۴)

Circuit	چکر	Acoustics	علم آواز
Cisoid	لبلائی خط	Anchor-ring	لنگر آچلا
Comet	شهاب	Annular	حلقه دار طلقه نما
Commensurable	متوافق	Astroid	ستاره نما
Cone	مخروط	Asymptotes	مستقارب
Conic	مخروطی	Auxiliary circle	معاون دایره
Contour line	هم ارتفاعی خط	Bipolar	دوقبلی
Convergence	استدقاق	Body centre	جسمی مرکز طریق
Crank	کرنیک	Cardioid	خط صنوبری
Critical case	فاصل صورت	Carried line	خط بردار
Crossed	{ متقاطع متوازی الاضلاع }	Catenary	زنجیری
parallelogram		Caustic	پاشنه
Cusp	قوس	Centre	مرکز خط
		Centre of rotation	مکمل و مرکز

Impulse	دشک	Cyclic	هم محیط
Indefinite	نامحدود و تکمله	Quadrilateral	چهار اضلعی
Integral		Cycloid	خط تدویر
Indicator	نماینده تصویر	Definite integral	محدود و تکمله
diagram		Directrix	مرتب
Index	نماینده یا اشاره	Eccentricity	خروج المکز
Instantaneous	فوری مرکز	Ecliptic	طریق الشمس
centre		Ellipsoid	ناقص نما
Integral	محکم	Elliptic Integral	ناقصی محکم
Integration	محکم	Ellipticity	ناقصیت
Integration	محکم بالحصص	Envelope	لحاف
by parts		Epicyclic	بردوریه
Intercept	باینی حصه	Epicycloid	برآمدیر
Interpolation	بینی ادراج	Epitrochoid	بلاستداری
Interval	وقفه	Equipotential	هم قوه
Intrinsic	ذاتی مساوی	Evolute	پریچپ
equation		Flexure	خم
Inverse	مطلوب	Focus	بازگشت
Inversion	تقلیب	Frustum	ناقص یا محکم
Involute	دورچپ	Geodesy	مقطوعه
Irrational	غیر ناطق	Harmonic	ارضیات
Lamina	پترا	Hyperboloid	موسیقی
Latus-rectum	وتر خاص	Hypocycloid	زائد نما
Lemniscate	چشمه نمایی	Hypotrochoid	در تدویر
Limacon	مکعب نما نمایی		برآمدیر

Point-roulette	نقطہ گردونیہ	Line-roulette	خط گردونیہ
Polar	قطبی	Linkage	رابطہ
Pole	قطب	Link-work	رابطہ کاری
Prolate Ellipsoid	لبو ترا ناقص نما	Loop	حلقہ
Prolate spheroid	لبو ترا کرہ نما	Magnetic curves	مغناطیسی منحنی
Pyramid	مخروط مضلع	Mechanical	مسیلی
Quadrature	تربیع	Modulus	مقیاس
Range	سب	Multiple Integral	ضعفی محمولہ
Rational	منطوقی	Node	عقدہ
Reciprocal	مکافی	Optical	مناظری
Rectification	تخطیط	Optics	علم مناظر
Reduction	تحویل	Orientation	تشریف
Reflection	انعکاس	Oscillating	اہترازی
Refraction	انکسار	cylinder	اسطوانہ
Refractive Index	انکسار نما	Osculating circle	لشی دائرہ
Retrograde	رجعی	Oval	بیض
Rolling	راہلنے	Paraboloid	مکافی نما
curves	غلطان منحنی	Parameter	متبدل
Roulette	گردونیہ	Partial	جسہ روی
Screw-thread	پیچ تاکا	Pericycloid	گرد تدویر
Semi-cubical	نیم کعبی	Period	دور
parabola	مکافی	Phase	ہیئت
Space centreode	فضائی مرکز طریق	Piston	فشادہ
Space Integral	مکافی محمولہ	Pivot	چول
Spandril	کمان شانہ	Planimeter	سطح پیم

Tractrix	خط تجری	Spheroid	کرہ نما
Trajectory	خط رمی	Spiral	لولبی
Transcendental	ماورائی	Stationary	اچل، بقیع
Trapezium	منحرف	Steam Engine	بھاپ انجن
Trochoid	استداری خط	Surface of revolution	گردشی سطح
Undulation	موج	Tension	تشداد
Vector	سمتی	Tidal clock	موج گھڑی
Witch of Agnesi	اگنسی کی ڈائین	Time integral	زمانی تکملہ

اشاریہ

اعلام صغریٰ کے لحاظ سے

- اچیل ٹاس، ۴۵۷
 اچیل نقطہ، ۴۵۷
 ارشمیدس کا لولب، ۴۱۲
 استدارای خط، ۴۰۵
 استدقاق، محدود و تکملہ کا، ۲۸۳
 انتقالیت (ہٹاؤ)، مستوی شکل کی، ۴۸۸، ۵۰۱
 انحناء، ۴۵۴، ۴۶۴، ۴۶۸
 اوسط قیمت کا مسئلہ، ۲۸۸
 اوسط قیمتیں، ۳۵۷
 اوسط مرکز، ہندسی اشکال کا، ۳۶۰
 ایملر کا سطح پیا، ۳۲۹
 براستدارای، ۴۱۰
 برچہ پیم، ۴۷۸، ۴۸۳
 برتدویر، ۴۷۷، ۴۵۹، ۴۸۲، ۴۹۵، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۴
 بردورے، ۴۱۶، ۵۰۳
 برنولی کا چشمہ منحنی، ۴۲۵، ۴۲۹

- پائیں منحنی، ۴۳۲
 پوتیلے کا رابطہ، ۴۳۰
 پیپس کے مسئلے، ۳۶۴
 تبدیلی، متغیر کی، ۲۳۵، ۲۹۸
 تحول، ضابطے، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۹۸
 تربیع، تقریبی، ۳۵۳
 تفرق، محدود، مسئلہ کا، ۲۸۹
 تقریبی، مثلث، ۳۵۳
 تقابیل، ۴۲۹، ۴۳۰
 مثلث، ۲۲۱
 با محصص، ۲۴۱
 ابدال سے، ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۴۰
 غیر منطبق تفاعلوں کا، ۲۳۲، ۲۵۷
 منطبق کسروں کا، ۲۲۸، ۲۴۸، ۲۵۱، ۲۵۳
 مثلثی تفاعلوں کا، ۲۳۸، ۲۹۸
 مثلے، محدود، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۱، ۳۰۲
 تقریبی قیمت، ۳۵۳
 ضعیفی، ۳۶۸
 چار سطحی، اسکا حجم، ۳۳۵
 شمشہ منحنی، برزولی کا، ۴۲۵، ۴۲۹
 چلیبی متوازی الاضلاع، ۴۳۲
 حجم، مجسموں کے، ۳۳۲، ۳۳۴، ۳۳۶، ۳۶۹
 خط تدویر، ۴۰۳، ۴۵۸، ۴۸۱، ۴۸۶، ۴۹۵، ۴۹۹، ۵۰۱
 خط جبری، ۳۹۹
 خط گردو نیہ، ۴۹۹

- دائرہ کا درجہ ، ۴۱۱ ، ۴۸۷
 دراستداری ، ۴۱۰
 دریچے ، ۴۸۶
 درندویر ، ۴۰۷ ، ۴۰۸
 دو قطبی متحد ، ۴۳۷
 ذاتی مساوات ، منحنی کی ، ۴۵۸
 رقبہ ، ۲۰۱ ، ۳۱۷
 اس کی علامت ، ۳۲۱
 جو ایک متحرک خط عبور کرے ، ۳۲۷
 رقبہ ، مستوی منحنیوں کے ، ۳۱۷ ، ۳۱۸ ، ۳۲۴
 اسکی آلی پیمائش ، ۳۲۹
 زاوہ ، ۳۱۹ ، ۴۲۸ ، ۴۲۹
 زنجیرہ ، ۳۴۳ ، ۳۹۷ ، ۴۵۸ ، ۴۶۳
 ستارہ نما ، ۴۱۶ ، ۴۹۳
 سطح پیا ، ۳۲۹
 سپین کے قاعدے ، ۳۴۱ ، ۳۵۶
 صنوبری (خط) ، ۴۱۳
 ضعفی کھلے ، ۳۶۸
 عقدہ ، ۳۹۰
 عقدوں کا طریقہ ، ۴۷۸
 علامت رقبہ کی ، ۳۲۱
 فوری مرکز ، ۴۸۸ ، ۴۹۴ ، ۵۰۱
 قرون کا دائرہ ، ۵۰۱
 قطبی ، متکافی ، ۴۳۲
 قوس (منحنی کی) ، ضابطے ، ۳۴۴ ، ۳۴۵ ، ۳۴۶ ، ۳۴۷

- قیمت '۳۵۷ کی
 کارٹینزی بیضہ '۳۳۹
 کرہ 'اسکی سطح' ۳۵۱
 اس کا حجم '۳۳۶
 کردی قطعہ 'اس کا حجم' ۳۳۶
 کعبی مخنیات '۳۹۱
 کوش کا طریقہ 'تقریری شکل' کا '۳۵۴
 کیسینی کے بیضے '۳۲۰
 گردیدہ دورہ '۳۰۷' ۳۰۹
 گردشی سطح 'اس کا رقبہ' ۳۴۹
 اس کا اوسط مرکز '۳۶۲
 گردونے '۳۹۳' ۳۹۵' ۳۹۹
 گونگا مخنی '۴۱۴' ۴۲۳
 لشی دائرہ '۴۶۸
 لفافہ '۴۷۰' ۴۷۵
 لنگر جملہ '۳۳۷
 لولبی 'مسادی الزاویہ' ۴۲۱' ۴۶۰
 ارشمیدس کا '۴۱۲
 مشکانی '۴۲۳
 لیسا زو کا مخنی '۴۰۰
 تغیر کی تبدیلی 'شکل' میں '۲۳۵' ۲۴۰
 مشکانی قطبی '۴۳۲
 مشکانی لولب '۴۲۳
 متوازی مخنی '۴۸۶
 مخروط 'قائم مستدیر' ۳۴۱' ۳۴۹' ۳۶۳

مرکز خط ۵۰۱

مزدوج نقطه ۳۹۰

مسادوی (الزادیه لوبی) ۴۲۱، ۴۶۰

مقناطیسی ۴۲۱

مکانی ۲۴۵، ۳۲۰، ۳۳۳، ۳۶۲، ۴۲۴، ۴۵۹، ۴۶۳، ۴۶۶

۴۶۹، ۴۷۴

مکانی نام ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۶۳

ماسی قطبی مسادات ۴۲۶

ناقص ۳۱۹، ۳۲۷، ۳۴۶، ۴۲۹، ۴۵۹، ۴۶۶، ۴۸۰، ۴۸۵

۴۹۰، ۵۰۳

ناقص نام ۳۳۸، ۳۶۳

گردشی، اسکی سطح ۳۵۲

ناقصی شکل ۳۴۷

نقطه گردونه ۴۹۳، ۴۹۵

نیم کبی مکانی ۲۹۴

نیون کاطریقه، انحناء پر بحث کر نیکا ۴۶۴

بارش کارابطه ۴۳۲

