

VI A

A Treatise on Hydromechanics Pt. I Hydrostatics

by

W H BISANT & A S RAMSEY

ہاسکویات

ترجمہ

• واولی محمد بدیر الدین، ایم۔ اے۔

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_188182

UNIVERSAL
LIBRARY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ماسکونیات

تصنیف

ڈبلیو۔ ایچ۔ بسینٹ ایس۔ سی۔ ڈی، ایف۔ آر۔ ایس

و

اے۔ ایس۔ ریفرے، ایم۔ اے

مترجمہ

محمد زید الدین، ایم۔ اے (عثمانیہ)

رکن دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ سرکار علی

۳۲۹ھ ۳۲۰ھ ۱۹۳۱ء

طبع دارالترجمہ عثمانیہ سرکار علی

فہرست اغلاط

نوٹ :- مطالعہ سے قبل ان غلطیوں کی تصحیح فرمائیجئے۔

صفحہ	غلط	صفحہ	سطر	صفحہ	صحیح	صفحہ	سطر
۱	۳۲	۱۶	۱۲	۱۶	پانی	۳۲	۱۶
۲	۱۳۲	۱۸	۸	۱۸	جزی	۱۳۲	۱۸
۳	۲۱	۱۱	۱۱	۱۱	اور پارہ	۲۱	۱۱
۴	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	زیر	۲۱	۲۱
۵	۱۹	۲۴	۶	۲۴	ہونگی	۱۹	۲۴
۶	۱۸	۲۵	۱۳	۲۵	ق و ب	۱۸	۲۵
۷	۲۱	۱۸	۱۸	۱۸	س ٹ	۲۱	۱۸
۸	۱۰	۳۰	۸	۳۰	سے گزرنے	۱۰	۳۰
۹	۴	۱۲	۱۲	۱۲	ح	۴	۱۲
۱۰	۱۵	۳۲	۹	۳۲	پیش	۱۵	۳۲
۱۱	۱۱	۲۰	۲۰	۲۰	پیش	۱۱	۲۰
۱۲	۱۹	۳۳	۶	۳۳	جزو	۱۹	۳۳
۱۳	۴	۱۸	۱۸	۱۸	فشارے	۴	۱۸
۱۴	۶	۲۰	۲۰	۲۰	اکائی	۶	۲۰
۱۵	۲	۳۶	۲	۳۶	اسراع	۲	۳۶
۱۶	۱۳	۱۱	۱۱	۱۱	کچھ	۱۳	۱۱
۱۷	۲۲	۳۶	۲۰	۳۶	حجم	۲۲	۳۶
۱۸	۴	۲۲	۲۲	۲۲	متجانس	۴	۲۲
۱۹	۱۸	۳۸	۹	۳۸	(د+مف د) ع	۱۸	۳۸
۲۰	۶	۱۰	۱۰	۱۰	مکانی	۶	۱۰

صنفی	سطر	غلط	صحیح	صنفی	سطر	غلط	صحیح
۳۹	۶	ذن	ذن	۴۴	۲۱	حاصل بردن	حاصل ضربوں
۴۳	۵	عن	عن	۴۵	۹	شوت	برستد
۴	۱۵	کمزور	کمزور	۴۶	۲۰	ذن	ذن
۴	۱۴	ک	ک	۴۷	۱۱	یر	پر
۴	۱۹	-	(راہ ہے نکال دیا جائے)	۴۹	۰	و	و
۵۱	۲	ما	ما	۸۰	۱	ب (شکل میں)	ب (ج)
۵۲	۳	ج کی	ج کی	۸۱	۲	دوب	دوب
۵۳	۳	دوم	دوم	۸۲	۱۱	دووں زادوں	دو زائدوں
۵۴	۸	ما	ما	۸۳	۸	<	>
۵۵	۱۵	دائرہ ایک	دائرہ کا ایک	۸۴	۵	ت	ت
۵۶	۲	بہ جم ط	بہ جم ط	۸۵	۱۰	<	>
۵۷	۵	ب	ب	۸۶	۱۴	کثافت	کثافت
۵۸	۱۴	مانع میں	مانع ہیں	۸۷	۳	توازن	توازن
۵۹	۱	داؤ	داؤ	۸۸	۹	قانون	قانون
۶۰	۶	ج	ج	۸۹	۱۵	آدب	آدب
۶۱	۶	ر	ر	۹۰	۱۱	ہی	ہی
۶۲	۱۴	استوانہ	استوانہ	۹۱	۳	بوجب	بوجب
۶۳	۱۹	سیال	سیال	۹۲	۱۳	ھ، ھ	ھ، ھ
۶۴	۲۰	سیال	سیال	۹۳	۱۴	۱/۲ (۱/۲ + ۱/۲)	۱/۲ (۱/۲ + ۱/۲)
۶۵	۲۰	د	د	۹۴	۱۴	شکل	شکل
۶۶	۲۰	ے	ے	۹۵	۶	ق د ق	ق د ق
۶۷	۲۰	ے	ے	۹۶	۳	طر	دل

صفحہ	سطر	علاط	صحیح	تصحیف	سطر	غلط	صحیح
۸۹	۷	تیں	تین	۱۳۵	۱۴	و	و
۹۰	۴	ح	سح	۱۳۱	۱۱	ئی	ی
۹۱	۱۲	اُ	اُ	۹	۴	اور	اور
۹۲	۱۳	اکالی	اکالی	۱۳۳	۱۲	ترشوں	ترشوں
۹۳	۶	ع	ج	۱۱۵	۹	د	د
۹۴	۱۷	مخروطی	مخروط	۹	۱۹	د. م. م	الطی و م. م
۹۵	۲	ترزو	تیراو	۱۳۸	۴	ح	ح
۱۰۲	۲۰	ن ق	ن ق	۱۵۱	۳	ناند	ناند
۱۰۶	۱	قائیت کے	قائیت کی	۱۶	۱۵	۲	۲
۱۰۷	۹	نمبر	نمبر	۱۶	۲۲	پوری	پوری
۱۰۸	شکل	ل (ادھکا)	ل (ادھکا)	۱۶۸	۷	لی	لی
۱۰۹	۶	مناسب	مناسب	۱۶۹	۱۴	میر	میر
۱۱۰	۱۳	ع	ع	۱۷۰	۲	تین	تین
۱۱۱	۱۲	کے	کے	۱۷۱	۵	رکھ کر	رکھ کر
۱۲۰	۱۷	جب ط	جب ط	۱۷۲	۱۷	ت	ت
۱۲۶	۱	م	م	۱۷۶	۱۱	ج	ج
۱۲۷	۴	ی	ی	۱۸۰	۱	ج	ج
۱۲۹	۳	دج ل	دج ل	۱۸۱	۲۱	م	م
۱۳۰	۱۸	اد پروار	اد پروار	۱۸۲	۱۹	پر	پر
۱۳۱	۴	ثمر (دوسرا)	ثمر	۱۸۳	۱۱	جائے	جائے
۱۳۵	۱۱	ط	طا	۱۸۷	۲	پہننے	پہننے
۱۳۷	۱۱	ح ث	ح ث	۱۸۸	۱۹	کے	کے
۱۳۷	۴	ج	ج	۱۹۰	۸	ح	ح
۱۳۸	۲۱	لا	لا	۹	۱۱	ح	ح

صفحہ	سطر	فہرست	صحیح	صفحہ	سطر	فہرست	صحیح
۱۹۰	۱۹	ف : ۳	ف : ۳	۲۵۲	۳	و : جب : ف	و : جب : ف
۱۹۲	۱۸	۱ -	۱ -	۲۵۵	۹	۲ ت -	۲ ت =
۱۹۳	۱۸	م : ف : ۳	م : ف : ۳	۲۹۰	۴	ف : س : ف : س	ف : س : ف : س
۱۹۹	۱۸	(	(	"	۱۵	صفر	صفر
۲۰۵	۵	ح	ح	"	"	ف : س	ف : س
"	۱۳	رکھیکا	رکھیکا	۲۹۲	۲	ب : ج	ب : ج
۲۱۲	۱۵	مستدیر	مستدیر	۲۶۹	۴	+	-
۲۱۳	۱	و : ن : ن	و : ن : ن	۲۸۲	۱۴	تو	تب
"	۲	توتوں	توتوں	۲۸۶	۶	Darboux	Darbou
"	۲۵	جم : م : ف	جم : م : ف	۲۸۸	۹	Britannica	Britannica
۲۱۶	۸	ف - ا	ف - ا	۲۹۲	۳	Britannica	Britannica
"	۱۵	(	(	"	۶	Über die	über der
۲۱۵	۱	ب	ب	۲۹۹	۱	"	"
۲۲۱	۱۵	م : م -	م : م -	۳۰۳	۶	(: دریائی)	(: کلا : باجئے)
۲۲۲	شکل	س : م	س : م	۳۰۹	۱۳	(: لا + ۹)	(: لا + ۹)
۲۲۵	۳	میں سے	میں سے	۳۱۵	۱۲	نقل	نقل
۲۲۷	۲۰	جن : ا	جن : ا	۳۱۶	۱	اُس حرکت صرف	اُس حرکت صرف
۲۲۸	۱	جن : ا	جن : ا	"	۷	سال	سیال
۲۲۹	۸	ت : د : د	ت : د : د	۳۱۸	۱۷	منجمن	مینجمن
۲۳۱	۹	س : م	س : م	۳۲۲	۵	تر	تر
۲۳۲	۳	جن : ا	جن : ا				
۲۳۰	۵	-	-				
۲۵۰	۱	د	د				
۲۵۱	۱۶	د : م	د : م				

نوٹ :- صفحہ ۱۳ پر پہلی سطر کے بعد صوبے کی جگہ لکھا گیا ہے کہ کچھ
 "میز ف کے ہٹاؤ کی وجہ سے جسم کے وزن کے
 مساوی نقصان = (د : ف - ل - گ) ط "۔

فہرست مضامین ماسکونیات باب اول

صفحہ

۱

۱۰

دفعات

۱ - ۱۴ تعریف - دباؤ کا مساوی ہونا - دباؤ کا انتقال - کشاف کا ناپ
اشک

باب دوم

۱۳

۱۹

۲۸

۳۰

۳۲

۲۰ - ۱۵ توازن کی شرط
۲۱ - ۲۴ مساوی دباؤ کی سطحیں
۲۷ غیر متجانس مائع
۲۸ - ۲۹ مثالیں
۳۰ - ۳۲ گھومنے والے سیال

باب سوم

۳۳-۳۴ حاصل دباؤ۔ دباؤ کے مرکز

اشک

باب چہارم

۴۸-۵۵ تیرنے والے جسم کا توازن۔ اچھال کی سطح۔ توازن کے محل

۵۶-۶۴ خاص صورتوں میں اچھال کی سطحیں

اشک

باب پنجم

۶۵-۷۳ توازن کی قائمیت۔ پس مرکز

۷۴ ڈیوپن کا مسئلہ

۷۵ لیکرٹ کا مسئلہ

۷۶ بار میں اضافہ

۷۷ پیچ کا اثر جازبہ

۷۸-۷۹ اچھال کی سطح بالعموم

۸۰ تیرا دی سطح۔ لیکرٹ کا مسئلہ

۸۱ مثالیں

۸۲-۸۹ محدود ہشاؤ۔ قید کی صورتیں

۹۰-۹۲ غیر متجانس مائع

صفحہ

دفعات

۹۳-۱۰۵ توانائی کے حصول کا اطلاق

امثلہ

۱۳۳

۱۵۰

باب ہشتم

۱۰۶-۱۰۸ تیرنے والے اجسام کے اہم تر اثرات

امثلہ

۱۶۷

۱۷۳

باب ہفتم

۱۰۹-۱۱۱ کلیہ بائل - پیش مطلق

۱۱۲-۱۲۱ گیہوں کا آمیزہ - شبنم - حرارت نوعی

۱۲۲-۱۲۹ کرہ جوانی - ارتقا حوں کا معلوم کرنا

امثلہ

۱۷۸

۱۸۲

۱۹۰

۲۰۳

باب ہشتم

۱۳۰-۱۳۲ لاکم طلیں کا تناؤ

۱۳۳-۱۳۷ توبیہ اور لدنیہ

۱۳۸-۱۵۵ تناؤ اور دباؤ

امثلہ

۲۱۱

۲۱۳

۲۲۲

۲۳۱

باب نہم

۱۵۶-۱۵۹ استوار یا کچکد اور پتلا

۲۳۸

صفحہ

۲۵۲

۲۵۵

دفعات

۱۹۲-۱۹۰ توبہ

امثلہ

باب دہم

۲۵۷

۲۶۷

۲۷۲

۲۸۰

۲۸۱

۲۹۳

۱۹۹-۱۹۳ سطحی تناؤ - شعاری سختی

۱۷۱-۱۷۰ متوازی تختیاں

۱۷۲-۱۷۱ لٹنے کے قطرے

۱۷۵ تیرنے والی سوئی

۱۷۶-۱۸۵ مائع کی جھلیاں

امثلہ

باب یازدہم

۳۰۵

۳۱۷

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۳۲

۳۳۹

۱۸۶-۱۹۳ گھومنے والے لٹک کی بحیثیت کا اضافی توازن،

زمین کی شکل پر اطلاق

۱۹۳-۲۰۰ جیکوبی کا مسئلہ

۲۰۱ ناقصی اسطوانہ

۲۰۲ پروانکارے کا مسئلہ

۲۰۳ توازن کی اور شکلیں

امثلہ

متفرق مثالیں

ماسکونیات

باب اول

۱۔ ہم عام تجربہ سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ایسی اشیا میں جیسے ہوا اور پانی ہیں یہ خواص ہائے جاتے ہیں کہ ان کے مادہ کے حصے ایک دوسرے سے نہایت آسانی کے ساتھ علیحدہ نہیں جاسکتے ہیں اور بغیر پذیرگی کی ان میں انتہائی قابلیت ہے۔ ان خواص کی توضیح مختلف عام واقعات سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً سبال چیزیں باسانی ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں ایک سیال کی بہت کم مقدار کو دوسرے سیال کی بہت بڑی مقدار میں شامل کرنے سے انکو انتہائی طور پر لطیف بنایا جاسکتا ہے۔ ہوا پمپ کے ذریعہ ہوا کو بہت رفیق کیا جاسکتا ہے اور اسی طرح کے دوسرے واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمل طور پر سیال کی قیمت پذیرگی غیر محدود ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سیال کے حصول کو ایک دوسرے سے حد کر کے نہیں بہت ہی طویل مزاحمت محسوس ہوتی ہے۔ اور عام طور پر قابل نظر انداز۔ ان مشاہدات کی تفہیم سے خود بخود ہم ایسی شے کا خیال کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ خواص بدرجہ اتم موجود ہوں جو کم یا زیادہ ہر سیال عام میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم ذیل کے نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔

سیال کال کی تعریف

۲۔ سیال کال ایسے ذرات کا مجموعہ ہوتا ہے جو خفیف ترین قوت کے زیر عمل فوراً ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ایک لا انتہائی پلاسٹک اس قسم کے سیال کو کسی سمت میں تقسیم کرے تو اس عمل تقسیم میں کوئی مزاحمت وقوع پذیر نہ ہوگی

اور مستوی پر سیال کا دباؤ صرف عمودی سمت میں عمل کرے گا۔ یعنی سیال کامل میں لزوجیت معدوم فرض کی جاتی ہے اور مرکز کی قسم سے کوئی قوت عمل نہیں کرتی۔
اس طرح تعریف شدہ بالائے سیال کی بنیادی خاصیت حسب ذیل قرار پاتی ہے۔
سیال کامل کا دباؤ ہمیشہ اُس سطح پر عمود وار عمل کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا تماس ہو۔

دراصل کوئی سیال ایسا نہیں ہے کہ جس پر اعمال تقسیم یا تفصیل سے کم و بیش فرسخت محسوس نہ ہوتی ہو۔ لیکن جس طرح کہ استوار جسم پر معدوم قدرت کے ایسے اجسام سے حاصل ہوتا ہے مثلاً شکل میں ذرا سی تبدیلی بہت بڑی قوت کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح سیال کا کل کام معدوم ایسی چیزوں کے مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے جن میں یہ خاصیت ہو کہ ان کے اجزاء جیسا آسانی سے جدا ہو سکیں اور دیکھنے میں عمل تقسیم درجہ انہائی تک ہو سکے۔

تمام سیال خواہ ان کا درجہ لزوجیت کچھ ہی ہو ذیل کی تعریف میں آجاتے ہیں۔
سیال ایسے ذرات کا مجموعہ ہے جو خفیف ترین قوت کے اثر کو قبول کر لیتے ہیں۔
جہاں کے جدا کرنے میں کافی عرصہ تک لگائی جاتی۔

پس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ساکن لزج سیال میں ماسی تعامل یا جذبی مٹاؤ نہیں ہوتا۔ اور اس لئے سیال کامل کی طرح کسی ساکن سیال پر دباؤ ہمیشہ اُس سطح پر عمود وار عمل کرتا ہے جو سیال کو مس کرتی ہے۔ اس طرز تمام سیالوں کے لئے بال لحاظ لزوجیت، علم ساکن سیالات کے تمام مسائل درست ہیں۔

علم حرکت سیالات (ماہرکیات) میں سیال کی لزوجیت کے شامل کرنے سے حرکت کی مساواتیں بہت حد تک بدل جاتی ہیں۔

۳۔ سیالات کی دو قسمیں ہیں۔ مائع اور گیس۔ اول الذکر ایسی مائعات ہیں۔ جیسے پانی اور بارہ جو قابل فدر دب نہیں سکتیں جب تک کہ بہت بڑے دباؤ کے زیر عمل نہ ہوں۔ بخار اور جو آسانی سے دب سکتی ہیں اور آزادانہ طور پر پھیل سکتی ہیں۔
اس لئے بعض اوقات ہم قسم اول کے ریانات کو بے پچک اور قسم دوم کو لچکا کہیں گے۔

۴۔ سیالات پر جاذبہ ارض کا اثر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دیگر اجسام پر۔ مائع کی صورت میں قویہ ظاہر ہے اور یہ کہ ہوا بھی وزن رکھتی ہے ایک بند برتن کو حتی الامکان ہوا سے

خالی کر کے وزن کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے نیز جوار بھٹا کے وقوع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیالات برسوسنچ اور چاند کی کششیں اسی طرح عمل کرتی ہیں جس طرح کہ زمین کی کشش۔ ان واقعات کی بنا پر نیز اس طرح کے اور واقعات کی بنا پر مان لیا جاتا ہے کہ تمام قسم کے سیالات تانوں تجاذب کے تابع ہن۔ یعنی اس قانون کے بموجب وہ دوسری مادی اشیاء پر کشش کا عمل کرتے ہیں اور ان پر بھی ان مادی اشیاء کی کشش کا عمل ہوتا ہے۔

سیالی دباؤ کی پیمائش

۵۔ مرض کرو کہ کچھ سیالی ادھ بعض قوتوں کے زیر عمل ساکن ہے اور ایک مسنوی سطح سیال کے ساتھ تماس رکھتی ہے اور اس کے تحت پر جو سیال کا عمل ہے اس کے خلاف توازن پیدا کرنے کے لئے سطح پر قوت ق لگانی پڑتی ہے۔

اگر سیال کا عمل ا پر یکساں ہو تو ق سے سیالی دباؤ فی اکائی رقبہ تقریباً اگر دباؤ یکساں نہ ہو تو رقبہ کے ہر نقطہ پر اسکو متغیر خیال کیا جائیگا اور اگر ایک نقطہ کے گرد کے چھوٹے رقبہ پر قوت عمل کرے تو ق سے تقریباً دباؤ کی شرح رقبہ پر تعبیر ہوگی۔


اگر علو الانہام کر دیا جائے تو فرض کرو کہ انتہا میں $d =$ تب بطور تقریب کے اس د کو ہم نقطہ زیر بحث پر دباؤ کا پ قرار دینگے۔ دہ قوت ہوگی دو کوئی رقبہ پر لگائی جائیگی اگر اس اکائی رقبہ پر شرح دباؤ یکساں خیال کی جائے اور نقطہ زیر بحث پر کے دباؤ کے مساوی ہو پس اگر کسی نقطہ پر دباؤ د ہو تو اس کے گرد کے چھوٹے رقبہ پر قوت د $d =$ جبہ عمل کریگی جہاں جبہ انتہا میں د $d =$ کے مابلہ میں سفر ہو جاتا ہے جسکے عم (اور اسکی وجہ سے د $d =$ صفر ہو جائے۔

۶۔ ساکن سیال کے کسی نقطہ پر دباؤ ہر سمت میں وہی ہوتا ہے۔ سیال کے خواص میں یہ خاصیت سب سے اہم ہے اس کا ثبوت سیال کی بنیادی خاصیت سے حسب ذیل طریقہ سے ادا کیا جاسکتا ہے۔

اگر ہم سیال کے ایک چھوٹے ذوربعیہ السطوح کے توازن پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے رتبوں پر کے دباؤ اور اس کی کثیت پر کی قوت عالم لکڑ متوازن قوتوں کا ایک نظام پیدا کرتی ہیں۔

اول الذکر قوتیں رخوں کے رقبوں پر منحصر ہونے کی وجہ سے ایسے بیلٹی ہیں جیسے مجسم (جسکو ہڈیات یا استخوانیں فرض کیا گیا ہے) کے کنارے کا مربع اور ثنائی الذکر قوت جبر اور کشافیت پر پر منحصر ہونے کی وجہ ایسی بدلتی ہے جیسے مجسم کے کنارے کا مکعب۔ اور اس لئے اگر مجسم کو لا انتہا ٹکھٹا دیا جائے جیکہ اس کی شکل ہمیشہ متشابہ رہے تو موثر الذکر قوت بمقابلہ رخوں پر کے دباؤ کے معدوم ہو جاتی ہے۔ اور اس لئے یہ دباؤ خود متوازن قوتوں کا ایک نظام پیدا کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ رخوں $و ب ج$ اور $ب ج د$ پر کے دباؤ کی شرحیں علی الترتیب $د$ کے تعبیر ہوتی ہیں کنارے $و د$ کے متوازی ان قوتوں کو تحلیل کرو۔ تو چونکہ رقبہ $و ب ج$ اور $ب ج د$ کے ظل $و د$ پر کے علی القوا تم مستوی پر وہی ہیں (فرض کرو کہ ہر ایک $ع$ کے مساوی ہے)۔



$$\therefore د ع = د ع$$

$$\text{یعنی } د = د$$

اور اسی طرح یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ دوسرے دو رخوں پر کے دباؤ میں سے ہر ایک $د$ یا $د$ کے مساوی ہے۔


اب چونکہ دو درجۃ السطوح کے رخ کسی سمت میں لئے جاسکتے ہیں اس لئے کسی نقطہ پر کا دباؤ ہر سمت میں وہی ہوتا ہے۔

یہ مسئلہ اس وقت بھی درست رہتا ہے جبکہ سیال ہلچل رہے ہو۔ کیونکہ ڈی ایلمبرٹ کے اصول کے مطابق اگر موثر قوتوں کی سمت الٹ دی جائے تو یہ بیردنی یا عالمہ قوتوں کے ساتھ مل کر رخوں پر کے دباؤ کے ساتھ متوازن ہونگیں۔ اور موثر قوتیں اسی رتبہ کی چھوٹی مقداریں ہیں جس رتبہ کی عامل قوتیں اور اس لئے بمقابلہ دباؤں کے معدوم ہو جاتی ہیں۔
۷۔ مسئلہ بالا کا حسب ذیل ثبوت کو شبہ کی مثالوں سے لیا گیا ہے۔

فرض کرو کہ $ن$ اور $ق$ سیال میں ایک دوسرے سے محدوداً فصلے پر دو نقطے ہیں۔ محور $ن ق$ کے گرد ایک بہت چھوٹے نصف قطر کا اسطوانہ بناؤ۔ $ق$ میں سے ایک مستوی $ن ق$ کے علی القوا تم کھینچو اور $ن$ میں سے کوئی مستوی گزاریو اور $ن ق$ کی کیت کے توازن پر غور کرو۔

اس کے سرسوں پر کے دباؤ اور منحنی سطح کا دباؤ اور وہ سیر دنی قوتیں جو اس پر عمل کرتی ہیں ایک متوازن قوتوں کے نظام کو تعبیر کرتی ہیں۔

فرض کرو کہ دائرہ نقاط اور نیر کے دباؤ ہیں۔ اور اسطوانہ کی تراش ق کا رقبہ عہ اور تراش ن کا رقبہ عہ ہے۔



بخ ن پر کے دباؤ د عہ کو اگر اسطوانہ کے محور کے متوازی تحلیل کر بن تو جزو تحلیل د عہ کے مساوی ہے۔ اور اسلئے

د عہ - د عہ = فی ن کے متوازی قوت عالمہ کا جزو تحلیل نقطہ ن میں سے گزرنے والے مستوی کی سمت خواہ کچھ ہی ہو یہ قوت عالمہ جبکہ اسطوانہ کا نصف لا انتہا چھوٹا ہو بلا آخر اسطوانے کے حصے ق نیر کی قوت عالمہ کے مساوی ہو جاتی ہے جبکہ یہ حصہ ایسے مستوی کے ذریعہ کاٹا جائے جو نقطہ ن میں سے گزرے اور محور پر عمود ہو۔ پس قوت عالمہ ہے

$$ق ن س ن عہ فر لا$$


جہاں ک میں وہ قوت ہے جو سیالی ذرہ کی برتبط ق سے فاصلہ لا پر عمل کرتی ہے۔ اسلئے

$$د = د + ق ن س ن عہ فر لا$$

لہ حسب ذیل تشریح جوت کے اس حصہ کو مکمل کر دے گی۔

فرض کرو کہ دباؤ ب نقطہ پ میں سے گزرنے والے مستوی ہیں۔ ث، ق علی الترتیب ون و اہ بان ب کی اوسط کثافتیں ہیں، مں سیال کے ان حصوں پر عمل کرنے والی قوتوں کے اسراع ہیں۔

تو قی و ب اور قی و ب (جن کے حجم مساوی ہیں) پر عمل کرنے والی قوتوں کا فرق



$$= ون و اور بان ب پر عمل کر سالی قوتوں کا فرق$$

$$= (س ن - س ث) \times حجم ون و$$

$$= (س ن - س ث) \times \frac{4}{3} \pi r^3 \times (عہ تراش ق کا رقبہ ہے)$$

یعنی دَ نقطہ ن میں سے گد ر نیوالی مستویوں کے لئے مستقل ہے۔

سیالی دباؤ کا انتقال

اگر کسی ساکن مائع کی سطح پر یا اس کے کسی دوسرے حصہ پر دباؤ ڈالا جائے یا اس میں اضافہ کیا جائے تو یہ دباؤ یا اضافہ دباؤ مائع کے سب حصوں میں مساوی طور پر منتقل ہو جاتا ہے۔

سیالوں کی یہ خاصیت بالالاست تجرب کی بنا پر حاصل ہوئی اور اس طور پر بعض اوقات اسے مان لیا جاتا ہے لیکن ہم سیال کی تعریف سے اسکو اخذ کر سکتے ہیں۔

فرض کرو کہ ساکن مائع کی سطح میں ن کوئی نقطہ ہے اور سیال کے اندر ق کوئی دوسرا نقطہ ہے۔ خط مستقیم ق کے گرد ایک حجموں نصف قطر کا اسطوانہ بناؤ جو نقطہ ن پر کی سطح اور ق میں گزرنے والے اور ن ق پر علی القوائم مستوی سے محدود ہو۔

اگر نقطہ ن پر کے دباؤ کو بقدر د کے زیادہ کیا جائے اور اسطوانہ پر کی اضافہ شدہ قوت کو اس کے محور کی سمت میں تحلیل کیا جائے تو جزو تحلیلی د عدہ کے مساوی ہے جہاں د اسطوانہ کے محور پر علی القوائم مستوی تراش کا رقبہ ہے اس کے مساوی قوت د عدہ کو سمت ق ن میں نقطہ ق پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ مخفی سطح پر سیال کا دباؤ محور کے علی القوائم ہے اس لئے ق پر کا دباؤ بقدر د کے بڑھ جاتا ہے۔

اگر خط مستقیم ن ق پورے طور پر سیال کے اندر واقع ہو تو ن اور ق کو مختلف خطوط سے جو بالتمام سیال کے اندر ہوں ملایا جاسکتا ہے۔ اور پھر ثروت بالا کی تکرار سے ثابت ہو سکتا ہے کہ دباؤ د نقطہ ق پر بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے منتقل ہو جاتا ہے۔

بقیہ نوٹ صفحہ ۵۔ اور سئلے

$$d = \frac{2}{3} \times \text{مس ث فلا} + \frac{2}{3} \times \text{مف (س ث)}$$

قوتیں چونکہ مسلسل ہیں اس لئے آخری رقم مساوات کی دوسری ارقام کے مقابلہ میں مرکباً دوم خیال کیجاتی ہے اور اسئلے د مستقل ہے۔

۹۔ اس خاصیت کی بنا پر رائج کا مادہ مشین۔ کے طور پر قوت کی تضعیف کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بانی سے بھرے ہوئے بند برتن میں دو سوراخ کر دئے جائیں اور ان کو خوب پسکر آنے والے فشاروں کے اثر سے بند کر دیا جائے اور پھر اگر کوئی قوت Q ایک فشار سے پر لگائی جائے تو دوسرے فشار سے پر ایک ایسی قوت Q لگائی پڑے گی کہ نسبت Q : Q نسبت دباؤ کے مساوی ہو جاوے۔ کیونکہ رقبہ کے ہر نقطہ کے دباؤ میں اضافہ کی شرح رقبہ کے ہر نقطہ پر منتقل ہو جاتی ہے۔ اور اسلئے Q پر کی قوت اس کے رقبہ پر منحصر ہوتی ہے۔

ان دونوں فشاروں کا درمیانی عمل برہم کے متساوی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ Q کو بڑھا لے سے اور Q کو گھٹانے سے ہم نسبت Q : Q کو جتنا بڑھا جائے بڑھا سکتے ہیں۔

۱۰۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی سیال کا دباؤ اس کی کثافت اور تپش پر منحصر ہوتا ہے۔ نیز اسکی نوعیت پر۔ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اگر تپش مستقل رہے تو دباؤ اس فضا کے بالعکس متناسب ہوتا ہے جسکو سیال گھیرے ہوئے ہے یعنی دباؤ ایسے بدلتا ہے جیسے اس کی کثافت۔

اس قانون کو پہلے ہائل نے بیان کیا لیکن یہ اس عام قانون کے نتیجہ کے طور پر اخذ ہو سکتا ہے کہ گیسوں کے کسی آمیزے کا دباؤ جبکہ ان میں کیمیائی عمل نہ ہوتا ہو ایسے دباؤں کا مجموعہ ہوتا ہے جو گیس علیحدہ علیحدہ پیدا کرتی ہیں جبکہ ایک ایک کر کے جدا گانہ طور پر برتن کو ان سے بھرا جائے کیونکہ برتن میں گیس کی مقدار کو دو چند کرنے سے دباؤ بھی دو چند ہو جائیگا اور سیال کے مقدار میں کوئی اور اس قسم کی تبدیلی دباؤ میں اس طرح کی متناسب تبدیلی پیدا کر دیگی۔

اسلئے اگر کسی گیس سیال کی کچھ مقدار کی کثافت D ہو اور اس کا دباؤ d تو جب تک کہ تپش وہی رہے

$$D = d$$

جہاں D مستقل ہے جسکو تجربہ کے ذریعہ اس مخصوص سیال کے لئے کسی معلوم تپش پر معلوم کرنا ہوگا۔ اگر گیس کا حجم V ہو جبکہ اس کا دباؤ d ہے اور V جبکہ دباؤ d تو

$$Vd = C$$

لہذا جبکہ سیالی اتمات کی اس خاصیت کے عمل استعمال کی ایک ایسی مثال ہے۔

یعنی ح د معلوم نہیں پر مستقل ہے۔
 ۱۱۔ دباؤ کے چھوٹے اضافہ کو جزئی نسبت اُس کی بجائے (حجمی) پچک سے ہر جو اس قلیل اضافہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اُس سے سیال کی پچک کی پیمائش کی جاتی ہے۔
 اگر ح حجم ہو تو خفیف کبھی پچک - $\frac{ح}{د}$ ہوگی اور پچک کا ناپ

$$- \frac{ح}{د} = \frac{فرد}{فرد}$$

ہوگا۔ مستقل تناسب پر گیس کی صورت میں ح د مستقل ہوتا ہے اور

$$\therefore د + ح = \frac{فرد}{فرد}$$

اس طرح پچک کا ناپ وہی ہوا جو دباؤ کا ناپ ہے۔
 اگر پچک اور دباؤ میں ربط معلوم ہو تو حجم دباؤ اور حجم میں ربط معلوم کر سکتے ہیں۔
 مثلاً اگر ہم ایک ایسے سیال کے وجود کا تصور کر سکیں جس میں پچک دباؤ کی دو چند ہو تو ہمیں ربط

$$- \frac{ح}{د} = \frac{فرد}{فرد} = ۲$$

حاصل ہوتا ہے۔ جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ د ح مستقل ہے۔

وزن کیت اور کثافت کے پیمانے

۱۲۔ سیال کے وزن، کیت اور کثافت کے پیمائش اسی طرح کی جاتی ہے جیسے ٹھوس اجسام کی صورت میں۔

اگر کیت کے سیال کا وزن د ہو تو حسب معمول قرار د ا دوں کے مطابق جن سے کیت اور قوت کی اکائیاں معرض تعریف میں آتی ہیں

$$و = ک ج$$

اگر کیت کے سیال کی کثافت ث اور حجم ح ہو تو
 ک = $\frac{ث ح}{و}$

اور $\rho = \frac{C}{V}$

معیاری چیز کے لئے $\rho = 1$ اور اس لئے کثیت کی اکائی معیاری چیز کے اکائی حجم کی کثیت ہے اگر کثیت کی اکائی پونڈ ہو تو مساوات $\rho = \frac{C}{V}$ سے ظاہر ہے کہ ایک پونڈ پر جاؤ بہ ارض کا عمل قوت کی ج اکائیوں کے مساوی ہے۔ اس لئے قوت کی اکائی تقریباً نصف اونس کے وزن کے مساوی ہے اور اس کو پونڈ مل کہتے ہیں۔

۱۳۔ گزشتہ صفحات میں ایسے سیالوں پر غور نہیں کیا گیا جنکی کثافت متغیر ہوتی ہے لیکن سمجھنا آسان ہے کہ مائع کی کثیت کی کثافت مسلسل طور پر نقطہ بہ نقطہ متغیر ہوتی ہے۔ اور آئندہ معلوم ہو گا کہ ایک پگڈار سیال کی کثیت جو جاؤ بہ ارض کے زیر عمل ساکن ہے اور جس کے تمام جہہ میں تپش مستقل ہے لازماً غیر متجانس ہونی چاہیئے۔ اس لئے سیال کے کسی نقطہ پر کثافت کی پیمائش اس نقطہ پر جاؤ کی یا کسی مسلسل طور پر بدلنے والی مقدار کی پیمائش کی طرح ہونی چاہیئے۔

غیر متجانس سیال کے کسی نقطہ پر کثافت کی پیمائش

فرض کرو کہ ایک نقطہ کے گھیرنے والے کچھ سیال کا حجم C ہے اور کثیت ρ نیز فرض کرو کہ ρ ایک متجانس سیال کی کثافت ہے جسکے C حجم کی کثیت ρ ہے یا جبین

$$\rho C = W$$

تو ρ کو C حجم والے غیر متجانس سیال کے اس حصہ کی اوسط کثافت کہا جاسکتا ہے اور بالآخر جبکہ C لا انتہاکم کر دیا جائے مگر یہ ہمیشہ نقطہ کو گھیرے ہوئے ہے تو ρ کو اس نقطہ پر سیال کی کثافت کہا جاسکتا ہے۔

۱۴۔ گیس کے دبانے میں جو کام ہوتا ہے اسکو معلوم کرنا۔

فرض کرو کہ d بار گیس کا حجم C ہے۔ اور جس برتن میں گیس ہے اس کی سطح کا جز فرس اور سطح فرس کے اندر دار عماد کا جز d فرس ہے۔
تو چھوٹے پگڈار میں جو کام کیا گیا اس کی مقدار ہے

$$W = d \times C \times d \text{ فرس}$$

اور حجم C سے C میں دبانے کے لئے جو کام کیا گیا وہ

$$= - \text{کر دفرح} = - \text{کر م فرح} \text{ اگر } ح د = م$$

$$= م \text{ لوک } \frac{ح}{ح} = ح د \text{ لوک } \frac{ح}{ح}$$

اگر چیک برتن کے گرو کے ہوائی کرہ کے موجودگی میں وقوع پذیر ہوئی ہو مثلاً اگر ایک اسطوانہ میں فشار سے ذریعہ گیس بند کی گئی ہو تو ہوائی کرہ کا دباؤ پچک کے کام میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح اگر کرہ ہوائی کے دباؤ ۲۱ برابہائی حجم ہو تو حجم ح میں دبائے کے لئے بیرونی کام ہو گیا اور

$$= - \text{کر } (د - ۲۱) \text{ فرح} ، \text{ جہاں } ح د = ۲۱ ح$$

$$= ۲۱ ح \text{ لوک } \frac{ح}{ح} - (ح - ح) ۲۱$$

امثلہ

(ان مثالوں میں ج ۲ کے مساوی دیا گیا ہے جبکہ فٹ اور ثانیہ اکائیاں ہوں)
۱۔ مستطیل رقبہ ۱ ب ج د سیالی دباؤ کے زیر عمل ہے۔ ۱ ب ثابت خطہ مستقیم ہے۔ اور رقبہ پر کا دباؤ طول ب ج (لا) کا ایک دیا ہوا تفاعل (د) ہے ثابت کر د کہ ج د کے کسی نقطہ پر دباؤ $\frac{د}{د}$ ہے جہاں ۱ = ۱ ب۔

اگر ۱ ایک ثابت نقطہ ہو اور ۱ ب ، ۱ د کی سمتیں ثابت ہوں اور اگر ۱ ب = لا اور ۱ د = ما تو ج پر دباؤ = $\frac{فیر د}{فرلا فرما}$

۲۔ مساوات ۱ = ج ث ح میں اگر قوت کی اکائی ۱۰۰ پونڈ وزن طول کی اکائی ۲ فٹ اور دقت کی اکائی ۱۰ ثانیہ ہو تو پانی کی کثافت معلوم کرو۔

۳۔ اگر دقت کی اکائی ایک دقیقہ طول کی اکائی ایک گز ہو ، اور اگر معیاری شے کے ۱۵ مکعب انچ کا وزن ۲۵ اونس ہو تو قوت کی اکائی درجہ فٹ کرو۔

۴۔ مساوات ۱ = ج ث ح میں دقت کی اکائی میں ثانیوں کی تعداد طول کی اکائی میں فٹوں کی تعداد کے مساوی ہے۔ قوت کی اکائی ۵۰ پونڈ وزن ہے اور معیاری چمرے ایک مکعب فٹ کا وزن ۱۳۵۰۰ اونس ہے۔ دقت کی اکائی معلوم کرو۔

- ۵۔ رفتار کی اکائی ۴ فٹ فی ثانیہ ہے پانی معیاری چیز ہے اور قوت کی اکائی ۱۲۵ پونڈ وزن ہے۔ وقت اور طول کی اکائیاں معلوم کرو۔
- ۶۔ پانی کے ایک کعب فٹ کے وزن کو تعبیر کرنے والا عدد اس کے حجم کو ظاہر کرنے والے عدد کا $\frac{1}{16}$ اور اس کی کمیت کو ظاہر کرنے والے عدد کا $\frac{1}{8}$ سے اور اس کو ایک فٹ اٹھانے میں کئے گئے کام کو ظاہر کرنے والے عدد کا $\frac{1}{16}$ ہے۔ طول، کمیت اور وقت کی اکائیاں دریافت کرو۔
- ۷۔ اگر گرہ ہوائی کا دباؤ، دباؤ کی ایکائی، آواز کی رفتار، رفتار کی اکائی، اسراع، جاذبہ اسراع کی اکائی، ہوتو قوت کی اکائی تقریباً معلوم کرو۔
- ۸۔ اگر ۱ فٹ اور ۱ ثانیہ طول اور وقت کی اکائیاں ہوں اور پانی کی کثافت معیاری کثافت ہو تو ۱ اور ۱ میں ربط معلوم کرو کہ مساوات $W = J \times H$ سے کسی چیز کا وزن پونڈوں میں معلوم ہو سکے۔
- ۹۔ ۸ فٹ فی ثانیہ کی رفتار رفتار کی اکائی اور کرنے والے جسم کا اسراع اسراع کی اکائی اور ایک ٹن کمیت کی اکائی ہوتو پانی کی کثافت معلوم کرو۔
- ۱۰۔ کچھ مانع ایک مخروط میں جس کا محور انتصابی اور اس نیچے کی طرف سے ڈالا دیا گیا ہے۔ اس مانع کے کسی نقطہ پر کثافت سطح پر کی کثافت سے بقدر ایک ایسی مقدار کے بڑی ہے جو ایسے بدلتی ہے جیسے سطح سے نقطہ کی گہرائی۔ ثابت کرو کہ جب مانع کو لانے سے اس کی کثافت یکساں ہو جائے تو یہ کثافت اصلی حالت پر اس نقطہ پر کی کثافت کے مساوی ہے جس کی گہرائی مخروط کے محور کی ایک چوتھائی کے مساوی ہو۔
- ۱۱۔ کثافت والے مانع سے بھرے ہوئے برتن میں سے مانع کا $\frac{1}{16}$ حصہ نکال دیا گیا ہے اور اس کو نہ کثافت والے مانع سے بھر دیا گیا ہے۔ اگر اس عمل کو م مرتبہ دہرایا جائے تو برتن میں کے مانع کی کثافت معلوم کرو۔
- ۱۲۔ ایک برتن کا حجم H ہے۔ اس کو کثافت والے مانع سے بھر دیا گیا ہے۔ اگر نہ کثافت والے مانع کا حجم تقریباً فی صغیر قطروں میں اس کے اندر ٹپک جائے تو حاصل شدہ مانع کی کثافت معلوم کرو۔
- ۱۳۔ ایک مانع کی کثافت نقطہ ب نقطہ بدلتی ہے۔ ثابت کرو کہ ایک معلوم نقطہ میں سے

گورنے والی سمتوں میں سے اُس سمت میں کثافت زیادہ سے زیادہ سرعت سے بدلتی ہے جو اس نقطہ میں سے گزرنے والی یکساں کثافت والی سطح پر عماد ہو۔ نیز اس سطح کے ماسی مستوی میں جو سمتیں ہیں ان میں سے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کثافت کے تغیر والی سمتیں وہ ہیں جو صدری تراشوں کے ماسوں پر منطبق ہونی ہیں۔



باب دوم

سیالوں کے توازن کی شرطیں

۱۵۔ عام سے عام صورت میں فرض کرو کہ ایسے سیال کی کچھ کمیت جو بچک دار ہو یا بے بچک منجائس ہو یا غیر متجانس، دی ہوئی قوتوں کے زیر عمل ساکن ہے اور فرض کرو کہ توازن کی شرطیں اور کسی نقطہ پر کا دباؤ معلوم کرنا مطلوب ہے۔

فرض کرو کہ سیال کے کسی نقطہ n کے محدود علی القوائم محوروں کے لحاظ سے لا، مافی ہیں۔ اور q اس کے نزدیک ایک ایسا نقطہ ہے کہ n ق محور la کے متوازی ہے فرض کرو کہ $la + م$ لا، مافی نقطہ q کے محدود ہیں۔ n ق کے گرد ایک چھوٹا منشور یا اسطوانہ بناؤ جو n ق پر کی علی القوائم مستویوں سے محدود ہو۔

فرض کرو کہ اسطوانہ کی عمودی تراش کا رقبہ n نقطہ پر کا دباؤ d اور نقطہ q پر کا دباؤ $d + م$ ہے۔

اب چونکہ بہت چھوٹا ہے، اس لئے مستوی n پر کے کسی نقطہ پر دباؤ تقریباً d کے مساوی ہوگا اور اس لئے اسپر کا دباؤ

$(d + م) ع$

ہوگا جہاں $ج$ بمقابلہ d کے صفر ہو جاتا ہے جیکہ $ع$ کو لا انتہا کم کیا جائے اس لئے کہ $ع$ کو ہم اس قدر چھوٹا فرض کر سکتے ہیں کہ بمقابلہ d کے $ج$ نظر انداز ہو سنے۔ اور اسطوانہ کے $ن$ پر کا دباؤ $d + م$ کے مساوی لیا جاسکے۔ اور اسی طرح $ن$ ق پر کے دباؤ کو لے سکیں

$(d + م) د$

اگر اسطوانہ n ق کی اوسط کثافت $ث$ ہو تو اسکی کمیت = $ث ع م$ لا اور

لاٹ عہ معن لاسے وہ قوت تغیر ہوگی جو ن فی پراسکے محور کے متوازی عمل کرتی ہے
جہاں لا معن ک، ما معن ک، سے معن ک سیال کے ذرہ معن ک پر جو (لا، ما، ی)
پر واقع ہے عمل کرنیوالی قوتوں کے اجزائے تحلیل میں۔
اس لئے ن ق کے توازن کے لئے

$$(د + معن د) - د = لاٹ عہ معن لا$$

$$معن د = دٹ لا معن لا$$

انتہائی سے جبکہ معن لا اور اس لئے معن د لا انتہا کم کر دئے جائیں نقطہ ن پر کی
کشاف ت ہوگی اور ہمیں حاصل ہوگا

$$\frac{\text{جف د}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{ٹ}}{\text{ٹ لا}}$$

$$\frac{\text{جف د}}{\text{جف ما}} = \frac{\text{ٹ}}{\text{ٹ ما}}$$

$$\frac{\text{جف د}}{\text{جف ی}} = \frac{\text{ٹ}}{\text{ٹ ی}}$$

$$\text{لیکن فرد} = \frac{\text{جف د}}{\text{جف لا}} \text{فرلا} + \frac{\text{جف د}}{\text{جف ما}} \text{فرما} + \frac{\text{جف د}}{\text{جف ی}} \text{فری}$$

$$\therefore \text{فرد} = \text{ٹ} (\text{لا فرلا} + \text{ما فرما} + \text{ی فری}) \dots\dots\dots (ص)$$

اس مساوات سے دباؤ معلوم ہو جاتا ہے۔

۱۶۔ صرکھا دباؤ متبوع متغیروں لا، ما، ی کا تفاعل ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ

لے غرت بلا میں عہ اس قدر چھوٹا لیا گیا ہے کہ اس کے خطی ابعاد بمقابلہ معن لا کے نظر انداز کئے جاسکیں
یعنی لاکسی تبدیلی معن لا کے حساب میں دباؤ د میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس پر لا، ما، ی کے اس
بدلنے سے اثر نہیں پڑتا۔

$$\frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{د}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما جف}^{\text{ا}} \text{ی}} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{د}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی جف}^{\text{ا}} \text{ما}} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{د}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی جف}^{\text{ا}} \text{لا}} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{د}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما جف}^{\text{ا}} \text{لا}}$$

اس لئے گزشتہ مساواتوں سے ہمیں مندرجہ ذیل مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$(ب) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{د}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}} = (\text{ث} \text{ے}) \\ \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{د}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}} = (\text{ث} \text{لا}) \\ \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{د}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}} = (\text{ث} \text{ما}) \end{array} \right.$$

جن سے

$$\text{ے} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ث}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ث}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}} = \text{ث} \left(\frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ے}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}} \right)$$

$$\text{لا} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ث}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ث}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}} = \text{ث} \left(\frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ے}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}} \right)$$

$$\text{ما} = \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ث}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ث}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}} = \text{ث} \left(\frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}} \right)$$

لا، ما، ے سے ضرب دیکر جمع کرنے سے

$$\text{لا} \left(\frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ے}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}} \right) + \text{ما} \left(\frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ے}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ی}} \right) +$$

$$\text{ے} \left(\frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}} - \frac{\text{جف}^{\text{ا}} \text{ما}}{\text{جف}^{\text{ا}} \text{لا}} \right) = \dots \dots \dots (ج)$$

جو توازن کے لئے ضروری شرط ہے۔

اس مساوات کی ہندی تعبیر یہ ہے کہ قوت کے خطوط

$$\frac{\text{فرلا}}{\text{لا}} = \frac{\text{فرما}}{\text{ما}} = \frac{\text{فری}}{\text{ے}}$$

سطحوں کے ایک نظام سے علی التوا تم قطع ہو سکتے ہیں۔

۱۷۔ تیزانیات - اگر سیال متجانس اور بے پچک ہو تو لا + فرلا + ما + فرما + ے + فری

(۱۱۲)

پورے فرقہ ہونا چاہیئے تاکہ توازن ممکن ہو سکے۔

بالفاظ دیگر قوتوں کا نظام متخلف یا بقائی ہونا چاہیئے اور قوتوں کی تسبیح فرقہ متفاعل کے مکانی تغیرات سے ہونی چاہیئے۔

اگر وہ فرقہ متفاعل ہو تو

فرد = - ث + فر

اس لئے $\frac{\text{ف}}{\text{ث}} + \frac{\text{فر}}{\text{ف}} = \text{م (مستقل)}$

مثلاً اگر قوتیں ثابت مرکزوں کی طرف یا ان کے باہر وار عمل کر نیوالی ہوں اور وہ ان مرکزوں کے فاصلوں کی متفاعل ہوں تو

$$\left\{ \frac{\text{ف}}{\text{لا}} \right\} = \text{ما} = \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{لا}} \right\} \quad \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{ما}} \right\} = \text{ے} = \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{ے}} \right\}$$

جہاں (ا، ب، ج) اس مرکز کے محدود ہیں جہاں قوت ف (ر) مائل ہے۔

اب $\frac{\text{ف}}{\text{لا}} = \frac{\text{ف}}{\text{لا}} + \frac{\text{ف}}{\text{ما}} + \frac{\text{ف}}{\text{ے}} + \frac{\text{ف}}{\text{فر}}$

لا + فرلا + ما + فرما + ے + فری = ث + فر

اور فرد = ث + فر

اس صورت میں چونکہ

$$\left\{ \frac{\text{ف}}{\text{لا}} \right\} = \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{لا}} \right\} + \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{ما}} \right\} + \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{ے}} \right\} + \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{فر}} \right\}$$

$$\left\{ \frac{\text{ف}}{\text{ما}} \right\} = \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{ما}} \right\} + \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{ے}} \right\} + \left\{ \frac{\text{ف}}{\text{فر}} \right\}$$

اس لئے یہ ظاہر ہے کہ مساوات (ب) ہمیشہ پوری ہوتی ہے لیکن اس سے نتیجہ نہیں نکالنا چاہیئے کہ اس طرح کی قوتوں کے زیر عمل غیر متجانس سیال کا توازن بھی ہمیشہ ممکن ہوتا ہے۔ جب کثافت مستقل ہو تو (ب) مساواتیں ہو جاتی ہیں

$$\frac{\text{جف مے}}{\text{جف م}} = \frac{\text{جف م}}{\text{جف ی}} = \frac{\text{جف لا}}{\text{جف ی}} = \frac{\text{جف مے}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{جف م}}{\text{جف لا}}$$

اور اسی لئے اس صورت میں ہمیشہ پوری ہوتی ہیں اس لئے اس قسم کی قوتوں کے زیر عمل ایک متجانس سیال کا توازن ہمیشہ ممکن ہے۔

۱۸۔ غیر متجانس سیال اگر قانون کثافت معلوم ہو یعنی 'ٹ اگر لا'، 'م' کا دیا ہو تفاعل ہو تو (ب) مساواتیں وہ شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے کہ دی ہوئی قوتیں لا مائے سیال کو توازن میں رکھ سکیں۔

۱۹۔ لچکدار سیال :- اگر سیال لچکدار ہو تو ایک اور شرط کا اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ

$$د = م \cdot \tau \quad \text{اگر تپش مستقل ہو}$$

$$\therefore \frac{ف}{د} = \frac{1}{م} \quad (\text{لا فرما} + \text{ما فرما} + \text{مے فری}). \quad (د)$$

اگر قوتیں توہ ذ سے حاصل ہو سکیں یعنی اگر

$$\text{لا فرما} + \text{ما فرما} + \text{مے فری}$$

پورا فرقہ (- فرہ) ہو تو

$$م = \frac{ف}{د} = - \text{فرہ}$$

$$\therefore \text{م لوک} = \frac{د}{ج} = - \text{ف} \quad \text{جہاں ج مستقل ہے۔}$$

$$\text{یعنی } د = ج \cdot \text{قوئم} \text{ اور } \tau = \frac{ج}{م} \cdot \text{قوئم}$$

جب قوتیں ثابت مرکزوں کی طرف مائل ہوں اور فاصلوں کے تفاعل ہوں (دفعہ ۱۷) تو یہ مساوات یہ شکل

$$م \frac{ف}{د} = ح ذ (ر) فر$$

اعتیار کرتی ہے اور دکاتین ہو سکتا ہے۔
اگر پیش متغیر ہو تو دباؤ، پیش اور کثافت میں یہ ربط

د = م ث (۱ + ع ت)
ہوتا ہے جہاں پیش ت سہی پیش پیاسے ناپی گئی ہے اور ع = ۳۶۵ ۰۰ ۰ و
اس سے ہیں حاصل ہوگا

$$د = م ث ع \left\{ \frac{۱}{ع} + ت \right\} = ح ر ث ت$$

جہاں ح = م ع ، اور ت = $\frac{۱}{ع} + ت$ ، ت کو پیش مطلق کہتے ہیں
جس کا صفر ۰۲۰۳ مئی پڑتا ہے۔

$$اس صورت میں \frac{ف}{د} = لا فرا + ما فرما + ع فری$$

ح ر ت

اور اس لئے ت تفاعل ہونا چاہیے لا، ما، ی کا۔
ان میں سے کسی صورت میں اگر کسی خاص نقطہ پر کا دباؤ دیا جائے تو مستقل دریافت
ہو سکتا ہے۔

پچکارسیالوں کی صورت میں اگر سیال کی کیفیت اور وہ جگہ جس میں بمحدود ہے معلوم ہوں
تو مستقل معلوم ہو جاتا ہے۔

۲۰۔ د دریافت کرنے کی مسادات طریقہ ذیل سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔
فرض کرو کہ ن ق ایک بہت چھوٹے اسطوانہ کا محور ہے جو ن ق پر کے علی التعمیم
مستویوں سے گھرا ہوا ہے۔

فرض کرو کہ دائرہ د + مع د نقاط ن اور ق پر کے دباؤ ہیں۔ سطحی تراش
کا رقبہ ہے اور مع سم، ن ق کا طول ہے اب اگر سمت ن ق میں ذرہ د ت ک
پر عمل کر نیوالی قوتوں کا جزو تحلیل میں مع ک ہو تو

$$(د + مع د) - د = ث + مع س مع س$$

اور اس لئے انتہا لینے سے

$$فرد = ث س فرس$$

یعنی کسی سمت میں دباؤ کے اضافہ کی شرح دو مقداروں کا حاصل ضرب ہے۔ ایک مقدار کثافت ہے اور دوسری مقدار قوت کا وہ جزو تخیلی ہے جو اس سمت میں عمل کرتا ہے۔ اگر نقطہ ن کے محدود لا، ما، ی اور س کے اجزائے تخیلی محوروں کی سمت ہیں لا، ما، ی ہوں تو

$$س = لا فرس + ما فرس + ی فرس$$

اور $\therefore$ فرد = ث (لا فرس + ما فرس + ی فرس) بموجب دفعہ ۱۵ اگر نقطہ ن کا مقام اسطوانی محدودوں (ر، ط، ی کے لحاظ سے دیا جائے اور اگر قوت س کے اجزائے تخیلی ر، ط، ی کی سمتوں میں ق، ت، ی ہوں تو

$$س = ق فرس + ت فرس + ی فرس$$

اور د کی مساوات ہو جاتی ہے

$$فرد = ث (ق فرس + ت فرس + ی فرس)$$

پھر اگر ن کا مقام قطبی محدودوں (ر، ط، ا، ن) کے لحاظ سے دیا جائے اور قوت کے اجزائے تخیلی س، ا، ن، ت ہوں جو علی الترتیب ر کی سمت میں زاویہ ط، دالے مستوی کے عمود کی سمت میں اور اس مستوی میں ر پر کے عمود کی سمت میں تحلیل کئے گئے ہیں تو معلوم ہوگا کہ

$$فرد = س فرس + ر ج ب ط فرد + ت فرس$$

اسی طرح فرد کے لئے جگہ کسی اور محدودوں کے نظام میں معلوم ہو سکتا ہے۔ ۲۱ - مساوی دباؤ کی سطحیں۔ تمام صورتوں میں جن میں کہ سیال کا توازن ممکن ہو سکے سے حاصل ہوگا

$$د = ف (لا، ما، ی)$$

اگر مستقل ہو تو $ف (لا، ما، ی) = د$ (۱)

جو ایسی سطح کی مساوات ہے جس کے تمام نقطوں پر دباؤ مستقل ہے اور جس میں دو مختلف قیمتیں دینے سے سادی دباؤ کی سطحوں کا ایک سلسلہ ملتا ہے۔ نیز د کو سیال کے بیرونی دباؤ کے مساوی رکھنے سے بیرونی سطح یا آزاد سطح حاصل ہوتی ہے۔

اگر بیرونی دباؤ صفر ہو تو آزاد سطح ہوگی

$ف (لا، ما، ی) = ۰$

مقادیر

$$\frac{\text{جف ف}}{\text{جف لا}}, \frac{\text{جف ف}}{\text{جف ما}}, \frac{\text{جف ف}}{\text{جف ی}}$$

جو سطح (۱) کے نقطہ (لا، ما، ی) پر کے عماد کی سمتی جیوب التمام کے تناسب ہیں با ترتیب

$$\frac{\text{جف د}}{\text{جف لا}}, \frac{\text{جف د}}{\text{جف ما}}, \frac{\text{جف د}}{\text{جف ی}}$$

کے مساوی ہیں یعنی $ث لا، ث ما، ث ی$ کے مساوی ہیں اور اس لئے $لا، ما، ی$ کے متناسب ہیں۔

اس لئے کسی نقطہ پر کی حاصل قوت اس عماد کی سمت میں عمل کرتی ہے جو اس نقطہ میں سے گزرنے والی سادی دباؤ کی سطح پر اس نقطہ میں سے کھینچا گیا ہے۔

اس لئے سادی دباؤ کی سطحیں وہ ہیں جو قوت کے خطوط کو علی التوائم قطع کرتی ہیں۔

اس نتیجہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ توازن کے لئے ضروری شرائط ایسی سطحوں کے نظام کا

وجود ہے جو خطوط قوت کو علی التوائم قطع کرتی ہیں۔ یہ نتیجہ ذمہ (۱۶) کی مساوات (ج) سے بھی حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کے نظام کے وجود کے لئے مساوات مذکورہ ضروری تحلیلی شرط ہے۔

۲۲۔ اگر سیال متجانس بالغ ہو یعنی اگر $ث$ مستقل ہو تو $لا، فر لا + ما، فر ما + ی، فر ی$ پورا تقریباً ہونا چاہیے۔ یا بالفاظ دیگر قوتوں کا نظام مقنطی یا بقائی ہونا چاہیے۔

عام صورت میں اگر قوتوں کا نظام بقائی ہو تو $ث$ کو لازماً قوت $د$ کا تفاعل ہونا چاہیے

کیونکہ $فرد = ث$ فرقہ اور فرد پورا فرقہ ہے۔ اسلئے $ث$ کو قوہ کا تفاعل ہونا چاہیئے۔ اس طرح $ف$ اور اس لئے $ث$ کے تفاعل ہیں اور مساوی دباؤ کی سطحیں مساوی قوہ کی سطحیں بھی ہیں اور مساوی کثافت کی سطحیں بھی۔
اگر سیال یکساں ہو اور ہمیشہ متغیر قوہ

$$\frac{فرد}{د} = \frac{ث}{ث}$$

اس طرح، اسی قسم کے عمل استدلال سے، $ث$ کا تفاعل ہے اور مساوی دباؤ کی سطحیں مساوی کثافت کی سطحیں بھی ہیں۔
لیکن اگر $لا$ فلا + ما فرما + مے فری پورا فرقہ نہ ہو تو یہ سطحیں عام طور پر منطبق نہیں ہوتیں۔
فرض کرو کہ سیال غیر متجانس اور بے پیمائش ہے تو مساوی دباؤ کی اور مساوی کثافت کی سطحیں حسب ذیل مساواتوں سے حاصل ہوتی ہیں

۱۵۔ یہ نتیجہ طرہ ذیل سے بھی مستط ہو سکتے ہیں۔

قریب کی دو مساوی دباؤ کی سطحوں پر غور کرو۔ جن کے درمیان سیال کی ایک تہ ہے اور فرض کرو کہ ایک سطح کے نقطہ $ن$ کے گرا ایک جھوٹا ۱۰ اڑہ بنایا گیا ہے اور اس کے محیط میں سے گزرنے والے عمادوں سے سیال کا کچھ حصہ علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ سیال کا یہ حصہ قوت عاملان کے سرور اور محیط پر کے دباؤ کے زیر عمل ساکن ہے اب چونکہ تقریباً یہ بہت جھوٹا اسطوانہ ہے اور اس کے محیط پر کے تمام نقطوں پر دباؤ مساوی ہے۔ اس لئے دونوں رحوں پر کے دباؤں کا فرق قوت عاملہ کی وجہ سے پیدا ہونا چاہیئے جو اس لئے اس سمت میں عمل کر رہی ہے جس سمت میں کہ یہ دباؤ عمل کرتے ہیں یعنی نفعوں پر کے عماد کی سمت ہیں۔

اگر تو میں ایک قوہ سے حاصل ہو سکیں تو حاصل قوت ہم قوہ سطحوں کے علی التوا اٹھ ہوگی اور اس لئے مساوی دباؤ کی سطحیں ہم قوہ سطحوں پر منطبق ہوگی۔

پھر اس عمودی اسطوانہ کے قوت وزن پر غور کرنے سے عمل کریمانی قوت لی کا کی کیت۔
اور چونکہ اس منفرک کیت بالراست اس فاصلہ کے متناسب ہے اس لئے کثافت مستقل ہونی چاہیئے یہی مساوی دباؤ کی سطحیں مساوی کثافت کی سطحیں بھی ہوتی ہیں۔

فرد = . فرٹ = .

یعنی لا فرلا + ما فرما + عے فری = .

جفٹ لا فرلا + جفٹ ما فرما + جفٹ ہی فری = ... (ب)

اس لئے یہ ایسی سطحوں کی تفرقی مساواتیں ہیں جو اپنے باہمی تقاطع سے مساوی دباؤ اور مساوی کثافت کے مائعوں کا تعین کرتی ہیں۔

(ب) سے ہمیں مائل ہوگا

$$\frac{\text{فرلا}}{\text{جفٹ لا}} = \frac{\text{فرما}}{\text{جفٹ ما}} = \frac{\text{فری}}{\text{جفٹ ہی}}$$

..... (ج)

لیکن شرائط توازن سے

$$\frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} + \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} = \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} + \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}}$$

$$\frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} + \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} = \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} + \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}}$$

$$\frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} + \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} = \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}} + \frac{\text{جفٹ لا}}{\text{جفٹ ما}}$$

اور اس لئے مساواتیں (ج) ہو جاتی ہیں

$$\frac{\text{فرلا}}{\text{جفٹ لا}} = \frac{\text{فرما}}{\text{جفٹ ما}} = \frac{\text{فری}}{\text{جفٹ ہی}}$$

... (د)

جو مساوی دباؤ اور مساوی کثافت کے مائعوں کی تفرقی مساواتیں ہیں۔

۲۳ — اب ہم ایک محدود کمیت کے سیال کے توازن پر غور کرنے سے یہ بتائیں گے کہ

ہم نے شکل (۲) کی سیاریوں والی مساواتوں کو ابھی تک استعمال نہیں کیا لیکن ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بھی مساواتوں (۵) سے پوری ہوتی ہیں۔ مثلاً

$$\text{ااااا جف د} \text{ فر لا فرما فری}$$

پر غور کرو۔ اگر ہم اسی منشور پر پہلے کی طرح مکمل کریں اور اس کا خیال رکھیں کہ منشور پر مستقل ہے تو ہمیں حدود ن، اور ن، ن، اور ن، ن وغیرہ کے درمیان تکمیل کرنے سے حاصل ہوگا

$$\text{ااااا د فرما فری}$$

اور اوپر کی طرح یہ ااااا دل ما فرس کے مساوی ہے جس میں پوری سطح پر تکمیل لیا گیا ہے۔ یعنی مساوات (۴) اس حالت میں بھی درست رہتی ہے جبکہ ہم تکمیل میں (ا یا ی) جزو ضربی کے طور پر مساوات کی طرف میں شامل کر دیں۔ اسی طرح کے استدلال سے حاصل ہوتا ہے کہ

$$\text{ااااا د (ن-ما-م ی) فرس} = \text{ااااا (جف د-ی جف د)} \text{ فر لا فرما فری}$$

اور مساوات (۵) سے اندراج کرنے سے یہ ہو جاتا ہے

$$\text{ااااا ث (اے-ی ما)} \text{ فر لا فرما فری}$$

اس طرح (۲) کی تصدیق ہوتی ہے۔

یہ یاد رہے کہ چونکہ سیال کامل، فرضی یا جذبی زور کی مزاحمت کے ناقابل ہونا ہے اس لئے اس قسم کے زور متوازن سیال کی کیفیت کے اندر نہیں پائے جاسکتے۔ اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محوروں کے گریسیارے سے جو مساواتیں حاصل ہوتی ہیں وہ لازماً پوری ہونی چاہئیں جسکے محوروں کے متوازی قوتوں کو تسلیل کرنے سے حاصل شدہ مساواتیں پوری ہوں۔ کیونکہ توازن کی صورت میں سوخا لڈکر مساواتیں سیال کے کسی محدود یا صغیر جز کے لئے درست ہوتی ہیں اور قوتوں کے اسی توازن سے لازم آتا ہے کہ سیاریوں کی مساواتیں بھی درست ہوں۔

۴۴۔ سیال کے کردی غصفر کے توازن پر غور کرنے سے ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ

ث (لا فرلا + ما فرما + مے فری) کو برا تقرقہ ہونا چاہیئے۔

کیونکہ اس عنصر کی سطح پر کے سیالی دباؤ تمام کے تمام مرکز کی سمت میں عمل کرتے ہیں اور اسلئے عمل کرنے والی قوتوں کا سمیاد مرکز کے گرد محدود ہونا چاہیئے۔
 فرض کر کہ مرکز کے محدود لا، ما، می اور اس پچھوٹے کرہ کے اندر کسی نقطہ کے محدود لا+ع، ما+ب، می+جہ ہیں۔

(۱۹)

اب چونکہ مرکز پر کی کثافت ٹ ہے اسلئے جلد ۳ فرم (ے۔ب۔ما۔جہ) ہو جاتا ہے

$$\{ \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف ما}} + \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف می}} + \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف جہ}} \} \text{ (ے۔ب۔ما۔جہ) } + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف ما}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف می}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف جہ}} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف می}} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف جہ}} \}$$

اب $\{ \frac{\text{جف ے}}{\text{جف ما}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف می}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف جہ}} \} = ۰$ کیونکہ کرہ کا مرکز حجم کا مرکز ثقل ہے
 اسی طرح $\{ \frac{\text{جف ے}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف ما}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف می}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف جہ}} \} = ۰$ دہیرو اور اگر فرتہ = فرعہ فرہ فرجہ

$$\text{تو } \{ \frac{\text{جف ے}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف ما}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف می}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف جہ}} \} = ۰$$

$$\frac{۱}{۳} \{ \frac{\text{جف ے}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف ما}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف می}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف جہ}} \} = ۰$$

$$\frac{۱}{۳} \{ \frac{\text{جف ے}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف ما}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف می}} + \frac{\text{جف ے}}{\text{جف جہ}} \} = ۰$$

اس طرح اگر ع، ب، جہ کی اسلئے قوتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو سمیاد کا جلد ہو جائیگا

$$\{ \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف ما}} - \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف می}} \} \text{ (ٹ۔ے۔) } + \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف جہ}} \}$$

اور چونکہ یہ سفر ہو جاتا ہے اس لئے

$$\frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف ما}} - \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف می}} = \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف ٹ}}{\text{جف جہ}}$$

۲۵۔ جاؤبہ ارض کے زیر عمل ساکن سیال۔
 مہرئی کو انتہائی بیکری نیچے کی طرف ناپنے سے

$$\text{لا} = \text{ما} \cdot \text{ے} \cdot \text{ج}$$

اور دفعہ (۱۵) کی مساوات (ع) ہو جاتی ہے

$$\text{فرد} = \text{ج} \cdot \text{ث} \cdot \text{فری}$$

جسکو ایک انتصابی چھوٹے اسطوانے کے توازن پر غور کرنے سے جی بلا واسطہ حاصل کر سکتے ہیں۔

متجانب سیال کی صورت میں

$$\text{د} = \text{ج} \cdot \text{ث} \cdot \text{ی} + \text{ہر}$$

اور مساوی دباؤ کی سطحیں افقی مستوی ہیں۔

اس لئے آزاد سطح افقی مستوی ہے اور اس لئے مبداء کو آزاد سطح میں اور n کو بیردنی دباؤ قرار دینے سے

$$\text{د} = \text{ج} \cdot \text{ث} \cdot \text{ی} + n$$

اگر آزاد سطح پر کوئی دباؤ نہ ہو تو

$$\text{د} = \text{ج} \cdot \text{ث} \cdot \text{ی}$$

یعنی کسی نقطہ پر دباؤ آزاد سطح کے نیچے اس نقطہ کی گہرائی کے متناسب ہوگا۔

غیر متجانب سیال کی صورت میں مساوات

$$\text{فرد} = \text{ج} \cdot \text{ث} \cdot \text{فری}$$

سے ظاہر ہے کہ ث کو ی کا تفاعل ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی افقی سطح کے تمام نقطوں پر کثافت اور دباؤ مستقل ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر فرض کرو کہ $\text{ث} \cdot \text{ی} = \text{م} \cdot \text{ی}$

$$\text{تو} \quad \text{د} = \text{ج} \cdot \text{م} \cdot \frac{\text{ی} + n}{1 + n}$$

۲۶۔ دو مائع جو باہم آمیز نہیں ہوتے ایک خمدار ملی میں ڈالے گئے میں ثابت کرو کہ انکی مشترک سطح سے آزاد سطحوں کے ارتفاع کثافتوں کے بالعکس متناسب ہوتے ہیں۔

مشترک سطح پر دباؤ وہی ہیں اور اگر مشترک سطح سے آزاد سطحوں کے ارتفاع ی ، ی ہوں اور کثافات کی کثافتیں ث ، ث ہوں تو یہ دباؤ علی الترتیب

$$ج\ ث ی + ج\ ث ی + ج\ ث ی$$

$$\frac{ج}{ث} = \frac{ی}{ث}$$

ہونگے اس لئے

۲۷۔ یہ ایک مشہور قانون ہے کہ اگر جاذبہ ارض اور چکنی سطحوں کے دباؤ کے زیر عمل کوئی نظام متوازن ہو تو وزن قائم ہوتا ہے بشرطیکہ مرکز ثقل نیچے سے نیچے مکن مقام میں واقع ہو۔ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غیر متجانس مائع کی صورت میں گہرائی کے ساتھ کثافت کو بڑھنا چاہیئے کیونکہ یہ صورت دیگر توازن غیر قائم ہوگا۔

اس طرح اگر ایک غیر متجانس مائع کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالا جائے تو سب سے وزنی نتیجہ بیٹھ جائے گی اور قانون کثافت یقیناً بدلتا ہوگا۔

مائع کی کچھ مقدار جس کی کثافت گہرائی کا ایک دیا ہوا تفاعل ہے دئے ہوئے برتن میں ہے۔ اگر اس مائع کو دوسرے برتن میں منتقل کیا جائے تو نئے قانون کثافت کا معلوم کرنا مطلوب ہے جب کہ ہر برتن ایک گردش سطح کی شکل میں ہو جس کا محور انتصابی ہے۔

لاکھ آج کے زیر ترین نقطہ سے اوپر کی طرف ناپ کر فرض کرو کہ $ما = ف (لا)$ پہلے برتن کا کوئی بھی مٹھی ہے اور $ما = ف (لا)$ دوسرے برتن کا۔

پس اگر پہلے برتن میں لالہ بندی والی تہ دوسرے برتن میں لالہ بندی والی تہ کے متناظر ہو تو چونکہ حجم مساوی ہیں اسلئے ہیں حاصل ہوگا

$$ک (ا) (ف) = ک (ا) (ف) = ک (ا) (ف)$$

اب عمل تکمیل سے لاکھ لاکھ کی رقوم میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسلئے $ث$ جو لاکھ تفاعل ہے، لاکھ کا تفاعل بنتا ہے۔

نیز اگر ان دو برتنوں میں مائع کی گہرائیاں گ۔ گ۔ ہوں تو گ۔ گ۔ کی رقوم میں معلوم کر سکتے ہیں اور اس لئے کثافت $ث$ گہرائی گ۔ لاکھ رقوم میں معلوم ہو سکتی ہے اگر قانون کثافت دیا جائے اور نئے برتن کی شکل معلوم کرنا مطلوب ہو تو ہم اس طرح عمل کرتے ہیں۔

کثافت چونکہ (گ - لا) کا اور نیز (گ - لا) کا یا ہوا تفاعل ہے ہم ان دونوں جلوں کو مساوی رکھ کر لا کو لا کی رقوم میں معلوم کر سکتے ہیں -
نیز متنناطہوں کے جھوں کو مساوی رکھنے سے ہم ما فر لا = ما فر لا حاصل کرتے ہیں جس میں لا کی قیمت لا کی رقوم میں مندرج کر کے ہم مطلوبہ مساوات معلوم کر لیتے ہیں - اور پھر پورے جھوں کو ایک دوسرے کے مساوی رکھ کر گ کی قیمت معلوم کرتے ہیں -
مثال ۱ - ایک اسطوانی برتن میں مائع کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی کا قانون کثافت معلوم کرہ اگر مائع کو ایک مخروطی برتن میں ڈالا جائے جسکا راس نیچے کی طرف ہو -
اس صورت میں

ث = مہ (گ - لا)

اور ۴ لا = ۱/۳ ۴ لا مس ع

نیز ۴ لا گ = ۱/۳ ۴ لا گ مس ع

∴ ث = مہ مس ع گے - لا = ۱/۳ ۴ لا مس ع (۳ گ ی - ۳ گ ی + ی)

اگر گہرائی می ہو -

مثال ۲ - مائع کی کچھ مقدار جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی ایک اونڈے یا اٹھ مکافی نما میں دی ہوئی بلند ہی تک بہری ہوئی ہے ایک ایسے برتن کی شکل معلوم کرنا ہے (جو گردش سطح کی شکل میں ہو) کہ اگر اس مائع کو اس میں ڈالا جائے تو کثافت ایسے بدلے جیسے گہرائی کا مربع -

اس صورت میں ث = مہ (ف - لا) = مہ (ف - لا) جہاں ف گہرائیاں ہیں -

∴ لا = ف - ۱/۳ (ف - لا) اگر مہ = مہ ج

مساوات ۴ لا فر لا = ما فر لا سے

ع ما = ۸ (ف - لا) { ف ج - (ف - لا) }

حاصل ہوتا ہے -

حل کو پورا کرنے کے لئے پورے حجموں کو مساوی رکھنا چاہیے جس سے $h = f = c$ حاصل ہوتا ہے جو f اور c میں مطلوبہ ربط ہے۔

۲۸ — جاذبہ ارض کے زیر عمل لچکدار سیال کا سکون۔

اس صورت میں $d = m = t$

$$\text{اور } \frac{f}{d} = \frac{c}{m} \text{ فری}$$

$$\text{لوک } \frac{d}{c} = \frac{m}{f} \text{ اور } d = c \text{ جو } m$$

یہاں بھی مساوی دباؤ کی سطحیں افقی مستوی ہیں اور مستقل c کا تعین y کی کسی دی ہوئی قیمت کے لئے دباؤ کے لئے دباؤ کے معلوم ہونے سے ہو سکتا ہے۔ یا اس صورت سے متعلق کسی دے ہوئے واقعہ کے معلوم ہونے سے۔

مثال :- ایک بند اسطوانہ میں جسکا محور انقباضی ہے ہوا کی دی ہوئی کیت ہے۔ اسطوانہ کے سرے سے y کو ناپنے سے

(۲۲)

$$t = \frac{d}{m} = \frac{c}{m} \frac{y}{m}$$

یہ اگر y کی دی ہوئی کیت، $\frac{1}{2}$ نصف قطر، f اسطوانہ کا ارتفاع ہو تو

$$k = \frac{t}{f} = \frac{t}{f} = \frac{c}{m} = \frac{c}{m} \frac{y}{m} \quad (1 - \frac{y}{m})$$

جس سے c معلوم ہو جاتا ہے۔

۲۹ — مساوات عامہ کے استعمال کی مثالیں۔

(۱) فرض کرو کہ مائع کا دیا ہوا حجم H محوروں کے متوازی قوتوں

$$-\frac{m}{a} - \frac{m}{b} - \frac{m}{c}$$

(۲۳)

اس نتیجہ کو $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ ٹ اگلی شکل میں رکھا جاسکتا ہے۔ یہ جملہ ایسی کشش کو ظاہر کرتا ہے جو مانع کی کل کمیت پر جبکہ وہ مرکز ثقل پر ایک مادی ذرہ میں کنٹین ہو جائے عمل کرتی ہے اور درحقیقت یہ جملہ یہ فرض کر کے بھی فوراً حاصل کیا جاسکتا ہے کہ یہ مانع قوت کے مرکز پر کی کشش اور بستوی کے تعامل کی وجہ سے ساکن ہے

(۳) ایک وزن دار مانع کا دیا ہوا حجم ایسی قوت کے زیر عمل ساکن ہے جو ایک ثابت نقطہ کی طرف عمل کرتی ہے اور ایسے بدلتی ہے جیسے اس نقطہ سے فاصلہ۔

ثابت نقطہ کو مبدأ قرار دو اور ی کو انتصابی سمت میں نیچے کی طرف نا پو۔ تو

$$\Delta = -\text{مہ لا} \text{ ما} = -\text{مہ ما} \text{ اے} = \text{ج} - \text{مہ ی}$$

$$\therefore \text{فرد} = \text{ٹ} \left\{ -\text{مہ لا} \text{ فلا} - \text{مہ ما} \text{ فرما} + (\text{ج} - \text{مہ ی}) \text{ فری} \right\}$$

$$\text{اور } \frac{\text{ٹ}}{\text{ٹ}} = \text{مہ} - \text{مہ لا} + \frac{\text{ما} + \text{اے} + \text{ی}}{۲} + \text{ج ی}$$

مساوی دباؤ کی سطحیں کرے ہیں۔ اور آزاد سطح بیرونی دباؤ کو صفر فرض کر کے مساوات

$$\text{لا} + \text{ما} + \text{اے} - \text{مہ ی} = \frac{\text{ج ی}}{\text{مہ}} = \frac{\text{مہ}}{\text{مہ}}$$

سے حاصل ہوتی ہے۔

$$\text{اس کو کہہ کا حجم ہے} \quad \frac{۳}{۴} \pi \left(\frac{\text{ج ی}}{\text{مہ}} + \frac{\text{مہ}}{\text{مہ}} \right)$$

اس کو دئے ہوئے حجم کے مساوی رکھنے سے مستقل مہ معلوم ہو جاتا ہے اور پھر کسی نقطہ پر کا دباؤ اور ی کی توہم میں حل کیا جاسکتا ہے۔

گھومنے والا سیال

۳۔ اگر سیال کی کچھ مقدار یکساں رفتار سے اور اپنے ذروں کے اضافی مقامات کی تبدیلی کے بغیر (یعنی استازیم کی طرح) ایک ثابت محور کے گرد گھومے تو گذشتہ مساواتوں کے ذریعہ ہم کسی نقطہ پر کا دباؤ اور مساوی دباؤ کی سطحوں کی نوعیت معلوم کر سکتے ہیں۔

کیونکہ اضافی توازن کی ایسی صورتوں میں سیال کا ہر ذرہ ایک دائرہ میں یکساں رفتار سے حرکت کرے گا اور سیال کے کسی ذرہ کے پر عمل کرنے والی بیرونی قوتوں اور اس پر کے سیالی دباؤ کا حاصل قوت ک سے مساوی ہوتا ہے جو محور کی طرف عمل کرتی ہے جہاں سے زاویہ رفتار اور ر، محور سے ذرہ کا فاصلہ ہے۔ اس لئے نتیجہ نکلتا ہے کہ بیرونی قوتوں کو اگر سیالی دباؤ اور محور سے عمل کرنے والی قوتوں تک سے ر کے ساتھ ترکیب دیا جائے تو ہمیں سکونی توازن کا ایک نظام ملے گا جس پر دفعتاً گردش کی مساواتیں استعمال ہو سکتی ہیں۔

متجانس مائع کی کچھ کمیت ایک برتن میں یکساں رفتار سے ایک انتصابی محور کے گرد گھوم رہی ہے کسی نقطہ پر کا دباؤ اور مساوی دباؤ کی سطحیں معلوم کرنا مطلوب ہے۔

انتصابی محور کو محور کی فرض کرو۔ قوت ک اسے ر کو محوروں کے متوازی تحلیل کرنے سے اس کے اجزائے تحلیل کی ک سے لا اور ک سے ما حاصل ہوتے ہیں اور سیالی توازن کی مساوات عام ہو جاتی ہے

(۲۴)

$$\text{فر د} = \text{ث} (\text{س}^2 \text{لا} + \text{س}^2 \text{ما} - \text{ج فری})$$

اور اس لئے

$$\text{د} = \text{ث} \left\{ \frac{1}{2} \text{س}^2 (\text{لا} + \text{ما}) - \text{ج ی} \right\} + \text{ہر}$$

اس لئے مساوی دباؤ کی سطحیں گردش کی ممانہیں اور اگر برتن کے اوپر کا سر اکتھا ہوا ہو تو آزاد سطح مساوات

$$\text{س}^2 (\text{لا} + \text{ما}) - 2 \text{ج ی} + \frac{\text{ہر}^2}{\text{ث}} = \frac{\text{ث}^2}{\text{ث}}$$

سے حاصل ہوتی ہے جہاں ۲ بیرونی دباؤ ہے۔ مستقل کاتین ہر خاص صورت میں مفروضہ چیزوں کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔

مثلاً اگر برتن کا سر بند ہو اور مائع سے اس کو بھر دیا جائے اور ۲ = ۰ تو محور کے بلند ترین نقطہ کو مبداء قرار دینے سے د = ۰ جبکہ لا، ما، ی صفر ہوں اور اس لئے ہر = ۰ اور

$$\text{د} = \text{ث} \left\{ \frac{1}{2} \text{س}^2 (\text{لا} + \text{ما}) - \text{ج ی} \right\}$$

۳۱۔ اب ایک ایسے پیکلہ ریتال کی صورت پر غور کرو جالیسے برتن میں بند ہے جو ایک انتصابی محور

کے گروہوں میں

اوپر کی طرح

فرد = ث {سہ (لا فرلا + ما فرما) - ج فری}

اور $d = m \text{ ث}$
 $\therefore m \text{ لوگ ث} = \text{سہ} \frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{4} - \text{ج ی} + \text{ھر}$

اس طرح مساوی دباؤ کی سطحیں اور مساوی کثافت کی سطحیں یکساں نہیں۔

فرض کر دو کہ برتن اسطوانہ ہے جو اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے اور نیز سیال کی کل کمیت دی ہوئی ہے مستقل معلوم کرنے کے لئے سیال کو عنصری افقی حلقوں میں (پراکھ کی کثافت یکساں) ترتیب دیا ہوا خیال کرو۔ اور فرض کر دو کہ اونچائی می پراکھ حلقہ کا نصف قطر ہے اور افقی موٹائی نصف ر، انتصابی موٹائی نصف می ہے، اور اسطوانہ کا نصف قطر ۱ اور ارتفاع ۱ ف سے تو

حلقہ کی کیت = ۴۲ شارمف ر م م ی

اویس ال کی کل کمیت (ک) = $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ ٹن فر فر فر می

جہاں سید اکو اسطوانہ کے قاعدہ میں لپٹا گیا ہے

اب (ث) = نوام $\times$ نوام $\frac{سہزار = ۲۰۰۰}{۲۰}$

$$\therefore K = \frac{2.22}{\text{جس}} \times \frac{1}{(1 - \frac{1}{10})} = 2.46$$

اس مساوات سے ہر معلوم ہو جاتا ہے

۴۲۔ اگر سال کیساں زفارسے گھوم رہا ہو اور کسی قسم کی قوتوں کے زیرِ عمل ہو تو توازن کی مساوات عام ہوگی

(FA)

فرد = ت { لا فرلا + ما فرما + مے فری + سہ } (لا فرلا + ما فرما) {

توازن کے امکان کے لئے شرط کی تین مساواتیں پوری ہونی چاہئیں جن سے فرد کا پورا انکملی ہونا ظاہر ہو اور اگر یہ شرطیں پوری ہوں تو مساوی دباؤ کی سطحوں اور بعض صورتوں میں

آزاد سطح کا تعین ہو سکتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ ہمیشہ آزاد سطح کا موجود ہونا ممکن نہیں واصل آزاد سطح کے وجود کے لئے ضروری ہے کہ مساوی دباؤ کی سطحیں گردش کے محور کے لحاظ سے متشاکل ہوں۔

امثلہ

۱۔ ایک بند ٹی جہاز قص کی شکل میں ہے اور جس کا محور اعظم انتصابی ہے تین مختلف مانعوں سے جن کی کثافتیں ρ_1 ، ρ_2 ، ρ_3 ، ρ_4 ہیں بھر دی گئی ہے۔ اگر سطوح فاصل کے کسی ایک ماسک سے علی الترتیب ρ_1 ، ρ_2 ، ρ_3 ، ρ_4 ہوں تو ثابت کرو کہ

$$\rho_1(\rho_2 - \rho_3) + \rho_2(\rho_3 - \rho_4) + \rho_3(\rho_4 - \rho_1) = 0$$

۲۔ ایک ساکن متجانس مائع کی دی ہوئی کثیت کے ذرات قانون قدرت کے بموجب ایک دوسرے کو جذب کرتے ہیں کسی نقطہ پر کا دباؤ معلوم کرو۔

۳۔ ایک مائع کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے آزاد سطح کے نیچے گہرائی کا مربع۔ (۱) مستطیل رقبہ پر دباؤ معلوم کرو جو انتصاباً عین ڈوبا ہوا ہے اور جس کا ایک سطح سطح میں ہے (۲) دائری رقبہ پر کا دباؤ معلوم کرو جو مائع میں عین ڈوبا ہوا ہے۔

۴۔ مکائی رقبہ کو جو دو خاص سے محدود ہے ایک مائع میں انتصاباً عین ڈوبا گیا ہے اور اس راس مائع کی سطح میں ہے۔ اس پر دباؤ معلوم کرو (۱) جبکہ مائع متجانس ہے (۲) جبکہ مائع کی کثافت ایسی بدلے جیسے گہرائی۔

۵۔ مساوی دباؤ کی سطحیں دریافت کرو جبکہ قوتیں ثابت مرکزوں کی طرف اہل ہوں اور ایسے بدلتی ہوں جیسے ان مرکزوں سے فاصلے۔

۶۔ ایک منتظم چار سطحی (ذواریبہ اسطوح) کو مائع سے بھر دیا گیا ہے اور اس طرح تھاں گیا ہے کہ ان کے دو مقابل کے کنارے افقی ہیں۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر کے دباؤ کا مائع کے وزن کے ساتھ مقابلہ کرو۔

۷۔ اگر نقطہ (x, y, z) مائع پر نیکی کا کئی کثیت محوروں کے متوازی قوتیں

$$X = \rho_1 x, Y = \rho_2 y, Z = \rho_3 z$$

عمل کریں تو ثابت کرو کہ مساوی دباؤ کی سطحیں راستہ کی مکائی میں ہوں اور مساوی دباؤ کی کثافت

کے منحنی قائم زائد ہیں۔

۸۔ ایک ٹھوس کرے کے اندر دوسری جوف میں جکے نصف قطر ٹھوس کرے کے نصف قطر کے نصف ہیں لہذا مائع سے بھر دیا گیا ہے۔ ٹھوس اور مائع کے ذرات ایسی قوتوں سے ایک دوسرے کو جذب کرتے ہیں جو ایسے بدلتی ہیں جیسے فاصلہ ثابت کر دے مساوی دباؤ کی سطحیں ٹھوس کرے کے ہم مرکز کرے ہیں۔

۹۔ ثابت کر دے قوتیں جو

لا = مہ (ما + مای + می) ، مہ = مہ (می + لا + لا) ، مہ (لا + لا + ما) سے قیہ جوتی ہیں مائع کی کیت کو ساکن رکھنے کی اگر مائع کی کثافت ایسے بدلے جیسے مستوی لا + ما + می = ۰ سے (فاصلہ ۲) نیز ثابت کر دے مساوی دباؤ اور مساوی کثافت کے کے منحنی دائرے ہیں۔

۱۰۔ اگر ایک مخروطی بیانی مائع سے بھر دیا جائے تو ثابت کر دے مائع کے حجم میں کسی نقطہ پر گئے اوسط دباؤ اور پالہ کی سطح کے ایک نقطہ پر گئے اوسط دباؤ میں نسبت ۳:۲ ہوگی۔

۱۱۔ ایک بے وزن برتن قائم مخروط کی شکل کا ہے جس کا ذریعہ راس ۲ مہ ہے۔ برتن کو مائع سے بھر دیا گیا ہے اور اس کو گور کے کسی نقطہ سے لٹکا دیا گیا۔ اگر مخروط کے محور کا میلان انحصالی سمت کے ساتھ ہو تو ثابت کر دے

۱۲۔ مہ = مم ۲ مہ - مم ۲ قوت (پے) کے زیر عمل ایک مستوی پر ساکن ہے مائع کی کچھ کیت ایک مرکزی جاذب قوت (پے) کے زیر عمل ایک مستوی پر ساکن ہے قوت کا مرکز مستوی سے ج فاصلہ پر اس طرف واقع ہے جس طرف مائع نہیں ہے۔ مائع کی آواز کر دی سطح کا نصف قطر اس ہے۔ ثابت کر دے مستوی پر دباؤ

$$= \frac{2}{1} \text{ ث مہ (ج-۳)}$$

۱۳۔ ایک متجانس مائع دو قوتوں کے زیر عمل ساکن ہے جو ایسے بدلتی ہیں جیسے دو ثابت نقطوں سے فاصلوں کے منکوس مربیعے مساوی دباؤ کی سطحیں معلوم کر دے۔

اگر صفر دباؤ کی سطح ایک کرہ ہو تو ثابت کر دے ایسے نقطوں کے طریق میں جن پر دباؤ قوت کے ایک مرکز سے فاصلہ کے بالکس متناسب ہے کرے ہیں۔

۱۳۔ اگر مانع کے ایک عنصر (جہ نقطہ لا، یا ای برہے) پر عمل کرنے والی قوتوں کے اجزائے تحلیل محوروں کے متوازی علی الترتیب

$$ما + ۲ ما + ی + ی، ی + ۲ می + لا + لا، لا + ۲ لا + ما$$

کے تناسب ہوں تو ثابت ہو کہ توازن مکمل ہو چکی صورتیں حاصل ہونا چاہیے

$$۱ = ۲ = ۲ = ۱$$

۱۵۔ مانع کی کچھ کیفیتیں

$$لا = (ما + ی) - لا، ما = (ی + لا) - ما، ی = (لا + ما) - ی$$

کے زیر عمل توازن میں ہے۔ کثافت معلوم کر اور ثابت کر کہ مساوی دباؤ کی سطحیں گردش کرنے والی ہیں۔
۱۶۔ مانع قوت کے ایک میدان میں ساکن ہے جہاں

$$لا = ما + ی - لا، لا = لا، ی = ما + ی - لا، لا = لا، ی = لا + ما - ی$$

ثابت کر کہ مساوی دباؤ اور کثافت کے معنی دائروں کا ایک جہٹ ہیں۔

$$۱۷۔ اگر لا = ما + ی، ما = ی + لا، ی = لا + ما$$

تو ثابت کر کہ مساوی دباؤ اور کثافت کے معنی ما (لا + ی) = مستقل اور

ما + ی = مستقل سے حاصل ہوتے ہیں

۱۸۔ مساوی دباؤ کی سطحیں معلوم کر جبکہ کسی نقطہ (لا، ما، ی) پر کی قوتوں کے اجزائے

تحلیل ما (ما + ی)، ی (ی + لا)، ما (لا + ما) ہوں ثابت کر کہ مساوی سطحیں

زائد می مکانی ہوں

$$ما (لا + ی) = ج (ما + ی)$$

۱۹۔ مانع قوتوں کے دے ہوئے نظام کے زیر عمل متوازن ہے اگر $فہ (لا، ما، ی)$

مشتق = $فہ (لا، ما، ی)$ کسی نقطہ پر کی کثافت کی دو ممکن قیمتیں ہوں تو ثابت کر کہ ہر

صورت میں مساوی دباؤ کی سطحوں کی مساواتیں

$$فہ (لا، ما، ی) + فہ (لا، ما، ی) = ۰$$

سے حاصل ہوتی ہیں جہاں اختیاری تبدل ہے۔

۲۰۔ ایک کھوکھلا گروہ جس کا نصف قطر اسے اکائی کثافت کے متجانس مائع سے عین بھر دیا گیا ہے۔ اسکو دو خارجی جاذب مرکزی قوتوں $\frac{1}{r^2}$ اور $\frac{1}{r'^2}$ کے درمیان جن کا ہمی فاصلہ ج ہے ایسے مقام پر رکھ دیا گیا کہ قوتوں کی وجہ سے اس کے مرکز کشش مساوی و متقابل ہیں۔ ثابت کرو کہ کسی نقطہ پر کا دباؤ ہے

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} - \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right\} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right) \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right)$$

۲۱۔ ایک کرہ جس کا نصف قطر ج ہے متجانس مائع سے تقریباً بھر دیا گیا ہے یہ کرہ قوت کے دو بیرونی مرکوز کے زیر اثر ہے جو کرہ کے قطر پر مرکوز کی متقابل جانبوں میں اس کے مرکز سے فاصلوں پر واقع ہیں کسی نقطہ پر قوت کے ہر مرکز کی کشش فاصلہ کے مربع کے تناسب معکوس میں ہے اور مائع کی کمیت پر ان کی کششیں بالترتیب $\frac{1}{r^2}$ اور $\frac{1}{r'^2}$ ج ۲ ج ۳ میں ہیں۔

(۲۰)

$$\text{اگر } \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right) \text{ اور } \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right) \text{ کے درمیان واقع ہوتو}$$

ثابت کرو کہ مرکز پر کا دباؤ ہے

$$\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right) + \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right) \right\} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right)$$

۲۲۔ ایک مائع کی کثافت جو ایک اسطوانی برتن میں ہے ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی۔ اس کو دوسرے برتن میں منتقل کیا گیا ہے جس میں کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی کا مربع۔ اس نئے برتن کی شکل معلوم کرو۔

۲۳۔ ایک مستطیل مخروط جس کا ذریعہ راس $\frac{1}{r}$ ہے پانی سے عین بھر دیا گیا ہے اور اس کا ایک کون ایک افقی مستوی میں مضبوط چڑوایا گیا ہے مستوی کو یکساں زاوی رفتار سے ایک انحصاری محور کے گرد جو مخروط کے راس میں گزرتا ہے گھمایا گیا ہے۔ بڑی سے بڑی

رفا معلوم کر دو کہ جس سے بلند ترین نقطہ پر دباؤ صفر ہو سکے اور اس صورت میں قاعدہ پر کا دباؤ بھی معلوم کر دو۔

۲۴۔ ایک سیدھا ڈنڈا جس کا ہر ذرہ ایسی قوت سے کشش کرنا ہے جو فاصلہ کے مربع کے بالعکس بدلتی ہے متجانس بے پچک سیال کی کیت سے گواہا ہے۔ مساوی دباؤ کا گنا سطحوں کی شکل معلوم کر دو۔

۲۵۔ ایک تین دار مائع انتہی متوی رہتا ہوا ہے اور ایک ثابت مرکز کی طرف ایسی مستقل قوت سے جذب ہو رہا ہے جس کی شدت جاذبہ ارض کے مساوی ہے۔ مساوی دباؤ کی سطحوں کی شکل معلوم کر دو۔

نیز مستوی پر کا دباؤ معلوم کر دو اور ثابت کر دو کہ جب مستوی قوت کے مرکز میں سے گزرتا ہے تو یہ دباؤ مائع کے وزن کا $\frac{1}{3}$ ہوتا ہے۔ نیز مستوی پر کا دباؤ اس صورت میں بھی معلوم کر دو جبکہ مستوی قوت کے مرکز کے نیچے یا اوپر واقع ہو۔

۲۶۔ ایک ہذات خول کا دو کروی سطحیں احاطہ کرنی ہیں جو ہم مرکز نہیں خول کا مادہ قدرت کے قانون کی بموجب کشش کرتا ہے خول کے اندر کے حصہ کو متجانس مائع سے جڑا بھر دیا گیا ہے جو اس کے ساتھ یکساں رفتار سے کون کے مرکز میں سے گزرتا ہے خطہ نیچے کے گرو گھومتا ہو ثابت کر دو کہ اس طرح کوئی مکانی گرو

۲۷۔ ایک استوار کروی خول متجانس بے پچک سیال سے بھر دیا گیا ہے جس کا ہر ذرہ ایک دوسرے کو ایسی قوت سے جذب کرتا ہے جو فاصلہ کے مربع کے بالعکس بدلتی ہے ثابت کر دو کہ سطح پر کے دباؤ اور سیال کے کسی اندرونی نقطہ پر کے دباؤ کا فرق اس نقطہ میں سے گزرنے والی کروی چھوٹی سے چھوٹی تراش کے قطر کے متناسب ہے۔

۲۸۔ ایک کھلا برتن جس میں مائع ہے یکساں تراوی رفتار سے ایک انتصابی محور کے گرد گھمایا گیا ہے برتن کی شکل اور اس کے ابعاد معلوم کر دو کہ وہ عین غالی ہو جائے۔

۲۹۔ متجانس سیال کی ایک غیر محدود کیت ایک بند سطح کے گرد ہے اور سطح کے اندرونی نقطہ (۱) کی طرف ایسی قوت سے جذب ہو رہی ہے جو فاصلہ کے کعب کے متناسب سکوس میں ہے اگر سطح کے کسی نقطہ N پر کے عنصر پر جو دباؤ ہے اسے سمت N و N میں تحلیل کیا جائے تو ثابت کر دو کہ اس طرح حاصل شدہ تمام نقطوں کے قطری دباؤ کا مجموعہ مستقل رہتا ہے خواہ سطح کی جسامت اور اس کی شکل کچھ ہی ہو بشرطیکہ نقطہ N سے لا متناہی

فاصلہ یرسیال کا باؤ معدوم ہو جاتا ہو۔

۳۰۔ خط منویری (cardioid)

$$r = (1 - \text{جم})$$

کو اس کے محور کے گرد جو انقباضی ہے (راس اوپر کی طرف) گھما کر ایک طرف بنایا گیا ہے اور اسکو پانی سے عین بھر دیا گیا ہے۔ یکساں زاویہ شمار سے یہی محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ قیاس معلوم کرو جبکہ صفر و باؤ کا خط ط = $\frac{\pi}{4}$ ہو کیسی دوسرے نقطہ پر بھی باؤ معلوم کرو۔ اور وہ نقاط بھی دریافت کرو جن پر کا و باؤ بڑے سے بڑا ہے

۳۱۔۔۔ تمام فضا ایک ایسے لچکدار سیال سے بھری ہوئی ہے جس کے ذرات ایک نقطہ کی طرف ایسی قوت سے جذب ہوتے ہیں جو ایسی بدلتی ہے جیسے فاصلہ اس سیال کی پوری کیفیت دی گئی ہے۔ ایک دائری قسم میں پرکا دائرہ معلوم کرو جس کا مرکز قوت کے مرکز پر ہے۔

۳۲۔۔۔ ایسے دائرے کھینچئے گئے جن کے مرکز محوری پر ہیں اور جو ستوی لاما کو مبدا و ہر مس کرتے ہیں کسی نقطہ کا تعین (رابطہ) سے کیا گیا ہے جہاں نقطہ ن میں سے گزرنیوالے دائرہ کا نصف قطر اور اس کا مرکز ج ہے تاہم وج ن کو طے سے اور ستوی وج ن اور محوری میں سے گزرنیوالے ایک ثابت ستوی کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے اس کو فنہ سے تفسیر کیا گیا ہے۔

ثابت کرو کہ

نذ = (۱- جملة) نذر + ت جبلة نذر + ف ر فط + ن ر جبلة فط

جہاں اٹل کے منصرم پھوٹیں م س "ام ت" ام ل علی الترتیب ج ن کی سمت
پر کے ہاس کی سمت میں اور دائرہ کی مستوی پر کے عماد کی سمت میں
ممل کرتی ہیں۔

۴۳۔ ایک پیکرہ اسرائیل کی کیست کہ ایک محو کے گرویکیاں نادی و فدا سے محموم ہوا ہے اور محو کے ایک نقطہ کی طرف ایسی کشش کے زیر عمل ہے جو فاصلہ کے مگرنا کے مساوی ہے۔ مہ، مہ سے بڑھ ہے۔ ثابت کہ کوہ مساوی کثافت کش کی سطح کی مساوات ہے

$$\left\{ \frac{r_k}{r_m} \times \frac{(r_m - r_k)}{r_m} \right\} \text{ م } = (1 + \frac{r_k}{r_m})^m - (1 + \frac{r_k}{r_m})^n$$

۳۴۔ مانع کی کچھ مقدار جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی ایک اسٹے مکان فی نما میں جس کا وتر خاص ج ہے ف ارتفاع تک بھری ہوئی ہے ثابت کر دو کہ اس کی کثافت ایسے بدلے گی جیسے گہرائی کا مربع اگر اس کو ایسے برتن میں منتقل کیا جائے جسکی شکل منحنی

$$۱۶ = ۲ ج ف^۲ (۱ - ۱۲) (۱ - ۱۲)$$

کو محور لاکے گرد گھمانے سے حاصل ہوتی ہے جہاں کوئی مستقل ہے۔

۳۵۔ جاذب بالذات مانع کی کمیت جسکی کثافت ث ہے تو وزن میں ہے قانون کشش معکوس مربع کا قانون ہے۔ ثابت کر دو کہ مانع کے کسی کرہ میں اوسط دباؤ مرکز پر کے دباؤ سے بقدر $\frac{۲}{۳} ث ر^۲$ کے کم ہوگا جہاں ر کرہ کا نصف قطر ہے۔

۳۶۔ ایک بند کھوکھلا قائم مستدبر مخروط ایک افقی مستوی پر اپنے قاعدہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کو مانع سے عین بھر دیا گیا جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی۔ اس کے بعد اسکو الٹ کر اس طرح تھما گیا ہے کہ اس کا اس عین مستوی پر ہوا اور محور امتصافی ہو۔ ثابت کر دو کہ اسکی منحنی سطح پر کا حاصل دباؤ مقدار میں غیر متغیر رہتا ہے لیکن مانع کی توانائی بالقدہ نسبت

$$۲ \left\{ جا \left(\frac{۱}{۲} \right) \right\} : ۳ جا \left(\frac{۱}{۲} \right)$$

سے بد جاتی ہے۔ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اگر مانع کو مستوی پر ڈال دیا جائے تو توانائی بالقدہ صفر ہوتی ہے۔

۳۷۔ ایک سیال قانون

$$(ث - ث۱) = (د - د۱)$$

کے مطابق خفیت طور پر رہتا ہے جہاں ہ ایک چھوٹی مقدار ہے۔ ثابت کر دو کہ اس سیال کی $\frac{۲}{۳} ث$ و ث۱ کیت اپنے ذاتی تجانب اور بیرونی دباؤ د کے زیر عمل ایک کر دی شکل اختیار کرتی ہے جس کا نصف قطر تقریباً

$$۱) \left(\frac{۲}{۳} - \frac{۲}{۳} \right) \times \left(\frac{۲}{۳} - \frac{۲}{۳} \right) \text{ ہے جہاں } م \text{ تجاذب کا مستقل ہے۔}$$

۳۸۔ گیس کی ک ک کیت جو مستقل پیش ہے تمام فشار میں پھیلا دی گئی ہے اور ہر نقطہ

(لا، ا، ی) برتوت (فی اکائی کیت) کے اجزائے تحلیل - ولا - ب، ما، - ج، ی ہیں۔
مبدأ و برداؤ اور کثافت علی الترتیب د اور ث کے مساوی ہیں۔ ثابت کرو کہ

$$ا ب ج ث ک = ۱ = ۸ ۳۲ د$$

۳۹۔ ہوا کی دی ہوئی کیت ایک ہوا بند اسطوانہ میں ہے جس کا محور انصافی ہے ہوا اسطوانہ کے محور کے گرد انصافی توازن میں گھوم رہی ہے۔ محور کے بلند ترین نقطہ پر د باؤ د اور اس کی متغیٰ سطح کے بلند ترین نقاط پر د باؤ د ہے ثابت کرو کہ اگر سیال مطلق طور پر ساکن ہوتا تو محور کے بالائی نقطہ پر کا د باؤ

(د-۵) ہوتا، جہاں ہوا کا وزن بھی محسوب کیا گیا ہے۔
لوک د۔ لوک د

۴۰۔ گیس کی کچھ کیت مستقل پشش پر ایسی قوتوں کے زیر عمل ساکن ہے جن کا قوت فشار کے کسی نقطہ پر نہ ہے (فشار کے حدودی شرائط کچھ بھی ہو سکتے ہیں)۔ اس نقطہ جہاں نہ صفر ہوتا ہے، د باؤ د اور کثافت ث ہے۔

اب گیس پر سے قوتوں کا عمل مٹا دیا گیا ہے اور اس کو ایسی فضا میں بند کیا گیا ہے جس میں اس کی کثافت یکساں مٹ رہی ہے۔ ثابت کرو کہ پھیلاؤ کے باعث گیس میں ذاتی د باؤ د، بالقرہ کا نقصان ہے۔

$$ث کر کر کہ نو - ث چ فرح$$

جہاں تک کل گیس بھر میں لے گئے ہیں جبکہ وہ ابتدائی حالت میں تھی۔
انہم - ایک پھیلاؤ سیال کی دی ہوئی کیت ک ایک استوار خول میں داخل کی گئی

اس خول کی سادات $\frac{۱}{۱} + \frac{۲}{۲} + \frac{۳}{۳} = ۱$ ہے اور سیال کے سبب کلیہ د باؤ د درست رہتا ہے یہ سیال ایسی قوتوں کے نظام کے زیر عمل سکوں اختیار کرتا ہے جس کا قوتی

$$تفاعل ہے $\frac{۱}{۱} - \text{لوک} \left(\frac{۱}{۱} + \frac{۲}{۲} + \frac{۳}{۳} \right) + \text{مستقل}$$$

اگر سطح

$$\frac{1}{\text{پ}^1} = \frac{1}{\text{ج}^2} + \frac{1}{\text{ب}^3} + \frac{1}{\text{ا}^4}$$

کے کسی نقطہ پرکہ دباؤ ثابت ہو تو ثابت کرو کہ خول کے اندر کمیت کے مساوی حصوں کے حساب سے اوسط دباؤ ہوگا

$$\frac{1}{\text{پ}^1} = \left(\frac{1}{\text{ج}^2} + \frac{1}{\text{ب}^3} + \frac{1}{\text{ا}^4} \right) \frac{1}{\text{ا}^5}$$

۴۲ — ایک بند نصف کرہی برتن کا نصف قطر وہ ہے۔ اسکو اس طرح رکھا گیا ہے کہ اس کی مستوی سطح افقی اور اوپر وار رہے اس میں متجانس وزن دار مائع ڈالا گیا ہے جو محور کی طرف ایسی قوت سے جذب ہوتا ہے جو محور سے فاصلہ کے معکب کے تناسب میں ہے۔ مائع کا حجم اس قدر ہے کہ اس کی آزاد سطح نصف کرہ کو اس سے زاویہ فاصلہ $\frac{\pi}{2}$ پر ملتی ہے۔ اگر یہ نظام محور کے گرد یکساں زاویہ رزنا سر سے گھومے تو آزاد سطح برتن کے مستوی سطح کو کنارہ پر ایسے دائرہ میں ملتی ہے جس کا نصف قطر بے ثابت کر دو کہ اکائی فاصلہ یہ قوت سے $\frac{1}{\text{ا}^5}$ ہو جونی چاہیے اور ب اور سر مساوات ذیل سے مربوط ہیں

$$\frac{1}{\text{ا}^5} = \frac{1}{\text{ب}^6} + \frac{1}{\text{ا}^5} + \frac{1}{\text{ا}^5} \left(\frac{1}{\text{ج}^3} + \frac{1}{\text{ا}^4} \right)$$

۴۳ — مائع کی کچھ یکساں کمیت کر دی شکل کی ہے۔ اس کی کثافت $\theta + \epsilon$ ہے اور نصف قطر اس کے گرد دوسرے بے پیک مائع ہے جس کی کثافت θ ہے اور بیرونی نصف قطر ب۔ یہ پورا نظام صحت اپنے ذاتی متوازن کی وجہ سے توازن میں ہے اور نیز کوئی بیرونی دباؤ عمل نہیں کرتا۔ ثابت کرو کہ مرکز پر کا دباؤ ہے

$$\frac{\pi}{\text{ا}^5} (\theta + \epsilon) \left(\frac{1}{\text{ا}^5} + \frac{1}{\text{ب}^6} \right) + \theta \left(\frac{1}{\text{ا}^5} + \frac{1}{\text{ب}^6} \right) \left(\frac{1}{\text{ج}^3} + \frac{1}{\text{ا}^4} \right)$$

۴۴ — ایک بے پیک سیال کی یکساں کر دی کمیت جس کی کثافت θ اور نصف قطر وہ ہے دوسرے بے پیک سیال سے جس کی کثافت ϵ اور بیرونی نصف قطر ب ہے گھری ہوئی ہے پورا سیال اپنے جائزہ کی وجہ سے متوازن ہے اور کوئی بیرونی دباؤ یا قوتیں عمل نہیں کرتیں دونوں سیالوں کو ملا کر اسی حجم کا ایک متجانس سیال تیار کیا گیا ہے اور پھر یک کمیت کر دی شکل

$$\frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \quad \text{ع (جہلم)}$$

۴۷۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ایک کرو خیل میں تھے تو ثابت کر کہ اس کے مرکز پر باؤں سے
یوٹھ میں فٹ ہوگا جہاں زمین کے مادہ کے ایک کعبہ فٹ کثرت کا وزن مثلاً ہوتا ہے اور زمین
کا نصف قطر ۱ فٹ۔

۴۸۔ تجاذبی مائع کا ایک کرہ ہے جس کا نصف قطر اسے کسی نقیہ پراس کی کثافت یکساں طور
پر بڑھتی جاتی ہے جیسے وہ تسلط مرکز کے قریب آتا ہے اسے کثافت ۱۰ اور اوسط
کثافت ۱۰ ہے۔ ثابت کر کہ مرکز پر کا دباؤ ہے

$$\frac{1}{2} = \{ 1.0 \text{ (ث - ثب)} + 3 \text{ ث} \}$$

۴۹۔ تجاذبی تیل کا ایک کرہ ہے جس کا نصف قطر ہے۔ مساوی کثافت کی سطحیں
حدود کی سطح کے ساتھ ہم مرکز رہے ہیں۔ اور آزاد سطح سے مرکز کی طرف جاملے ہیں کثافت کسی
قانون کی بموجب بڑھتی جاتی ہے۔ ثابت کر کہ مرکز پر کا دباؤ اس دباؤ سے جبکہ کثافت یکساں
ہو پھر

$$\frac{1}{2} = 3 \text{ جکر (ث - ث) رفر}$$

کے بڑا ہوتا ہے جہاں ت پوری کثیت کی اوسط کثافت کو اور ث اس حصہ کی اوسط کثافت
کو تعبیر کرتا ہے جو مرکز سے رفاصلہ کے اندر ہے اور جب تجاذب کا مستقل ہے۔

باب سوم

سطحوں پر سیالات کا حاصل دباؤ

۳۳۔ ہم نے گذشتہ باب میں یہ دیکھا ہے کہ سیال کے کسی نقطہ پر دباؤ کس طرح معلوم کیا جاتا ہے جبکہ سیال دی ہوئی قوتوں کے زیر عمل ساکن ہو۔ اب ہم ان دباؤ کے حاصل دریافت کریں گے جو سیال سطحوں پر پیدا کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ تماس رکھتے ہوں۔
سطحوں پر سیال کے عمل کو ہم اس ترتیب سے بحث میں لائیں گے۔ پہلی سیالات کا حاصل مستوی سطحوں پر پھر جاذبہ ارض کے ماتحت سیال کا مل سطحی سطحوں پر اور آخر میں کسی دی ہوئی قوتوں کے ماتحت ساکن سیال کا مل سطحی سطحوں پر۔

مستوی سطحوں پر سیالی دباؤ

چونکہ مستوی کے تمام نقطوں پر دباؤ مستوی پر عمود وار ہوتے ہیں اور ایک ہی سمت میں عمل کرتے ہیں اس لئے حاصل دباؤ ان تمام دباؤں کا مجموعہ ہوتا ہے۔
پس اگر سیال بے پچک ہو اور صرف جاذبہ ارض کے زیر عمل ہو تو کسی مستوی پر کا حاصل دباؤ

$$= \rho \cdot g \cdot h$$

جہاں ρ سے مستوی کا رقبہ اور h سے اس کے مرکز ہندسی کی گہرائی تعبیر ہوتی ہے۔

عام طور پر اگر سیال کسی قسم کا ہوا دی ہوئی قوتوں کے زیر عمل ساکن ہو تو مستوی کے اندر محور لا اور مالو اور فرض کر دو کہ نقطہ (لا) پر دباؤ d ہے۔

تورفہ کے غصہ صف لا صف مایر کا دباؤ = د صف لا صف ما
 ∴ حاصل دباؤ = $\frac{d}{r} \times r$ فرما فرما

جہاں تکمیل کل رقبہ زیر بحث لیا گیا ہے
 اگر قطبی محدود استعمال سکے جائیں تو حاصل دباؤ

$$= \frac{d}{r} \times r \times r \times r$$


۳۴۔ تشریف۔ سطح مستوی کی صورت میں دباؤ کا مرکز وہ نقطہ ہے جہاں مستوی سے اس
 تنہا قوت کی سمت لینی جو مستوی سطح پر کے تمام سیالی دباؤں کے حاصل کے مساوی ہے۔

یہاں دباؤ کے اثر، تعریف مستوی سطحوں کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ آئندہ یہ معلوم
 ہوگا کہ منحنی سطحوں پر سیارہ حاصل مل ہمیشہ ایک تنہا قوت میں تحلیل نہیں کیا جاسکتا۔ (۳۲)

وزن داریال کی صورت میں یہ ظاہر ہے کہ افقی رقبہ کا دباؤ کا مرکز اس کا مرکز ہمدسی ہوگا کیونکہ
 اس کے ہر نقطہ پر کا دباؤ مساوی ہے اور چونکہ گہرائی کے بل پر ہونے کے ساتھ دباؤ بھی بڑھتا جاتا
 ہے اس لئے غیر افقی مستوی میں دباؤ کا مرکز ہمدسی کے نیچے واقع ہوگا۔

کسی مستوی رقبہ کا دباؤ کا مرکز معلوم کرنے کے لئے سنا بطے۔ فرض کرو کہ مستوی کے اندر
 علی القوائم محاورے کے لحاظ سے کسی نقطہ کے محدود (لا، ما) ہیں اور اس پر کا دباؤ د، اور
 اس کے ساتھ کے نقطہ کے محدود (لا، ما + صف لا، ما + صف ما) ہیں۔

نیز (لا، ما) دباؤ کے مرکز کے محدود ہیں۔



تو $\bar{M} = \text{کر د فرما فرلا} = \text{دلا کے گرو حاصل دباؤ کا سمیاری}$
 $= \text{دلا کے گرو رقبہ کے تمام عناصر پر کے دباؤں کے سمیاریوں کا مجموعہ}$

$$= \bar{M} = \text{د م ف م م ف لا} \times \text{ما}$$

$$= \text{کر د م فرما فرلا}$$

$$\bar{M} = \frac{\text{کر د م فرما فرلا}}{\text{کر د فرما فرلا}}$$

$$\bar{L} = \frac{\text{کر د لا فرما فرلا}}{\text{کر د فرما فرلا}} \quad \text{اسی طرح}$$

تکملے رقبہ زیر بحث پر لئے گئے ہیں۔
 اگر قطبی محور استعمال کئے جائیں تو اسی طرح کے طریق عمل سے

$$\bar{L} = \frac{\text{کر د ر جم ط فر فر فرط}}{\text{کر د ر فر فر فرط}}, \quad \bar{M} = \frac{\text{کر د ر ج ب ه فر فر فرط}}{\text{کر د ر فر فر فرط}}$$

۳۵۔ اگر سیال متجانس اور بے چسب ہو اور صرف جاذبہ ارض ہی عمل کرے تو
 د ج ت گ

جہاں گ سطح کے نیچے نقطہ ن کی گہرائی ہے۔ اس لئے اس صورت میں

$$\bar{L} = \frac{\text{کر گ لا فرما فرلا}}{\text{کر گ فرما فرلا}}, \quad \bar{M} = \frac{\text{کر گ م فرما فرلا}}{\text{کر گ فرما فرلا}} \quad \dots (۴۵)$$

بعض اوقات مستوی اور سیال کی سطح کے خط تقاطع کو ایک محور مقرر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر
 اس خط کو ہم محور لا فرض کریں اور مستوی اور افق کے درمیان زاویہ ط ہو تو

د = ج ث مابظ طہ ، اور اس لئے

$$\frac{\text{لا} = \frac{\text{لا لا مافرما فرلا}}{\text{لا مافرما فرلا}}}{\text{لا} = \frac{\text{لا مافرما فرلا}}{\text{لا مافرما فرلا}}} \quad (۳)$$

ان آحی مساواتوں (ب) سے ظاہر ہے کہ دباؤ کے مرکز کا مقام مستوی اور افق کے درمیانی زاویہ پر منحصر نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر مستوی اور سیال کی سطح کے خط تقاطع کے گزرنے پر مستوی کو گھمایا جائے تو دباؤ کے مرکز کے مقام میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔

اگر مساواتوں (د) میں گ کو مستقل قرار دیا جائے یعنی اگر مستوی کو واقعی فرض کیا جائے تو (ا) اور (ب) مابظ کے مرکز ہنسی کے محدود ہو جاتے ہیں اور یہ پنجہ دفعہ کے مطابق ہے۔ یہیں مساواتوں (ب) میں لا اور مآ کی قیمتیں ط پر منحصر نہیں ہیں اور ط کے محدود ہونے سے ان کی شکل میں کوئی فرق نہیں آتا اور اس صورت میں مرکز ہندسی کے محدود حاصل نہیں ہوتے۔ اس ظاہری سبب سے ظاہر کی گئی تو یہی اس طرح ہو سکتی ہے۔ ط کو کٹا ہی چھوٹا لیا جائے مستوی اور مال کی سطح کا درمیانی سیال پیشہ نہ کی شکل میں ہوگا۔ اور مستوی کے مختلف نقاط پر کے دباؤ اگرچہ انتہا میں سبب محدود ہوتے ہیں لیکن یہ مساویت کی نسبتوں میں محدود نہیں ہوتے بلکہ لہ کی کسی محدود قیمت کے لئے یہ دباؤ جو مستقل نسبتیں آپس میں رکھتے ہیں ان مستقل نسبتوں میں یہ صفر ہوتے ہیں۔

اس دفعہ کی مساواتیں استدلال ذیل سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔

مستوی رقبہ کو محدود کرنے والے خط کے ہر نقطہ سے انتصابی خط و سیال کی سطح تک کھینچ کر اس سیال کی کچھ کیت ان میں گھر جائیگی۔ اب مستوی کے تعادل کا انتصابی جو تحلیل سیال کی اس کیت کے وزن کے برابر ہوگا اور یہ وزن کیت کے مرکز میں سے گزرنے والے انتصابی خط میں عمل کرے گا اور جہاں پر یہ خط مستوی رقبہ کو لے گا وہ دباؤ کا مرکز ہوگا۔

دہی محور کو ایک غرضی محور کا وزن جو مستوی کے نقطہ (لا، مآ) میں سے عمل کرتا ہے ج ث گ مع لا مع مابظ ہوگا جہاں افق کے ساتھ مستوی کا میلان ط ہے اور اس نے مستوی کے نقطوں پر عمل کرنے والی ان متوازی قوتوں کا مرکز مساواتوں

$$\begin{aligned} \text{لا} - \frac{\text{کارج ٹانگ لاجم طہ فرما فرلا}}{\text{کارج ٹانگ جم طہ فرما فرلا}} &= \text{ما} - \frac{\text{کارج ٹانگ لاجم طہ فرما فرلا}}{\text{کارج ٹانگ جم طہ فرما فرلا}} \text{ سے لینے} \\ \text{لا} - \frac{\text{کارج لافرما فرلا}}{\text{کارج فرما فرلا}} &= \text{ما} - \frac{\text{کارج لافرما فرلا}}{\text{کارج فرما فرلا}} \text{ سے حاصل ہوتا ہے۔} \end{aligned}$$

پس یہ ظاہر ہے کہ دباؤ کے مرکز کی گہرائی گھر سے ہوائی سیال کی کمیت کے مرکز کی گہرائی کا دو چندان ہے۔

۳۶۔ وزن دار مائع کی صورت میں دباؤ کے مرکز کا مقام مسئلہ ذیل سے ہندسی طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔

اگر قہ کے مستوی میں ایک ایسا خط مستقیم لیا جائے جو مائع کی سطح کے متوازی اور قہ کے مرکز ہندسی سے اتنا ہی نیچے واقع ہو جتنا اس سے (مرکز ہندسی سے) مائع کی سطح اوپر واقع ہے تو اس خط مستقیم کا قطب بلحاظ مرکز ہندسی پر کے میاری قطع ناقص کے جس کے نیم محور اس نقطہ پر گردش کے صدری نیم قطر ہیں دباؤ کا مرکز ہوگا۔

رقبہ کو ۱ اور گردش کے صدری نصف قطروں کو ۱، ب، فرض کر دو تو یہ صدری نصف قطرهاں مساواتوں سے معلوم ہوتے ہیں۔

$$\text{ا ب} = \frac{\text{کارج لافرما فرلا}}{\text{کارج لافرما فرلا}} = \text{ا}$$

میاری (Moment) ناقص کی مساوات ہے

$$۱ = \frac{\text{لا}^۲}{۲} + \frac{\text{ما}^۲}{۲}$$

جہاں حواس کے محور مرکز ہندسی پر کے صدری محور ہیں۔

فرض کرو کہ لا، ما دباؤ کے مرکز کے محد ہیں اور سطح میں کے خط کی مساوات ہے

$$\text{لاجم طہ} + \text{ماجم طہ} = \text{ع}$$

$$\therefore \bar{L} = \frac{3}{8} \text{ ' } \bar{M} = \frac{3}{14}$$

قطبی محور استعمال کرنے سے اور دلا کو ابتدائی خط لینے سے ہمیں دھج ثا ر جب ط حاصل ہونا چاہیے اور

$$\bar{L} = \frac{\text{کرکر ر جب ط فر فرط}}{\text{کرکر ر جب ط فر فرط}} = \frac{3}{8}$$

$$\text{اور } \bar{M} = \frac{\text{کرکر ر جب ط فر فرط}}{\text{کرکر ر جب ط فر فرط}} = \frac{3}{14}$$

(۲) ایک دائری رقبہ جس کا نصف قطر ہے انتصابی سمت میں ڈبویا گیا ہے اور اس کا مرکز ہندی گہرائی گ پر واقع ہے۔

مرکز کو مبدأ اور اس میں سے گزرنے والے نیچے مارا انتصابی خط کو ابتدائی خط قرار دے۔ اگر نقطہ (ر، ط) پر کا دباؤ د ہو تو

$$d = \text{ج مٹ (گ + ر جم ط)}$$

اور مرکز کے نیچے دباؤ کے مرکز کی گہرائی

$$\frac{d}{\text{ہگ}} = \frac{\text{کرکر ر جم ط (گ + ر جم ط) فر فرط}}{\text{کرکر ر (گ + ر جم ط) فر فرط}}$$

نتیجہ دفعہ (۳۶) کے مسئلہ سے فوراً اخذ کیا جاسکتا ہے۔

(۳) ایک انتصابی سطح جس کا عرض افقی ہے کہ ہوائی کے زیر عمل ہے جو مستقل تپش پر ہے۔

اگر مستقل کے قاعدہ پر کہ ہوائی کا دباؤ ۲۱ ہو تو ی لمبندی پر دباؤ ۲۱ نوم ہوگا دفعہ (۳۷) اور اگر ب سے مستقل کا عرض تعبیر ہو مستقل کی ایک افقی پٹی پر کا دباؤ

$$21 = \text{نوم} \times \text{ب صف ی}$$

اگر مستقل کا طول و ہو تو اس پر کا حاصل دباؤ

$$r = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b) = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$$

∴ رخ ا ب ج د پر کا دباؤ (۵)

$$= \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$$

$$= \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b) = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$$

$$= \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$$

دباؤ کا مرکز مساواتوں

$$r = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b) = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$$

$$r = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b) = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$$

سے حاصل ہوگا۔

۲۔ نیچے رخ ع ج د ف کے لئے۔

ع ف اور ع ج کو محاور قرار دو۔ تو کسی نقطہ کے لئے

$$r = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$$

$$r = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$$

اور نتیجہ عمل بالکل پہلی صورت کی طرح۔

۵۔ دائرہ کا ایک رخ انتصابی سمت میں ایک مانع میں مبین ڈبو یا گیا۔ دائرہ ایک کنارہ مانع کی سطح میں ہے اور مانع کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی۔

سطح کے اندر کے کنارے کو محور ولا قرار دیں تو $r = \frac{1}{2} (a + b) - \frac{1}{2} (a - b)$ سے

اس لئے دباؤ کا مرکز مساواتوں

(۳۷)


اگر مستوی رقبہ اور آزاد سطح کا خط تقاطع ا ب ہو تو ا ب سے دباؤ کے مرکز کا فاصلہ رقبہ اور انحصاری سمت کے درمیانی زاویہ پر منحصر نہیں ہوتا (دفعہ ۳۵) اس لئے ہم رقبہ کو انحصاری لے سکتے ہیں۔

(۳۸) فرض کرو کہ ثابت نقطہ و کی گہرائی گ ہے اور رقبہ کے اندر د لا، و صا ثابت ہو ہیں۔
اگر د لا کا سیلان افق کے ساتھ ط ہو تو
 $d = ج ث (گ - لا جب ط - ما جم ط)$

$$\therefore لا = \frac{ا + ب جب ط + ج جم ط}{ا + د + ف جب ط + ق جم ط} = \frac{ا + ب جب ط + ج جم ط}{ا + د + ف جب ط + ق جم ط}$$

$$اور ما = \frac{ا + ب جب ط + ج جم ط}{ا + د + ف جب ط + ق جم ط}$$

جہاں 'ا' ب' ح وغیرہ معلومہ مستقل ہیں۔ اب ط کو سا ق کرنے سے دباؤ کے مرکز کا طریق ایک محوطی تراش ہوگی۔



دفعہ (۳۶) کے مسئلہ کی مدد سے بھی ہم اس نتیجہ کو اخذ کر سکتے ہیں۔
ہندسی مرکز ہر میں سے گزرنے والے صدی محوروں کو حوالے کے محور قرار دیکر
اور و کے محدد (عیا) پر فرض کر کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ دباؤ کا مرکز خط مستقیم
لا جب ط + ما جم ط = - (گ + د جب ط + ب جب ط + ج جم ط)

کاتقطب (ضنا، عا) بلحاظ معیاری ناقص کے ہے اور مساواتوں

$$\frac{ا^۲ جب ط}{ضنا} = \frac{ب^۲ جم ط}{عا} = (گ + ع جب ط + ج جم ط)$$

سے حاصل ہوتا ہے۔ ان مساواتوں سے مساواتیں

$$\left(\frac{ا}{ضنا} + ع\right) جب ط + ب جم ط = گ$$

$$\left(\frac{ب}{عا} + ج\right) جم ط + ع جب ط = گ$$

حاصل ہوتی ہیں۔

پہلے جب ط کو اور پھر جم ط کو ساقط کر کے حاصل شدہ نتیجوں کا مربع نیکر جمع کریں تو ہمیں مطلوبہ طریق کی مساوات معلوم ہو جاتی ہے جو

$$(ا^۲ ب + ع ب^۲ ضنا + ب^۲ عا) = گ^۲ (ا^۲ عا + ب^۲ ضنا)$$

ہے۔

اگر د اور ہر ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں یعنی اگر ع = ۰ اور ب = ۰ تو طریق کی مساوات ہو جائیگی

$$\frac{ضنا}{ا^۲} + \frac{عا}{ب^۲} = \frac{۱}{گ^۲}$$

۳۹ — ایک برتن میں دو قسم کے مائع میں جو ایک دوسرے کے ساتھ آمیز نہیں ہوتے۔ (۳۹) برتن کا قاعدہ مستوی ہے اور اس کے پہلو مستوی اور انتصابی ہیں۔ ایک پہلو پر حاصل دباؤ اور اس کے دباؤ کا مرکز معلوم کرو۔

فرض کرو کہ اوپر کے مائع کی کثافت ρ_1 اور گہرائی h_1 گ سے اور نیچے کے مائع کے لئے متناظر تمام ρ_2 ، اور h_2 ہیں۔ مشترک سطح افقی مستوی ہوتی چاہیے جس کے ہر نقطہ پر کواڈرانت J ٹ گ ہوگا اور مشترک سطح کے نیچے Y گہرائی پر کواڈرانت J ہوگا

$$J ٹ گ + ج ٹ ی$$

انتصابی پہلو کا عرض B لینے سے اس پر اوپر کے مائع کا دباؤ $P = \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2$ ٹ ب گ

اور بیچے کے مانع کا دباؤ = $\frac{1}{2} (ٹ گ + ٹ ی) ب فری$
 $= \frac{1}{2} ب گ (ٹ گ + ٹ ی)$
 حاصل دباؤ ان دونوں کا مجموعہ ہو گا جو

$$= \frac{1}{2} ب (ٹ گ + ٹ ی) ب گ + \frac{1}{2} ب گ (ٹ گ + ٹ ی) ب$$


اس پہلو پر کے سیالی دباؤ کا معیار (اس کے اور آزاد سطح کے خط تقاطع کے گرد)

$= \frac{1}{2} ب ی فری (ٹ گ + ٹ ی) ب گ + \frac{1}{2} ب گ (ٹ گ + ٹ ی) ب فری$
 اعمال تکمل کو پورا کر کے متذکرہ بالا حاصل دباؤ کے جملہ سے اسکو تقسیم کرنے سے ہمیں دباؤ کے مرکز کی گہرائی حاصل ہو جاتی ہے۔

منحنی سطحوں پر کے حاصل دباؤ


۴۔ ایک متجانس دائرے کا جو جاذبہ الارض کے زیر عمل ساکن ہے کسی سطح پر حاصل انتصابی دباؤ دریافت کرو۔

فرض کرو کہ سطح $ن ق$ پر ایک وزن دار مانع کا عمل ہو رہا ہے اور مانع کی آزاد سطح پر اس کا ظل $و ب$ ہے۔ مانع کی کیت $وق$ ، مانع کے انحنی دباؤ اور $ن ق$ کے تعامل کے باعث متوازن ہے۔ اس تعامل کو انتصابی سمت میں تحلیل کیا جائے تو یہ جزو تحلیل $وق$ کے وزن کے برابر ہونا چاہیے اور برعکس اس کے $ن ق$ پر کا انتصابی دباؤ $وق$ کے وزن کے برابر ہو گا اور اس کی کیت کے مرکز میں سے عمل کرے گا۔



اگر $ن ق$ کو مانع اور $و ب$ کی طرف دباؤ کے جس طرح کہ دوسری شکل سے ظاہر ہے اس سطح کو خارج کرو۔ اور $ن ق$ کا ظل پہلے کی طرح مانع کی سطح پر لو اور فرض کرو کہ فضاء $وق$ اسی قسم کے

(۴۰)




مانع سے بھری ہوئی ہے اور مانع کو نیچے سے خارج کر دیا گیا ہے۔

ن ق کے تمام نقطوں پر کے دباؤ وہی ہیں جو پہلے تھے لیکن متقابل سمتوں میں اور چونکہ اس مفروضہ صورت میں انتصابی دباؤ اوق کے وزن کے مساوی ہے اس لئے اصلی صورت میں حاصل انتصابی دباؤ اوپر کی جانب اوق کے وزن کے برابر ہوگا۔

اگر سطح کو مانع جزا اوپر کی طرف اور جزا نیچے کی طرف دبائے تو نقطہ ن میں سے جو سطح کے زیر بحث حصہ کا بلند ترین نقطہ ہے ایک انتصابی سطح مستوی ن رکھیں جو اور فرض کر کے مانع کی سطح پر ن س ق کا ظل راجع ہے۔

تو حاصل انتصابی دباؤ ن س ریر

$$= \text{ن س ر کے اندرونی مانع کا وزن}$$



اور ر ق پر = ج ق کے اندرونی مانع کا وزن
 اور پورا انتصابی دباؤ = ج ق کے اندرونی مانع کا وزن + ن س ر کے اندرونی مانع کا وزن۔

یہ نتیجہ گزشتہ دو صورتوں کی مدد سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ ن ر کا انتصابی

عامی مستویوں کے خط تماس سے دو حصوں N و S ، S میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر کے دباؤ علی الترتیب W اور W' اور نیچے وار ہیں۔ اور چونکہ

N پر کا دباؤ = W N پر کا وزن

اور S پر کا دباؤ = W' S پر کا وزن

اس لئے ان کا فرق یعنی N پر کا انتصابی دباؤ = W N پر کا وزن

اسی طرح دوسری صورتوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔


مشاہدہ طلب ہے کہ یہ تحقیق غیر متجانس مائع (جس میں کثافت گہرائی کا ایک تفاعل ہونی چاہئے) کیونکہ مساوی دباؤ کی سطحیں مساوی کثافت کی سطحیں ہوتی ہیں) کی صورت میں بھی درست ہے بشرطیکہ قانون کثافت مائع کی مفروضہ وسعت میں بھی وہی خیال کیا جائے۔

۴۱۔ سطح N پر کا حاصل افقی دباؤ کسی وی ہوئی سمت میں معلوم کرنا۔

دی ہوئی سمت کے علی القوام انتصابی مستوی پر N ق کا ظل کو اور فرض کرو کہ یہ

ظل N ق سے

کیت N ق، N ق پر کے دباؤ، N ق پر کے حاصل افقی دباؤ، اور مستوی N ق کے متوازی انتصابی مستویوں میں عمل کرنے والی قوتوں کے زیر عمل ساکن ہے۔



اس لئے N ق پر کا افقی دباؤ N ق پر کے افقی دباؤ کے مساوی ہے۔ اور یہ دباؤ ایک ہی خط مستقیم میں عمل کرتے ہیں یعنی N ق کے دباؤ کے مرکز میں سے گزرنے والے افقی خط میں سے۔

اس لئے عام طور پر کسی سطح پر حاصل دباؤ معلوم کرنے کے لئے اس پر کا انتصابی دباؤ

اور علی القواہر سمتوں میں حاصل نفی دباؤ معلوم کرو۔ یہ تین تو میں بعض صورتوں میں ایک تنہا قوت پر تحمل ہو سکیں گی جس کے لئے شرط سکونیات کے عام طریقوں سے حاصل کیجا سکتی ہے۔

مثال ۱۰ ایک نصف کرہ متجانس مائع سے بھر دیا گیا ہے اور اس کو مرکز میں سے گزرنے والے دو علی القواہر انتصابی سمتوں سے پانچوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان پانچ سمنی حصوں میں سے ایک حصہ پر کا حاصل عمل دریافت کرو۔

مرکز کو میداناً احاطہ کرنے والے افقی نصف قطروں کو محور لا اور محور ما ۱ اور انتصابی نصف قطر کو محور سی فرض کرو تو لاکہ متوازی دباؤ، ربع ما وی ریک دباؤ کے مساوی ہوگا جہاں ما وی، دلا کے علی القواہر سمنی سطح کا ظل ہے۔
اس لئے دلا کے متوازی دباؤ

$$= \text{ج ث } \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16} \text{ ج ث } \frac{1}{4}$$

(۴۲)

اور اس کے نقطہ عالمہ کے متحد ہیں

$$(0, \frac{3}{8}, \frac{1}{4}, \frac{3}{14}) \text{ دفعہ (۳۷) مثال (۱۱)}$$

اسی طرح وصال کے متوازی دباؤ = $\frac{1}{16} \text{ ج ث } \frac{1}{4}$ حلقہ

$$(\frac{3}{8}, 0, \frac{3}{14}, \frac{1}{4})$$

پر عمل کرتا ہے۔

حاصل انتصابی دباؤ = مائع کا وزن = $\frac{1}{4} \text{ ج ث } \frac{1}{4}$ اور $\frac{3}{8}$ سستیم $\frac{3}{8} = \frac{1}{4}$

کی سمت میں عمل کرتا ہے۔

تینوں تونوں کی سمتیں نقطہ

$$(\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{14}, \frac{1}{4})$$

میں سے گزرتی ہیں۔ اور اس لئے وہ ایک تنہا قوت

$$\frac{1}{4} \text{ ج ث } \sqrt{8 + 4\pi}$$

کے مساوی ہیں جو خط مستقیم

$$\text{لا} - \frac{\pi}{8} = 1 = \frac{\pi}{4} - 1 = \frac{\pi}{4} = \frac{2}{\pi} (Y - \frac{\pi}{14})$$

$$\text{یعنی} \quad \text{لا} = \frac{\pi}{4} = \frac{2}{\pi} Y$$

میں مل کرتی ہے۔ یہ خط مستقیم مرکز میں سے گزرتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ تمام سیالی دباؤ کرہ کی سطح پر عمود وار عمل کرتے ہیں۔ یہ خط مستقیم سطح کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہے اس کو دباؤ کا مرکز کہہ سکتے ہیں۔

۴۲۔ وزن دار مائع میں ایک ٹھوس جسم جڑایا کلاً ڈبوایا گیا ہے اس کی سطح پر کا حاصل دباؤ معلوم کرو۔

فرض کرو کہ ٹھوس کو کھنکھ لایا گیا ہے اور اس کی بجائے اسی قسم کا مائع بھر دیا گیا ہے تو اس پر کا حاصل دباؤ وہی ہو گا جو اصلی ٹھوس پر تھا۔ لیکن اس مائع کی کثیت اپنے وزن اور اس کو گھیرنے والے مائع کے دباؤ کے زیر اثر ساکن ہے۔ اس لئے حاصل دباؤ ہٹا ہے ہوئے مائع کے وزن کے برابر ہو گا اور اس کو مرکز نقل میں سے انتصابی سمت میں عمل کریگا۔

اسی طرح کے استدلال سے صریحاً یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کسی ٹھوس جسم پر پچکدار سیال کا حاصل دباؤ جسم کے ہٹائے ہوئے پچکدار سیال کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔

یہ نتیجہ دفعات (۴۰) اور (۴۱) کی مدد سے اس طرح بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سطح کو مس کرتے ہوئے متوازی افقی خطوط مستقیم کھینچ جن سے ایک استوانہ بنے جس کے اندر ٹھوس گھم جائے تھاس کا مخفی سطح کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے جن پر کے حاصل افقی دباؤ اسطو انے کے محور کے متوازی ہیں اور ایک دوسرے کے مساوی ہیں مگر مقابلہ نہیں میں عمل کرتے ہیں۔ اس لئے جسم پر کے افقی دباؤ ایک دوسرے کے افکوز ایل کرتے ہیں اور اس لئے حاصل صاف انتصابی سمت میں عمل کرتا ہے۔ اب اس حاصل انتصابی دباؤ کو معلوم کرنے کے لئے سطح کو مس کرتے ہوئے متوازی انتصابی خطوط کھینچو تاکہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ ایک حصہ کا حاصل انتصابی دباؤ اوپر وار عمل کرتا ہے اور دوسرے حصہ

پر کا بیچے وار۔ ان دونوں کا فرق صریحاً ٹھوس کے ہٹاے ہوئے سیال کا وزن ہے۔
۴۳۔ ایک ٹھوس جسم پورے طور پر وزن دار مان میں غرق کیا گیا ہے، اگر اس کی سطح کا کچھ حصہ منحنی سطح اور بقیہ حصہ معلومہ مستوی رقبے ہوں اور اگر اس کا حجم (ح) دیا جائے تو منحنی سطح پر کا حاصل دباؤ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

کیونکہ مستوی سطحوں کا رقبہ اور ان کا محل معلوم ہے اس لئے ہم ان رقبوں پر کے حاصل افقی دباؤ لا اور حاصل انتہائی دباؤ ما معلوم کر سکتے ہیں اور چونکہ جسم کی پوری سطح پر کا دباؤ ج ث ح کے مساوی ہے اور اوپر وار انتہائی مستقیم عمل کرتا ہے اس لئے اس کی منحنی سطح پر کا حاصل افقی دباؤ لا ہوگا اور حاصل انتہائی دباؤ ج ث ح - ما
مثال۔ داری رقبہ کو ایک ماسی حصے کے گرد زاویہ ط میں گھمانے سے ایک ٹھوس جسم بنایا گیا ہے اس کو پانی میں اس طرح تھما گیا ہے کہ اس کا پچھلا مستوی رخ افقی اور گہرائی تک پورے۔

اس صورت میں

$$ح = \pi \times \text{لا} = ج \times \text{ث} \times \pi \times (گ - وجب ط) جب ط$$

$$\text{اور } ما = ج \times \text{ث} \times \pi \times (گ - گ جسم ط + وجب ط جسم ط)$$

۴۴۔ کسی سطح پر ایک ایسے سیال کا حاصل دباؤ دریافت کرو جو کسی معلومہ قوتوں کے زیر عمل ماکن ہے۔

فرض کرو کہ سیال کے زیر عمل سطح ع =۔ کے نقطہ (لا، ما، ی) پر کا دباؤ لا ہے جب اب دوم میں حاصل کردہ دباؤ کی طرح معلوم کیا گیا ہے۔

$$\frac{1}{ع} = \left(\frac{جف لا}{جف ما} \right) + \left(\frac{جف ما}{جف ی} \right) + \left(\frac{جف ی}{جف ی} \right)$$

تو نقطہ (لا، ما، ی) پر کے عماد کے جیوب التمام ہونگے

$$\frac{ع جف لا}{ع جف ما} ، \frac{ع جف ما}{ع جف ی}$$

فرض کرو کہ اس نقطہ کو گھیرنے والے رقبہ کا عنصر صف س سے تعبیر ہوتا ہے تو محوروں کے متوازی اس عنصر پر کے دباؤ ہونگے

دع جفء لا مف س دع جفء ما مف س دع جفء ی مف س
اس لئے اگر تلوں کے متوازی حاصل دباؤ لا ، ما اے اور حال جفت
ل ، م ، ن ہوں تو

$$لا = کر د دع جفء لا فرس$$

$$ما = کر د دع جفء ما فرس$$

$$ے = کر د دع جفء ی فرس$$

$$ل اور = کر د دع (ا جفء ی - ی جفء ما) فرس$$

$$م = کر د دع (ی جفء لا - لا جفء ی) فرس$$

$$ن = کر د دع (لا جفء ما - ما جفء لا) فرس$$

سب مکمل کل سطح زیر بحث پر ہیں۔
یہ حاصل ایک تنہا قوت کے معادل ہونگے اگر

(۴۴)

$$لال + ما م + ے ن = ۰$$

۴۵۔۔۔ حوالے کی سطحوں کے متوازی مستوی لینے سے جسم کی سطح تین مختلف طریقوں
سے عناصر میں تقسیم ہو سکتی ہے

$$\text{مثلاً} \quad \text{مف لا مف ما} = \text{لا ما پر مف س کا ظل} = \text{ع جفء ی مف س}$$

اور اس لئے ے = کر د لا فرما اور اسی طرح لا = کر د فرما فری ، اور

ما = اگر د فری فرلا

ل = اگر د (ما فرلا فرما - می فری فرلا)

= اگر د (ما فر - می - می) فرلا

فر = اگر د (می فری - لا فرلا) فرما

(ن) - اگر د (ما فر - ما فرما) فری

۴۴۔۔۔ اگر سیال بے مزہ، حار، ریزہ، ابر مل، مالن، ہوا اور محوری، انتھائی ہو تو وہ، می کہ
تھیں، ہنگامہ، بکری، فرض کرو کہ، می سب۔

۵ = اگر د (می - می) فری

مستوی می رودی ہوئی سطح کا قطر سب سے بلند، عام، لا کے، داری اس نفل کے
دما کو تفسیر کرتا ہے۔

اسی طرح ماستی می لای کے نفل کے دما کے مساوی ہے۔
اگر سیال بے بیک ہو اور صرف جاذبہ، ارض میں بر عمل کرے، تو ذرات لا، سب
سیال کے اس حصہ کے وزن کے مساوی ہے، جہت میں اور سیال کی سطح بر اس کے
نفل کے درمیان واقع ہے۔

۶۔۔۔ یا اگر د فرلا فرما دی ہوئی سطح کے اوپر کے سیال کا وزن ہے۔

پیشانی، دفات (۴، ۱۰، ۱۱) کے نتائج کے ساتھ توافقی ہیں۔

۴۴۔۔۔ اگر ایک ٹھوس جسم جڑ یا کٹا کسی سیال میں غرق کیا جائے اور یہ سیال می ہو تو
تو قوتوں کے زیر عمل ساکن ہو تو جسم پر کا حاصل سیالی دما، اسی قوتوں کے حاصل کے مساوی
ہوگا جو ہٹائے ہوئے سیال پر عمل کرتی ہے۔

کیونکہ ہم جسم کو سیال سے نیا جدا کر کے اس کی جگہ پر اسی قسم کے سیال سے پُر کیا اور اٹھو۔

کر سکتے ہیں۔ اب یہ داخل شدہ سیال ان توبوں اور گرد کے سیال کے دباؤں کے زیر عمل ساکن ہوگا۔ اور اس لئے تامل دباؤ ان دی ہوئی قوتوں کے حاصل کے مساوی ہوگا مگر سمت متقابل میں عمل کرے گا۔

جسم کی حرکت کو سال سے بڑھتی۔ یہ تالون کثافت کی پابندی کرنی چاہیے یعنی مساوی کثافت کی سطحیں گرد کے سیال کی کثافت کی سطحوں کے ساتھ مسلسل ہونی چاہئیں۔

امثلہ

۱۔ ایک وزن موٹی رسی جس کی کثافت یا لی کی کثافت کی وجہ سے ایک سرے سے جو پانی کے باہر ہے اس طرح نکال گئی ہے کہ اس کا نیچہ حصہ غرق آب رہے۔ غرق شدہ حصہ کے وسط پر رسی کا تندا دریا بنتا کرو۔

۲۔ ایک کھوکھلے گڑے کا نصف قطر ہے۔ اسکو مانی سے عین چھوایا گیا ہے اس کی سطح کو ایک ایسے مستوی سے جو مرکز کے نیچے جگہ لائی پر واقع ہے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان حصوں پر کے حاصل انضامی دباؤ معلوم کرو۔

۳۔ ایک برتن تر، طے منقطع کی شکل کا ہے جسکا قاعدہ منقطعوں والا مستوی کثیر الاضلاع ہے اس کا اس طرح رکھا گیا کہ اس کا محور انضامی اور اس سے بیچے وار رہے۔ اس کو سیال سے بھر دیا گیا۔ بن کا پری یا داس پر کے منقطع کے گرد حرکت کر سکتا ہے لیکن اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لئے ایک رسی کے ذریعہ اسکو تھاما گیا ہے جو رخ کے قاعدہ کے نقطہ وسطی اور کثیر الاضلاع کے مرکز سے بانڈ دلیگی ہے۔ ثابت کرو کہ ہر رسی کے ساتھ اور سیال کے کل وزن میں نسبت ۱:۲ جب ۲ حصے جہاں عم افق کے ساتھ ہر رخ کا میلان ہے۔

۴۔ ایک قبہ دو عم مرکز نصف دائروں سے گھرا ہوا ہے اور ان کا مشترک قطر آزاد سطح میں واقع ہے ثابت کرو کہ دباؤ کے مرکز کی گہرائی

$$\frac{3}{4} (b + b) (a + b)$$

$$(a + b + a + b)$$

ہے جہاں a و b نصف قطر ہیں۔

۵۔ ایک مربع پتھر کے دباؤ کا مرکز معلوم کرو جس کا ایک راس سیال کی سطح میں ہے۔

اگر اس کو اس راس کے لئے مستوی میں دکھایا جائے اور میٹر یا میٹریہ پر کسی طرح نافع
ہو تو باہر سے ہوا اس کے دباؤ کے مرکز کا طریق معلوم کرو۔

۱۔ ایک ناقص میٹر کے دباؤ کا مرکز معلوم کرو جو بالی میں عین ڈوبا ہوا ہے۔ اگر اس کو اپنے
انتصابی ستوی میں اس طرح دکھایا جائے کہ ہمیشہ بالی میں غرق رہے تو اس کے محوروں کے
درجے دباؤ کے مرکز کا طریق معلوم کرو۔

۲۔ ایک مکعب صندوقہ بالی میں ہے دیکھا گیا ہے اس کا دیگر وزن دار اور مکعب بیٹھنے
والا ہے اور اس کو جکھنے سے روکنا کے لئے زبردستی کر دیا گیا ہے۔ ماری ماری سے اس کو
زور دے کر گڑا دے کے گڑا دے میں دکھایا گیا ہے، بالی میں خارج ہونے لگے۔ ان
زوریوں کے حواسوں سے متاثر ہو کر۔

۳۔ ہم عمود دائروں کے ایک نظام کو بالی میں اس طرح ڈھونڈ کیا ہے کہ مرکزوں کے درجہ ایک
ی ہوئی گہرائی پر رہے۔ ثابت کر کے کہ یہ مرکزوں کے درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کے
مرکز ایک مکانی پروجیکشن ہوتے ہیں۔

۴۔ ایک نیم قطع ناقص (محاورہ ۱ اور ۲) کے دباؤ کا مرکز معلوم کرو جو ایسے قطر سے محدود
ہے جس کا میلان محور اعظم کے ساتھ $\frac{1}{4}$ ہے۔ یہ ناقص کی سطح انتصابی ہے اور وسط سائرانی سطح
میں واقع ہے۔

۵۔ ایک نیم قطع ناقص اپنے محور اعظم سے محدود ہے اور ایسے نافع میں عین ڈوبا ہوا ہے
جس کی کثافت ایسے ہلکی ہے جیسے گہرائی۔ اگر محور اعظم نافع کی سطح میں واقع ہو تو خروج امرار
دریافت کر کے کہ دباؤ کا مرکز ہو سکے۔

۱۱۔ ایک مربع پتھر ۱ ب ج د بالی میں ڈوبا ہوا ہے اس کا مکعب ۱ ب ج د کی سطح میں واقع
ہے۔ نقطہ ب سے ج د کے نقطہ سے تک خط مستقیم ب سے ایسا کھینچو کہ دووں حصوں
پر نکلے دباؤ مساوی ہوں۔

ایسی صورت میں ثابت کرو کہ

دباؤ کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ: مربع کا ضلع $\cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$
۱۲۔ ایک نصف دائرہ میں سے جس کا قطر نافع کی سطح میں ہے ایک دائرہ کا ٹکڑا لیا گیا ہے
اس دائرہ کا قطر نصف دائرہ کا انتصابی نصف قطر ہے۔ نتیجہ جس کے دباؤ کا مرکز معلوم کرو۔

۴۶ ۱۳۔ ایک نصف دائری انصہابی میٹر پر سی طرح پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس کے محدود کرنے والے قطر کا سہرا ۲ پانی کی سطح میں ہے اور پانی کی سطح کے ساتھ اس قطر کا میلان عد ہے۔ اگر دے دباؤ کا مرکز ہو اور قطر ۲ اسے کا درمیانی رادیہ ہو تو ثابت کرو کہ

$$\text{مس ط} = \frac{۱۶ + ۲۳}{۲۱۵ + ۱۶} \text{مس ع}$$

۱۴۔ اگر ایک مثلث کے داسوں کی گہرائیاں مانع کی سطح کے نیچے 'ا ب' ج ہوں تو ثابت کرو کہ مرکز ثقل کے نیچے دباؤ کے مرکز کی گہرائی ہوگی

$$\frac{(ب - ج)^۲ + (ج - ا)^۲ + (ا - ب)^۲}{۱۲}$$

۱۵۔ ایک مستوی رقبہ جو ایک سیال میں ڈوبا ہوا ہے اپنے متوازی اس طرح حرکت کرتا ہے کہ اس کا مرکز ثقل ہمیشہ ایک ہی انصہابی خط میں رہتا ہے۔ ثابت کرو کہ (۱) دباؤ کے مرکز کا طریقہ قطع زائے جس کا ایک متقارب دیا ہوا انصہابی خط ہے اور (۲) اگر مختلف محلوں میں اس کے مرکز ثقل کی گہرائیاں ۱، ۱ + ہ، ۱ + ہ + ہ، ۱ + ہ + ہ + ہ اور ان کے متناظر دباؤ کے مرکز کی گہرائیاں ۱، ۱ + ک، ۱ + ک + ک، ۱ + ک + ک + ک ہوں تو

$$\begin{vmatrix} ک & ہ & ہ & (ک - ہ) \\ ک & ہ & ہ & (ک - ہ) \\ ک & ہ & ہ & (ک - ہ) \\ ک & ہ & ہ & (ک - ہ) \end{vmatrix} = ۰$$

۱۶۔ مکانی کے ایک قطعہ کے دباؤ کا مرکز معلوم کرو جو وتر خاص سے محدود ہے اور وتر خاص کے ایک سرے پر کا ماس مانع کی سطح میں ہے۔

اگر مانع کی سطح اوپر چڑھے اور مکانی ساکن رہے تو ثابت کرو کہ دباؤ کا مرکز ایک خط مستقیم میں حرکت کرتا ہے۔

۱۷۔ ایک مخروط پانی میں پوری طرح غرق ہے۔ اس کے قاعدہ کے مرکز کی گہرائی دی گئی ہے۔ اگر اس کی محب سطح برکے حاصل دباؤ د، د، د، د ہوں جبکہ افق کے ساتھ اس کے محور کے میلان کے جیب بالترتیب س، س، س، س ہیں تو ثابت کرو کہ

$$د(س - س) + د(ا س - س) + د(س - س) = ۰$$

۱۸۔ محوروں اور منحنی مالا + مالا = ۱۸ کے درمیانی رقبہ کے دباؤ کا مرکز معلوم کرو۔ محاور علی القواہم ہیں اور ایک محوریال کی سطح میں واقع ہے۔

۱۹۔ مانع کی کچھ مقدار و سوازی مستویوں کے درمیان ہے۔ یہ مانع ایک مرکزی قوت کے زیر عمل ہے جو ایسے بدلتی ہے جیسے خاملہ اگر مستویوں کے اُن حصوں کے رقبے جہاں سیال مس کر رہا ہے 'ب' ہوں تو ثابت کر کہ اس حصوں پر کے دباؤں میں نسبت ۱ : ۱ : ۱ : ۱ ہے۔

۲۰۔ ایک ٹھوس کرہ ایک افقی مسنوی پر کیا جواسے اور ایک مانع میں عین دوبا ہوا ہے۔ انصافی قطب میں سے گزرنے والے، وعلی القواہم مستویوں سے اس کرہ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر کرہ کی کثافت ۱۸ ریال کی ہو تو ثابت کر کہ یہ حصے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونگے

لشکر طیکہ ۱۸

۲۱۔ زائد کا ایک متقارب سیال کی سطح میں ہے۔ اس رقبہ کے دباؤ کے مرکز کی گہرائی معلوم کرو جو دو بے ہوشے متقارب منحنی، اور زائد کی سطح میں کے وفاق خطوط مستقیم سے محدود ہے۔

۲۲۔ ایک مخروط بانی میں اس طرح دوبا ہوا ہے کہ اس کے قاعدہ کا مرکز بانی کی سطح کے نیچے اس کے ارتفاع کے ۱/۳ گہرائی پر واقع ہے۔ اسی قاعدہ اور ارتفاع کا ایک مکانی بنا بھی اس طرح غرق ہے کہ اس کے قاعدہ کے مرکز کی گہرائی سطح کے نیچے دسی ہے جو مخروط کا قاعدہ کے مرکز کی ہے۔ نیز انصافی سمت کے ساتھ اس کے محور کا سیلان بھی وہی و مخروط کے محور کا ہے۔ یہ سیلان کیا ہونا چاہیئے کہ ان دونوں محبوسوں کی محبوسوں پر کے دباؤ مساوی ہوں۔

۲۳۔ ایک بند اسطوانہ مانع سے تقریباً بھرا ہوا ہے اور اسے ایک تلویمی خط کے گرد جو انصافی ہے یکساں رفتار سے گھوم رہا ہے۔ اس کی منحنی سطح پر کیا گھل دباؤ معلوم کرو۔ اس کے اوپر کے سرے پر جو دباؤ ہے اس کا نقطہ معلوم کرو۔

۲۴۔ ثابت کر کہ جو رقبہ منحنی (۸) جہم طہ = ب کے متقارب اور اس کی توس کے درمیان گھرا ہوا ہے اس کے دباؤ کے مرکز کی گہرائی ہے

$$\frac{1}{4} \times \frac{14 + 22}{22 + 3}$$

جہاں متقارب سیال کی سطح میں ہے اور منحنی کا مستری انصافی ہے۔

۲۵۔ ایک خرد طوائف سے بھر دیا گیا ہے۔ اس کا ڈھکن وزن دار شیشک بیٹھنے والا ہے اور ایک قبضہ کے گرد حرکت کرتا ہے۔ اس خرد طوائف کو قبضہ میں سے گزرنے والے ٹکڑیوں کی خطہ کے گرد (جو انتہائی ہے) یک۔ اس وقت اسے نگہایا گیا ہے۔ بڑی سے بڑی زاویہ رفتار معلوم کرو کہ طوائف کی شکل کی طرح ہے۔

۲۶۔ کروی خول کا ایک حصہ ایک مستوی سے تراش لیا گیا ہے اور بقیہ حصہ کو ایک افقی مستوی پر اس طرح رکھا گیا ہے کہ درجہ ٹی تراش مستوی کو اس کرے۔ بھر لو ہوائی ترین نقطہ پر کے ایک جیسے سواری کے، یہ پانی سے بھر دیا گیا ہے۔ کروی خول کا بڑے سے بڑا حصہ دریافت کرو جو ثابت لیا جاتے اس طرح کی پانی با برنگل چرنے نہ پائے خواہ خول کتنا ہی ہلکا ہو۔ ایسی صورت میں ثابت کرو کہ حوالہ پر کی پورا دباؤ ٹائٹ کے وزن کے ساتھ ۱:۲ کی نسبت رکھتا ہے۔

۲۷۔ ایک غرق شدہ مستوی رقبہ اس خط مستوی میں کے ایک خط مستقیم کے گرد گھومتا تو ثابت کرو کہ دباؤ کا مرکز اس مستوی میں ایک خط مستقیم میں ہے۔

۲۸۔ ایک ٹھیک کا گنڈا ۱۲ سے اس کے رخ افقی اور انتہائی ہیں۔ اس کے گرد ایک وزن دار رقبہ ہے جس کا حجم $\frac{1}{2} \pi r^2 h$ ہے۔ $\{1 - \frac{1}{2} \pi r^2 h\}$ ہے۔ مانع ہر ایک۔ ایسی قوت عمل کرتی ہے کہ رقبہ کے مرکز کو مرکز سے جلتی ہے۔ یہ جیت اس مرکز سے فاصلہ حاصل۔ فاصلہ ۱۰ یروقت کی مقدار ہے۔ آزاد سطح کی شکل، کسی نقطہ پر کیا دباؤ معلوم کرو۔ اگر ایک انتہائی نرخہ جیت سے ہے۔ یہ ایک افقی خط مستقیم کے گرد حرکت کر کے نو ثابت کرو کہ یہ رخ ساکن ہوگا بشرطیکہ اس رخ کے زیریں ہمارے سے چکر حاصل ہو۔

۲۹۔ ایک سوس نکافی نما سطح میں سے گزرنے والے مستوی سے تراشا گیا ہے جو اس کے محور پر عملی افراکت ہے۔ یہ نکافی نما پورے طرح افقی ہے۔ اس طرح اس کا رخ دی ہوئی گہرائی پر ہے اور اس کا انتہائی سمت کے دباؤ دیا جاتا ہے۔ اس کی سطح پر کے حاصل دباؤ کی مقدار معلوم کرو۔

۳۰۔ ایک مکعبی رقبہ دو تر خاص سے ملے دو ہے۔ اس کو دو تر خاص کے گرد زاویہ ط میں گھما کر ایک ٹھوس بنایا گیا ہے اور اس ٹھوس کو پانی میں اس طرح تھاں کیا ہے کہ یہ عین غرق ہے اور اس کا چلا مستوی رخ افقی ہے۔ اگر منحنی سطح پر کے حاصل دباؤ کا سیلان افق کے

ساتھ نہ ہونو ثابت کر دو کہ

۳ جب ۱ ط ۱۰ = ۵ ح ط - ۲ جب ط ۱۰ جھ ط - ۲ ط

۳۱ — سیال کی کچیا ایک ایک محو کئے گز دانسانی توازن میں لگھوم رہی ہے۔ سیال تانوں قدرت کی بوجب کشش کرنا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا زور داخل کر، ایک یا ۱۰ اس کو بھی رقا، یہ بھی ہے جو کہ اس جگہ کے سیال۔ اور وہ کی ہے۔ کہا اپنی جگہ میں ہو کر کی طرف آئے گا یا اس سے پرے ہٹے گا۔

۳۲ — سیال کی ایک حد محدود کہتے ہیں، وہ ۱۰ مل کے لئے ہیں۔ سیال کی مختلف حالت ہے اور اس کا ہر حصہ۔ دوسرے حصہ کہ قانون قدرت کے وجہ جذب کرنا ہے تو ان کے اندر دنی و دہر دنی نصف قطر علی السرتبب ایک با ایک ہیں اور ان کی کمائیں تہا ہے ہیں۔ نخل بھی ایک دوسرے کے اور۔ سیال کو قانون قدرت کے کہ جب جذب کرتے ہیں۔ نخل پر کی حامل قوت معلوم کر دو اور ثابت کر دو کہ اس صورتوں میں ہر توتہ واقعی ہوگی۔

۳۳ — ایک دیا ہوا قریباً آتما بی ہوریر ایک وزن دار بال میں مرق ہے اس رقبہ کو قاعدہ مان کر ایک مخروط بنایا گیا ہے جو کلینا مان میں برق سے اس کا باقی معلوم کرو جبکہ سطح پر کا حامل دباؤ مستقل ہو اور ثابت کر دو کہ دباؤ غیر متغیر ہو گا اگر مخروط کو اس افقی خط کے گرد گھمایا جائے جو قاعدہ کے مرکز ثقل میں سے گزرتا ہے اور قاعدہ کے مستوی پر عمود وار ہے۔

۳۴ — ایک مخروطی برتن کو جس پر محور انفضائی اور اس بنیے وار سبب جہ میں سے گزرنے والے ایک مستوی سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان حصوں کو اس سے ایک ایک قبضہ اور ایک ڈوری کے ذریعہ جو برتن کے کنارہ کا قطر ہے اور حاصل مستوی پر عمود وار ہے جدا کرنے سے روکا گیا ہے۔ اگر برتن کو پانی سے بھرا دیا جائے تو رسی کے تناؤ کا پانی کے وزن کے ساتھ متبادل کر دو۔

۳۵ — ایک کھوکھلے مخروط کو جسکی چوٹی کھلی ہے پانی سے جڑ دیا گیا ہے اس کے محور میں سے گزرنے والے دو مستویوں سے (جن کا درمیان زاویہ دیا گیا ہے) مخروط کے ایک طرف جو سطح کا حصہ کٹا ہے اس پر کا حامل دباؤ اور اس کا خط عمل معلوم کر دو۔

اگر زاویہ اس قائمہ ہو تو ثابت کر دو کہ یہ خط مخروط کی چوٹی سے گزرتا ہے۔
۳۶ — ایک برتن ناقصی کافی نسا کی شکل کہ سب سے اس کا محور امتداد پانی سے ۱۰ اس کو ۱۰

۱۲/۱ + ۱۲/۲ = ۱۲/۳
 ہے۔ صدری مستویوں سے اسے چار سو سی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے ایک حصہ میں گ کہائی اب پانی ڈالا گیا ہے۔ اگر منحنی حصہ پر کے حاصل دباؤ کو امتصائی اور افقی سمت میں تحلیل کیا جائے تو ثابت کرو کہ افقی جزو تحلیل کا نقطہ عمل نقطہ (۱۲/۱، ۱۲/۲، ۱۲/۳) میں سے گزرے گا۔

۳۷۔ نصف کرہ کی شکل کا ایک پیالہ پانی سے بھر دیا گیا ہے۔ اگر اسکو ایک ایسے مستوی سے تراشا جائے جو اس کے مرکز میں سے گزرتا ہے اور افق کے ساتھ دباؤ زاویہ بناتا ہے تو پیالے کے اوپر کے حصہ پر عمل دباؤ کی سمت اور مقدار دریافت کرو۔

۳۸۔ ایک کھلے مخروطی خول میں جس کا وزن نظر انداز کیا جاسکتا ہے پانی بھر دیا گیا ہے اور اس کے کنارے کے ایک نقطہ سے اس کو لٹکا کر توازن کا محل بندریج اختیار کرنے دیا گیا ہے اگر اس کا زاویہ راس جنم ۲/۱ ہو تو ثابت کرو کہ بانی کی سطح نقطہ ثقلی میں سے گزرنے والے نکتہ بی خط کو نسبت ۲:۱ میں تقسیم کریگی۔

۳۹۔ ایک منظم کتبۃ الاصلیٰ اچھوری سطح مانع میں غرس ہے سینے مرکز ثقل کے گرو جکت کر سکتا ہو ثابت کرو کہ دباؤ کے مرکز کا طریق ایک کرہ ہے۔

۴۰۔ ایک نصف کرہ کی ظرف پانی سے بھر دیا گیا ہے اور اس کے وسطی نصف قطر میں سے دو انتصائی مستوی کھینچے گئے ہیں۔ جو سطح کو نصف چھانک میں راستے میں۔ اگر مستویوں کا دباؤ زاویہ ۲۰ ہو تو ثابت کرو کہ اس چھانک پر حاصل دباؤ انتصائی سمت کے ساتھ زاویہ

مس (۱) جب

بناتا ہے

۴۱۔ نیم قطرب کا ایک ثابت کرہ ہے اس کو ثلث کثافت والے سیال کی کیت ۱۲/۱ احاطہ کے ہوئے ہے یہ سیال ایک ابستہ نقطہ کی طرف قوت مہرانی اکائی کیت سے جذب ہوتا ہے جس کا فاصلہ اس کے مرکز سے چ (ب) ہے۔ بیرونی دباؤ کو صفر فرض کر کے ثابت کرو کہ حاصل دباؤ درانت کرو۔

۴۲۔ کرہ کی سطح کی سطح ۱۲/۱، ۱۲/۲، ۱۲/۳ میں سے ایک خاصیت رکھتا ہے اگر اس کو اس طرح رکھیں

منطبق ہو جائے تو ثابت کر دو کہ

ف : ق : ر : ل : (م + ن) : ۳ - م : (ن + ل) : ۳ - (ل + م) — ایک کعب صندوق کے ضلع کا طول و ہے اور اس کے وزن دار ڈھکن کا وزن و ہے جو ایک کنارے کے گرد حرکت کر سکتا ہے۔ صندوق کو پانی سے بھر دیا گیا ہے اور اس کنارہ کے ایک سرے میں سے گزرنے والے قطر کے ذریعہ اس کو انتصابی طور پر رکھا گیا ہے اب اگر اس کو یکساں زاوی رفتار سے گھمایا جائے تو ثابت کر دو کہ

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \right) \left(\frac{1}{3} \right)$$

سے کم نہ ہونا چاہیے تاکہ پانی گرنے جائے جہاں و صندوق کے اندرونی پانی کا وزن ہے — ۴۸ — ایک ناقص ناکو مرکز میں سے گزرنے والے کسی مستوی سے ترائش کر اس کی منحنی سطح اور مستوی ترائش سے ایک بند استوار برتن تیار کیا گیا ہے۔ برتن کو پانی سے عین بھر کر ایک افقی میز پر اس طرح رکھا گیا ہے کہ مستوی قاعدہ میز پر رکھا رہے۔ ثابت کر دو کہ منحنی سطح پر کا حال دباؤ ایک انتصابی قوت کے مساوی ہے جو پانی کے نصف وزن کے مساوی ہے اور جس کا خط عمل مستوی قاعدہ کو مرکز سے $\frac{1}{3}$ فاصلہ پر قطع کرتا ہے جہاں ر قاعدہ کا مزدون نصف دتر اور ع مرکز سے افقی مای مستوی پر عمود ہے۔

۴۹ — ایک چھوٹا ٹھوس جسم ایک سیال میں ساکن رکھا گیا ہے جس میں کسی نقطہ پر کا دباؤ قائم محدود لا، مای کا ایک دبا ہوا تفاعل ہے۔ ثابت کر دو کہ اس جفت کے اجزائے ترکیبی جو جسم کو اس کے مرکز ثقل کے گرد گھمانے کا میلان رکھتا ہے

$$(ج - ب) \frac{f_2}{f_1} - \left(\frac{f_2}{f_1} - \frac{f_2}{f_1} \right) \left(\frac{f_2}{f_1} \right) \frac{f_2}{f_1}$$

$$+ \frac{f_2}{f_1}$$

اور اسی طرح کے دو اور جملے ہیں جہاں (ب، ج، د، ع، ف) مرکز ثقل میں سے گزرنے والے محاورے کے لحاظ سے جسم کے حجم کے جمودی میا روں اور جمود کے محال روں کو تعبیر کرتے ہیں۔

۵۰۔ ایک استوار کردی نول کا نصف قطر ہے۔ اس میگیس کی گیت تک ہے جس میں دباؤ کثافت کا لگھا ہے کیس ایک ثابت بیرونی نقطہ سے (جس کا فاصلہ مرکز سے ف ہے) ایسی قوت سے دفع ہوتی ہے جو دباؤ کا لگائی گیت $\frac{1}{2}$ کے مساوی ہے۔

ثابت ہے کہ دباؤ کے حامل دباؤ ہے

$$\frac{\text{لک}}{\text{فنا}} \times \frac{\text{۸ فٹ}^۲ - \text{۲ فٹ}^۲}{\text{۲ فٹ}^۲ + \text{۲ فٹ}^۲}$$

۵۱۔ پانی سے بھر ہوا ایک ظرف ناقص بنا (محاورہ، ب، ح) کے آٹھویں حصہ کی شکل کا ہے جو تین صدی ستویں سے محمد وہ ہے۔ محور انصالی ہے اور گروہائی کا دباؤ نظر انداز ہو سکتا ہے۔

(۵۰)

ثابت کرد کہ سطح پر کا حاصل سیالی دباؤ ایک ایسی قوت ہے جس کی شدت ہے

$$\frac{1}{2} \left\{ \text{ب}^۲ + \text{ح}^۲ + \frac{1}{2} \text{ا}^۲ + \frac{1}{2} \text{ب}^۲ + \frac{1}{2} \text{ح}^۲ \right\}$$

۵۲۔ ایک گھوکھٹا ناقص بنا پانی سے بھر دیا گیا ہے اور اس طرح رکھا گیا کہ محور افقی کے ساتھ زاویہ عدنائے اور محور ج افقی ہے۔ ثابت کرد کہ محور د میں سے گزرنے والے انصالی ستویں کے ظرف کی سطح پر کا سیالی دباؤ ایک رنج (Wrench) کے مساوی ہے جس کی گتائی ہے

$$\frac{1}{2} \text{ب}^۲$$

م ح جب تک حجم عد

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \left(\text{ا}^۲ + \text{ب}^۲ + \text{ح}^۲ + \frac{1}{2} \text{ا}^۲ + \frac{1}{2} \text{ب}^۲ + \frac{1}{2} \text{ح}^۲ \right)$$

۵۳۔ ایک مثلث ایک مانع میں غرق ہے جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی۔ اس مثلث کے اس مانع کی سطح کے نیچے غہ، ب، ج فاصلوں پر واقع ہیں۔ ثابت کرد کہ دباؤ کے مرکز کی گہرائی ہے

$$\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \left(\text{ا}^۲ + \text{ب}^۲ + \text{ح}^۲ + \frac{1}{2} \text{ا}^۲ + \frac{1}{2} \text{ب}^۲ + \frac{1}{2} \text{ح}^۲ \right) + \text{ج}^۲$$

۵۴۔ ایک مستوی رقبہ ایک وزن دار غیر متجانس سیال میں کلیتا غرق ہے اور ایک ایسے

افقی نہایت محور کے گرد گھومتا ہے جو گ گہرائی پر ہے اور مستوی پر نمودار ہے۔ اگر گہرائی پر سال کی کثافت مہ ی کے مساوی ہو اور اگر محور اور مستوی کے نقطہ تقاطع میں سے گزرنے والے دو علی الاقوام محاوروں میں سے ہر ایک کے لحاظ سے مستوی رقبہ متشاکل ہو تو ثابت کرو کہ دباؤ کے مرکز کا طریق نقصان میں ایک قطع ناقص ہے جس کے مرکز کی گہرائی ہے

گ (۱) - ک (۲) ک (۲)

۲ گ - (۱) + ک (۲) (۲) + ک (۲)

جہاں متشاکل محوروں کے لحاظ سے رقبہ کے گردش کے نصف قطر ک (۲) ہیں اور گہرائی کا دباؤ ہے

۱ + ج مہ (۱) - گ (۲)

۵۔ ثابت کرو کہ کسی غرق آب مستوی رقبہ کا دباؤ ایک قوت میں جو رقبہ کے مرکز ہندسی پر عمل کرتی ہے اور ایک جہت میں جو رقبہ کے مستوی میں ایک محور کے گرد ہے تحلیل ہو سکتا ہے۔ نیز ثابت کرو کہ اس جہت کا محور اس ماس پر عمود وار ہے جو مرکز ہندسی پر کے معیار می ناقص کے افقی قطر کے سرے پر بھیجا گیا ہے۔



باب چہارم

تیرنے والے اجسام کا توازن

۴۸ — تیرنے والے جسم کے توازن کی شرطیں معلوم کرنا۔

ہم یہ فرض کریں گے کہ سیال مہرٹ جاذبہ ارض کے زیر عمل ساکن بنے اور جسم بھی صرف اسی قوت کے زیر اثر سیال میں آزادانہ تیر رہا ہے۔ اس طرح جسم پر عمل کرنے والی قوتیں مہرٹ اس کا وزن اور گردے سیال کا دباؤ ہو گا۔ اس لئے توازن کے اقامت کے لئے حامل سیالی دباؤ جسم کے وزن کے مساوی ہو گا اور انتصابی سمت میں عمل کرے گا۔

اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ جزا یا کٹا غرق شدہ ٹھوس کی سطح پر کا حاصل سیالی دباؤ ہٹا ہے ہوئے سیال کے وزن کے مساوی ہوتا ہے اور اس کی کمیت کے مرکز میں سے گزرنے والے انتصابی خط میں عمل کرتا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جسم کا وزن ہٹائے ہوئے سیال کے وزن کے مساوی ہونا چاہیئے اور یہ کہ جسم اور ہٹا ہے ہوئے سیال کی کمیتوں کے مرکز ایک ہی انتصابی خط میں واقع ہونے چاہئیں۔

یہ شرطیں توازن کے لئے ضروری اور کافی ہیں خواہ سیال جس میں جسم تیر رہا ہے کسی نوعیت کا ہو۔ اگر سیال غیر متجانس ہے تو ہٹائے ہوئے سیال کو اس طرح خیال کرنا ہو گا کہ وہ بھی جسم کو گھیرنے والے سیال کے قانون کثافت کی پابندی کرتا ہے باضفاً دیگر اس میں ایسے طبقات فرض کرنے ہو گئے جو گرد کے افقی طبقات کے ساتھ مسلسل ہوں نیز اسی قسم کے اور اسی کثافت کے ہوں۔

مثلاً اگر ایک ٹھوس جسم جزا غرق شدہ یانی میں تیر رہا ہو تو اس کا وزن ہٹائے ہوئے یانی کے وزن اور ہٹائی ہوئی ہوا کے وزن کے مجموعہ کے مساوی ہو گا۔ اور اگر ہوا کو خارج کر دیا جائے یا اس کے دباؤ کو کثافت یا پٹش کی تخفیف سے کم کر دیا جائے

مستطیل اسی کے معیار اور مثلث گنگ د کے درجہ معیار کے فرق کے مساوی ہوتے

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \text{جب ط} - \frac{1}{3} \times \text{اس ط} = \frac{1}{3} \times \text{قطط} + \frac{1}{3} \times \text{اجم ط}$$

یا جب ط (۱ - مس ط) (مس ط)

کے متناسب ہوگا اور یہ اسی صورت میں معدوم ہو سکتا ہے جبکہ ط = ۱ یا ۰

اس لیے توازن کا کوئی دوسرا محل نہیں ہو سکتا۔

مثال ۳ - ایک مثلثی فنڈ اور اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کے کنارے انفریڈ ہیں۔ اس کے توازن کے محل دریافت کرو۔

دیش کر کہ مرکز ثقل دیل مندر کی دو تراسس ہے جو اس کے مرکز ثقل سے گزرنے والے

انسانی ستوی سے پیدا ہوتی ہے۔

نق میراؤ کا خطا اور ہٹا ہے

مائع کا مرکز ثقل ہے۔ توازن کی صورت میں

رقبہ ان فی : رقبہ اب ج : نشو

کی کثافت : مائع کی کثافت

اور اس لیے ن فی کے تمام محلول

کے لیے ان ق مستقل ہے۔ اس لیے

ن ق ہمیشہ اپنے وسطی نقطہ پر ایک ایسے

زائد کو مس کرتا ہے جس کے تغارب اب

اور ج ہیں۔

نیز ہٹا، ن ق برعمود وار ہونا چاہیے اور چونکہ

$$اھ : ہی = اٹ : ٹا$$

اس لیے فی، ن ق برعمود وار ہوگا۔ یعنی فی سی زائد کے نقطہ ی پر کا

عماد ہے۔ اس لیے اب یہ مسئلہ ن سے منحنی پر عماد ٹھننے کے مسئلہ میں تعمیل ہو جاتا ہے

فرض کر کہ عماد اب، ج کے حوالہ سے منحنی کی مساوات ہے

$$لاا = ح$$

اور زاویہ ب ا ج = طہ ' ا ب = ۱۲ ' ا ج = ۲ ب
 نیز فرض کرو کہ نقطہ سے کے محدود (لا) ہیں۔ ۱۰ ب نقطہ کے محدود ہیں اور
 نقطہ سے پر کے عماد کی مساوات ہے

$$\text{ع۔ م۔} = \frac{\text{ماجم طہ۔ لا}}{\text{لاجم طہ۔ ما}} (\text{فنا۔ لا})$$

اور اگر یہ نقطہ میں سے گزرے جس کے محدود 'ب' ہیں تو

$$(\text{ب۔ ما}) (\text{لاجم طہ۔ ما}) = (\text{ا۔ لا}) (\text{ماجم طہ۔ لا})$$

$$\text{با۔ لا۔} (\text{ا۔ بجم طہ}) = \text{ما۔} (\text{اجم طہ + ب}) \text{ (ب۔ م)}$$

مساواتیں (ع۔ م۔) اور (ب۔ م۔) رائہ کے تمام نقطوں کا انجین کرتی ہیں جن پر کے محاس
 نیز اذ کے خطوط جو نکلتے ہیں۔

نیر مساوات (ج۔ ب۔) 'ب' ا ج کے متوازی مردوج قطروں کے حوالہ سے
 ایک قائم رائہ کی مساوات ہے۔ اس سے ان دونوں زائندوں کے تقاطع نقطہ سے کے
 محل میں۔

مساوات

$$\text{لا۔} (\text{ا۔ بجم طہ}) = \text{لا۔} (\text{اجم طہ + ب}) (\text{ج۔ لا۔} = \text{ج۔} =$$

سے لامعوم ہو سکتا ہے اس مساوات میں صرف ایک اصل معنی ہے اور ایک یا تین
 مثبت اعلیں ہیں۔ اس لئے توارس کے محل تین ہو سکتے ہیں یا صرف ایک۔

اگ منشور اور رائے کی کثافتیں نہ اور ف ہوں تو چونکہ ترقبہ ن ا ق

$$= \frac{1}{4} \text{ ا ن} \times \text{ا ق جب طہ} = ۲ \text{ لا ما جب طہ} = ۲ \text{ ج جب طہ}$$

$$\text{اس لئے} \quad ۲ \text{ ف ج جب طہ} = ۲ \times \text{نہ} \times \text{ا} \times \text{ب جب طہ}$$

$$\text{یا} \quad \text{ف ج۔} \quad \text{نہ} \times \text{ا} \times \text{ب}$$

جس سے ج معین ہو جاتا ہے۔

مرض کرو کہ منشور متساوی الساقین ہے تو ۱ = ب رکھنے سے لا کو متعین کرنے کی

کی مسادات ہو جاتی ہے

$$\text{لا} - \text{ج} = ۱ (۱ + \text{جم طہ}) (\text{لا} - \text{ج} = \text{لا}) =$$

اس کے ہمیں لا = ج ملتا ہے جس سے ما = ج حاصل ہوتا ہے اور ب ج افقی قرار پاتا ہے جو صریحاً توازن کا محل ہے اور نیز

$$\text{لا} = \frac{۱}{۲} (۱ + \text{جم طہ}) \pm \left\{ \frac{۱}{۴} (۱ + \text{جم طہ}) - \text{ج} \right\}$$

$$= ۱ + \text{جم طہ} \pm (\text{لا} - \text{ج} = \text{لا})$$

اس لئے مساوی الساقین منشور کے توازن کا محل صرف ایک ہوگا تا آگے
۱ جم طہ < ج

اور چونکہ ت ج = ۱ نہ ۱ اس لئے یہ

$$\text{جم طہ} < \frac{۱}{۲}$$

کے مثل ہے۔

مثال ۴۔ دی ہوئی شکل اور وزن کے غبارہ کے توازن کا محل معلوم کرو جبکہ کردہ ہوائی کے مختلف ارتفاعوں پر تپش کے تغیرات نظر انداز کئے جائیں۔

تپش مستقل ہو تو ہی ارتفاع یہ ہوا کا دباؤ = ۱۱ تو تپش اور اس کی کثافت

$$= \frac{۱۱}{۲} \text{ فو ک} \quad \text{جہاں } ۱۱ \text{ اُس مستوی پر کے ہوائی دباؤ کو تعبیر کرتا ہے جہاں سے ارتفاع}$$

کی یہ پائیس ہوئی ہے۔

بٹائی ہوئی ہوا متغیر کثافت کے طبقات کے سلسلوں پر مشتمل ہوگی اور اگر غبارہ کے

زیر ترین نقطہ کا ارتفاع ی ہو اور اس نقطہ سے غبارہ کی کسی افقی تراش (لا) کا فاصلہ

لا ہو اور ف غبارہ کا ارتفاع ہو تو بٹائی ہوئی ہوا کے ایک طبقہ کا وزن ہوگا

$$\frac{۱۱}{۲} \text{ فو ک} \frac{\text{ج} (۱ + \text{لا})}{\text{لا}} \text{ لا}$$

اگر یہ شرط پوری ہو تو جسم ساکن ہوگا اور نہ ہی نہ ہلے نہ بڑکے نہ دبائے اور نہ وزن کے فرق کے مساوی ہوگا۔ اور مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے ٹھوس جسم پر محور کریں جو پانی میں سیر رہا ہو اور ایک رسی کے ذریعہ ٹکایا گیا ہو جو پانی کی سطح کے اوپر ایک انگلی سے بلند ہوئی ہے۔ توازن کی حالت میں رسی انتہائی ہوگی اور اس کے تانہ اور حامل سیالی دباؤ جو ہٹا ہے ہونے سیال کے وزن کے مساوی ہے) کچھ مجموعہ جسم کے وزن کے مساوی ہوگا۔ اس لئے رسی کا تانہ جسم کے وزن اور مثلاً ہونے سیال کے وزن کے فرق کے مساوی ہوگا اور یہ دونوں وزن ان فاصلوں کی نسبت منکوس میں ہونگے جو ان کے خطوط عمل اور دوری کے خط کے درمیان ہیں اور یہ تینوں خطوط ایک ہی انتہائی ستوی میں ہونگے۔

۵۲۔۔۔ اندہ کی تحقیق میں حسب ذیل ہندسی مسئلے کا رد ثابت ہونگے۔


اگر ایک ستوی سطح ایک ٹھوس جسم کو قطع کرے اور اس ستوی کو ایک بہت چھوٹے زاویہ میں ایسے خط مستقیم کے گرد گھمایا جائے جو انی ستوی میں واقع ہو تو قطع کردہ حجم وہی رہے گا بشرطیکہ خط مستقیم ستوی تراش کے رقبہ کے مرکز ہندسی میں سے گزرتا ہو۔ اس کتابت کرنے کے لئے کسی قسم کے ایک اسطوانہ پر محور کرو جس کو ایسی ستوی سطح قطع کرتی ہے جو اس کے قاعدہ کے ساتھ زاویہ طرباتی ہے۔

فرض کرو کہ تراش اس کے مرکز ہندسی کا فاصلہ اسطوانہ کے قاعدہ سے ہی ہے اور تراش کے قاعدہ کا عنصر صغیر اور مستویوں کا درمیانی حجم ح ہے تو

$$ح = \frac{حجم \times ن}{ل}$$

ن = حجم $\times$ ح = ح (مع حجم $\times$ ن ل) ح

ح = ح (قاعدہ کا رقبہ)



اب رقبہ کا مرکز ہندسی ان تمام تراشوں کا مرکز ہندسی ہے جو ان نقطہ میں سے گزرنے والے ستوی قطع کرتے ہیں۔ یہ بات ان تراشوں کے ظل اسطوانہ کے قاعدہ پر پڑنے سے بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے۔

اب چونکہ تمام تراشوں کے لئے ح وہی ہے


اس لئے قطع کردہ حجم بھی وہی ہو جائے۔

کسی شخص کی صورت میں اگر قاطع مستوی کو اپنے مرکز ہندسی کے گرد ایک بہت چھوٹے زاویہ میں گھمایا جائے تو تراشوں کو محدود کرنے والے سطحینوں کے نزدیک کی سطح بغیر کسی قابل قدر غلطی کے اسطوانی خیال کی جاسکتی ہے۔ اور اس لئے مسئلہ بالاکلی تصدیق ہو جاتی ہے۔
بالفاظ دیگر قاطع مستوی کے مقام میں تبدیلی سے حجم میں جو نقصان اور اضافہ ہوتا ہے ان دونوں کا فرق کسی ایک کے مقابلہ میں لا انتہا چھوٹا ہوتا ہے۔

۵۔ تعریف۔ اگر ایک حجم متجانس مائع میں تیرا ہو تو مائع کی سطح حجم کو جس مستوی پر قطع کرتی ہے اس کو تیراؤ کا مستوی کہا جائے گا۔
ہٹائے ہوئے مائع کی کیت کا مرکز ہذا اچھال کا مرکز کہلاتا ہے۔

۱۔ حسب ذیل بات کو دیا جاسکتا ہے۔

فرض کر دو کہ قاطع مستوی α ج. اب α ایک خط ج. لا کے گرد ایک چھوٹے زاویہ (ط) میں گھمایا گیا ہے اور اس کے رذ کا عنصر α ہے۔




تو قطع شدہ حجم میں جو اضافہ ہوگا اس کی جبری قیمت α ط ما α کے مساوی ہوگی۔ اب اگر یہ معدوم ہو جائے تو α ط ما $\alpha = 0$ ، جو اس بات کی شرط ہے کہ α کا مرکز ہندسی محور لا پر واقع ہو۔ اس طرح اگر α ج. کو مرکز ہندسی فرض کیا جائے تو α ج. میں سے گزرنے والا ہر مستوی اس شرط کا پورا کرے گا۔

معمی نہ رے کہ قطع شدہ حجم کا جبری معیار محور لا کے گرد α ط لا ما α ہے جو معدوم ہوگا اگر α ط لا ما $\alpha = 0$ ۔ یہی اگر محاور ج. لا. ج. ما رقبہ کے صدر می محاور ہوں۔

اگر جسم اس طرح حرکت کرے کہ پٹائے ہوئے مانع کا حجم بدلے تو تیراؤ کی مستوی سطحوں کے نصاب کو تیراؤ کی سطح اور ہ کے طریق کو اچھال کی سطح کہتے ہیں۔

۵۔ اگر ایک مستوی حرکت کرے اس طور پر کہ اس سے ایک ٹھوس جسم کا ہر حصہ مستقل حجم قطع ہو اور اگر قطع شدہ حجم کا مرکز ہندی ہو تو ہر اس سطح کا ماسی مستوی جو ہ کے طریق سے قاطع مستوی کے متوازی ہوگا

دوسرے الفاظ میں تیراؤ کی سطح کے کسی نقطہ پر اور اچھال کی سطح کے متناظر نقطہ پر کے ماسی مستوی ایک دوسرے سے متوازی ہوتے ہیں۔



ناطع مستوی ا ج ب کو ایک جھوٹے زاویہ میں بھراؤ فرض کر دو کہ اس کا نیا مقام ا ج ب ہے قانون ا ج آ اور ب ج ب کے حجم سادی ہیں۔

فرض کر دو کہ ان قانون کے بعد مرکز گ گ ہیں۔

گ گ محدود میں نقطہ ی یو اس طور پر کہ

ی ہ : گ گ :: حجم ا ج آ : حجم ا د ب

گ گ ی کو لاؤ اور نقطہ ہ ہو اس طور پر کہ

ی ہ : گ گ :: حجم ب ج ب : حجم ا د ب

تو ہ ہ مرکز ہندی ہوگا۔

لیکن ی ہ : گ گ :: ی ہ : گ گ

اور اس لئے ہ ہ ، گ گ کے متوازی ہے۔

جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر زاویہ ا ج آ کو لا انتہا کم کر دیا جائے تو انہما میں

سطح ہوگی جو سطحِ مرقب کے متشابہ ہے۔

۵۔ اجمال کے معنیوں کی خاصیتیں۔

مطلق دستور کے لئے، موجب و منفی (۴۹) تیراؤ کا معنی ن ق کا لغات ہے جو ایک زائد ہے جس کے تقارب ۱ ب، ۲ ج ہیں اور چونکہ ۱ ہ = ۲ ب، ۱ ج = ۲ ب، اس لئے اجمال کا معنی ایک متشابہ زائد ہے۔

اگر جسم ایک مستوی تیراؤ جو ایک مکانی سے محدود ہے تو تیراؤ اور اجمال کے معنی مساوی ہو گئے۔

لیکن اگر تیراؤ ناقصی تو اس سے محدود ہو تو معنی ہم مرکز ناقص ہوئے جو باہم متشابہ اور متشابہ بطور واقع ہوئے۔

اگر کسی میرے اما۔ تو را کا مرقب شدہ مستطیل ہو تو تیراؤ کا معنی میرے کا ایک تنہا لہذا ہوگا اور اجمال کا معنی ایک مکانی ہوگا۔

اس کو ثابت کرنے کے لئے فرض کر دو کہ تیراؤ کے دھکے مکملوں ا ح ب اور ا ج کے جواب میں بدستی مکرر دل کے معانات ہد، ہد ہیں۔


اگر ا ج = ج = ب = ا، ب ب = ہ، ج ج = ہ، ح، س = کل رقبہ جو قطع ہوتا ہے

تو س = س × ہ ل = ۱/۲ × ۱/۲ = ۱/۴ اور ب = (۱/۲ - ۱/۴) = ۱/۴

س لا = س × ہ ل = ۱/۲ × ۱/۲ = ۱/۴ اور ب = (۱/۴ + ۱/۴) = ۱/۲ اور ب = (۱/۴ - ۱/۴) = ۰

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

اور س = ۱/۲ = ۱/۲



یہ مثلثی دستور کی خاص صورت ہے اور جیسا دہاں یہاں بھی یہ او کی اور اجمال کے معنی متشابہ معنی ہیں۔

در حقیقت تیراؤ کا معنی ایک مکانی ہے جس کا س ج ہے۔ چنانچہ ہر ایک خط مستقیم بن گیا ہے۔

مثال (۲) دفعہ ۴۹ کی صورت میں س = ۱/۲


اور اچھال کا معنی مکانی ۳۲ = ۱۲ لا ہے۔

اس مکانی کے راس ہ پر انحناء کا نصف قطر $\frac{1}{2}$ ہے جو گ سے کم ہے۔

اس طرح ظاہر ہے کہ اچھال کے معنی کے تین عماد کھینچ سکتے ہیں جن سے توازن کے تین محل ملے گے۔

۵۱۔ اگر جسم ایک پتھر ہو جو زائد سی قوس سے محدود ہو تو معنی متناہد نامہ ہونگے۔

اگر قہ وقی تیراد کا خط ہو اور ۲۲۱۲۱۲



ق ق کے موازی اور اس کے مزدوج قطر

ہوں اور اس کے درمیان راوہ طہ ہو اس طرح

کہ $\frac{1}{2} \text{ ق} = \frac{1}{2} \text{ ق} = \frac{1}{2} \text{ ق}$

رفیق ق ق - $\frac{1}{2} \text{ ق} = \frac{1}{2} \text{ ق} = \frac{1}{2} \text{ ق}$ جب طہ فلا

$$= \left\{ \frac{1}{2} \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| - \frac{1}{2} \right\} \text{ لوک} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{2} \right)$$

اس طرح اگر آ کے ساتھ ایسی ج کو جن کے ساتھ جو نسبت ہے وہ متصل ہے

نیز

$$\text{رہ} (ج) = \frac{1}{2} \text{ جب طہ } \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \text{ فلا}$$

$$- \frac{1}{2} \text{ جب } \left(1 - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2}$$

اور اس ج کو جن کے ساتھ جو نسبت ہے وہ مستقل ہے۔

بہت سے خالص مندی استدلال سے بھی مستنبط ہو سکتے ہیں۔

۵۲۔ ایک مندرجہ ذیل صورت میں جو اس طرح تیرا ہے کہ اس کا اس آزاد طح

کے بے نسبت تیرا کی اور اچھال کی سطحیں گروستی زائد نما ہونگی۔

اگر مندرجہ ذیل اس واسطی تراش کا محور اعظم $\frac{1}{2}$ ج اور $\frac{1}{2}$ ج پر کا محور

$$\frac{ج}{۳۴} = ج'$$

اسی طرح دفعہ ۴۰ (۲) سے

$$ج (۱-۴) = \frac{ج (۱-۴) (۳+۵)}{(۲+۳) ۴} \leftarrow ج' \frac{۲}{۳}$$

جس سے اجمال کی سطح کے لئے متقاطعتی نقطہ ملتا ہے۔

۴۲ کسی تراش کا اسطوانہ۔

تیراؤ کی سطح نفت طہندسی کے خط و سنے پر ایک نقطہ ہے جو ج = ح سے حاصل ہوگا جہاں ڈ مودی تراش اور ح غرق سند نجم ہے۔

فرض کر دو قاطع مستوی کی مساوات

ی = ل + م + ج ہے اور سید و قاعدہ میں لیا گیا ہے۔

اجمال کے مرکز کے محدود (لا، نا، ی) ذیل کی مساواتوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

ح لا = کر لای فرلا فرما، قاعدہ تکمیل لیا گیا

= کر لا (ج + ل + م + نا) فرلا فرما

= اول + ہ م


اسی طرح

ح آ = کر لای فرلا فرما

= ل + ب م

اور ح ی = کر لای فرلا فرما

= (اول + ل + م + ب م) + ج' =



جہاں ا = لا فرلا فرما، ہ = لا ما فرلا فرما، ب = آما فرلا فرما

اگر ہم تراش کے صدری محوروں کو محور لا اور محور ما فرض کریں تو $h = 0$.

” ح آء اول ح آء ب م ح (ق - ج) = ۱/۴ (اول + ب م)

اس لئے اجمال کی سطح کی مساوات ہے

$$\frac{r - r_2}{r} = \frac{r_1}{b} + \frac{r_2}{a}$$

۶۳۔ ایک گردش مجسم ایسے مانع میں تیر رہا ہے جو ایک انتقصابی محور کے گرد گھوم رہا ہے گویا یہ ٹھوس ہے مجسم کا محور گردش کے محور پر منطبق ہوتا ہے۔ توازن کی شرط معلوم کرنا مطلوب ہے۔

گھومنے والے مانع کی کیت میں ایک گروشی سطح کھینچو جس کا محور گھومنے والے مانع کے محور پر منطبق ہو۔ اس سطح کے اندرونی مانع کے توازن پر غور کرو۔ اس مانع پر سیالی دباؤں کا حاصل اس کے وزن کے مساوی ہونا چاہیئے اس طرح اگر اس مانع کی جگہ کوئی مجسم لے لے تو اس کی سطح پر بھی یہی سیالی دباؤ عمل کریں گے اور اس لئے اس قسم کا مجسم متوازن ہوگا اگر اس کا وزن ہٹائے ہوئے نیسے کے وزن کے برابر ہو یہ قابل توجہ ہے کہ خواہ مجسم کیال کے ساتھ گھومے یا ان کی زاویہ رفتار مختلف ہو یا یہ ساکن ہو ہر صورت میں نتیجہ بالاصداق آئے گا۔ مثال :- ایک اسطوانہ گھومنے والے مانع میں تیرا ہے جس گہرائی تک یہ ڈوبتا ہے اسے معلوم کرو۔

اگر سہ زاوی رفتار ہو تو آزاد سطح کے کوئی بھی مکانی کی مساوات اس کے اس کو مبداء قرار دینے سے $s = \frac{1}{2} a t^2$ جی ہوگی۔ اور اگر تیراؤ کے دائرہ کے نیچے یعنی اس دائرہ کے نیچے جو آزاد سطح اور اسطوانہ کی سطح کے تقاطع سے حاصل ہوتا ہے اسطوانہ کے قاعدہ کی گہرائی کی ہو اور اس کے قاعدہ کا نصف قطر تو ہٹانے ہوئے سیال کا حجم، کی ارتفاع کے اسطوانہ

کے حجم اور سطح ارتفاع کے کافی نما کے حجم کے فرق کے مساوی ہوگا۔
پس اگر اسطوانہ کی کثافت ρ اور سیال کی کثافت ρ_1

$$\rho_1 \text{ راف} = \rho (\text{رہی} - \frac{\rho_1}{\rho} \text{ سطح})$$

$$\text{اور یہی} = \frac{\rho_1}{\rho} \text{ ف} + \frac{\rho_1}{\rho} \text{ (ف اسطوانہ کا ارتفاع ہے)}$$

۴۔ زیادہ عام صورت ایسے جسم کی ہے جو جزاً مکلاً غرق شدہ ایسے مائع میں تیر رہا ہے جو معلومہ قوتوں کے زیر عمل ساکن رہے۔ اور جی قوتیں جسم کے سالمات پر بھی عمل کریں۔ اس جسم میں متوازن قوتوں کا حاصل قوت ہٹائے ہوئے مائع پر بھی حاصل قوت ہے۔ جس کے مساوی ہوگی۔ اور ان قوتوں کے خطوط عمل وہی ہونگے۔

کیونکہ یہ مائع علیحدہ کر لیا جائے اور اس کی جگہ کو مٹائے ہوئے مائع سے پُر کر دیا جائے تو جسم پر سیال کا حاصل دباؤ وہی ہوگا جو مٹائے ہوئے مائع پر رہا ہے۔ اور اس سے وہ ہلے ہوئے مائع پر بھی اسی قوت کے مساوی اور متقابل ہوگا۔

مثال۔ مائع کی کچھ کثیت ایسی قوت کے زیر عمل ساکن رہے جس کا مرکز ایک تہ نشہ ہے۔ اور جیسے بدلتی رہے جیسے اس مرکز سے فاصلہ ایک ٹھوس جسم کو دی فطاح کی شکل کا اس میں براہِ غرض ساکن ہے۔ اس کا اس مذکورہ بالا ثابت نقطہ پر رہے مائع اور ٹھوس کی کثافتوں کا مفہد پر کرنا مطلوب ہے۔

توازن کی صورت میں فرض کرو کہ مائع کی آزاد سطح کا نصف قطر اور گروی سطح کا نصف قطر ہے۔ قطاع کے حجم کو مٹائے ہوئے مائع کے حجم کے ساتھ $\frac{\rho_1}{\rho}$ کی نسبت لیں اور نوٹہ کے مرکز سے ان کی کمیتوں کے مرکوزوں کے فاصلے r_1 اور r_2 کی نسبت رکھیں گے۔
اگر کثافتیں ρ_1 اور ρ_2 ہوں تو $\rho_1 r_1 = \rho_2 r_2$

مشلہ

۱۔ دو قائم ہم محور مخروطوں کو جن کے راسی راوئے وہی ہیں راسوں سے جو کو ایک ہم نایا گیا ہے۔ اس کو ایک برتن میں اس طرح رکھا گیا کہ اس کا ایک سر برتن کے افقی قاع پر چکا ہوا ہے۔

جہاں میں پانی ڈالا گیا ہے اگر اوپر سے مخروط کا ارتخاع نیچے کے مخروط کے ارتخاع کا تین گنا ہو اور ان کی مشترک کثافت پانی کی کثافت کا چھ سو فیصد ہو تو ثابت کر کہ جسم عین اُسے کو ہونگا جیسے پانی اس کے اوپر کے رے کے مستوی "تک پہنچ جائے۔

۱۔ معلومہ وزن اور حجم کا ایک مخروط نیچے وار راس کے ساتھ تیر رہا ہے۔ ثابت کر کہ مخروط کی سطح جسکو مانع مں کرنا ہے کم سے کم ہوگی جبکہ اس کا زاویہ راس 45° ہو۔
 ۲۔ ایک مربع تختہ ایک مانع کے اندر جس کی کثافت اس کا راس کا راس سے رکھا گیا ہے۔ ثابت کر کہ اس کے تیرنے کے چاروں طرف محل ہر سے کہتے ہیں جبکہ اس کا صرف ایک معلومہ کونہ مانع کی سطح کے نیچے ہو۔

۳۔ ایک جسم پانی میں تیر رہا ہے۔ ایک کھوکھلے برتن کو اندھا کر کے اس پر رکھا گیا ہے اور اسے نیچے دبا گیا ہے۔ جس کے محل میں کیا اثرات تو ع پیدا ہوگا (۱۱) بلحاظ برتن کے اندر فی مانع کی سطح کے زاویہ پانی برتن کے راس فی مانع کی سطح کے۔

۵۔ ایک کھوکھلے نصف کرہ کی سطح کے ایک نقطہ پر ایک وزن در درہ لگا دیا گیا ہے۔ خول پانی میں اس طرح تیر رہا ہے کہ ذہ پانی کی سطح کے من پور ہے، اور کنارہ کی سطح پانی کی سطح کے ساتھ زاویہ 54° بنائی۔ یہ ثابت کر کہ

نصف کرہ کا وزن اس پانی کو برتن جہاں میں سما سکتا ہے $2\frac{1}{2}$ تا $3\frac{1}{2}$ ہے۔
 ۶۔ ایک مخروط جس کا نصف راس 60° اور محور کا طول 10 ہے۔ انتظامی محور اور

نیچے وار راس۔ اسے ساتھ ایک سیال میں تیر رہا ہے۔ یہ کثافت مخروط کی کثافت کا چھ سو فیصد ہے۔ ثابت کر کہ اس کے تمام کھوکھلیوں کا مرکز ایک ہی نقطہ ہوگا۔ اگر سیال، مثل ٹھوس کے مخروط کے محور پر سطح ہوئے رے امتداد میں۔ کے مرکز $\frac{1}{2}$ کی زاویہ راس سے نکلتے ہوئے۔

۷۔ ایک ٹھوس مخروط کو اس کے محور میں سے گزرنے والے مستوی سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ حصے ایک قبضہ کے ذریعہ اس پر جوڑ دے گئے ہیں اور اس نظام کو پانی میں اس طرح رکھا گیا ہے کہ راس نیچے وار اور محور انتظامی ہو۔ اگر حصوں کی علیحدگی کے بغیر یہ نظام تیر رہا ہو تو ثابت کر کہ وہ نہ ہوتے محو کا طول ف جب سے بڑا ہے جہاں مخروط کے محور کا طول ف اور اس کا زاویہ راس 60° ہے۔

۸۔ ایک مخروط کا راس ایک برتن کے مینہ سے بر جس میں پانی ہے نیچے کر دیا گیا ہے۔

مخروطی اسطوار پر توازن میں ہے کہ اس کا مائل ضلع استقامتی اور اس کے قاعہ کا زیر ترین سطح
پانی کی سطح کو عین مس کرتا ہے۔ مخروط کی کثافت کا پانی کی کثافت سے مقابلہ کرو

۹۔ منحنی $\frac{1}{4}$ = لہک ت۔ کے گوبیضہ کو اس کے تقارب کے کردہ گھما کر ایک یا لے کی

منحنی سطح بنائی گئی ہے یہ یا لہ ایک مانع میں اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کو محور انتظامی
اور ٹوٹ سہائیچہ وار ہے اور اس میں ایک رماؤں ورنی مانع ڈال دیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ
اگر پیائے کو مناسب وزن دیا جائے تو دونوں مانعوں کی سطحوں کے درمیان فاصلہ
مستقل رہے گا۔

۱۰۔ ایک اسطوانہ ایک مانع میں اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا محور انتظامی ت کے ساتھ
زاویہ میں اسٹا بنا رہا ہے اور اس کا اوپر وار سر سطح کی سطح کے عین اوپر ہے۔ ثابت کرو کہ
اسطوانہ کا نصف قطر اسکے ارتفاع کا چھٹہ ہے۔

۱۱۔ ایک ہی شے سے بڑے دو ڈنڈوں کے سہ برابر دسے میں او
یہ ڈنڈے ایک مانع میں اس طرح تیر رہے ہیں کہ اس کا زاویہ مانع میں دسے سے تیز ہے۔ ثابت کرو کہ
یہ مانع کا منحنی مکانی ہے۔

۱۲۔ ایک مخروط نیچے وار اس کے ساتھ پانی کے ایک اسطوانی برتن میں تیر رہا ہے۔ اس کو
بغیر جھکانے کے پانی کی سطح سے عین باہر نکالا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ کام ہو گیا کیا وہ ہے

(۱۲ - ۱۱)

جہاں مخروط کا وزن دسے اور توازن کی حالت میں مانع کی سطح کے نیچے وار دسے
ل ہے اور ل اسٹا لہ کا طول ہے جو توازن کی حالت میں مخروط کے ہمارے دسے
پانی سے بھرا جاسکتا ہے۔

۱۳۔ ایک قائم مستدیر اسطوانہ اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا ایک سر اسٹا ہے۔
اچھا ل کی سطحیں معلوم کرو۔

۱۴۔ تھالیں ماوے کی ایک دسی ہونی سدا ہے ایک گروشی مانع مانع آا۔
جو نیچے وار اس کے ساتھ تیر رہا ہے۔ ثابت کرو کہ تیراؤ کے سنو سے اس کے مرکز

کے فاصلہ کا مرتبہ در خاص کے تناسب ملے گا۔

۱۵۔ چھوٹی مورتائی کا ایک کھوکھلا نصف کر دی چال ایسے ڈھکنے سے بند ہے جسے اسی شے کا بنا ہوا ہے اور مورتائی وہی ہے جو پیالہ کی ہے۔ اگر پیالہ ایک مائع میں تیر رہا ہو اور ہر کہ اس کا مرکز مائع کی سطح میں ہو تو ثابت کر دو کہ ڈھکنے کا مریمان انصافی سمت کے ساتھ ہوگا۔

۱۶۔ ایک قائم مستدیر مخروط کا مستوی قاعدہ ماضی کی شکل کا ہے۔ یہ مخروط اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا طویل ترین کون افقی ہے۔ اگر زاویہ راس ۲۰ درجہ ہو اور مستوی قاعدہ ۱۰ ذلیل ترین کون کا درمیانی زاویہ یہ ہو تو ثابت کر دو کہ

$$5 \text{ مم } 3 = 5 \text{ مم } 4 - 5 \text{ مم } 2$$

۱۔ اگر ایک قائم مستدیر مخروط کا ارتفاع قاعدے کے قطر کے مساوی ہو تو مخروط اپنے سے بڑی کثافت والے کسی مائع میں تیرے گا اس طرح کہ اس کا مائل ضلع افقی ہو۔

۱۸۔ ایک مخروط کا ارتفاع ۲۰ درجہ اور زاویہ راس ۲۰ درجہ ہے اس کا راس ایک مائع کی سطح کے نیچے گہرائی پر ثابت کر دیا گیا ہے۔ ثابت کر دو کہ توازن کی حالت میں اس کا قاعدہ مائع کے مین باہر ہوگا اگر

$$\text{تقل}^2 \text{ حم}^2 \text{ جم}^2 \text{ ط} = \text{ثقل}^2 \text{ جم}^2 \text{ ط} - \text{جم}^2 \text{ ط} + \text{جم}^2 \text{ ط} + \text{جم}^2 \text{ ط}$$

جہاں ث اور ث بالترتیب مائع کی اور مخروط کی کثافتیں ہیں۔ اور ط مساوات گ جم = ث جم (ط + جم)

سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۔ ایک ذواربہ السطوح (چار شئی) پانی میں اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا ایک کونہ غرق اس کونہ پر ملنے والے تینوں کونوں سے مساوی اور ایک دوسرے کے علی التوا قائم ہیں۔ ثابت کر دو کہ توازن کے حال ایک، یادو، یا تین ہو سکتے ہو جب اس کے کہ چار سطحی کی کثافت کہ پانی کی کثافت سے جو نسبت ہے وہ ۴:۲۷ سے بڑی ہو یا مساوی یا چھوٹی۔

۲۰۔ ایک نصف کر دی مخروط (نصف قطر ۱) جس میں پانی ہے اپنے محور کے گرد جوا انصافی ہے $\frac{3}{16} \pi$ کی زاویہ رفتار سے گھوم رہا ہے۔ ایک گروہ (نصف قطر ۱)

پانی یرسا کہ اسے اس طور پر کہ اس کا زیرین نقطہ حل کو سہاگہ ہو۔ پانی یرسا
ہیں ڈالتا۔ اگر آزاد سطح حل کی کوریکنٹار سے میں سے کوریکنٹار سے
کرہ کی کثافت۔ پانی کی کثافت : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰

۲۱ — ایک متساوی الساقین مثلثی پتھر (ج) (زاویہ ج قائمہ) ایسے اے میں جسکی
کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی اس طرح تیز ہوتی ہے کہ اس کی سطح۔ متساوی الساقی ہے
اور اس کا زاویہ ج مانی میں ہر ق ہے اگر اب اس مانی سمیت۔ اے ساتھ۔ او۔ پتھر۔ + ھ
بنائے تو ثابت کر دو کہ توازن کے۔ دونوں مخلوط میں جن میں اب افقی نہیں ہوتا۔ کی
قیمت شکل ذیل کی مساوات سے حاصل ہوگی

م سب ط + جم ط - (ب س ط + جم ط) ۲

۲۲ — ایک قائم مستطیل اسطوہ میں جس کا محور اتنا ہی سے مائع کی لمبائی سے برابر ہے۔ کی
کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی اس میں مساوی ہے۔ تاہم وہ قائم مستطیل ہے۔ پھر اسطوہ کے
محور پر منطبق ہوتا ہے نیچے۔ دار اس کے ساتھ آہستہ آہستہ۔ پتھر۔ + ھ۔ دیا
گیا ہے اگر مخروط ڈالیں میں ہو جبکہ۔ مائع میں ہے۔ ق ہو۔ تاہم کہ۔ مائع۔ + ھ۔ دیا
گہرائی پتھر کی ابتدائی کثافت کے مساوی ہوگی جو۔ پتھر۔ + ھ۔ دیا۔ مائع۔ + ھ۔ دیا۔

۲۳ — ایک ٹھوس مخروط جس کا ارتفاع۔ او۔ اس۔ مائع۔ + ھ۔ دیا۔ کثافت۔ مائع۔ + ھ۔ دیا۔
اس کے گرو حرکت کر سکتا ہے۔ اس کا اس ایک مائع کی سطح کے نیچے پتھر کی ثابت
کر دیا گیا ہے۔ مائع گہرائی پتھر کی کثافت مہی ہے۔ مخروط متوازن ہے۔ اس طو۔ مائع۔ + ھ۔ دیا۔
محور انقباضی سمت کے ساتھ راویہ ط۔ مائع۔ + ھ۔ دیا۔ اور اس کا قاعدہ مائع کی سطح کے مابین ہے۔ ثابت کر دو۔

مہ گ ھ جم ط = ھ ف م {جم ط + م (جم ط - م)} ۳

۲۴ — ایک مکمل مکافہ مابین جس میں ایک وزن دار کرہ پڑا ہوا ہے۔ پانی میں تیر رہا
ہے۔ اس کے اس پر ایک سو رانخ ہونے کی وجہ سے رتن اور کرہ کی درمیانی مضامیالی
سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کرہ کا حاصل دباؤ اس پانی کے نصف وزن کے مساوی ہو
جو کرہ کے بھرنے کے لئے دار کرہ ہوتا ہے، ثابت کر دو کہ پانی کی سطح کے نیچے کرہ کے مرکز
کی گہرائی $\frac{2}{3}$ ہے جہاں مکافہ مابین کا وتر خاص ۴ اور اس سے تمام مستوی

کر دیا گیا ہے۔ مانع کی کثافت ۳ ہے اگر غرق اس طور پر تیر رہا ہو کہ اس کا قاعدہ پوری طرح غرق ہو اور اس کا محور انتہائی سمت کے زاویہ طہ بنائے تو ثنابت کر کہ

$$ف^۳ (ث - ث) = \{ (جم + ط) - (ع - ط) \} = ۲ = ۲ \text{ دقت جم طہ جم } ۳$$

۳۰۔۔۔۔۔ لانتہا چھوٹا برف کا ٹکڑا جس کی شکل قیام مستدراستطوان خیال کیجا سکتی ہے پانی میں اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا محور انتہائی ہے جو حصہ غرق ہے اس پر ثنابت کے دوسرے ذرات آکر جیسے جاتے ہیں اس طور پر کہ اس کی اسطوانی شکل برقرار رہتی ہے اور اس کے محور او بضعف قطر میں مساوی سمت میں مساوی اضافہ ہوتا ہے۔ غیر غرق شدہ حصہ کی انتہائی شکل معلوم ہو۔ اگر ثنابت کی کثافت اثنائی ۹۶ ہو تو ثنابت کر کہ اس کی سطح منحنی

$$۱ (۹ - لا - ما) = ۲۵ = ۲۴$$

کی گردش سے حاصل ہوگی۔

۳۱۔۔۔۔۔ ایک مساوی الاضلاع مثلث ایک مانع میں تیر رہا ہے جس کی کثافت مثلث کی کثافت کا چار گنا ہے۔ اچھال کی پوری سطح دریافت کرو۔ اور ثنابت کر کہ آن لفت اس طرح پڑ جائے انخفا غیر مسلسل ہے منحنی کے ماس زاویہ

$$\frac{۳۱۸۱۲}{۱۰۶} = ۳۰۰$$

پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۳۲۔۔۔۔۔ ایک ٹھوس جو ستویں لا = ۱۰ ما = ۱۰ ب = ۱۰ ی = ۱۰ ی = ج سے محدود ہے پانی میں اس طرح تیر رہا ہے کہ قاعدہ ی = ۱۰ پوری طرح غرق ہے۔

ثابت کر کہ ایسے ہٹاؤں کے لئے جن میں غرق شدہ حجم مستقل رہے اور قاعدہ پوری طرح پانی کے اندر اور اس کے مقابل کا رخ پوری طرح پانی کے باہر ہے اچھال کی سطح کی مساوات ہے

$$\frac{۱}{۳} - \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۳}$$

۳۳ — کسی عمودی تراش کا ایک اسطوانی ظرف اس طرح تیار ہا جسکے اس کے محور کا ۲ ج طول غرق ہوتا ہے جب کہ محور انتصابی ہو۔ ثابت کرو کہ اچھال کی سطح کی مساوات ہے

$$\frac{y}{j} = \frac{a}{b} + \frac{a'}{b'}$$

جہاں انتصابی حالت میں محور کا جو حصہ غرق ہوتا ہے اس کا وسطی نقطہ مبدا رہے، عمودی انتصاباً اوپر دار ہے اور محاورہ لا، اما عمودی حالت میں تیراؤ کی نسبی سطح کے مرکز ثقل میں سے گزرنے والے جمود کے معیاروں کے صدی محوروں کے متوازی ہیں اور تیراؤ کی سطح کے ان محوروں کے لئے گردش کے نیم قطب ہیں۔



(۸۲)

پانچم

تیرنے والے جسموں کے توازن کی قائمیت

۶۵۔ اگر ایک تیرنے والا جسم کے محل میں کسی سمت میں صیغہ سا ہٹاؤ پیدا کیا جائے تو عام طور پر جسم یا تو ایسے اصلی محل پر یا اس پر نیکی طرف مائل ہوگا یا اس محل سے دور ہٹنے کا رجحان رکھے گا۔ ہٹاؤ کی اس خاص سمت کے لئے صورت اول میں توازن کو قائم اور صبریت دوم میں غیر قائم کہتے ہیں۔

پہلے اچھوٹے انتظامی ہٹاؤ پر غور کرو۔ اگر جسم تنہا اس سیال میں جڑاؤ بنو سکتا ہے تو ایک ہی سیال میں جس کی کھال گہرائی کے ساتھ ساتھ جڑاؤ کا کٹاؤ سیدھا ہو تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو دبا کر نیچے اتار دینے سے ہٹاؤ ہونے سیال کا دباؤ نہ بچاے گا اور مرعوف اس کے اسکو اور ایٹما سے یہ دباؤ ٹھٹ جائیگا۔ اس لئے ہر صورت میں سیالی دباؤ کا میلاں جسم کو اس کے سکوں کے محل کی طو لیا جائے گا۔ اور اسلئے انتظامی ہٹاؤ کا لحاظ کرتے ہوئے توازن قائم ہے۔

لیکن یہ یاد رہے کہ یہ انتظامی ہٹاؤ اس کے لئے ثابت کیلکولی ہے۔ ہٹاؤ کے وجہ سے دباؤ میں جو اضافہ ہوتا ہے اگر اس سے تیرنے والے جسم کے کسی حصہ میں یکساں پیدا ہو جائے تو توازن کا قائم ہونا ضروری نہیں بلکہ فی الحقیقت یہ غیر قائم ہو سکتا ہے۔

کسی اختیار پر ہٹاؤ سے عام طور پر جسم کے محل میں انتظامی اور زیادہ جی دونوں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہٹاؤ چھوٹا ہو جیسا ہم نے

فرض کیا ہے، جسم کے محل میں ان تبدیلیوں کے اثرات براہِ الگ الگ خور کیا جاسکتا ہے۔ اب ہم ایک چھوٹے زاویہ مثلاً دو کے اثر پر یہ فرض کر کے غور کریں گے کہ ہٹائے ہوئے سیال کا دباؤ ہمیں بدلتا۔ اور اس لئے سیالی دباؤ جسم کی کمیت کے مرکز کو اٹھانے یا بٹھانے میں کوئی میلان نہیں رکھتا۔

۶۶۔ ایک ٹھوس جسم سکون کی حالت میں ایک متجانس مائع میں تیر رہا ہے اسکو ایک دے ہوئے انتظامی مستوی میں، ایک چھوٹے زاوے میں سے گھمادیا گیا ہے۔ یہ معلوم کرنا مطلوب ہے کہ سیالی دباؤ جسم کو اپنے ابتدائی محل میں لیجانے کا میلان رکھے گا یا نہیں۔

فرض کر دو کہ محورِ ما کے گرد جو تیراؤ کے مستوی اوب میں واقع ہے جسم کو چھوٹے راویہ ط میں سے گھمایا گیا ہے، و ما کا غنہ کے مسنوی پر علی القوائم ہے ابتدائی محل سے ولا تیراؤ کے

واقع ہے۔ فرض کرو کہ جیسے جسم
گھمایا جاتا ہے یہ محور اس کے
ساتھ ہی جاتے ہیں۔

اگر تیراؤ کے مستوی پر رقبہ
کا عنصر فرما فرما سے تعبیر ہو تو

عنصری ستون ناق کا حجم

ی فر لا فرما ہوگا جہاں ی طول نق کو تغیر کرتا ہے، ہٹائے ہوئے محل میں متناظر ستون نق کا طول ی + لاٹھ اور اس کا حجم (ی + لاٹھ) فر لا فرما ہے۔ یس ہٹائے ہوئے سیال کا حجم ح دونوں صورتوں میں وہی ہوگا اگر

کسری (ی + لاط) فرلا فرما = τ = کسری فرلا فرما

جہاں تکملے جسم کی اُس تراز پر لے گئے ہیں جو ابتدائی محل میں تیراؤ کی سطح سے قطع ہوتی ہے۔

یہ اس جملہ میں تحویل ہو جاتا ہے $\text{لا فرلا} = \text{ما}$ ۔ جس کے یہ معنی ہیں

کہ سطحی تراستس کا مرکز نقل و ماہر واقع ہونا چاہیے جیسا کہ صفحہ ۵۲ میں ثابت کیا گیا ہے۔

فرض کرو کہ یہ شرط پوری ہوتی ہے۔ ابتدائی محل میں مرکز نقل ث اور اچھال کا مرکز ہر ایک ہی انحصانی خط میں واقع ہوتے ہیں اور اچھال کے مرکز کے ممدوں کو ہم (لا، آ، ہی) سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ ہم دیکھنے میں کث کے لئے (لا، آ، ہی) وہی ہیں۔ پٹائے ہوئے محل میں اچھال کا مرکز مقام ہیر جیلا ہوتا ہے اور فرض کر کہ ہ کے محدد ابتدائی محوروں کے حوالے سے (لا، آ، ہی) ہیں۔

اب $\text{ح لا} = \text{لا ی فرلا فرما}$ ، $\text{ح ما} = \text{لا ی فرلا فرما}$

$\text{ح ی} = \text{لا ی فرلا فرما}$

جہاں ہر سی ستون ن کے حجم کو ی دلا فرما لیکر اس کے مرکز نقل کو اسے طول کے وسطی نقطہ پر لیا گیا ہے اور یہ سیکلے اس بنا پر نکلے گئے ہیں۔

مٹائے ہوئے محل میں متناظر عنصری ستون ن ق ہو گا جس کا ط ل ی + لا ط ہے۔ اس کا مرکز نقل ن سے $\frac{1}{2}$ (ی + لا ط) فاصلہ پر واقع ہے اور اس لئے ن سے $\frac{1}{2}$ (ی - لا ط) فاصلہ پر۔ اس لئے

$\text{ح لا} = \text{لا ی فرلا فرما}$ (ی + لا ط) $\text{ح ما} = \text{لا ی فرلا فرما}$ (ی + لا ط) دلا فرما

$\text{ح ی} = \text{لا ی فرلا فرما}$ (ی - لا ط) (ی + لا ط) دلا

ہم دیکھے ہیں کہ جھوٹے راویہ ط کی پہلی قوت تک ہی = ہی اور اس لئے اچھال کی سطح کا ماسی سنوی تیراؤ کے مستوی کے متوازی ہے جیسا کہ صفحہ ۵۲

میں ثابت کیا گیا تھا۔

اب ہٹائے ہوئے محل میں جسم پر مساوی و متقابل دو متوازی قوتیں عمل کرتی ہیں یعنی ایک قوت اس کا وزن W نیچے اور دوسری قوت جو نقطہ ثقل سے انتصاباً نیچے وار عمل کرتا ہے اور دوسری اچھال کی قوت جو نقطہ ثقل سے انتصاباً اوپر وار عمل کرتی ہے۔ یہ قوتیں ایک جفت بناتی ہیں۔ اس جفت کا مستوی گردش کے محور پر علی التوائم ہو گا صرف اُس صورت میں جبکہ فاصلہ h ایک ایسے انتصابی مستوی میں واقع ہوں جو دما پر عمود وار ہے۔ یعنی اگر $MA = MB$

ا۔ $MA = MB$ (ی + لاط) فرلا فرما = $MA = MB$ فرلا فرما

جو۔ $MA = MB$ لاما فرلا فرما = $MA = MB$ میں تحویل ہو جا رہا ہے جس کے


یعنی ہیں کہ گردش کا محور دما، جسم کی اس تراش کا جہود کا صدری محور ہونا چاہیے جو تہر اُٹے مستوی سے قطع ہوتی ہے۔

جب یہ شرط پوری ہو تو h میں سے گزرنے والا انتصابی خط h کو ایک نقطہ M پر قطع کر لیا جسکو ہم مرکز یا پس مرکز کہیں گے۔

جسم پر عمل کرنے والا جفت $W \times h$ و $W \times h$ ط

جسم کو اپنے اصلی محل پر لیجانے کا میلان رکھتا ہے اگر h ، h کے اوپر واقع ہو یا یہ اصلی ہٹاؤ کو بڑھانے کا میلان رکھتا ہے اگر h ، h کے نیچے واقع ہو۔

نیز حاصل ہوتا ہے $h \times M$ ط



ہ ہ = لا۔ لا

= ط کر لا^۲ فر لا فرما

ح

اسلئے ہ ہ = - چ اچھا جہاں اس گزشت کے محور کے گرد جسم کی اوس

نشان کا جو دو کا معیار ہے جو تیار کے مستوی سے قطع ہونی ہے۔

اس لئے جسم کو اپنے اصلی محل کی طرف لیجائے گا سیلان رکھنے والا جنت
یہی استر وادی جنت ہے

ج ت ح (ہ ہ - ہ ت) = ج ت (ا س - ح) = ہ ت

۶۷۔ اب یہ کوئی عملی تراس کے مرکز ثقل سے ہونے والے ہوتے ہیں
دو ہوتے ہیں جن کے جواب میں محور کے معیار میں ہوتے ہیں۔ اس لئے
ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک گام ہوتا ہے۔ ان میں ایک جنت پیدا کرے گا
جو جسم کو متوازن کرنے کا سیلان رکھے گا اگر ہ ت = ح ت = ج ت = ح ت

ہیں۔ ان میں کی تمامیت کے لئے ہ ہ = ج ت

۶۸۔ کام ہو مٹا دینا کر کے میں کیا جاتا ہے۔ جب کہ تو ایک چھوٹے
راویہ میں ہوتی رہتی ہے۔ مرکز ثقل میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔
گردیدہ ایسا ہے جو جسم پر عمل کرنے والا جنت ہوگا

ج ت (ا س - ح) = ہ ت

اس لئے ط میں ایک چھوٹی مقدار فرط کا اضافہ پیدا کرے کے لئے ہ ت

جو کام سے کا وہ = ج ت (ا س - ح) = ہ ت

مکمل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ راوی ہٹاؤط کے پیدا کرنے میں حکم کیا جاتا ہے وہ
= ج ت (ا س - ح) = ہ ت

۶۹۔ قاننیت کے شرائط کا کافی ہونا۔ یہ او کے مسہی میں کسی ایسے محور کے گرد جو پانی تراش یا فاصل آب کے مرکز تفل میں سے گزرتا ہے اگر چھوٹا گھماؤ یا گرامش مل لی جائے تو یہ گردشیں گردشوں طہ طہ کا مرکب خیال کی جاسکتی ہے جنہیں بالترتیب فاصل آب کے مدد میں محوروں کے گرد لیا جائے۔ ان میں سے ہر گردش علیحدہ طور پر ایک استہدادی جفت پیدا کرتی ہے اور اس لئے ہٹاؤ کے پیدا کرنے میں بیرونی عامل کا کل کام یا توانائی بالقوہ میں اضافہ ہوگا

ط ج ث (ج۔ ح × ھ ث) طہ + ط ج ت (ج۔ ح × ھ ت) طہ

جس سے نتیجہ ستیج ہوتا ہے کہ شرائط ھ ت > ط ج اور نیز > ط ج ایسے ہٹاؤں کے لئے قاننیت کی کافی شرطیں ہیں جن سے ہٹائے ہوئے مانع کے حجم میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔

۷۰۔ قاننیت کے مسئلہ پر بحث کسی قدر مختلف ہر ایہ میں ہو سکتی ہے۔ مرکز الجہد یا پس مرکز کی یہ تعریف کہ وہ خط ھ ت اور ایک خفین ہٹاؤ کے بعد اجمال کے نئے مرکز میں سے گزرنے والے انتصابی خط کا نقطہ تقاطع ہے جس مسئلہ ذیل کی طوف رہبری کرتی ہے۔

پس مرکز اجمال کے منحنی کے اس نقطہ پر کا مرکز انجما ہے جہاں پر ت میں سے گزرنے والا انتصابی خط اس منحنی سے ملتا ہے۔


یہ صاف ظاہر ہے کیونکہ نقطہ ہر منحنی کے متصلہ عا دوں کا نقطہ تقاطع ہے۔ پس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ہٹاؤ کے لئے بشہ طیکہ ہٹایا ہوا حجم وہی رہے، سیالی دباؤ کی سمت ہمیشہ اجمال کے منحنی کے برہیجہ کا انتصابی

لے اس قسم کے ہٹاؤں کو کام ہوتا ہے اس کے جلد میں طہ طہ والی رقم شامل ہیں ہوتی۔ اس کو دو آئیدہ ۹ کی طرح تات کیا جاسکتا ہے۔

ملا کر جوڑو۔

۱۔ سب کو گرتے کی، وہ تہ ہنر اعلیٰ ہے۔ یہ ایسے مکر کے رسالے ہیں کہ کتے میں
مرض کا دیکھ کر ہم اطباء کامرک بند ہی ہو اور اطباء کا ہے۔ اس معانی پر

زاویہ طوٹے۔



اگر تیرا، کے مسموم کے رقبہ کا معرعہ ہو اور جاس سے کر۔ ۔ اسلئے
انسانی حظ پر موو، ہم، ہم، ہوں تو

هم م - هم م = (ج) ل م ن ه و ز ح ط

Σ + ۱۰۰ - ط - عه × جف

! $حل \times ح = ط$ است

لیکن اگر ہیرکا مرکز احما ہے۔ ہوتو

هل = هم × ط = هم × ط

$$21 = 2 \cdot 10 + 1$$

ایس جھولے بٹاڑ ط کے لئے اسنے وادی معیار

= ج ف ح × شام × ط = ج ب ط (ا س ر - ح × ه ت س)

۷۲۔ گزشتہ دفعہ میں یہ بات فرض کر لی گئی ہے کہ سیالی دباؤ کے عمل کا انتصابی خط ایک خفیف ہٹاؤ کے بعد ہٹ کو قطع کرتا ہے۔ یہ صرف اس وقت درست ہوگا جبکہ ہٹاؤ کی سطح مسوی نقطہ ہر ارجھال کی سطح کی صدری تراستس ہو۔ جب یہ صورت نہ ہو تو ہٹاؤ کے انتصابی مستوی پر خط عمل کا ظل، ہٹ کو نقطہ ہر پر قطع کرے گا جو سطح کی عمادی تراشیں کا مرکز انخا ہوگا۔

اس لئے نقطہ ہر پر ارجھال کی سطح کی کسی عمادی تراش کے انخا کا نصف قطر $\frac{1}{2}H$ ہوگا اور اگر تیراؤ کے مستوی کے جوہ کے صدری معیار اس کے مرکز ہندسی پر $\frac{1}{2}H$ سے ہوں تو ارجھال کی سطح کے انخا کے صدری نصف قطر $\frac{1}{2}H$ پر

$$-\frac{H}{2} \text{ اور } \frac{H}{2}$$


ہونگے اور اس کی صدری تراشیں تیراؤ کے مسوی کے صدری محوروں کے توازی ہونگی۔

۷۳۔ قدرتا ایک نہایت اہم صورت پیش ہوتی ہے۔ یہی ایک جہاز کے توازن کی ثابیت کا سوال جبکہ رولنگ (Rolling) کی وجہ سے اس کے محل میں ہٹاؤ پیدا ہو۔

عام طور پر جہاز کے لئے اُچھلے (Tossing) کے بغیر ردحکنا ممکن نہیں ہے کیونکہ جہاز کے دونوں سرے غیر متشاکل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بہت لمبے جہاز کی صورت میں جیسے کہ عام طور پر بحر اوقیانوس (Atlantic Ocean) میں چلنے والے جہاز ہوتے ہیں یہ مان لیا جاسکتا ہے کہ جہاز ایک مستوی سے جو اس کے طول پر عمود دار ہو متشاکلا تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں جہاز میں متشاکل کے دو انتصابی مستوی ہونگے۔ اور اس لئے انتصابی خط ہٹاؤ کے تیراؤ کے مستوی کے مرکز ہندسی ج میں سے گزرے گا۔

یہ خط ہٹاؤ ارجھال کے تنہی کو متشاکلا تقسیم کرتا ہے اور نقطہ ہر اعظم

یا اخل انما کا نقطہ ہے۔ ان میں سے پہلی صورت میں برہنجیہ کا قرن بیچے کی طرف



نکھلا ہے اور دوسری صورت میں اوپر کی طرف نکھلا ہے۔

نقطوں سے ہٹاؤ کے اثرات فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں۔

پہلی صورت میں تقویمی معیار امر (Righting moment) جو ہٹاؤ کے دئے ہوئے راویہ کے لئے تائیت کا سکھنیا قیاب سے ب ما کے مساسب ہے جو نقطہ سے ماسن ق مدمود ہے اور ہٹاؤ کے راویہ کے ٹھہرنے سے بڑھتا ہے۔

دوسری صورت میں تقویمی معیار اعظم قیمت اعداد کر ہے ۱۔ پھر گھٹتا ہے اور اس نخل بعد دم ہو جاوے جو ماسن ق ق سے ماضی ہوتا ہے۔ یہ نوارل کا ایک محل ہے لیکن اسے توازن کا د غیر قائم ہے کیونکہ عام جیلی قانون کے مطابق قائم اور غیر قائم نوارل کے محل بری اری سے یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ اگر ب کو مسدا وان کرا چھال کے معنی کی مساوات $C = Z$ (نہ) حاصل کی جائے تو

$$C = Z = \frac{W}{V}$$

اور تقویمی معیار ہوگا $\frac{W}{V}$ فرزد


جہاں د جہاز کا وزن ہے۔
عام طور پر معمولی ہٹاؤں کے لئے اچھاں کا مٹھنی نقدیما رائڈ کی ایکس
فوس ہوگا اور پلو جہاز کی صورت میں ایسی جہاز کی صورت میں جسکے
پلو خط آب کے نزدیک انتصابی ہوں اچھاں کا مٹھنی مکانی کی توس
ہوتا ہے۔

جہاز کی صورت میں اگر لائن کے لئے مرکز مابعد ہر ہو تو حاصل ضرب
وہ ہٹا ہر کو جہاز کا استحکام (Stiffness) کہتے ہیں۔

ہم اے — ڈیوین کا مسئلہ — سیدھا تیرے والے جہاز کی صورت میں تیراؤ کی
سطح کی عرض تراش کے انہما کا نصف قطر ہوگا

$$r = \frac{R}{2} = \frac{R}{2}$$

جہاں فاصل آب کے گھیرے کا عنصر فرس ہے، اس کا رقبہ ہے
اور جہاز کے پلو کا انتصابی مٹ کے ساتھ میلان عہ ہے۔ اور محاور لا اور ما
جہاز کی اس تراش کے طولی اور عرضی محور ہیں جو تیراؤ کے مستوی سے قطع
ہوتی ہے اور یہ محور اس مستوی کے مرکز ہندسی ج میں سے گزرتے ہیں
اس کو ثابت کرنے کے لئے فرض کرو



کہ تیراؤ کی سطح کی عرضی تراش پر 'ج' ج
دو متصل نقطے ہیں اور 'ج' کا ماسی مستوی
فاصل آب ان ف د کے ساتھ
چھوٹا راویہ طہ بناتا ہے اور فرض کرو کہ اس
ماسی مستوی سے جہاز کی جو تراش حاصل
ہوتی ہے اس کا ظل فاصل آب پر
ان ق ق ب ہے، اس طرح ج کا

ظل ف رقبہ ان ق ق ب کا مرکز ہندسی ہے۔ فرض کرو کہ متساظر عہ ہے
ن ق ن ق ہیں اور ان ق = فرس تو

رتبہ ل ق ن ق = ماط مس م فرس

ج ف × (ل) = ل ن ا ط مس م فرس

اور چونکہ ج ج = ر ط اور انتہا میں ج ف = ج ج اس لئے

ر ط = ل ن ا ط مس م فرس

اس تھم کو سب سے پہلے سی ڈیوین (C Dupm) نے اپنے

ایک مقالہ میں سائنس کی اکادمی (Academie der sciences) کو
 علاقہ میں پیش کیا صولی راسش کے انخا کے نصف قطر (ر) کے لئے
 بھی ایک متناظر جملہ نہ بچا ہو ہوئے ۔

۵۷ — لیکچرٹ کا مسئلہ — اگر ع (ا) اور ل (ب) کے لئے پس م کزی
 بلندوں کو سنی اچمال کی سطح کی مرمی اور طوی تراشوں کے انخا کے نصف قطروں
 کو ر اور س سے تہیہ کیا جائے تو ہم جائے ہیں کہ

$$ر = \frac{ج}{ح} \text{ اور } س = \frac{ج}{ح}$$

جہاں ج اور ح فاصل آب کے جمود کے صدری معیار ہیں۔ لیکچرٹ
 نے ان مقدروں میں حسب ذیل روابط قائم کئے

$$ر = \frac{فرج}{فرح} = ر + \frac{ج فر}{فرح} ، س = \frac{فرج}{فرح} = س + \frac{ح فر}{فرح}$$

لیکچر کے اس مضمون کا ترجمہ مسٹر میری نیلڈا (Mr. Nielda)


نے The proceedings of the Institute of Naval Architects کے

میں اور مارچ ۱۸۷۲ء کے (Messenger of Mathematics)

میں دیا ہے جو دو ثبوت وہاں دئے گئے ہیں ان میں سے پہلا حسب ذیل ہے۔ تاریخی
 ایسی کی خاطر اسکو یہاں بیان کیا جاتا ہے امید ۷۰ء میں اس کا زیادہ باضابطہ
 ثبوت دیا جائیگا ۔

فاصل آ ب کے موازی اور اس سے فری فاصلہ پر تراش لینے سے

فرح = $\frac{1}{2}$ فری



فرض کر دو کہ ا ق ن ب فاصل آ ب
بر اس نہی تراش کا ظل ہے۔ تو فرج
ا ق ن ب اور ا ق ن ب کے
درمیان رقبہ کے جہود کا مہیا رہے۔

∴ فرح = $\frac{1}{2}$ ما فری × مس و فرس


اور فرج = $\frac{1}{2}$ ما مس و فرس

پس $\frac{1}{2} = \frac{\text{فرج}}{\text{فری}} = \frac{\text{فرج}}{\text{فرح}}$

(۷۶)

∴ $\frac{1}{2} = \frac{\text{فرج}}{\text{فرح}} = \frac{\text{فرج}}{\text{فرح}} = \frac{\text{فرج}}{\text{فرح}}$

یا $\frac{1}{2} = \frac{\text{فرج}}{\text{فرح}}$



۶۔ بار میں اضافہ جہاز کے بار
میں اگر اضافہ کیا جائے تو اس کا اثر
مرکز مابعد کے محل پر۔

یہ مان کر کہ جہاز میں تشاکل کے
دو انتظامی مستوی ہیں فرض کر دو کہ تیراؤ
کے مستوی کا مرکز ہندسی ج ہے ان میں
سے ایک مستوی میں قائمیت پر غور کرو۔
بار میں خفیف اضافہ کی وجہ سے

فرض کر دو کہ ج کا نیا مقام ج ہے اور مزید ہٹاؤ مع ح سے تعبیر ہوتا ہے۔

اب اگر h اور m کے نئے محل h' اور m' ہوں تو

$$m' = h' - m + h$$

$$= m + h$$

$$\text{لیکن } J \cdot h' = m' \cdot h = h \cdot h$$

$$m' = m + h \cdot \frac{h'}{h} = m' \cdot \frac{h'}{h} \quad (h' - m + h)$$

جہاں h' سے J تعبیر ہوتا ہے جو تیراؤ کی سطح کا نصف قطر انتخاب ہے۔

$$\text{اس لئے } m' = m \cdot \frac{h'}{h} = (h' - m + h)$$

$$\frac{m' \cdot h'}{h} = (h' - m + h)$$

پس معلوم ہوا کہ پس مرکز بلحاظ جہاز کے اوپر اٹھتا ہے اگر یہ تیراؤ کی سطح کے مرکز انحناء کے نیچے واقع ہو اور نیچے بیٹھتا ہے اگر یہ مرکز انحناء کے اوپر واقع ہو۔
۷۷۔ پیچ بانی جہاز (Screw-steamer) کا اپنے پیچ کے عمل کی

وجہ سے جھک جانا (Heeling over) -

(یوٹوبیوٹیکس گرین ہل) (Prof Greenhill) سے سبب ہے

(۷۷)

اگر انجن کو پھرانے والا جفت فٹ پونڈوں میں لی ہو اور فی گردشوں کی تعداد N تو ایک منٹ میں جو کام ہوتا ہے وہ $2\pi N$ لی ہوگا۔ لیکن اگر انجن طبعی طاقت سے کام کر رہا ہو تو

$$\text{کام} = 2\pi N \dots$$

$$2\pi N \dots$$

اگر طرہ ادب ہو جس میں سے جہاز جھک جاتا ہے اور مرکز ثقل کے ادب پس مرکز ثقل ارتفاع F ہو اور جہاز کا وزن ٹنوں میں W ہو تو

$$L = 2220 \text{ وٹ جب } 6$$

$$2220 \text{ وٹ جب } 6 = 2220 \text{ وٹ جب } 6$$

اس مساوات سے طہ ملتا ہے۔
 جھکنے کے آخر کو وسطیٰ مستوی سے ج فاصلہ پر ایک ایسا وزن ورکھنے سے
 زائل کر دیا جاسکتا ہے کہ

$$و + ج = ل$$

$$یا ۲۲ ن ج و = ۳۳ ط$$

پنگھبانی جہاز کی صورت میں جھکاؤ طولی سمت میں ہوگا اور اس صورت
 میں ف طولی، پس مرکزی ارتفاع ہوگا۔
 یہ قابل توجہ ہے کہ جبک جانے کی سمت گردش کے سمت کے مخالف
 ہوتی ہے۔ مثلاً پنگھبانی جہاز کی صورت میں جو آگے کو جارہا ہے سا سینے کا حصہ
 خفیف سا اٹھا ہوا ہوگا اور پیچھے کا خفیف ڈوبا ہوا۔

۷۸۔ اچھال کی سطح بالعموم۔

فرض کرو کہ ابتدائی آب خط تراشش کے مرکز ہندسی میں سے گزرنے
 والے انتصابی خط میں مبدایا گیا ہے۔ اگر ابتدائی تراشش ی = ج ہو تو
 خفیف طور پر ہٹائے ہوئے محل میں اس مستوی کی مساوات ہوگی

$$ی = ج + ل + لا + م$$

جہاں ل، م چھوٹے ہیں۔

اگر ان دو محلوں میں (لا، با، ی) اور (لا، ما، ی) اچھال کے مرکوزوں
 کے محدود کو بتبیر کریں تو

$$ح (لا - با) = ل (ی - ج) لا فلا فرما = ل + ف + م$$

$$ح (لا - با) = ل (ی - ج) ما فلا فرما = ل + ف + م +$$

$$ح (ی - با) = ل (ی - ج) لا فلا فرما = ل + ف + م + م + ب + م$$

$$جہاں لا = ل لا فلا فرما، ف = ل لا فلا فرما، ب = ل لا فلا فرما$$

اس لئے $۲(ی-ی) = ل(لا-لا) + م(ما-ما)$

یا $۲(ی-ی) = \frac{ح}{ب} + \frac{ب}{ب} - ۲(لا-لا) (ما-ما)$

جو اچھال کی سطح کی تقریبی شکل ہے۔ اگر ابتدائی محور لا اور ما مستوی تراش کے صدری محور ہوں تو $ف =$ اور اگر مبداء کو اچھال کے مرکز پر پہلے مقام منتقل کیا جائے تو سطح کی مساوات ہو جائیگی

$$۲ی = \frac{ح}{ب} + \frac{لا}{ب}$$

اب اگر ہم پس مرکزوں کی تعریف اس طرح کریں کہ وہ اچھال کی سطح کی صدری عمودی تراشوں کے مراکز اٹھنا ہیں تو اچھال کے مرکز کے اوپر پس مرکزوں کے ارتفاع صدری نصف قطر انچ $\frac{۱}{۲}ح$ یا $\frac{۱}{۲}ب$ ہونگے۔

۷۹۔ قائمیت کی مشروط۔

اچھال کی سطح کے نقطہ (لا، ما، ی) پر عمودی مستوی ہے

$$طا-ی = \frac{ح}{ب} (ضما-لا) + \frac{ح}{ب} (عما-ما)$$

لہذا اس مستوی سے مجسم کے مرکز ثقل (ب، ی، تا) کا عمودی فاصلہ ہوگا

$$\left\{ تا-ی + \frac{ح}{ب} + \frac{لا}{ب} \right\} \left\{ ۱ + \frac{ح}{ب} + \frac{لا}{ب} \right\} - \frac{۱}{۲}$$

$$= \left\{ تا-ی + \frac{ح}{ب} + \frac{لا}{ب} \right\} \left\{ ۱ - \frac{ح}{ب} - \frac{لا}{ب} \right\}$$

$$= تا-ی + \frac{ح}{ب} (۱-۱) + \frac{لا}{ب} (۱-۱) = تا-ی$$

اب دفعہ ۵۵ کی رو سے توازن کے محل ایک ایسے وزنی جسم کے توازن کے محل درامت کرنے کے معادل ہیں جو اچھال کی سطح سے محیط ہو اور ایک اتھی مستوی پر لگا ہوا ہو پس قائمیت کے لئے اس مستوی سے مرکز ثقل کا ارتفاع اقل ہونا چاہیئے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ $\frac{1}{2}H$ اور $\frac{1}{2}H$ سے جی چھوٹا ہو یا مرکز ثقل دونوں پس مرکزوں کے نیچے واقع ہو۔

۸۰۔ تیراؤ کی سطح - لیکٹرٹ کا مسئلہ۔

فرض کریں کہ ٹھوس دفعہ ۸ کے بموجب دو سرے محل میں ہے اور اسکو دبائے سے غرق شدہ حجم میں ایک چھوٹی مقدار مفع ح کا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مجموعہ مفع ح کی چپکے کنی کے مرکز ثقل کے محدود ضا، عا، طا ہوں و

$$\text{ضامفع ح} = (\text{ح} + \text{مفع ح}) (\text{لا} - \text{لا} + \text{مفع لا} - \text{مفع لا})$$

$$= \text{ل مفع} + \text{م مفع} + \text{دفعہ ۸}$$

$$\text{اسی طرح عا مفع ح} = \text{ل مفع} + \text{م مفع} + \text{ب}$$

$$\text{اور لا مفع ح} = \frac{1}{4} (\text{ل مفع} + \text{ل مفع} + \text{ل مفع} + \text{م مفع} + \text{م مفع} + \text{ب})$$

نیز جیسے پلٹی کی موٹائی کم کر دی جاتی ہے نقطہ (ضامفع، عا، طا) تیراؤ کی سطح کے متناظر نقطہ پر منطبق ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے یعنی آب خط رقبہ کے مرکز پر۔

اس لئے تیراؤ کی سطح پر روابط حاصل ہوتے ہیں

$$\text{لا} \times \text{فرح} = \text{ل فرح} + \text{م فرح}$$

$$\text{کا} \times \text{فرح} = \text{ل فرح} + \text{م فرح}$$

$$\text{جی} \times \text{فرح} = \frac{1}{4} (\text{ل فرح} + \text{ل فرح} + \text{ل فرح} + \text{م فرح} + \text{م فرح} + \text{ب})$$

اور تیراؤ کی سطح کی مساوات ہوگی

$$۲ = \frac{\text{فرح}}{\text{فرہ فرہ}} - (\text{فرہ}) \left\{ \frac{\text{لا}^۲ \text{فرہ}}{۲} - \text{لا}^۲ \text{فرہ} + \text{لا}^۲ \text{فرہ} \right\}$$

خاص صورت میں جبکہ فرہ = ۰ تو یہ مساوات ہو جاتی ہے

$$۲ = \frac{\text{لا}^۲ \text{فرح}}{\text{فرہ}} + \frac{\text{فرح}}{\text{فرہ}}$$

اور تیراؤ کی سطح کے نصف قطر انہما ہیں $\frac{\text{فرح}}{۲}$ اور $\frac{\text{فرہ}}{۲}$ جیسا دندہ ۵ پر ہے۔

صم دیکھتے ہیں کہ ٹھوس کی دو متوازی تراشوں کے صدری ۰.۶ کا داری

ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح اگر $\text{فرہ} = ۰$ تو اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ

$$\frac{\text{فرہ}}{\text{فرح}} = ۰.۶ \text{ اس طرح دندہ ۵ کے نتائج صرف ان صورتوں میں ہی درست ہونگے}$$

جن کو اس دندہ میں مان لیا گیا ہے یعنی تشاکل کے انتصابی مستوی موجود ہیں

جن میں افقی تراشوں کے تمام صدری محور واقع ہوتے ہیں۔

۸۱۔ پس مرکز کا مقام معلوم کرنے کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

مثال ۱۔ نصف قطر اور طول ف کا ایک ٹھوس اسطہ اندہ انتصابی محور کے ساتھ تیر رہا ہے۔

اس صورت میں تیراؤ کا مستوی ایک دائری رقبہ ہے اور

$$\text{دندہ} = \frac{\text{فرہ}}{\text{فرح}} = \frac{\text{لا}^۲ \text{فرہ}}{\text{فرہ}} = \frac{\text{لا}^۲ \text{فرہ}}{\text{فرہ}}$$

$$= \frac{\text{فرہ}}{\text{فرح}} = \frac{\text{لا}^۲ \text{فرہ}}{\text{فرہ}} = \frac{\text{لا}^۲ \text{فرہ}}{\text{فرہ}}$$

$$= \frac{\text{لا}^۲ \text{فرہ}}{\text{فرہ}}$$

لے ایکٹ کے سڈکی یقیع اور گرسٹہ چند دعات کا طرز مستلال اور دعات آیدہ ۹۱، ۹۲، ۹۳

۴، ۱۰، ۱۵ ڈاکٹر رام دج (Dr Bromwich) کے من فکر کا نتیجہ ہیں۔

اس لئے اگر محور کا طول f غرق ہو تو

$$\pi a^2 \times \text{ہم} = \frac{4}{3}\pi \times \text{ہم} \quad ; \quad \text{ہم} = \frac{f}{2}$$

اور توازن قائم ہوگا اگر

$$\frac{f}{2} < \frac{f}{2} - \frac{f}{2}$$

مثال ۲ — ایک دائری اسطوانہ تیرا ہے اسطور پر کہ اس کا محور افقی اور سیال کی سطح میں ہے۔ اس کو اس کے محور میں سے گزرنے والے انتصابی مستوی میں ہٹا دیا گیا ہے۔

تیراؤ کا مستوی ایک مستطیل ہے اور

$$f = \frac{1}{2} f$$

جہاں f اسطوانہ کا طول اور $\frac{1}{2} f$ نصف قطر ہے

$$\therefore \text{ہم} = \frac{1}{3} \frac{f}{2}$$

اور توازن قائم ہوگا اگر

$$\frac{f}{2} < \frac{1}{3} \frac{f}{2}$$

مثال ۳ — ایک ٹھوس مخروط انتصابی محور اور نیچے والے اس کے ساتھ

تیرا ہے۔

فرض کرو کہ f محور کا طول ہے،

y محور کا وہ حصہ جو غرق ہے،

اور x مخروط کا زاویہ راس ہے

$$\text{تو} \quad f = \frac{1}{2} y \quad \text{مس} = x$$

$$و \quad ح = \frac{۱}{۳} ی ۲ مس ۲$$

$$۲: ھ م = \frac{۳}{۴} ی مس ۲$$

$$ھ ت = \frac{۳}{۴} ف - \frac{۳}{۴} ی$$

۱. اس لئے توازن قائم یا غیر قائم ہوگا بموجب اس کے کہ

$$ی مس ۲ < یا > ف - ی$$

یا
میں اگر $< یا > ف$ جم ۲
میں اگر $< یا > ف$ جم ۲
میں اگر $< یا > ف$ جم ۲

$$\left(\frac{۱}{۳} ی ۲ \right) = \frac{۳}{۴} ف$$

اس لئے توازن قائم یا غیر قائم ہوگا بموجب اس کے کہ

$$\frac{۳}{۴} ف < یا > (جم ۲)$$

مثال ۴۔ ایک مستند سی الوجین مثلثی منشور تیر رہا ہے اس طور پر کہ

اس کا قاعدہ غرق نہیں ہے اور اس کے کنارے افقی ہیں۔
۱. توازن کے اس محل پر غور کرو جس میں منشور کا قاعدہ افقی سے
مائل ہو دیکھو دشت (۲۹)۔

اس صورت میں اگر اراق = ۲ م، اور لان = ۲ لا اور اگر صف (۸۰) کی

مسافات (ب) میں ہم ۱۔ لے لیں تو لا اور م، مساواتوں

$$لا + م = ۲ جم ۲$$

$$لا = ۲ م$$

سے حاصل ہوتا ہے۔

۲. اور ل ج کو حوالے کے محاور قرار دیے سے دشت اور ھ کے محدود

علا از ترتیب ہونے

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \text{ اور } \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$: \text{ ہٹ} = \frac{2}{3} \left\{ \frac{2}{3} (1-1) + \frac{2}{3} (1-1) + \frac{2}{3} (1-1) \right\} \quad (۸)$$

$$\frac{2}{3} = \left\{ \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right\} \text{ جم} - \frac{2}{3} (1+1) (1+1) + \frac{2}{3} (1+1) (1+1) + \frac{2}{3} (1+1) (1+1)$$

جس سے اور مساوات بالائی ادا سے ہم حاصل کرتے ہیں

$$\text{ہٹ} = \frac{2}{3} \text{ جب } \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3} \text{ جم} - \frac{2}{3} \right)$$

رتبہ ناق = ۲ م جب ط اور اگر م پس مرکز ہو اور ل منشور کا طول تو

$$\frac{2}{3} \text{ م جب ط} \times \text{ہم} = \frac{2}{3} \text{ ناق} \times \text{ل}$$

$$: \text{ ہم} = \frac{2}{3} \text{ ناق}$$

$$\text{لیکن } \text{ناق} = ۲ (1+1) - \frac{2}{3} (1+1) \text{ جم}$$

$$= \frac{2}{3} \text{ جم} - \frac{2}{3} (1+1) \text{ جم}$$

$$: \text{ ہم} = \frac{2}{3} \text{ جم} - \frac{2}{3} (1+1) \text{ جم}$$

$$\text{اور ہم} < \text{ہٹ} < \text{م جب ط} > \text{جم} - \frac{2}{3} (1+1) \text{ جم}$$

یعنی اگر جم ط < ۲

ہم اس صورت پر غور کر کہ جس میں قاعدہ افقی ہے اور اس لئے ناق، ب ج کے متوازی ہے۔

$$\text{رتبہ ناق} = ۲ م جب ط$$

$$\text{ان} = \text{اق} = ۲ م، \text{ناق} = ۲ م - \text{جم} - \frac{2}{3}$$

اس لئے $ھم = \frac{۴}{۳} م$ جب $\frac{۲}{۳}$ اور $ھٹ = \frac{۴}{۳} (۵ - م)$ جم $\frac{۲}{۳}$

اور $ھم < ھٹ$ اگر جم $\frac{۲}{۳} > \frac{۱}{۲}$

اب دفعہ (۴۹) میں جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے ہم نے ثابت کیا ہے کہ توازن کے یا تو تین محل ہونگے یا صرف ایک بموجب اس کے کہ

جم $\frac{۲}{۳} < ۱$ یا $\frac{۲}{۳} > ۱$

اس لئے نتیجہ نکلتا ہے کہ جب توازن کے تین محل ہوں تو درمیانی محل جس میں ج ب افقی ہے غیر قائم توازن کا محل ہوگا۔ اور دوسرے دو نوں محلوں میں توازن قائم ہوگا۔

اگر توازن کا صرف ایک محل ہو تو توازن قائم ہوگا۔

طالب علم کے لئے یہ ابھی مستحق ہوگی اگر وہ ان نتائج کو اجماع کے منہی کی مساوات معلوم کر کے اس کے مرکز اجتماع کا مقام دریافت کرنے سے حاصل کرے۔

۸۲۔ متحدہ دہٹاؤ۔ اگر ایک ٹھوس جسم پانی میں تیر رہا ہو اور اس کو توازن کے محل سے ہٹا کر ایک دئے ہوئے زاوے میں کھایا جائے تو پہلے کی طرح سیالی دباؤ کا معیار استرداد ہی ہوگا یا غیر استرداد ہی بموجب اس کے کہ نقطہ L جس پر اچھال کے نئے مرکز میں سے گزرنے والا اختصابی خط، خط ھٹ کو قطع کرتا ہے ھٹ کے اوپر یا نیچے واقع ہو۔

اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اگر L ھٹ کے اوپر واقع ہو تو جسم کو آزاد کر دینے سے وہ اپنے اصلی محل کی طرف لوٹ آئیگا اور اس میں سے استتار کر لیا جائے کہ قایمیت کی ہمارے سابق تعریف کے بموجب اصلی محل قائم توازن کا محل ہوگا۔ علم اصل کا ایک عام قانون یہ ہے کہ قائم اور غیر قائم توازن کے محل یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ جسم اپنے اصلی محل سے اس ہٹاؤ میں توازن کے محلوں میں سے گزر چکا ہو۔

مثلاً ایک خاص مثال حسب ذیل ہے۔

اس لئے ہٹائے ہوئے سیال کا حجم
 $= \frac{1}{2} \text{ حجم (ط - ع) (ناقص کا رقبہ)}$

$$= \frac{1}{2} \pi r^2 \text{ جب } \frac{1}{2} \text{ حجم ع} \left\{ \frac{\text{حجم (ط - ع)}}{\text{حجم (ط + ع)}} \right\}$$

اب اگر سیال اور مخروط کی کٹافٹیں ٹکرائیں تو چونکہ ہٹائے ہوئے
 سیال کا وزن مخروط کے وزن کے مساوی ہے اس لئے

$$\text{ث} \text{ جب } \frac{1}{2} \text{ حجم ع} \left\{ \frac{\text{حجم (ط - ع)}}{\text{حجم (ط + ع)}} \right\} = \text{ث} \text{ ف} \text{ س} \text{ ع} \quad [\text{ن مخروط کا ارتفاع ہے}]$$

$$\text{یا} \quad \left(\frac{\text{د}}{\text{ن}} \right) = \text{ث} \text{ ف} \left\{ \frac{\text{حجم (ط + ع)}}{\text{حجم (ط - ع)}} \right\} \frac{1}{\text{حجم ع}}$$

$$\text{اور} \quad \left(\frac{\text{د}}{\text{ن}} \right) < \frac{\text{حجم ط}}{\text{حجم (ط + ع)}} < \text{ف}$$

$$\text{یا اگر} \quad \left(\frac{\text{د}}{\text{ن}} \right) < \frac{\text{حجم ع} \left\{ \frac{\text{حجم (ط + ع)}}{\text{حجم (ط - ع)}} \right\}}{\text{حجم ط}}$$

ط کو لا انتہا چھوٹا فرض کرنے سے صغیر ہٹاؤ کے لئے ہمیں قانینیت کی
 شرط ملے گی

$$\left(\frac{\text{د}}{\text{ن}} \right) < \frac{\text{حجم ع}}{\text{حجم ط}}$$

جو دفعہ (۸۱) کی مثال ۳ کے مطابق ہے۔

فرض کرو کہ مخروط کا توارن تبدیلی ہے یعنی فرض کرو کہ

$$\text{ث} = \text{ث} \text{ ف} \text{ ع}$$

تو محمد و ہٹاؤ کے بعد سیال کا عمل مخروط کو اپنے اصلی محل کی طرف لیجا۔ سنہ اہل ہرگا

اگر

جم عجم ط < ۸ (جم ط + ع) (جم ط - ع)


یہ ایک ایسی شرط ہے جو ہمیشہ صادق آتی ہے کیونکہ ع اور ط میں سے ہر ایک زاویہ قائمہ سے کم ہے۔

اس لئے مخروط کے تبدیلی توازن کی صورت میں کسی محدود ہٹاؤ کے لئے توازن کو قائم کہا جاسکتا ہے۔

۸۴۔ جب مانع ایک برتن میں ہو جسکو اپنے اصلی محل سے ذرا سا ہٹا دیا گیا ہے تو گذشتہ تحقیقات کی مدد سے ہم حاصل نیچے وار دباؤ کے خط عمل کا تعین کر سکتے ہیں درحقیقت اس صورت میں پچھلی صورت کی طرح یہ مسئلہ حسب ذیل ہے۔
ایک ٹھوس جسم اب ج سے ایک دیا ہوا حجم ایک مستوی کے ذریعہ تراش لیا گیا ہے اس حجم کا مرکز ہندسی ہ ہے اور خط جھ اس مستوی پر عمود وار ہے۔ اگر وہی حجم ایک ایسے مستوی سے تراشا جائے جو مستوی اب سے بہت چھوٹا زاویہ بناتا ہے تو اس خط مستقیم کا محل معلوم کرنا مطلوب ہے جو دو سرے مستوی پر عمود وار ہے اور اس سے جو حجم کٹتا ہے اس کے مرکز ہندسی میں سے گزرتا ہے۔

اگر برتن کی اندرونی سطح ایسے مستوی کے لحاظ سے متشاکل ہو جو جھ میں سے گزرتا ہے اور تراش کے دونوں مستویوں کے خط تقاطع پر عمود وار ہے تو وہ خط جسکا محل دریافت کرنا مطلوب ہے جھ کو مرکز مابعد ہ پر قطع کرے گا جس کا مقام ہمارے گزشتہ نتائج سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۸۴۔ برتن جس میں مانع ہو۔ ایک کھوکھلا برتن جس میں مانع ہے مانع (۸۴) میں تیرا ہے توازن کی نوعیت معلوم کرنا مطلوب ہے یہ فرض کر کے کہ جسم کی کمیت کے مرکز میں سے گزرنے والے ہٹاؤ کے انتصابی مستوی کے لحاظ سے جسم متشاکل ہے اور یہ کہ جسم اور مانع کی کمیتوں کے مرکز ایک ہی انتصابی خط میں ہیں۔



درجہ کر دو کہ ہٹائے ہوئے سیال
کا یس مرکز ہے اور برتن کے
اندرونی سیال کا ہر اور ہٹائے ہوئے
سیال کا درجہ ہے اور اندرونی سیال
کا ورنہ کی کیفیت کے مرکز کے
گرد معیار لینے سے حاصل ہائی و باؤ برتن
کو متوازن کرنے کا میلان رکھیں گے
یا اس کے برعکس بہ جب اس کے کہ
و ت م - و ت م
بت باہمی ہوئی موجب اس کے کہ

$$\frac{و}{و} < یا > \frac{ت}{ت م}$$

مثال — ایک کھوکھلا مخروط جس میں پانی ہے پانی میں تیر رہا ہے اس طور پر
کہ اس کا محور متضامی ہے —

درجہ کر دو کہ ف = مخروط کے محور کا طول
ف = مخروط کے اندرونی سیال میں ڈوبے ہوئے محور کا طول
ی = بیرونی سیال کی سطح کے نیچے ڈوبے ہوئے محور کا طول
خروط کے زاویہ راس کو ۲۰۰ لینے سے ہیں حاصل ہوگا

$$ھ م = \frac{۳}{۴} ی س ۲ ع$$

$$ھ ت = \frac{۳}{۴} ف - \frac{۳}{۴} ی$$

$$ث م = \frac{۳}{۴} ی ق ۲ ع - \frac{۳}{۴} ف$$

لہ یہ صورت ایسے جہاز سے متعلق ہے جس میں سوراخ ہو گیا ہو اور روکنا ہو۔ اگلی دفعہ ایسے
سہارا جہاز سے متعلق ہے جو سر کے لہر اور pitch (کرتا ہے۔

اِسی طرح $\frac{3}{2} = \frac{3}{2}$ و قطْعہ $-\frac{2}{2}$ و

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{9}{5} \text{ نیز}$$

اس نے توازن قائم ہوگا اگر

$$\frac{q_1 \text{ قطره} - q_2 \text{ قطره}}{q_1 \text{ قطره} - q_2 \text{ قطره}} < \left(\frac{y}{n}\right)^3$$

جہاں مساوات

و۔ و۔ = $\frac{1}{2}$ جٹ افسانہ (ع۲۔ ن۳) = مخروط کا وزن،


سے می حاصل ہوگا۔

۸۵۔ اگر برتن کے اندرونی سیال اور ہٹائے ہوئے سیال کی کمیتوں کے مرکز ایک ہی انتصابی میں نہ ہوں تو فرض کرو کہ ان مرکزوں میں سے گزرنے والے انتصابی مستوی کی سمت میں ہٹاؤ واقع ہوتا ہے اور جسم اس مستوی کے لحاظ سے متشاکل ہے۔

فرض کرو کہ جسم کی کمیت کا مرکز ثقل ہٹائے ہوئے سیال کا ہر برتن اندرونی سیال کا ہے اور ہر ہر پریس مرکز ہیں۔

نیز فرض کرو کہ ثقل توازن کے محل میں افق ہے اور ثقل کے ہٹائے ہوئے محل میں ثقل سے
 کرنے والا افقی خط ہے۔

اگر وہ کسی کو بھی معنی ہوں
جو گزشتہ دفعہ میں لئے گئے اور طہ
ہشامی کا زاویہ ہو تو تادرن قائمہ یا غیر
قائم ہو گا جو جب اس کے کو



وہ مثل $\langle$ یا $\rangle$ و مثل

یا (ثانہ ط ۱ - ن جب ط) < یا > (دشان جم ط ۱ - ن جب ط)
 اور چکر و دشان = کر دشان
 اس لئے تو زان قائم ہو گا یا غیر قائم بموجب اس کے کہ

$$\frac{ق}{و} < یا > \frac{د}{ن}$$


۸۶۔ قیود کے ماتحت تیرنے والے جسموں کے توازن کی قائمیت -

قید کی ایسی صورتوں میں جس میں جسم نے ہٹاؤ کے لئے ہٹائے ہوئے مانع کا حجم نہیں بدلتا پس مرکز کا نظریہ سیالی دباؤ کے خط عمل کا تعین کرتا ہے اور قائمیت کا سوال پھر آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔
 مثال کے طور پر فرض کر دو کہ ایک جسم جزو عرق شدہ، ایک افقی محور کے گرد حرکت کر سکتا ہے اور یہ افقی محور اُس مستوی تراش کے مرکز ہندسی (ج) کے انتصاباً نیچے واقع ہے جو مانع کی سطح جسم میں کاٹی ہے۔

اگر جسم کو چھوٹے زاویہ ط میں ہٹا دیا جائے تو اس ہٹاؤ کا یہ اثر ہو گا کہ مرکز ہندسی (ج) نیچے بیٹھ جائے گا اور یہ ہٹاؤ ط پر منحصر ہو گا۔ اور اس لئے صغیر مقداروں کے پہلے رتبہ تک ہٹایا ہوا حجم غیر متغیر رہے گا اور پس مرکز وہی ہو گا گویا کہ ج مانع کی سطح میں ہی واقع ہے۔

اگر جسم ایسے افقی محور کے گرد حرکت کر سکتا ہو جو نقطہ ج کے نیچے انتصاباً واقع نہ ہو تو ہٹاؤ ہوئے حجم میں جو تبدیلی واقع ہوگی وہ نظر انداز نہیں ہو سکے گی اور قائمیت کے سوال کو ہٹاؤ ہوئے مانع کے عمل پر بالراست غور کرنے سے حل کرنا پڑے گا۔

مثال۔ ایک مستطیل پتہ ایک مائل سطح کی کثافت اکی کثافت کا دو چند ہے ساکن ہے اس طور پر کہ اس کے دو متعلق انتصابی ہیں۔ یہ پتہ اپنے ایک انتصابی متعلق کے وسطی نقطہ کے گرد اپنے مستوی میں حرکت کر سکتا ہے۔
 شکل پتہ کو تعبیر کرتی ہے جبکہ اسکو چھوٹے زاویہ اوب (ط) میں ہٹا دیا گیا ہے۔ نقطہ وجوان کی سطح میں ہے متعلق کا وسطی نقطہ ہے۔



اگر $و = ۱$ اور اگر ارتفاع = ۲ بتو

$$اوب = \frac{۱}{۲} و ط$$

اور و کے گرد میار لینے سے
توازن قائم ہوگا اگر

$$۲ (\frac{۱}{۲} و ط \times \frac{۲}{۲} + اوب \times ون) < ۲ \times و ب \times \frac{۱}{۲}$$

جہاں $ه$ ن نقطہ $ه$ میں سے گزرنے والا انتہائی ہے۔
یعنی چونکہ

$$ن و = و ن \text{ جم ط} - ه ن \text{ جب ط} = \frac{۱}{۲} - \frac{۱}{۲} ط$$


توازن قائم ہوگا اگر

$$۲ و ۲ < ۳ ب ۲$$

۸۷۔ اس خاص صورت میں جبکہ جسم کی کثیت کا مرکز اور محور جس کے گرد یہ حرکت کر سکتا ہے دونوں مانع کی سطح میں واقع ہوں تو قائمیت کے تعین کے لئے ایک ضابطہ دفعہ (۶۹) کے ضابطہ کے ماثل حاصل کیا جاسکتا ہے۔
جس محور کے گرد جسم حرکت کر سکتا ہے اس کو ج اور توازن کے محل میں ہٹاے ہوئے مانع کے حجم کو ح فرض کرو۔

فرض کرو کہ ا ج مرکز کا ابتدائی مستوی ہے اور ج م کے گرد (جو کا غلہ کے مستوی پر عمود دار ہے) ایک چھوٹے زاویہ میں ہٹانے کے بعد خط آ ب ج ب بن جاتا ہے۔

حاصل سیالی دباؤ، وزن ب د ا ب کے مساوی ہے جو اوپر وار عمل کرتا ہے اور یہ ذیل کے وزنوں کے معادل ہے۔



وزن ا ب د یعنی ج ت ح جو اوپر کی طرف عمل کرتا ہے، فائدہ (ا ب ج) کا وزن جو اوپر کی طرف عمل کرتا ہے اور فائدہ ا ب ج کا وزن جو نیچے کی طرف عمل کرتا ہے

ان دونوں قانونوں کی وجہ سے استرودادی معیار

$$= \text{ج} \text{ا} \text{ط} \text{ف} \text{ا} \text{ز} \text{ا} = \text{ج} \text{ا} \text{ط} \text{ا} \text{ر}$$


جہاں ج کے گرد رقبہ ج ا ج کے جوہر کا معیار ا ر ہے۔ ہٹاؤ کی وجہ سے معیار کا نقصان

$$= \text{ج} \text{ا} \text{ط} \text{ا} \text{ر} = \text{ج} \text{ا} \text{ط} \text{ا} \text{ر} \times \text{ح} \text{ا} \text{ن} \times \text{ط}$$

اس لئے توازن قائم ہوگا اگر

$$\text{ا} \text{ر} \text{ا} \text{ح} \times \text{ح} \text{ا} \text{ن}$$

(۸۷)



۸۸۔ ایسے جسم کی عام صورت میں: گ گہرائی پر کے ایک افقی محور کے گرد حرکت کر سکتا ہو مرض کر کہ تیزاد کے مستوی پر محور کا ظل ج ا ہے اور ن اور ط کے ظل ل اور ن ہیں۔

معیر زادئی ہٹاؤ ط کے لئے ج کا انتصابی ہٹاؤ ط کے رتہ کا ہوگا اور اس لئے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

گشتہ دفعہ کی طرح ہٹاے ہوئے مانع کے تغیر کی وجہ سے استرودادی

$$\text{معیار} = \text{ج} \text{ا} \text{ط} \text{ا} \text{ر} \text{ا} \text{ح} \times \text{ح} \text{ا} \text{ن} \times \text{ط}$$

= ج ث ح × (ھ ن - گ) ط

پس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ توازن قائم ہوگا اگر

ج ث (س - ج ث ح (ھ ن - گ) + و (ث ل - گ)

مثبت ہو اس شرط کے ساتھ کہ

و × ج ل = ج ث ح × ج ن

نتیجہ صریح - اگر جسم متجانس مادے میں آزادانہ تیر رہا ہو اور تشاکل کا ایک ستوی رکھتا ہو اور اگر اس مستوی میں کسی افقی محور کے گرد جسم کو ایک صغیر زاویہ ط میں لکھا دیا جائے تو اسے ردادی جفت ہوگا

ج ث ط (س - ح × ھ ث)

جہاں تشاکل کے مستوی اور مانع کی سطح کے خط تقاطع کے گرد سطحی تراش کے جہود کا معیار (س) ہے۔

۸۹ - ایسے جسم کا توازن جو دو مائعات میں جزو غرق شدہ تیر رہا ہے۔ فرض کر دو کہ اوپر کے مانع کی کثافت ث اور نیچے کے مانع کی کثافت ھ ہے۔

نیز فرض کر دو کہ کل حجم غرق شدہ ح ہے اور ح ، ح کا وہ حصہ ہے جو نیچے کے مانع میں غرق ہے۔ تیراؤ کے مستویوں کے رقبہ (ل) ، (ل) ہیں۔ تب جسم کے وزن کو تھانسنے والی قوتیں ، مانع کی کمیتوں کے اوزان ث ح اور ث ح ہیں جو اوپر وار عمل کرتی ہیں۔ (۸۸)

ایسی صورت لو جس میں جسم ایک ایسے انتصابی مستوی کے لحاظ سے متشاکل ہے جو ہٹاؤ کی مستوی پر عمود وار ہے ، اس طرح جسم اور کمیتوں ث ح اور ث ح کے مراکز ہندسی ث ، ھ ، ھ ایک ہی انتصابی خط میں ہونگے۔ اگر جسم کو ایک صغیر زاویہ ط میں تشاکل کے مستوی میں کسی افقی محور کے گرد ہٹا دیا جائے تو توازن کے محل پر لیجانے کا میلان رکھنے والی

نوتوں کا کل سیارث کے گرو ہوگا

ح ث (ا س ر ا - ح × ہ ث) ط + ج ث (ا س ر ا - ح × ہ ث) ط

یا ج ث ح × ہ ث م × ط + ج ث ح × ہ ث م × ط

جس میں ث م اور ہ م کی شت سمت اور وار ہے۔

تو اذن ضرباً قائم ہوگا اگر م اور م دونوں ث کے اوپر واقع ہوں لیکن اگر م، ث کے نیچے ہو تو قائمیت کے لئے

ث ح × ہ ث م < ث ح × ہ ث

یا ت (ا س ر ا - ح × ہ ث) < ت (ا س ر ا - ح × ہ ث)

۹۔ غیر متجانس مانع — ایک ٹھوس جسم متغیر کثافت کے مانع میں تیر رہا ہے۔ اجمال کی سطح معلوم کرنا مطلوب ہے۔

پہلے ایک جسم کی صورت میں غور کرو جو ایسے مانع میں تیر رہا ہے جو نزدیکی ترتیب میں مختلف کثافتوں ت، ث، ث کی ہوں برشل ہے۔ فرض کرو کہ ث کثافت کی تہ کی اوپر کی سطح کے نیچے جسم کا کل حجم غرق شدہ ح ن سے تعبیر ہوتا ہے۔

دفعہ ۷ کی طرح فرض کرو کہ اس مستوی کی ابتدائی آب خطراتی ج ہے اور فرض کرو کہ خفیف طور پر ہٹا ہے ہوئے محل میں اس مستوی کی مسادات ج = ج + ل + م ما ہے تو ہمیں یہ مسادات حاصل ہوتی ہے

{ ث ح + (ث - ث) ح + (ث - ث) ح + ... + (ث - ث) ح } (لا - لا)

= { ت + (ت - ت) ل + (ت - ت) ل + ... + (ت - ت) ل } ل

+ { ث ت + (ث - ث) ت + ... + (ث - ث) ت } م

اسی طرح (ا - با) اور (ی - عا) کے لئے متناظر مساداتیں حاصل

ہوتی ہیں، یہاں ان دو محلوں میں اجمال کے مرکز بالترتیب (لا، با، ی) (لا، ما، ہی) ہیں اور ا، افر، بر، متناظر آب خط تراش پر علی الترتیب دو ہر سے محلوں

کر لا فر لا فرما ، کر لا فر لا فرما ، کر لا فر لا فرما

کو تعبیر کرتے ہیں۔

سلسل سیال کی صورت لینے سے

(۸۹)

ک (لا - لا) = ل + ف م

ک (با - با) = ف ل + ب م

اور ک (ی - ی) = ۱ (ل + ل) + ف ل م + ب م

یہاں ک = ث ح + ج فرث

= ث ح + [ث ح] - ث فرح

= ث فرح

اور (= ث و + ج فرث

= ث و + [ث و] - ث فر و

= ث و ن + ث فر و

اور اسی طرح کا جمل ب کے لئے ہوگا۔ لاحتہ ان غرق شدہ جسم کی اندر کی اور بجلی تراشوں سے متعلق ہیں، اس صورت میں جن سرکھا صفر ہے اور اور ان بھی صفر ہے سوائے اس صورت کے جبکہ جسم کا پینڈا چٹایا مستوی ہو۔ اجمال کی سطح تین مساواتوں سے دفعہ ۸ کی طرح حاصل ہوتی ہے اور خاص صورت میں جبکہ ف = ۰ ، اور مبداء اجمال کے مرکز کی متوازن


۱۔ $\frac{1}{2} = \text{کث فرا} / \text{کث فرح} = \frac{1}{2} \text{ ل}$

(۳) اسطوانہ جس کا محور انتصابی ہے۔

یہاں ۱ = مستقل، اس طرح $\frac{1}{2} = \text{شان لان} / \text{ک}$

۹۳۔ توانائی بالقوہ۔ تیرنے والے اجسام کے توازن کی قائمیت کے نظریہ کی بنیاد توانائی کے اصول پر بھی رکھی جاسکتی ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے ہم اس مضمون پر اب بحث کرتے ہیں۔

وزن دار اشیاء کے ایک سمندر میں ایک جسم کو داخل کرنے میں جو کام ہوتا ہے اس کو معلوم کرنا مقصود ہے جبکہ جسم کے دخول سے مائع کی ہموار سطح میں جو تبدیلی ہوتی ہے اور اس میں جو خلل ہوتا ہے ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر عمودی تراش فرلا فرما کا ایک انتصابی منشور، جسم کے حدود کو جہاں



مائع اسے مس کرتا ہے عناصر فرس، فرس میں قطع کرے جو سی، یا گہرائیوں پر ہیں اور جن پر کے دباؤ علی الترتیب د، د ہیں اور اگر ط، طم وہ حادثہ زاو ہوں جو فرس، فرس پر کے عماد انتصابی خط کے ساتھ بناتے ہیں تو گہرائی کو بقدر ایک صغیر مقدار فری کے بڑھانے میں، ان عناصر پر کے مجموعی دباؤں کے خلاف جو کام ہوتا ہے یہ ہے

(د فرس، جم ط - د فرس، جم ط) فری = (د - د) فرلا فرما فری

اس لئے زیر بحث محل میں جسم کو رکھنے میں جو کام ہوا وہ

= { فرلا فرما (م، د فری - م، د فری) }

$$= \{ \int_{\gamma_2}^{\gamma_1} f(z) dz, \int_{\gamma_2}^{\gamma_1} f(z) dz \}$$

... (۱) = ∫∫∫ دمرلا فرما فری .

جہاں تکمیل عرقِ ستہہ حجم یر لیا گیا ہے۔


جہاں تکمل عرق ستہ حجم یر لیا گیا ہے۔
اگر مانع متخاض ہو تو د = ج ت ی اور کام چھوڑ دے

= چٹ لڑی مرلا فرما فری

ج ن ح ی =

جہاں بیٹائے ہوئے مانع کا حجم ح اور اس کے مرکز ہمدسی کی گہرائی H ہے۔ جب کوئی جسم مانع میں تیر رہا ہو تو اس کو مانع کے اندر رکھ دینے میں جو کام ہوا ہے اس کی وجہ سے اس میں توانائی بالقوہ آ جاتی ہے اور اگر مانع متجانس ہو اور جسم اور بیٹائے ہوئے مانع کی کمیتوں کے مرکز ثقل، h ہوں اور ان کی گہرائیاں H ، H' ہوں تو جسم کی توانائی بالقوہ کا ناپ $W = (H - H')$ (طا) مانع کا حجم ہے۔ با جب جسم توان میں تیر رہا ہو تو $W = H \times \text{حجم}$ ہے۔

۹۴ — تیرنے
والے جسم کو تیراؤ کے
مستوی کے کسی محور
کے گرد چھوٹے زاویہ
ط میں گھمانے میں
جو کام ہوتا ہے اس کو
معلوم کرنا۔



۱۵۔ یہ مصری نعل تشکیل بالکل فرضی ہے جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فنا حسن کو جس طرح مجسمہ بنائے ہے اسی قسم کے لئے سے مصری گئی ہے اور جس کی نعل کیسٹ لئے کی ہوا آزاد اداسط پر ہے۔

جہاں جسم کی سطحی تراش کا رقبہ Δ اور ω کے گرد اس کی گردش کا نصف قطر r ہے۔

اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ توازن قائم ہوگا اگر

$(\Delta r^2 \times C \times h) = (\Delta r^2 \times C \times h)$

فرقہ $\frac{C}{r^2} = C \times h$ (اے - ح $\times$ ہر ش)

۹۵۔ اگر ہٹائے ہوئے مائع کا حجم مستقل ہو اور اگر ہٹائے ہوئے محل میں اچھال کے مرکز میں سے گزرنے والا انتظامی خط Δ کو نقطہ r میں قطع کرے تو ہر کو مرکز ابدی ایس مرکز کہتے ہیں۔

پس مرکز کے وجود کے لئے تخلیلی شرطیں یہ ہیں

$(\Delta r^2 \times C \times h) = (\Delta r^2 \times C \times h)$

یعنی گردش کا محور ω سطحی تراش کے مرکز ہندسی میں سے گزرنا چاہیئے۔

(دفعہ ۵۲ کے ساتھ مقابلہ کریں)۔ اور چونکہ اچھال کا نیا مرکز، مستوی لاوی میں ہونا چاہیئے اس لئے


$(\Delta r^2 \times C \times h) = (\Delta r^2 \times C \times h)$

لیکن $(\Delta r^2 \times C \times h) = (\Delta r^2 \times C \times h)$ ∴ $(\Delta r^2 \times C \times h) = (\Delta r^2 \times C \times h)$

۱۔ بعض علماء و فط پس مرکز کو ذرا وسیع معنوں میں استعمال کرتے ہیں چنانچہ پس مرکز کی تعریف وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ نقطہ ہے جہاں اچھال کی سطح کے دو متصل عمادوں کی درمیانی اقل فاصلہ ان عمادوں میں سے ایک کو قطع کرتا ہے۔

(۹۳)

یعنی محور واسطی تراش کا صدری محور ہونا چاہیے۔
اس صورت میں یہ ظاہر ہے کہ اگر ہر ، فٹ کے اوپر واقع ہو تو جسم کے وزن اور حاصل سیالی دباؤ سے بنا ہوا جنت جسم کو واپس توازن کے محل پر لچائیگا میلان رکھے گا اور



$$\begin{aligned} &= ج \text{ ث } ح \times ث \text{ م } \times ط \\ &= ج \text{ ث } ح (ه \text{ م} - ه \text{ ث}) ط \\ &ه \text{ م} = \frac{ط}{ح} \text{ اور توازن قائم} \end{aligned}$$

یا غیر قائم ہوگا بموجب اس کے کہ م ،
ث کے اوپر ہو یا نیچے۔

جو کنڈیس مرکز اچھال کی سطح کے متصل عمادوں کا نقطہ تقاطع ہے اسلئے
عام طور پر ہر کی سطح کے صدری اختلا کے دو مستویوں میں اگر ہٹاؤ لئے جائیں
توان کے جواب میں دو پس مرکز ہونگے۔ اور اچھال کی سطح کا ایک صدری
نصف قطر اختلا م ہے۔

۹۶۔ مقید اجسام۔ ایک تیرنے والا جسم ایک ثابت افقی محور کے گرد گھومنے
پر مجبور ہے۔ اس صورت پر دفعہ (۹۴) کی طرح غور کیا جاسکتا ہے۔

اگر و ما ثابت محور ہو اور (ضنا، عا، طا)، (لا، ما، تی) علی الترتیب
ث اور ه کے محدد ہوں اور م جسم کا وزن ہو تو توازن کی شرط ہوگی
ج ث ح لا = و ضنا

اگر گردش کا محور تیراؤ کے مستوی میں ہو اور جسم کو ایک صغیر زاویہ
ط میں گھمایا جائے تو مٹائے ہوئے مانع کی وجہ سے توانائی بالقوہ میں اضافہ

$$= \frac{1}{4} ج \text{ ث } ط (ل \text{ م} - ح \text{ تی}) + ج \text{ ث } ط ح لا$$

اور جسم کے ہٹاؤ کی وجہ سے نقصان

$$= - \frac{1}{4} ط \text{ و } ط ا + ط \text{ و } ضنا$$

اس لئے توانائی بالقوہ میں کل زیادتی

$$= \frac{1}{2} ج ث ط' (س' - ح تی) + \frac{1}{2} ط' و ط$$

اور توازن قائم ہو گا بشرطیکہ

$$س' < ح تی - و ط / ج ث$$

۹۷۔ اگر گردش کا محور و، گ گہرائی پر ہو اور تیراؤ کے مستوی پر اس کے ظل کو ہم محور مانیں اور اوپر کی طرح فرض کریں کہ محاذ جسم کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو بقدر $\frac{1}{2} گ ط'$ کے نیچے اترتا ہے اور ہٹائے ہوئے مانع کی وجہ سے توانائی بالقوہ میں اضافہ

$$= \frac{1}{2} ج ث (ری + لا ط + \frac{1}{2} گ ط') (ا - \frac{1}{2} ط') \text{ فلا فرما}$$

$$- \frac{1}{2} ج ث ی' فلا فرما$$

$$= \frac{1}{2} ج ث (لا ط' - \frac{1}{2} ی' ط' + ی' گ ط' + لا ی ط) \text{ فلا فرما}$$

$$= \frac{1}{2} ج ث ط' (س' - ح تی + ح گ) + ج ث ط ح لا$$


اور جسم پر جاذبہ ارض نے جو کام کیا وہ

$$= و ط (لا - ا - \frac{1}{2} ط') + ضا ط + \frac{1}{2} گ ط' - ط$$

اس لئے کل بیرونی کام جو ہوا وہ

$$= \frac{1}{2} ج ث ط' (س' - ح تی - گ) + \frac{1}{2} و ط (طا - گ)$$

جہاں سطحی ترازو کا رقبہ $\frac{1}{2}$ ہے اور تیراؤ کے مستوی پر ثابت محور کا جو ظل ہے اُس کے گرد اس کی گردش کا نصف قطر مہا ہے۔




قائمت کے لئے شرط ہے۔
 اصرار < ح (حق) - گ) - ج (جائے) (طا - گ)

۹۸۔ غیر متجانس مائع۔ ایک جسم غیر متجانس مائع میں تیر رہا ہے، تیرا ڈکے
مستوی میں کسی خط کے گرد اس کو گھمانے میں جو کام کیا جاتا ہے اسے معلوم کرو۔
دفعہ (۹۴) کی طرح محاورہ اور دہی ترقیم استعمال کرو۔ ہم لے سکتے ہیں
ث = ث (می) لیکن فرد = ج ث فری

∴ د = ج {ف (ی) - ف (و)}

دفعہ (۹۳) کے بموجب
جسم کو کسی محل میں مانع کے
اتحاد داخل کرنے میں جو کام
کرنا پڑتا ہے وہ

اگر دفر لا فری ہے
جہاں تکمل غرق شدہ حجم
پر لیا گیا ہے۔ جسم کو جب
ایک صغیر زاویہ طہ میں لگایا
جائے تو یہ کام ہو جائیگا



﴿﴾ ذٰلِكَ لَا يُفْرَا فَرَى + ﴿﴾ ذٰلِكَ لَا يُفْرَا فَرَى

جہاں عنصہ فرلا فرلا، فری پر کا یاد آؤ، آتے اور پہلے مکمل کی وسعت وہی ہے جو پہلے تھی لیکن دوسرا مکمل فائز (فوز) ب و ب کے اندر لیا گیا ہے۔

اسماء - ج: ف: ی - ۱/۲ ی ط + لاطه - ف: (۰) { (۹۵)

$$= د + ج (لا ط - \frac{1}{4} ی ط) + ف (ی) + \frac{1}{4} ح لا ط + ف (ی)$$

{ { { } = فرما زبانی - دمج طلاث - ۱ ج طہ ای ت - ۲ فرت) { مرلا مرامری

نابالوں سے متعلق تنکھ میں ہی ہر جگہ بلا طے اور د کے مملہ بالا میں طہ کی صرف یہی نوت برقرار رکھنے سے

ح = {ف (ی) - ف (۱۰) + لاط ف (ی)}

$$= \{ج ی ف (۰) + لاط ف (ی) \}$$

∴ { ۱ - ۱/۴ } اُطْفَ (۰) + لاطف (۰) - لاطف (- لاطف) {

$\frac{1}{p} \text{ ح لاطات } (.) = \frac{1}{p} \text{ ج مث لاط}$

اس لئے ہنساؤ پیدا کرنے میں مانع کے دباؤں کے خلاف جو کام ہوا وہ تو انسانی
باقیہ میں اخلاقی ہے۔

ع ج ط ا ث ف ز لا فرما فری - ۱ ج ط ا ث ف ز لا فرما فری (ی ت - لا ف ز لا فرما فری)

۱۴ ج شطرنج لافرا

لیکن جسم کے وزن نے جو کام کیا وہ

$$\therefore \text{ج} \times \text{ھ} = \{ \text{ت} + \text{ر} + \text{ک} \} \text{فری (ر) فری}$$

جہاں تکمیل زیر ترین تہوار سطح سے سطحی تراش تک لیا گیا ہے۔

۱۰۰۔ چونکہ دفعہ (۹۳) کا نتیجہ (۱) درست ہے خواہ جسم مانع کے نیچے نکلا ہوا ہو یا نہ نکلا ہوا اس لئے گزشتہ دو دفعات کے نتائج بھی ہر ایک صورت میں درست ہیں اور چونکہ دفعہ (۹۴) کا جملہ (۱) دفعہ (۹۸) کے جملہ (۱) کی صورت ایک خاص صورت ہے اسلئے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ متجانس مانع کے لئے بھی (۹۶) حاصل شدہ نتائج درست ہیں خواہ جسم مانع کے نیچے نکلا ہوا ہو یا نہ ہو۔

۱۰۱۔ کلاً غرق شدہ جسم۔ ایک جسم غیر متجانس مانع میں کلاً غرق شدہ

تیر رہا ہے۔ اس کو کسی افقی محور کے گرد

ایک متغیر زاوے میں گھمانے میں

جو کام کیا جاتا ہے اسے معلوم کرو۔

ادپر کی طرح واما کو گردش کا محور

لو اور فرض کرو کہ محاورہ و لاوی

جسم میں ثابت ہیں۔ نیز فرض کرو

کہ واما کی گہرائی گ ہے اور

ت = ف (گہرائی)


اس طرح توازن کے محال میں

$$\text{ج} = \{ \text{ف} (\text{ی} + \text{گ}) - \text{ت} (.) \}$$

اور ہٹائے ہوئے محل میں

$$\text{د} = \{ \text{ف} (\text{ی} - \frac{1}{2} \text{ی} \text{ط} + \text{گ} + \text{لاط}) - \text{ت} (.) \}$$

$$= \text{د} + \text{ج} (\text{لاط} - \frac{1}{2} \text{ی} \text{ط}) \text{ت} + \frac{1}{2} \text{ج} \text{لاط} \frac{\text{ر}}{\text{فری}}$$



یا $H = C \{ \frac{1}{2} \pi - \theta \}$ - (۱) θ - کٹ فری (۲) فری {


جہاں θ ، θ ، θ اور θ جسم کی زیر ترین اور بلند ترین افقی تراشوں سے متعلق ہیں اور مکمل بلند ترین نقطہ سے زیر ترین نقطہ تک لیا گیا ہے۔
اگر جسم اپنے بلند ترین یا زیر ترین نقطہ پر چپا نہ ہو تو ہم لکھ سکتے ہیں

$H = C \{ \frac{1}{2} \pi - \theta \}$ (۲) فری / کیت

جہاں مکمل زیر ترین نقطہ سے بلند ترین نقطہ تک لیا گیا ہے۔

۱۰۳۔ ایک ٹھوس جسم کو مائع میں ڈبوئے سے توانائی بالقوہ جمع ہو جاتی ہے۔

اگر ایک ٹھوس جسم ایک برتن میں جس میں مائع ہے ڈوبا جائے تو کام ہوتا ہے اور اس لئے مائع کے مرکز ثقل کے اوپر اٹھ آنے سے توانائی بالقوہ حاصل ہوتی ہے۔



فرض کرو کہ مائع کی گہرائی H ہے جسم کے غرق شدہ حصہ کی گہرائی Y ہے برتن اور ٹھوس جسم کی متناظر قوی تراشیں C اور C' ہیں، مائع کا حجم H ہے اور ٹھوس جسم کے غرق شدہ حصہ کا حجم C ہے۔ تب

$C \{ \frac{1}{2} \pi - \theta \} = C' \{ \frac{1}{2} \pi - \theta' \}$ (۱) فری

اور توانائی بالقوہ میں اضافہ $C \{ \frac{1}{2} \pi - \theta \}$ کے تغیر کے مساوی ہے جبکہ

یہ تسمیہ لائیں اضافے مف لا کی وجہ سے پیدا ہو۔

ج ث = ۱ المکر یہ تغیر

= لا لا مف لا - (مف لا - مف ی) ح - (لا ی) - ی مف ی - ی ی مف ی

اب چونکہ
ح = لا لا فلّا - ی ی ی

اس لئے لا مف لا = ی مف ی

اس لئے تغیر = ح (مف ی - مف لا)

یہ نتیجہ اس بات کو زیر نظر رکھ کر بھی فوراً حاصل ہو سکتا ہے کہ ح ٹھوس جسم پر کے حاصل انتصابی دباؤ کے مساوی ہے اور تابع کے چڑھاؤ مف لا کی وجہ سے جسم کا اٹھار مف ی - مف لا ہے۔

۱۰۴۔ ایک اسطوانی برتن کے اندر کچھ مائع ہے، ایک جسم اس مائع کے اندر تیر رہا ہے، جسم کی توانائی بالقوہ۔

جسم کو داخل کرنے لے پیشتر برتن کے اندر جو مائع ہے اس کی سہوار یا ساکن سطح کو شمار کی سطح سطح مابو۔ فرض کرو کہ برتن کی عمودی تراش با ہے اور جسم کی آب راس جبکہ جسم رہا ہو سی ہے۔ فرض کرو کہ توازن کے محل میں غرق شدہ حجم ج ہے۔ ج ث = ۱ لینے سے ج جسم کے وزن کو بھی تعبیر کرتا ہے۔ فرض کرو کہ کسی دوسرے محل میں غرق شدہ حجم ج ہے۔ اس منوالہ کر غل میں یانی کی ہوا سطح بقدر فاصلہ سطح کے اوپر اٹھ جائیگی۔ پس اگر سطح کے نیچے اچھال کے مرکز کی گہرائی گ ہو تو وزن ح بقدر گ + ج کے مساوی بلندی کے اوپر اٹھا دیا گیا ہے اور کام جو ہوا وہ ح گ + ج کے مساوی ہے۔ اس لئے اگر سطح کے اوپر جسم کے مرکز ثقل کا ارتعاش ق سے بعیر ہو تو حل توانائی بالقوہ ہوگی

ج ق + ح گ + ج

اب فرض کرو کہ $ح = ج + ح$ اور فرض کرو کہ ہٹائے ہوئے محل میں جسم کے حجم $ج$ کے مرکز ہندی کی گہرائی $گ$ ہے اس طرح $ح گ = ج گ + ح گ$ صفا جہاں صفا $= \frac{ج}{ب} - \frac{ج}{ب}$ بشرطیکہ $ج$ چھوٹا ہو۔ تو آئی بالنتوہ ہوگی

$$ج (ن + گ) + ج \left\{ \frac{ج}{ب} - \frac{ج}{ب} \right\} + \frac{ج}{ب} =$$


$$= ج (ن + گ) + ج \left(\frac{ج}{ب} - \frac{ج}{ب} \right) + \frac{ج}{ب} =$$

$$ج ط + \frac{ج}{ب} \left(\frac{ج}{ب} - \frac{ج}{ب} \right) + مستقل$$

جہاں ط اُس انتصابی فاصلہ کو تعبیر کرتا ہے جو مرکز ثقل اور اچھال کے مرکز کے درمیان ہے۔

۱۰۵۔ مثال۔ ایک اسطوانہ دوسرے اسطوانہ میں تیر رہا ہے۔

تیرنے والے اسطوانہ کے قاعدہ کے مرکز ہندی کو مبادو لو اور فرض کرو کہ قاعدہ کا رقبہ $ل$ ہے۔ نیز فرض کرو کہ $ل$ کی سطح کے مستوی کی مسادات



$ل + م + ن = ع$ ہے جہاں اوپر وار انتصابی خط کی سمتی جیوب التمام $ل، م، ن$ ہیں۔

تب $ج = \frac{ل + م + ن}{ب}$ اور اگر توازن کے محل میں اچھال کے مرکز کا

مقام $ھ$ ہو تو خط $ھ$ کا ظل اوپر وار انتصابی پڑے گا

$$\frac{ل + م + ن}{ب} = ع$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho V \right) &= \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right) \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right) \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right) \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right) \end{aligned}$$

جہاں $\frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right) = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right)$

اور تکمیل عمودی تراش پر لے گئے ہیں۔

نیز اگر جسم کے مرکز ثقل کے محور ۱، ۲، ۳ ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho V \right) = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right)$$

اور $\frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho V \right) = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right)$

اس طرح توانائی بالقوہ ہوگی

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho V \right) = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right)$$

مستقل

مثلاً فرض کرو کہ ۱ = ب = ۰، اس طرح ث، مرکز ہندسی کے خط دی

پرواقع ہوگا۔ لکھو ح = اف جہاں ث انتصابی محل میں ڈوبنے کی گہرائی ہے

تب توانائی بالقوہ ہوگی

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho V \right) = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right)$$

ایسی صورت میں جبکہ اسطوانہ تقریباً انتصابی ہو ہم تقریباً ث = ۱ - $\frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right)$

رکھتے ہیں۔ اور ث اور م کے سر جو جاتے ہیں

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho V \right) = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \rho (V_1 + V_2 + V_3) \right)$$

یس قانیت کے لئے $\frac{1}{2}$ (ف - ج - ۲) (ف) کو لازماً تراش کے حمود کے کم سے کم میار سے کم ہونا چاہیے۔

مرکز برائے اگر تراشیں دائرہ یا کوئی ایسی شکل ہو جس کے لئے $e = 0$ ، $b = 0$ ۔ تو توانائی بالحدود ایسے محل میں جس میں محور انتصابی کے ساتھ زاویہ ط بننا ہر یہ ہوگی

$$\frac{1}{2} J - \left(\frac{1}{2} J - \frac{1}{2} J \right) + \left(\frac{1}{2} J - \frac{1}{2} J \right) (ف - ج - ۲) + \frac{1}{2} e - \frac{1}{2} e$$

ہٹا سے ہوتے حجم کو مستقل لینے سے $c = 0$ ، اس طرح بالکل محل میں توازن (۱۱) کے لئے لازماً

$$- (ف - ج - ۲) (ف) + e (۲ + مس ط) = 0$$

جس سے ط کی ایک حقیقی قیمت ملتی ہے جبکہ

$$\frac{1}{2} (ف - ج - ۲) (ف) < 0$$

یعنی جبکہ انتصابی کل غیر قائم ہے۔

مثله

۱۔ پانی سے بھاری شے کا ایک برحق ہے جس کو اوندھا کر کے پانی کی سطح پر رکھا گیا ہے، اس میں اتنی کافی ہوا ہے کہ وہ تیر سکتا ہے۔ اگر اسکو کچھ فائبر سے پانی کے اندر ذرا نیچے ڈکھیل دیا جائے تو ثابت کر دو کہ وہ توازن کے ایسے محل میں ہوگا جو انتصابی ہٹاؤ کے لئے غیر قائم ہے۔

۲۔ ایک ٹھوس مکافی نما اپنے محور پر ایک حمود اور مستوی سے محدد ہے۔ اگر یہ تیر رہا ہو اس طور پر کہ اس کا محور انتصابی ہو اور اس میں پانی میں غرق ہو تو ہٹاؤ سے ہوئے مانع کے مرکز نقل کے اوپر پس مرکز کار تقار و تر خاص کے نصف کے مساوی ہوگا۔

۳۔ ایک مخروط جس کا زاویہ راس 90° ہے پانی میں اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا محور انتصابی ہے اور اس نیچے کی طرف ہے۔ ثابت کر دو کہ اس کا پس مرکز

نیراؤ کے مستوی میں واقع ہوگا اور اس کا توازن قائم ہوگا بشرطیکہ اس کی کثافت
اضافی $\frac{2}{3}$ -

۴ — ایک مساوی الساقین نانہ اس طرح تیار ہائے کہ اس کا قاعدہ افقی ہے
اور اس کی دھاریا پانی میں غرق ہے۔ ثابت کرو کہ ایسے بیٹاؤ کے لئے جو دھار
کے علی التوا قائم مستوی میں وقوع پذیر ہو توازن قائم ہوگا اگر فانہ کی کثافت اور
سیال کی کثافت کی باہمی نسبت اس نسبت جسم ۴ء : اسے بڑی ہو جہاں ۲ء
فانہ کا زاویہ ہے

۵ — ایک بند اسطوانی ظرف برت سے ایک چوتھائی بھر دیا گیا ہے۔ اور
استعمابی محور کے ساتھ پانی میں اسے تیرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے ظرف کا
وزن اس پانی کے وزن کا ایک چوتھائی ہے جو اس میں سما سکتا ہے۔ برت کے
پہلے سے پہلے اور بعد توازن کی نوعیت کی جانچ کرو۔ جبکہ تپش کی تبدیلی کی وجہ سے
ہم کی تبدیلی نظر انداز کر دی جائے۔

۶ — ایک ہٹھوس جسم دوسرے مخروط کی شکل کا ہے اور دوساوی دائری
رخوں سے محدود ہے اور اپنے سے دو چند کثافت کے ماتع میں افقی محور کے ساتھ
تیر رہا ہے۔ ثابت کرو کہ توازن قائم ہوگا یا غیر قائم اگر نصف زاویہ راس بالترتیب
۲۰ سے کم ہو یا زیادہ۔

۷ — ایک اسطوانی جہاز کی عمودی تراشیں، ال وتر خاص کے دوساوی مکافیل
کی دوساوی توئیں ہیں جو پینڈے پرس کرتی ہیں، پینڈان مکافیلوں کا مشترک
راس ہے اور اس طرح جہاز کے پہلو بلحاظ پانی کے متعہ ہیں۔ جہاز سیدھا تیر رہا
ہے اور اس کا پینڈا گ گہرائی پر ہے۔ ثابت کرو کہ پینڈے کے اوپر پس مرکز کا
ارتفاع ہے

گ ($\frac{3}{4}$ + $\frac{1}{2}$)

۸ — ایک گروشی مجسم کے کسی قطعہ کو جو قائم تراش سے پیدا ہوتا ہے ماتع میں غرق

کرنے سے اچھال کے مرکز اور پس مرکز کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ متقل رہتا ہے۔
خواہ قطعہ کی بلندی کچھ ہی ہو، گردشی مجسم کی شکل دریافت کرو۔

۹۔ پانی پارہ پیرساکن ہے اور ایک مخروط اس قدر وزنی ہے کہ جب تک اس کا راس پارہ کے اندر نہ گھس جائے یہ ساکن نہیں رہ سکتا۔ مخروط کی کثافت معلوم کرو تاکہ توازن قائم ہو سکے۔

۱۰۔ اگر تیرنے والا جسم اسطوانہ ہو جس کا محور انتصابی ہے اور جس کی کثافت اضافی، مانع کی کثافت اضافی کے ساتھ نسبت نہ رکھتی ہے تو ثابت کرو کہ توازن قائم ہوگا اگر قاعدہ کے نصف قطر اور بلندی کی باہمی نسبت ۱:۱۰ (۱۰:۱) سے بڑی ہو۔
۱۱۔ مکانی مسائل کا یکساں خول انتصابی محور کے ساتھ تیر رہا ہے اور اس کا تین چوتھائی حصہ پانی نے نیچے غرق رہنا ہے جبکہ اس کو محور کی پیم گہرائی تک ایسے مانع سے بھردیا جائے جس کی کثافت ۵ ہے۔ ثابت کرو کہ توازن قائم ہے۔
۱۲۔ گردشی مکانی شاک کی شکل کے ایک طرف میں پانی ہے اور یہ طرف ایک ثابت کھر درے کرہ پر ساکن ہے اس طور پر کہ اس کا راس کرہ کے بلند ترین نقطہ پر ہے۔ توازن کے قائم ہونے کی شرط معلوم کرو۔

۱۳۔ ایک بے وزن اسطوانی خول میں مانع ہے اور یہ خول دوسرے مانع میں تیر رہا ہے۔ ثابت کرو کہ توازن قائم ہوگا سوا اس صورت کے جبکہ اندرونی مانع کی کثافت کو بیرونی مانع کی کثافت کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ایک سے کم ہو اور اس نسبت ثنائی کے نصف سے بڑی ہو جو اسطوانہ کے نصف قطر کو اندرونی مانع کی گہرائی کے ساتھ ہے۔

۱۴۔ ایک نصف کرہ کی خول کو جس میں مانع ہے ایک ثابت کھر درے کرہ کے راس پر رکھ دیا گیا ہے جس کا قطر خول کے قطر کا دو چندان ہے۔ ثابت کرو کہ توازن قائم یا غیر قائم ہوگا بموجب اس کے کہ خول کا وزن مانع کے دو چندان وزن سے بڑا یا چھوٹا ہو۔

۱۵۔ ایک گردشی مجسم اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا راس نیچے کی طرف ہے۔ اس کی شکل معلوم کرو جبکہ پس مرکز کا مقام مانع کی کثافت پر منحصر نہ ہو۔

۱۶۔ ایک مخروطی خول نیچے دار راس کے ساتھ غیر قائم توازن میں تیر رہا ہے۔

توازن قائم بنانے کے لئے اس میں کٹنا پانی ڈال دیا جائے۔

۱۷۔ ایک ٹھوس مخروط مائع میں اس طرح رکھ دیا گیا ہے کہ اس کا محور متعصبانی سے اور اس کا راس نیچے دار برتن کے قاعدہ پر جس میں مائع ہے ٹکا ہوا ہے۔ اگر مائع کی گہرائی مخروط کے ارتفاع کا نصف ہو اور اس کی کثافت مخروط کی کثافت کا چار گنا ہو تو ثابت کرو کہ توازن قائم ہوگا اگر مخروط کا زاویہ راس ۱۲۰ سے بڑا ہو۔

ٹھوس مخروط کی بجائے اسی ارتفاع کا ایک پتلا مخروطی غول رکھ دیا گیا ہے جس کا زاویہ راس ۱۲۰ ہے اور جس کے اندر مرکز کے وسطی نقطہ کی ہوا سطح تک مائع ہے اور اس مائع کی کثافت بیرونی مائع کی کثافت کا نصف ہے۔ ثابت کرو کہ توازن قائم ہوگا اگر غول کا وزن اس کے اندرونی مائع کے وزن کے تین چوتھائی سے کم ہو۔

۱۸۔ ایک اسطوانی ظرف میں جس کا وزن نظر انداز کیا جا سکتا ہے پانی ہے۔ اس ظرف کو ایک ثابت کمرہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس پر رکھ دیا گیا ہے اسطوانہ اس کے قاعدہ کا مرکز کمرہ کو مس کرتا ہے۔ صغیرہ کے لئے قائمیت کی شرط معلوم کرو۔ اگر اس قسم کے بناؤں کے لئے توازن تبدیلی ہو تو ثابت کرو کہ چھوٹے اسطوانہ ہٹا کر دے گئے۔ یہ توازن غیر قائم ہوگا۔

۱۹۔ ایک گروہی مجسم کی شکل معلوم کرو جو متعصبانی محور کے ساتھ قائم ہو۔ پھر کہ مجسم کے زیر ترین نقطہ سے اس مرکز اور اچھال کے مرکروں کے فاصلہ ہر دو درمیان مستقل نسبت رہی ہے۔ اس کی کثافت پتھر کی ہو۔

۲۰۔ ایک نصف دائری اسطوانہ متعصبانی محور کے ساتھ ایک مائع میں جس کی کثافت اس کی کثافت سے دو گنا ہے رکھ دیا گیا ہے۔ اگر یہ اسطوانہ اس سطح سے گزر کر حرکت کر سکے جو متعصبانی مستوی رخ اور سطح کا خطاطی ہے تو قائمیت کی شرط معلوم کرو۔

۲۱۔ ایک قائم مستدیر مخروط افقی محور کے ساتھ ایک مائع میں جس کی کثافت اس کی کثافت کا دو گنا ہے پتھر کا ہے۔ اس کے راس کو مائع کی سطح میں ایک ثابت نقطہ کے ساتھ ڈال کر دیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ قائمیت کے لئے زاویہ راس کو ۱۲۰ سے کم ہونا چاہیے۔

۲۲۔ ایک اسطوانی ظرف اپنے مرکز ثقل میں سے گزرنے والے ایک افقی محور کے گرد حرکت کر سکتا ہے، اور اس کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ اس کا محور انتصابی ہو۔ اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے تو ثابت کرو کہ ابتدا میں توازن غیر قائم ہوگا۔ ایسی شرط معلوم کرو کہ کافی پانی ڈالنے سے توازن قائم بنانا ممکن ہو۔

۲۳۔ دئے ہوئے وزن کا ایک مخروطی ظرف اپنے افقی قاعدہ کے ایک قطر کے گرد حرکت کر سکتا ہے، اس کو ایک وزن دار سیال سے جزو بھردیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ توازن ہمیشہ قائم ہوگا اگر مخروط کا نصف زاویہ $\alpha > 30^\circ$ لیکن اگر زاویہ اس سے بڑا ہو تو معلوم کرو کہ توازن کب قائم ہوگا اور کب غیر قائم۔

۲۴۔ پانی ایک ظرف میں ہے جس کا قاعدہ افقی ہے۔ اس میں ایک مکانی نما ہے جس کا اس ظرف کے قاعدہ پر لگا ہوا ہے۔ مکانی نما کو سیال اور قاعدہ جزو بھردیا گیا ہے۔ مکانی نما کی کثافت نوعی پانی کی کثافت کا $\frac{1}{2}$ ہے اور اس کے محور کے طول کو وتر خاص کے ساتھ نسبت $4:3$ ہے۔ سیال کی کم سے کم گہرائی معلوم کرو جس کے لئے توازن قائم ہوگا۔

۲۵۔ ایک مکانی نما پائال جس کا وزن W ہے، ایک افقی میز پر رکھا ہے اس کے اندر پانی کی کچھ مقدار ہے جس کا وزن N ہے۔ اگر پائال اور اس کے اندر کے پانی کے مرکز ثقل کا ارتعاش ہوتو توازن قائم ہوگا بشرطیکہ مکانی نما کا وتر خاص

$$< 2(n+1) \text{ ف}$$

۲۶۔ ایک گردشیں جسم انتصابی محور کے ساتھ تیر رہا ہے۔ اس کے محور کے ایک ثابت نقطہ پر اوزان رکھنے سے اس کو مختلف گہرائیوں تک ڈوبا گیا ہے۔ مجسم کی شکل معلوم کرو کہ توازن ہمیشہ تعدیلی رہے۔

۲۷۔ ایک ٹھوس مخروط جس کا محور انتصابی اور اس نیچے وارے ایک محور کے گرد جو اس کے ٹکونی خط پر منطبق ہوتا ہے حرکت کر سکتا ہے۔ کس گہرائی تک اس نظام کو پانی میں غرق کیا جائے کہ مخروط کا توازن قائم ہو۔

۲۸۔ کاک کا ایک ٹھوس جسم ایسی سطح سے محدود ہے جس کی ٹکونین ناقص

کے ایک راج دو محور اعظم کے گرد گھما نے سے ہوتی ہے۔ جسم پادہ میں مارکہ تاکہ
غرق ہے۔ اگر صغیر زاوی اہٹاؤں کے لئے توازن تعدیلی ہو تو ثابت کرو کہ

$$2z^2 + 4mz + m^2 - z^2 - 2 = 0 \quad (z = \text{جھجھک})$$

۲۹۔۔ ایک ٹھوس مخروط جس کا زاویہ راس ۲۰° سے کم ہے ایک چکنے
سید مار کے گرد جو اس کے مرکز ثقل میں سے گزرتا ہے اور اس کے محور پر عمود
ہے حرکت کرسکتا ہے۔ اگر مار کو مانع کی سطح میں رکھا جائے تو ثابت کرو کہ مخروط قائم
توازن کی حالت میں ہوگا۔ جبکہ اس کا محور افقی کے ساتھ زاویہ جب ۳۰° جب ۴۰° کا
میلان رکھتا ہو۔

۳۰۔۔ ثابت کرو کہ تیرنے والے حصہ کو اس کے مرکز ثقل کے گرد چھوٹے زاویہ
ط میں سے ٹھانے میں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔

$$1 - 2z^2 + 4mz + m^2 - z^2 - 2 = 0 \quad (z = \text{جھجھک})$$

جہاں جسم اور مٹائے ہوئے مانع کے مرکز ثقل کا درمیانی فاصلہ ۱ سے اور جسم
کے مرکز ثقل اور تیرنے کے مسوری کے رقبہ کے مرکز ثقل کے درمیان افقی فاصلہ
۲ ہے۔

۳۱۔۔ ایک مکانی نمائندہ جس کا رخا ص ۴۱ سے ۴۲ جس کی کیفیت کا مرکز راس
سے ۲ فاصلہ پر ہے دو حالت میں تیر رہا ہے جن کی کٹنائیں ۱ اور ۲ ہیں
اور ۱ کے فاصلہ ۱ سے کم کرو کہ جسم کو ایک افقی محور کے گرد چھوٹے زاویہ ط میں
گھما کر اس میں یہ کام کرنا پڑتا ہے وہ ہے۔

$$1 - 2z^2 + 4mz + m^2 - z^2 - 2 = 0 \quad (z = \text{جھجھک})$$

جہاں ۱ ف محور کے وہ طول ہیں جو سیالوں میں غرق ہیں۔

۳۲۔۔ ایک متناہم ارادیہ متناہم اساتیرہ مثلث سیال میں اس طرح تیر رہا ہے
کہ اس کا راس ۱ سے کی طرف سے قاعدہ افقی ہے، اور اس کے رقبہ کا ۱/۲ حصہ

سیال کے نیچے غرق ہے پس اس کا مرکز نقل پس مرکز پر منطبق ہوتا ہے۔ دریافت کرو کہ توازن حقیقت میں قائم ہے یا غیر قائم۔

۳۳ — گردشی مکانی نما کی شکل کا ایک مجسم انتصابی محور کے ساتھ تیر رہا ہے۔ اگر جمود کا مرکز پس مرکز پر منطبق ہو تو ثابت کرو کہ توازن قائم ہوگا۔

۳۴ — لا اسکے متوازی ایک مستوی سے سطح ج با = ی (۱ - لا) کو قطع کرنے سے جو مجسم پیدا ہوتا ہے وہ اپنے سے ن گنتی کثافت والے سیال میں تیر رہا ہے۔

اگر کسی انتصابی مستوی میں صغیر زاوی ہٹاؤ کے لئے توازن تعدیلی ہو تو ثبات کرو کہ

$$ن = ۱ + \frac{۵}{۸} - \frac{۱}{۲} ج$$

۳۵ — ایک متساوی الساقین مثلثی پترا اب ج ایک مانع میں جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا قاعدہ اب افقی ہے اور مانع کی سطح کے اوپر واقع ہے۔ اگر مانع کی سطح کے نیچے ج کی گہرائی گ ہو تو ج کے اوپر پس مرکز کی بلندی ہے

$$\frac{۱}{۲} گ - \frac{۱}{۲} ق$$

۳۶ — ایک ناقصی پترا ایک مانع میں نصف غرق شدہ تیر رہا ہے اس طور پر کہ اس کا عرضی محور (۱۲) انتصابی ہے۔ مانع کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی کا مربع۔ ثابت کرو کہ پس مرکز کی گہرائی ۳۲ و ۱۵/۱۱ ہے۔ جہاں ز، خردج المکرز ہے۔

۳۷ — نصف قطر کا قائم مستدیر اسطوانہ ایک مانع میں اس طرح ساکن ہے کہ اس کا محور انتصابی ہے اور اس کا طول ج مانع میں غرق ہے اگر ی گہرائی پر کثافت ذ (ی) ہو تو ثابت کرو کہ مرکز مابعد کی گہرائی ہے

کری فہ (ی) فری - $\frac{1}{p}$ فہ (ج)

کری فہ (ی) فری

۳۸ — ایک گردش مکافی نما ایک مانع میں جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا محور انتصابی اور اس نیچے وار ہے - ثابت کرو کہ توازن قائم یا غیر قائم ہوگا - بموجب اس کے کہ $\frac{1}{p}$ ج $\frac{1}{m}$ (م + ۱) سے چھوٹا ہو یا بڑا جہاں محور کا طول $\frac{1}{p}$ ج اس کا طول غرق شدہ ۱، اور تکوینی مکانی کا وتر خاص م ہے -

۳۹ — ایک چٹا کرہ نما (Oblate Spheroid) ایک مانع میں جسکی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی کا مربع نصف غرق شدہ تیر رہا ہے اور اس کا محور انتصابی ہے - ثابت کرو کہ مانع کی سطح کے اوپر مرکز ما بعد کا ارتقاع ہے

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q}$$

۴۰ — ایک ٹھوس گردش مکافی نما اس طرح تیر رہا ہے کہ اس کا محور انتصابی اس نیچے وار اور اس کے مانع کی سطح میں ہے مانع کی کثافت ی گہرائی پر $\frac{1}{p}$ (ی + ۱) ہے جہاں تکوینی مکانی کا وتر خاص ۱ ہے - ثابت کرو کہ اس سے پس مرکز کا فاصلہ $\frac{1}{p}$ ہے -

۴۱ — ایک مخروط نیچے وار اس کے ساتھ مانع میں تیر رہا ہے جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی کا مربع - اگر مخروط کی کثافت مانع کی اس کثافت کے مساوی ہو جو مخروط کے ارتقاع کے $\frac{1}{p}$ گہرائی پر ہے تو مخروط کا لاد یہ اس جبکہ توازن تبدیلی ہو مساوات

$$\frac{1}{p} = \frac{2}{3} \left(\frac{2}{5} \right)$$

سے حاصل ہوگا۔

(۱۰۵) ۴۴ — ف ارتفاع اور ۴ د وتر خاص کا ایک ٹھوس مکانی مناسباتی محل میں ایک مانع کے اندر اس طرح متوازن ہے کہ اس کا راس نیچے وار ہو اور یہ اپنے راس کے گرد جو مانع کی سطح کے نیچے کج گہرائی پر ثابت کر دیا گیا ہے حرکت کر سکتا ہے۔ مانع کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی۔ ثابت کر دو کہ توازن قائم ہوگا اگر مکانی مناسبات کی کثافت کو اس کے راس پر کے مانع کی کثافت کے ساتھ جو نسبت ہے وہ $\frac{ج^۳ + ۴ج^۲ + ۴ج}{۳ف}$ سے کم ہو۔

۴۴ — نصف زاویہ راس کا ایک قائم مستدیر ٹھوس مخروط کا غرق شدہ ایک مانع میں جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی اس طرح تیرا ہے کہ اس کا راس اوپر وار اور محور انتصابی ہے۔ اگر مخروط کا ارتفاع ف اور مانع کی سطح کے نیچے اس کے راس کی گہرائی ب ہو تو ثابت کر دو کہ راس سے پس مرکز کا فاصلہ $\frac{۳ف \times ۵ب + ۴ف - ۴س}{۴ب + ۴ف}$ ہے۔

۴۴ — ڈھلے ہوئے لوہے کی نیچیاں موٹی چادر کا ایک اسطوانی میا جس کا نصف قطر ف اور وزن و پونڈ ہے پانی میں سیدھا تیرا ہے۔ ثابت کر دو کہ اس کا مرکز ثقل نچلے رخ کے اوپر

$$\frac{۲۱}{۳۹۳} + \frac{۵}{۲۱}$$

سے بلند تر نہیں ہو سکتا۔

نیز ثابت کر دو کہ اس کا وزن خواہ کچھ ہی ہو اس کا پس مرکز نچلے رخ کے اوپر۔ د ۱ ف سے زیادہ بلند رہتا ہے۔

۴۵ — ایک اسطوانی پیالہ یکساں پتلی ڈھلی ہوئی دھات کی چادر سے بنایا گیا ہے۔ پیالہ کی تراش دائری ہے اور اس کا قاعدہ چپٹا اور منہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا طول قاعدہ کے نصف قطر کا $\frac{۱}{۲}$ گنا ہے اور پیالہ میں جتنا پانی سما سکتا ہے اس کا وزن

و ہے۔ ثابت کرو کہ پیالہ انتصابی کونوں کے ساتھ قائم توازن میں پانی کے اندر نہیں تیر سکتا اگر اس کا وزن (۶۰۲۹) و اور (۵۸۷۱) و کے درمیان واقع ہو۔
 اگر پیالہ کا وزن $\frac{1}{2}$ و ہو تو اس میں پانی ڈال کر اس کے توازن کو قائم نہ کیا جاسکتا ہے تاکہ انتصابی کونوں کے ساتھ یہ تیرے بشرطیکہ پیالہ میں جو پانی ڈالا جائے اس کا وزن $\frac{1}{2}$ و اور $\frac{1}{2}$ و کے درمیان ہو۔

۴۴۔ ایک گنجی جس کی کثافت $\frac{1}{2}$ ہے قطع سکائی کی شکل کی ہے۔ اس کا وتر خاص $\frac{1}{2}$ و ہے اور یہ راس سے $\frac{1}{2}$ ف فاصلہ کے دہرے میں سے محدود ہے۔ یہ جی ایک مانع میں جلی کثافت $\frac{1}{2}$ ہے اس طرح تیر رہی ہے کہ اسکی سنوئی طم انتصابی ہے۔ اگر

$$۳ \text{ ف (۱۔ کہ) } < ۱۰ \text{ و}$$

$$\text{اور } ۴ \text{ ف (۱۔ کہ) } + ۱۰ \text{ و } < [۲ \text{ ف (۱۔ کہ) } + ۱۰ \text{ و}]$$

تو ثابت کرو کہ قائم توازن کے دو مکمل ہیں جن میں محور انتصابی خط کے ساتھ زاویہ

$$\sin^{-1} \left\{ \frac{۳}{۱۰} \right\} (۱۔ کہ) - ۲ \left\{ \frac{۳}{۱۰} \right\}$$

بناتا ہے۔ یہاں کہ $\frac{۳}{۱۰} = \frac{۳}{۱۰}$ ثا

۴۵۔ ایک جسم دو انعامات میں جن کی کثافتیں $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ ہیں آزادانہ تیر رہا ہے۔ آزاد سطح اور سطح سے جسم کی جو ڈبائیں حاصل ہوتی ہیں ان کے رقبے $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{2}$ ہیں اور ان کے مراکز ثقل ج اور ج ہیں۔ خفیف ہٹاؤ کے لئے ثابت کرو کہ ہٹاؤ ہونے سے سیال کی کمیت دہی نہ ہوگی اگر گردش کا

محور اس انتصابی سنوئی میں واقع ہو جو ج ج کو نسبت $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ میں یا

$\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ میں تقسیم کیا ہے بموجب اس کے کہ انعامات

غیر محدود ہیں یا ایک ایسے ظرف میں ہیں جس کو مستویوں $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{2}$ سے تراشنے سے تراستوں کے رقبے $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{2}$ ہیں۔

۴۸۔ ایک دوسرا دکانی جہاز دو مساوی اور متشابه جہازوں کو ایک دوسرے کے ساتھ طویل ملا کر بنایا گیا ہے، ہر ایک میں ایک ہی طرح کا ہم وزن بوجھ لاد گیا ہے۔ اگر علیحدہ جہازوں کی صورت میں پہلو پر لڑ گننے کے لئے مرکوز انقل کے ادیر پس مرکز کا ارتفاع دہوتو ثابت کرو کہ دوسرے جہاز کی صورت میں یہ ارتفاع

د + $\frac{b^2}{c}$ ہو گا جہاں تیراؤ کے مستوی کا رقبہ (کسی ایک کا حجم غرق شدہ ح اور وسطی مستویوں کا درمیانی فاصلہ ۲ ب ہے۔

(۱۰۶) ۴۹۔ ایک منشوری جسم کے رخ یا پہلو خط آب کے نزدیک انتصابی ہیں اس کو اس طرح لاد گیا ہے کہ اس کا مرکز انقل اس کے پس مرکز پر منطبق ہوتا ہے جب کہ اس کو اس کے محاوروں کے متوازی محور کے گرد گھما کر اس میں ہٹاؤ پیدا کیا جائے ثابت کرو کہ توازن قائم ہے۔

۵۰۔ ایک مخروط ناقص جس کا نصف زیادہ باس ہے ایک مانع میں جبکی کثافت اس کی کثافت کا دو چند ہے تیرا ہے۔ ثابت کرو کہ یہ اس طرح تیر سکتا ہے کہ اس کا محور انتصابی سمت سے مائل ہو اور بڑے قطر والا سر سیال کے باہر ہو بشرطیکہ

$$\text{جم م} < (س + ر) \frac{h}{2} / \frac{1}{4} (س + ر) \frac{1}{7}$$

جہاں رنوں کے نصف قطر س اور ر ہیں۔

۵۱۔ پتلے مخروطی خول کا ایک بند مقطوع جس کا وزن نظر انداز کیا جاسکتا ہے متجانس سیال میں تیر رہا ہے اور اس کے اندر زیادہ وزنی دوسرا متجانس سیال ہے۔ ثابت کرو کہ خواہ کونسا ہی رخ غرق کیا جائے قائمیت کی شرط جبکہ محور انتصابی ہو یہ ہے

$$\frac{r^2 (r^2 + r^2 + r^2)}{r^2 (r^2 + r^2) - (r^2 + r^2)} > \frac{r^2}{r^2}$$

جہاں محور کا غرق شدہ طول ف اور کون کا غرق شدہ حصہ ل ہے۔ مقطوعہ کے غرق شدہ برج کا نصف قطر ہے۔ اور اندرونی و بیرونی دائروں کے خطوط آب کے نصف قطر اور ہم ہیں۔

۵۲۔ ایک ٹھوس مکعب مانع میں انتصابی محور کے ساتھ تیر رہا ہے۔ ثابت کرو کہ تمام راہوں کی ہٹاؤں کے لئے توازن قائم باغیر قائم ہوگا۔ بوجب اس کے کہ نیزاؤں کے مستوی سے مکعب کی تراش سیدیں بالمشکلت ہو۔

۵۳۔ ایک ناقص نما ایک مانع میں جس کی کثافت نوعی اس کی کثافت نوعی کا دو چند ہے تیر رہا ہے۔ ایک چھوٹا حفت انتصابی مسوی میں ناقص نما پر عمل کرتا ہے اور اس کے حفت دور بر ہٹائے ہوئے محل میں رکھنا ہے۔ ثابت کرو کہ حفت کے مسدے اور سیال کی سطح کا سطح رابطہ اور وہ محور جس کے گزرائے ناقص نما گھومتا ہے باہم منبوج ہوئے بلحاظ اس ماسلی مخروطی سے جو نیزاؤں کے مسوی میں ہے۔

۵۴۔ اگر ایک تیرے والے ہمہ کا محل عمر قائم ہو تو جو حکم مرکز قفل دونوں پس مرکزوں کے اور واقع ہوگا ثابت کرو کہ جسم میں سطح آب کے مستوی میں ایک خط ثابت کرنے سے اس کے گزرائے روشن کے لئے قائم محل حاصل ہو سکتا ہے بشرطیکہ یہ خط ایک خاص مانع کے باہر واقع ہو۔

۵۵۔ ایک ٹھوس متعاش مخروط قائم توازن کی حالت میں ایک سیال میں تیر رہا ہے۔ اس طور کہ اس کا محور انتصابی ہے اور قاعدہ سیال سے باہر ہے۔ سیال کی صافیت ایسے ہی جیسے گہرائی کی ف ویں مت۔ ثابت کرو کہ مخروط کا نصف راہیہ راس

$$\text{جہاں} \frac{2}{\text{ماس} + \text{ق}} = \frac{\text{ق}}{\text{ق}}$$

سے تراہونا چاہیے۔ جہاں مخروط کا ارتفاع ف اور محور کا غرق شدہ طول ل ہے۔ ۵۶۔ ایک وزن دار ماس مکعب ایک سیال میں یورپی طرح غرق گردیا گیا ہے۔ سیال کی کثافت = گہرائی کے مکعب کا مکعب کے راس اتقی ہیں۔

ثابت کر دیکیں مرکزی ارتفاع $\frac{۱۲}{۱۰}$ مہ $\frac{۱۲}{۱۰}$ ہے جہاں مکعب کی کمیت ک اور اس کے ایک کنارے کا طول ۱ ہے۔

۵۷ — قائم مستدیر مخروط کی شکل کا ایک پتلا ظرف جس کا وزن نظر انداز کیا جاسکتا ہے انتصابی محور کے ساتھ ایک مانع میں تیر رہا ہے۔ مانع کی کثافت مہ $\times$ (۱ + ی) ہے جہاں مانع کی سطح کے نیچے گہرائی ی ہے اور محور کا غرق شدہ طول ف ہے اگر مخروط کے اندر مہ (۱ + $\frac{۳}{۲}$) کثافت کا مانع ہو تو ثابت کر دو کہ توازن قائم ہوگا بشرطیکہ

$$\frac{۳}{۵} \left(\frac{۱۲}{۱۰} \right) < \frac{۳}{۵} \frac{۱۲ + ف}{۱۵ + ف}$$

۵۸ — ایک تنخاس وزن دار مکانی شکل کے اسطوانے کا ایک طویل حصہ مکونوں کے علی القوانم دو مستویوں سے اور ایسے ایک مستوی سے محدود ہے جو مکونوں کے محور پر عمود وار ہے۔ یہ اسطوانہ اس طرح ساکن ہے کہ اس کا محوری مستوی انتصابی ہے اور زیر ترین مکون ایک ظرف کے افقی کمر درے پیدے کو مس کرتا ہے اس ظرف میں مانع ڈال دیا گیا ہے جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی کی کن دیں قوت۔ مانع کی گہرائی گ ہے، جسم کا ارتفاع ف (کے گ) اور مکون کی مکانی کا در خاص ۴ ہے۔ یہ فرض کر کے کہ تیراؤ کی حالت پیدا نہیں ہوتی ثابت کر دو کہ ثابیت کے لئے جسم کی کثافت کو مانع کے زیر ترین طبقہ کی کثافت کے ساتھ جو نسبت ہے وہ

$$\frac{۴}{۸} \frac{جا (۱ + ن)}{(۲ + ن)} \left(\frac{۳}{۲} (گ) \right) \frac{۳}{۳ - ن} = ۱۰$$

سے کم ہونی چاہیے جبکہ

$$۱۵ گ < (۵ + ن) (۳ - ف) (۱۰ - ۱) (جا ن) = ۱۲ (ن + ۱)$$

جا کا تفاعل ہے

۵۹۔ ایک یخیاں ٹھوس قاعہ مستدبر مخروط کی کثافت نہ اور زاویہ رأس ۲ ص ہے یہ مخروط ایک سیال میں تیرا ہے اس طور پر کہ اس کا راس نیچے کی طرف اور اس کا قاعدہ سطح کے اوپر ہے۔ سیال کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی کی نوبت اور مخروط کے ارتفاع کے مساوی گہرائی پر اس کی کثافت ہشت ہے۔ ثابت کرو کہ انتصابی نخل میں توازن قائم ہوگا بشرطیکہ

$$(1+n)(1+\frac{1}{n})(1+\frac{1}{n}) < (1+\frac{1}{n})^3 \text{ جم } 6+5$$

نیز یہ مخروط اس صورت میں ہی متوازن ہوگا جبکہ انتصابی کے ساتھ اس کے محور کا میلان ط مساوات

$$(1+n)(1+\frac{1}{n})(1+\frac{1}{n}) < (1+\frac{1}{n})^3$$

$$= (1+\frac{1}{n})^3 \text{ جم } 3+2 \text{ ط } 3+2 \text{ (جم ط) جب } 2+3$$

سے حاصل ہو۔

۶۰۔ ایک کعب جس کا کنارہ ۱ ہے پانی میں اس طرح تیرا ہے کہ اس کے درخ افقی ہیں اور انتصابی کناروں کا طول لی پانی میں غرق ہے۔ اگر کعب کو ایک افقی کنارے کے متوازی محور کے گرد ایک محدود زاویہ ط میں گھمایا جائے اس طور پر کہ ہٹائے ہوئے پانی کا حجم غیر متغیر ہے اور اوپر کے رخ کا کوئی حصہ غرق نہ ہونے پائے تو ثابت کرو کہ کام جو کرنا پڑتا ہے وہ ہے

$$[\frac{1}{2} \text{ ط }] \text{ جب } \text{ط} - (1-\text{ل}) \text{ جب } \frac{1}{2} \text{ ط}$$

جہاں کعب کا وزن و ہے۔ (دیکھو صفحہ ۱۰۵)

۶۱۔ ایک جہاز کے پینے میں پانی ہے اور جہاز سمندر جس تیرا ہے۔ ایک ٹھوس جسم کو رین برکی ایک مشین کے ذریعہ تھام کر جہاز کے پینے میں لٹکایا گیا ہے اس طور پر کہ جسم پانی میں جزو غرق رہتا ہے اور پانی کا وزن و ہٹاتا ہے۔ اس کو پھیرا اور محوراً غرق کیا گیا ہے تاکہ اس کا صغیر طول ص لا اور

غرق ہو جائے۔ ثابت کرو کہ جہاز اور اس کے اندرونی پانی کی توانائی بالقوہ میں اضافہ ہے

$$\{و-ا\} \left(\frac{و}{ج} + \frac{ا}{ب} \right) \{سنا\}$$

جہاں جہاز اور اس کے اندرونی پانی کا وزن و ہے جسم کے فاصل آب کا رقبہ ا اور جہاز کے فاصل آب کا رقبہ ج ہے اندرونی پانی کی سطح کا رقبہ با ہے۔
۶۲۔ مکانی نما $\frac{ا}{و} + \frac{با}{ب} = ۲$ سی کی شکل کا جہاز انتصابی محور کے ساتھ یانی بس تیر رہا ہے۔ اگر اس کو تیراؤ کے مستوی میں کے کسی محور کے گرد محدود زاویہ ط میں گھمایا جائے اور ہٹایا ہوا حجم وہی برقرار رہے تو ثابت کرو کہ جو کام کیا گیا وہ ہے

$$\{ج ش ح\} \{ع جب ط- ف (۱- جم ط)\}$$

جہاں محوری سے گردش کے محور کا عمودی فاصلہ ح ہے اور ابتدائی محل میں مرکز ثقل اور اچھال کے مرکز کے درمیان فاصلہ ف ہے۔
(۱۸) ۶۳۔ تناو کہ جہاز پر ایک وزن کے پٹانے سے جو بقائیکہ کل وزن کے جھوٹا ہے جہاز کے جھکاؤ پر کوئی دریافت ہو سکتا ہے۔ اگر ہٹاؤ اتنی عرصہ پر ہو اور وسطی خط سے زاویہ ط بنائے تو ثابت کرو کہ عرشہ کا ڈھال ایسا ہے کہ خط میلان اعظم، وسطی خط کے ساتھ زاویہ مس ۱ (م مس ط) بناتا ہے جہاں پس مرکزی ارتفاعوں کی نسبت م ہے۔

۶۴۔ مربع تراش کا ایک کندہ یانی میں تیر رہا ہے اس طور پر کہ اس کے دونوں مربع رخ انتصابی ہیں اور تین کنارے جوان رخوں پر عمود ہیں پوری طرح غرق ہیں۔ اگر ایک معلومہ کنارہ پانی سے باہر رہے تو ثابت کرو کہ توازن کے تعین محل ہونے کے بشرطیکہ کندہ جس سے کاٹنا ہو ہے اس کی کثافت نوی $\frac{۳۳}{۳۳}$ اور $\frac{۳۳}{۳۳}$ کے درمیان واقع ہو، اور اگر یہ شش ط پوری ہو تو ثابت کرو کہ دونوں غنیہ

وہ نقطے جو انتصابی ہٹاؤ سے غیر متاثر رہتے ہیں ایک ایسے خط پر واقع ہوتے ہیں جس کی مساوات ہے

$$\frac{\text{ضالہ}}{\text{وا۔ (ا۔ ن) ل' / ۳}} + \frac{\text{عاما}}{\text{ب'۔ (ا۔ ن) ل' / ۳}} + \text{ن۔} = ۰$$

جہاں محسوس کی کثافت کو مانع کی کثافت کے ساتھ نسبت ن ہے۔




باب ششم

تیرنے والے اجسام کے بہتر اوزان

۱۰۹۔ اگر ایک وزن دار جسم مانع میں قائم توازن کے محل میں تیر رہا ہو اور اسے اس محل سے ذرا ہلایا جائے تو وہ چھوٹے انتصابی اور زاویاتی بہتر اوزان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسے بہتر اوزان کا سوال ایک ماحر کی سوال سے اوریہ کہ اگر ہم مانع کی حرکت کو نظر انداز کر دیں تو جسم کے بہتر اوزان کے اوزان کے لئے جو نتائج حاصل ہونے دو حقیقی دوران کے اونی ہر دو ہونگے۔ اس کتاب کی بہت کج جہاننگ آتھیں ہے ہم دیکھیں کہ نفس کر سکتے ہیں کہ مانع نہ جمہ و نظ انداز دیا ہے۔ علاوہ بریں ہم صرف ایک سا سویت پر غور اس کے۔ ہم فرض کریں گے کہ جسم اپنے مرکز میں سے گزرنے والے انتصابی مستوی کے نیچے سے متماثل ہے اور یہ کہ ابتدائی ہٹاؤ اس مستوی کے متوازی ہے۔

ظاہر ہے کہ جسم کے تمام سطحوں کی بعد کی حرکتیں اس مستوی کے متوازی ہونگی اور اگر توازن قائم ہو تو حرکت چھوٹے انتصابی اور زاویاتی بہتر اوزان پر مشتمل ہوگی



اول فرض کرو کہ دشا اور ہر میں سے گزرنے والا خط (ج ح د) تیراؤ کے مستوی کے مرکز ہنہ سی میں سے گزرتا ہے۔ جب یہ صورت ہو تو انتصابی اور زاویاتی ہٹاؤں پر ایک دوسرے سے علحدہ غور کیا جاسکتا ہے۔

ایک چھوٹے انتصابی ہٹاؤ پر غور کرو۔ جسم کے چھوٹے حصہ ح ع کو جسے سیال کے باہر اٹھایا گیا ہے ایک پتلا اسطوانہ خیال کیا جاسکتا ہے۔
فرض کرو کہ ح ع = ی تو ح ث = ج ث۔ ی اور جسم پر نیچے وار
قوت = جسم کا وزن۔ ہٹاے ہوئے سیال کا وزن
= ج ث ل = ی

جہاں یہ اوج کے مستوی کا رقبہ ہے۔

(۱۱۰)

$$\therefore \text{ک فر ح ث} = \frac{\text{ج ث ل}}{\text{فرت}} = \text{ج ث ل ی}$$

جہاں جسم کی کمیت ک ہے۔

لیکن ک ج = ہٹائے ہوئے سیال کا وزن
= ج ث ح = جسم کے حصہ ج د کا حجم ح ہے۔

اس لئے مساوات

$$\frac{\text{فر ی}}{\text{فرت}} + \frac{\text{ج ل ی}}{\text{ح}} =$$

سے حرکت کا تعین ہوتا ہے۔

اس لئے پورے اهتزاز کا وقت ہوگا

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{J}}$$

۱۰۔ اب ج کے گرد ایک چھوٹا زادی ہٹاؤ (ع) فرض کرو، تب ث
بقدر اس فاصلہ کے اوپر اٹھیکگا جو ع پر منحصر ہوگا اور اس لئے نظر انداز کیا
جاسکتا ہے۔ بقابلہ ان مقداروں کے جو ع پر منحصر ہوتی ہیں اور پھر اگر جسم کو
ساکن فرض کر کے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ (اس فرض کی بناء
پر کہ توازن قائم ہے) ث میں سے گزرنے والے افقی محور کے گرد اهتزاز
کرے گا۔

اگر ابتدائی ہٹاؤ ث کے گرد لیا جائے تو بھی دراصل وہی بات پیدا ہوگی

کیونکہ ایسی صورت میں ج انتی سمت میں قابل قدر فاصلہ طے کر گیا (یعنی صرف پہلے رتبہ کی صورت مندوں کا لحاظ کرنے ہوئے) اور ہٹائے ہوئے سال کی مقدار اوپر کی طرح غیر متغیر رہیگی۔

اگر پس مرکز ہونوں کے گروسیالی دباؤ کا معیار

$$= \text{ح ت ح} \times \text{دش جب ط}$$

اور ط کو کٹانے کی طاف امل ہوتا ہے جہاں ط وہ زاویہ ہے جو دش و انتسابی کے ساتھ آن ب پر ماتا ہے۔

$$\text{لیکن } \text{دش} = \frac{\text{سٹا}}{\text{ح}} - \text{ا}، \text{ اگر } \text{دش} = \text{ا}$$

اب چونکہ دش میں سے گزرنے والا انتی محور صدر می محور ہے اس لئے

$$\text{ک سٹا} = \frac{\text{فٹا}}{\text{دش}} = \text{ج دش} (\text{سٹا} - \text{ا ح}) \text{ط}$$

جہاں ط کی اعلیٰ نوٹس طر امدار کردی گئی ہیں اور دش میں سے گزرنے والے انتی محور کے گرو جسم کے جوہر کا معیار ک سٹا ہے۔ یعنی

$$\text{سٹا} = \frac{\text{فٹا}}{\text{دش}} + \text{ج} \left(\frac{\text{سٹا}}{\text{ح}} - \text{ا} \right) \text{ط} =$$

(۱۱) یہ مساوات چھوٹے اہترارات کو فقیر کرتی ہے جبکہ سٹا < ا ح یعنی جبکہ دش کے اوپر واقع ہو اور اہترارات وقت

$$\text{سٹا} = \frac{\text{ح}}{\text{ج (سٹا} - \text{ا ح)}} \text{ط}$$


میں واقع ہونے میں۔

اگر دش کے نیچے واقع ہو تو دش کی علامت بدل دی جائیگی۔

یہ معلوم رہے کہ قائمیت کے پر کہنے کی بنا پر اس منجہ سے اخذ ہو سکتی ہے جو ابھی حاصل کیا گیا اہتراز کے لئے سٹا - ا ح کا ایک مثبت مقدار ہونا ضروری ہے

۱۰۸۔۔۔ نائینا اگر دش کو طانے والا خط نقطہ ج میں سے نہ گزرے تو

دونوں حرکتیں ایک دوسرے سے غیر متعلق نہیں ہونگی اور وہ قانونِ جہانِ حرکتوں کی تعین کرتا ہے طریقہ ذیل سے معلوم ہو سکتا ہے۔



فرض کرو کہ جسم کو تشاکل کے انتصابی مستوی میں خفیف طور پر ہٹا کر چھوڑ دیا گیا ہے اور خط $ه$ $د$ $ا$ $ب$ آن ت بر انتصابی کے ساتھ زاویہ $ط$ بناتا ہے اور $ی =$ سطح کے نیچے $ج$ کی گہرائی $ج$ $ع$ ، عرض کرو کہ $ه$ $د$ $ا$ تیراؤ کے مستوی کو نقطہ $د$ پر قطع کرتا ہے اور

$$ه$$
 $د$ $ا$ $ج$ $د = ب$ ، $د$ $ا$ $د = د$

اور دیگر نمونہ گذشتہ کی طرح۔

$$تب$$
 $د$ کی گہرائی $ی = ب$ $ج$ $ط + د$ $ب$ $ط$

زیر بحث رشتہ تک۔

$$ی = ب$$
 $ط + د$ $ا$

ہٹائے ہوئے سیال کا وزن

$$ا$$
 $ب$ $ط + ج$ $ع$ $ج$ یا $ا$ $ف$ $ب$ $ج$

کے مساوی حجم کے سیال کا وزن ہوگا۔

$$ی$$
 $وزن = ج$ $د$ $ا$ $ج$ $د$ $ا$ $ی$

اور ایک $\frac{\text{فزی}}{\text{فرت}}$ (ی + د + ب ط) = ج - (ج ث ح + ج ث ای)

= ج ث ای

$$(۱) \quad \frac{\text{فزی}}{\text{فرت}} = \text{ب} \frac{\text{فراط}}{\text{فرت}} - \text{ح} \frac{\text{ل}}{\text{ح}} \text{ی}$$

(۱۱۳) ثبات سے تیز دالے انھنی محور کے گرد (حصہ دہری محور ہے اور ثبات کے ساتھ) (بہم) آزاد فی حرکت کو پیش رفت رکھ کر دوسری مساوات حاصل ہوگی۔
نست۔ اگر سیالی دماؤ سے مویار کو درجہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
ایک تو حصہ ۱۰۰ سیالی وجہ سے ہے اور دوسرا ہنسائے ہوئے سیالی کے حصہ ۴۰ ج کی ہے۔

سیالی دماؤ کا ثقل الذکر حصہ = ج ث ح جو جس مرکز ہمیں سے
اور دوسرا حصہ ۶۰ ہے اور موخر الذکر حصہ = ج ث ای جو تیزاد کے مستوی کے
مركز ہندسی سے غرض کرتا ہے۔

ط کہ حصہ ۱۰۰ کے کو میلان رکھنے والی سمت میں معیار

$$= \text{ج ث ح} - \text{ج ث ب ط} - \text{ج ث ای (ب جم ط - د جب ط)}$$

$$= \text{ج ث ب ط} - \text{ج ث ای (ب - د ط)}$$

$$= \text{ج ث ب ط} - \text{ج ث ای (ب - د ط)}$$

جہاں سی اور ط کے حامل ثقب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے

$$\text{یک سر} \frac{\text{فزی}}{\text{فرت}} = \text{ج ث (سر} \frac{\text{ل}}{\text{ح}} - \text{و ح) ط} + \text{ج ث ای}$$

$$(۲) \quad \text{سر} \frac{\text{فزی}}{\text{فرت}} = \text{ج (سر} \frac{\text{ل}}{\text{ح}} - \text{و ح) ط} + \text{ج ل} \text{بی}$$

(۱) اور (۲) مساواتوں سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{فزی}}{\text{فرت}} + \text{ج ل} \frac{\text{ل}}{\text{ح}} = \text{ج ل} \frac{\text{ل}}{\text{ح}} + \text{ج ل} \frac{\text{ل}}{\text{ح}} - \text{ج ل} \frac{\text{ل}}{\text{ح}} - \text{ج ل} \frac{\text{ل}}{\text{ح}} =$$

$$\frac{\text{فرق } ۲}{۱} - \frac{\text{ج } ۱ \text{ ب}}{\text{ح } ۲} + \frac{\text{ج } ۲}{\text{ح } ۱} \left(۱ - \frac{\text{ح } ۱}{\text{ح } ۲} \right) = ۰$$

جن کو لکھا جاسکتا ہے

$$(۳) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{فرق } ۲}{۱} + \text{ری} - \text{ب ب ن ط} = ۰ \\ \frac{\text{فرق } ۲}{۲} - \frac{\text{ع ی}}{\text{ب}} + \text{ن ط} = ۰ \end{array} \right.$$

ان مساواتوں کو مکمل کرنے کے لئے دوسری مساوات کو لہ سے ضرب دیکر پہلی مساوات میں جمع کرو اور فرض کر دو

$$(۴) \quad \frac{\text{ل ن} - \text{ب ن}}{\text{ر ب} - \text{ل ع}} = \frac{\text{ل}}{\text{ب}}$$

اس طرح حاصل ہوگا

$$\frac{\text{فرق } ۲}{۱} (\text{ری} + \text{ل ط}) + (\text{ر} - \frac{\text{ل ع}}{\text{ب}}) (\text{ی} + \text{ل ط}) = ۰$$

اور اگر (۴) کی اصلیں لہ لہ ہوں تو

$$(۵) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{ی} + \text{ل ط} = \text{ج جم} \left\{ \text{ل ع} - \frac{\text{ل ع}}{\text{ب}} \right\} + \text{ت ع} \\ \text{ی} + \text{ل ط} = \text{ج جم} \left\{ \text{ل ع} - \frac{\text{ل ع}}{\text{ب}} \right\} + \text{ت ع} \end{array} \right.$$

ان سے ی اور ط پوری طرح معلوم ہو جاتے ہیں۔
نشا کی گہرائی اس شکل کے جلد سے حاصل ہوتی ہے

(۱۱۳)

$$\text{ج} + (\text{جم} + \text{ع}) + \text{ب جم} (\text{ن ط} + \text{ب})$$

اور اس کی حرکت دو مختلف اهتزازوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک قوانین ارتعاش کی پابندی کرتا ہے۔ یہ دونوں اهتزاز صغیر اهتزازات کے ہم وجود ہونے کے

اصول کے مطابق باہم مرکب ہوتے ہیں۔
یہ دیکھ لیا جاسکتا ہے کہ اگر $\{a, b\}$ میں دو نقطے لئے جائیں جن کے فاصلے
ج سے سمت ج میں l کم ہیں نو وقت t پر ان نقاط کی انتصابی گہرائیاں
می + l ط اور می + l ط ہونگی یعنی گہرائیاں ہونگی

$$ج \text{ جم } \{a, b\} - l \text{ ط } \{a, b\} + t \text{ عم } \{a, b\} = \text{ج جم } \{a, b\} - l \text{ ط } \{a, b\} + t \text{ عم } \{a, b\}$$

اور اس لئے ان نقطوں کی انتصابی حرکتیں سادہ ہتزازوں پر مشتمل ہیں
جو قانون رفاص کی پابندی کرتے ہیں۔ ڈوہیل (Dubamel) نے اپنی کتاب
نصاب جیل فو ۱۵۲ (Cours de mecanique, Art 152) میں اس امر کی دریافت
کہ حوالہ دینے ہوئے اس کو ایم کوشی (M Cauchy) کی طرف سے کیا ہے۔
مساواتیں (۵) ارتعاش کی طبعی حیثیتوں کو تعمیری ہیں۔ ہتزازوں کے

$$ادوار \frac{2\pi}{\omega} \text{ زیادہ آسانی کے ساتھ می} = \{a, b\} \text{ جم } (t + \text{صد}) \text{ اور ط} =$$

ب جم (ت + صد) کو مساواتوں (۳) میں مندرج کرنے سے اویں نسبت $\frac{1}{2}$ کو نتیجہ سے
ساقط کرنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

مثله

۱۔ ایک سبب ہاؤنڈاؤٹے ہوئے ارتفاع سے یا نی کی سطح پر امصابا گرایا گیا ہے
اس کی حرکت دریافت کرو اور اس کے لئے شرط معلوم کرو کہ وہ جس عرق ہو جائے۔

۲۔ ف ارتفاع کا انتصابی اسطوانہ ایک مانع میں تیر رہا ہے جس کی کثافت
اسطوانہ کی کثافت کا دو چد ہے۔ مانع ایک اسطوانی ظرف میں ہے۔ اگر ظرف سخت
نصف ف اسطوانہ کے نصف قطر کا دو چد ہو اور اسطوانہ کو خفیف طور پر انتصاباً
پٹا جاوے تو ثابت کرو کہ ہتزاز کا وقت $\frac{2\pi}{\omega}$ ما ۳ ف ۳ ح ہو گا۔

۳۔ ایک جسم جسکی سطح کا بجلا سہ کر دی ہے ایک درنداریال میں یہ رہا ہے
ثابت کرو کہ صغیر زامی ہتزاز کا وقت وہی ہو گا خواہ ایسی منجائش سیال میں تیرے۔

۴۔ ایک مجوف نصف کرہ کو دو ایک افقی قطر کے گرد حرکت کر سکتا ہے سیال سے جزاً بجز دیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ صغیرا ہتزاز کا وقت وہی ہوگا جو اُس صورت میں ہوتا جبکہ اس میں سیال نہ ہو۔

۵۔ ایک ٹھوس ناقص ماپنے سے دو چند کثافت نوعی؛ لے اُتے میں تیر رہا ہے اس طور پر کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا محور انتصالی ہے چھوٹے انتصالی ہتزاز کا وقت معلوم کرو، نیز دوسرے دو افقی محوروں کے گرد صغیرا زوئی ہتزازات کے اوقات معلوم کرو۔

۶۔ ایک کسبدر جس کے کنارے کا طول ۱۲ ہے (سیال میں تیر رہا ہے اس طور پر کہ اس کا مرکز ثقل سیال کی سطح کے نیچے ب گہرائی ۱۲ ہے۔ اگر اس میں صغیر ہٹاؤ پیدا کیا جائے اس طرح کہ اس کے دورخ انتصالی رہیں تو ثابت کرو کہ اس کے صغیر انتصالی اور زوئی ہتزازات کے اوقات علی الترتیب ہونگے

$$2\pi \sqrt{\frac{b}{g}} \quad \text{اور} \quad 2\pi \sqrt{\frac{b}{g} \left(\frac{b+a}{b} \right)} \quad \text{ج (۳ ب) - ۲}$$

۷۔ ایک اسطوانہ مائع میں انتصالی ہتزازات کر رہا ہے۔ یہ مائع ایک دوسرے اسطوانہ میں ہے جس کا نصف قطر اول الذکر کے نصف قطر کا $\frac{1}{n}$ کثا ہے۔ ثابت کرو کہ اسطوانہ کے محور کا فرق شدہ طول جبکہ وہ سکون کے محل میں ہو

$$2\pi \sqrt{\frac{b}{g} \left(\frac{b+a}{b} \right)} \quad \text{ج (۳ ب) - ۲}$$

ہوگا جہاں ت ایک بورے ہتزاز کا وقت ہے۔
۸۔ ث کثافت کی ایک موم جی ث کثافت کے سکن پانی میں انتصالی تیر رہی ہے اس کو روشن کر دیا گیا اور دیکھا گیا کہ اس کا شعلہ پانی کی طرف یکساں رفتار سے اتر رہا ہے اور جی جس رفتار سے جل رہی ہے وہ وہی ثابت کرو کہ

$$2\pi \sqrt{\frac{b}{g} \left(\frac{b+a}{b} \right)} \quad \text{ج (۳ ب) - ۲}$$

نیز ثابت کرو کہ اگر جی کو اُس وقت بجا دیا جائے جبکہ اس کا طول $\frac{1}{n}$ باقی رہے

توبی پانی کے باہر اٹھ کر جاگی اگر د < ماثل ج / ث یس اگر

د > ماثل ج / ث تو اس کے استزادات کا وقت ۲۲ ماثل لی / ج ہوگا
 ۹ — ایک قائم مخروط انتصالی محور اور نیچے دار راس کے ساتھ سیال میں سیر رہا
 ہے اور اس کے محور کا $\frac{1}{2}$ حصہ غرق ہے مخروط کے وزن کے مساوی ایک
 وزن اس کے قاعدہ پر رکھ دیا گیا ہے جس سے مخروط واپس اٹھنے کے پتیتر
 اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کا محور پورا غرق ہو جاتا ہے ثابث کر دو کہ

$$ن^۳ + ن^۲ + ن = ۷$$

۱۰ — ۲ زاویہ راس کا مخروط و نصف قطر کے استوانہ میں اس طرح تیر رہا ہے
 کہ اس کے محور کا طول و عرق ہے اگر اسکو ایک صغیر طول میں انتصالی نیچے ڈیکیل
 دیا جائے ثابث کر دو کہ اس کے استزاد کا وقت ہوگا

$$۲۲۲ \sqrt{۲۱ - ۲۱} (۲۱ - ۲۱) \text{ ف}$$

۳۲ ج

جاں ف مخروط کا ارتفاع ہے۔

۱۱ — ایک ظرف گردشی مکافی نما کی شکل کا ہے ، اس کا محور انتصالی ہے اور
 اس میں مانع کی اتنی مقدار ہے جسکا حجم اسی وتر خاص کے ایک مکافی نما کے قطعہ
 کے حجم کے مساوی ہے جو اس مانع میں تیر رہا ہے۔ اگر اس مکافی نما کو اٹھا دیا
 جائے کہ اس کا راس عین سطح پر ہو اور اگر چھوڑ دینے پر یہ اپنے محور کے $\frac{3}{4}$ کے
 مساوی گہرائی تک لوٹنے سے قبل غرق ہو جائے ثابث کر دو کہ
 مانع کی کثافت : مکافی نما کی کثافت :: ۴۸ : ۷

۱۲ — دئے ہوئے زاویہ راس کا ایک ٹھوس مخروط ایک ایسے محور پر تھما
 گیا ہے جس کے گرد یہ حرکت کر سکتا ہے اور جو مخروط کے قاعدہ کے ایک قطر
 پر منطبق ہوتا ہے۔ اگر محور کو افقی طور پر یکڑا جائے اور اتنا نیچے کیا جائے کہ مخروط
 کے حجم کا $\frac{1}{8}$ نیچے دار راس کے ساتھ ایک متجانس مانع میں غرق ہو جائے

ذرائع اور مخروط کی کثافتوں میں نسبت معلوم کرو جبکہ توازن تعدیلی ہو۔
 اگر محور کو اتنا نیچے نہ کیا جائے کہ توازن تعدیلی ہو جائے اور پھر مخروط کو
 ضعیف طور پر ہٹا دیا جائے تو صغیرا بہتر از کا وقت معلوم کرو۔
 ۱۳۔ ایک چمٹا (Oblate) کردہ نابوری طرح دو سیالوں میں غرق کر دیا
 گیا ہے۔ پہلے سیال کی کثافت اضافی اوپر کے سیال کی کثافت اضافی کا دو چند ہے
 کردہ نما انصافی محور کے ساتھ تیرا ہے اور اس کا مرکز سیالوں کی مشترک سطح
 میں ہے۔

۱۴۔ درج کر کے کہ صغیر ہٹاؤ واقع ہوتا ہے اولاً انصافی سمت میں اور انصافی
 اس کے مرکز ثقل میں سے گزرنے والے افقی خط کے گرد ثابت کر، کہ صغیرا بہتر ازوں
 کے اوقات علی الترتیب ہونگے

$$۲۲ \sqrt{\frac{b^2}{c}} \quad \text{اور} \quad ۲۲ \sqrt{\frac{a^2}{c}} - \frac{a}{c} \times \frac{b}{c} \times \frac{a+b}{a-b}$$

جہاں تکوینی ناقص کے نصف محور a اور b ہیں۔

۱۴۔ ایک متجانس نفوس جسم ایک مانع میں جس کی کثافت ایسے بدلی ہے
 جیسے گہرائی کا عرق شدہ تیرا ہے اس کا مرکز ثقل گہرائی پر ہے۔ ثابت کرو
 کہ صغیرا انصافی بہتر از کا وقت $۲۲ \sqrt{\frac{a}{g}}$ ہے۔

۱۵۔ یکساں موٹائی کا ایک پتہ مستادی اساقین قائم الزاویہ مثلث کی شکل
 کا ہے۔ اس کا ایک عادیہ زاویہ سیال کی سطح کے نیچے ثابت کر دیا گیا ہے اور یہ
 اس طرح ساکن ہے کہ اس کا وہ ضلع جو غرق نہیں ہے افقی ہے۔ ثابت کرو کہ
 اس کے اپنے مستوی میں صغیرا بہتر از کا وقت ہوگا

$$۲۲ \sqrt{\frac{a}{g}}$$

جہاں ثبات کے ہر ضلع کا طول a ہے۔

۱۶۔ ایک جسم کی کوئین شععی ۵۱ ، لا $\frac{1}{3}$ کو محور a کے گرد گھمانے سے

ہوئی ہے۔ یہ جسم تیر رہا ہے اس طور پر کہ اسکے محور کا حصہ ف غرق ہے۔ اگر اس کو بقدر $(n - \frac{1}{2})$ ف کے نیچے بٹھا دیا جائے تو ثابت کر دو کہ لوٹنے پر وہ عین نکل آئے گا۔

۱۷۔ م کیت کا ایک گردش جسم مختلف مائعات میں تیر رہا ہے اگر کسی مائع میں انتصابی اہتر از کے وقت اور اس مائع کی کثافت σ میں ربط

$$\sigma = \frac{1}{f} \left(\frac{1}{n} \right)$$

پایا جائے جہاں ف ایک دئے ہوئے تفاعل کو تغیر کرتا ہے تو ثابت کر دو کہ جسم کی نصف انہاری تراش کی مسادات ہوگی

$$\frac{1}{2} (n + m) = \int \frac{f}{a} \left(\frac{1}{n} \right) \left(\frac{1}{m} \right)$$

۱۸۔ ایک یکساں فائز کی دھار پر عمود وار تراش ہر جگہ متساوی الما قین مثلث ہے جس کا نصف زاویہ راس مس 120° اور قاعدہ ب ہے۔ اسکی دھارائے کی سطح میں ثابت کر دی گئی ہے اور فائز اپنے سے دو چند کثافت نوسعی کے مائع میں تیر رہا ہے۔ پھر اس کو راس کے گرد ایک صغیر زاویہ طہ میں نیچے بٹھا دیا گیا ہے ثابت کر دو کہ اپنے ابتدائی محل پر لوٹ آنے کے لئے جو وقت درکار ہو گا وہ تقریباً یہ ہوگا

$$\frac{1}{\sigma} \left\{ \frac{1}{n} \right\} \left\{ \frac{1}{m} \right\}$$

۱۹ جا (۳) گاما تفاعل کو تغیر کرتا ہے۔ مترجم

ماہیت

کرہ ہوائی کا دباؤ

(۱۱۶)

۱۰۹۔ اگر ایک شیشہ کی نلی آئرینا تین فٹ لمبی جس کا ایک سرابند ہوا پارے سے بھری جائے اور پھر پارہ کے ایک طرف میں انکار اس طرح رکھی جائے کہ اس کا کھلا سرا ڈوبا ہوا رہے تو یہ معلوم ہوگا کہ نلی کے اندر پارہ کچھ اتر گیا ہے اور اس طرح ساکن رہے کہ اس کی اوپر کی سطح برتن کے پارہ کی سطح کے اوپر تقریباً ۲۹ انچ بلند ہے۔ یہ تجربہ جسکو پہلے طریسیلی (Torricelli) نے کیا باہر پیمائش کے استعمال کی طرف رہبری کرتا ہے جس سے کہ ہوائی کا دباؤ ناپا جاسکتا ہے۔

باریم اپنی سادہ ترین شکل میں ایک سیدھی شیشہ کی نلی میں بھرا ہوا ہے جس میں پارہ ہوتا ہے اور جس کا پچھلا سرا پارہ کے ایک چھوٹے حوض میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ سرابند ہوتا ہے اور بازو ا ب میں ہوا نہیں ہوتی۔



تجربوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سطح ج کے اوپر پارہ کی سطح ب کا ارتفاع تقریباً ۲۹ انچ ہوتا ہے اور چونکہ سطح پ پر کوئی دباؤ نہیں رہا اس لئے یہ ظاہر ہے کہ ج پر ہوا کا دباؤ وہ قوت ہے جو پارہ کے ستون پ ق کو تھامے ہوئے ہے۔

ہم نے پہلے یہ بتایا ہے کہ ساکن سیال کا دباؤ افقی مستوی پر کے تمام نقطوں

بروز ہی ہوتا ہے اس لئے ج پر کا دباؤ ق پر پارہ کے دباؤ کے مساوی ہے۔
 فرغن کر دو کہ پارہ کی کثافت نہ ہے اور ج پر کرہ ہوائی کا دباؤ π ہے تب
 $\pi = ج \times پ$

اور ارتفاع پ ق سے کرہ ہوائی کے دباؤ کی پیمائش ہوتی ہے۔
 پارہ کی کثافت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ موزوں سال
 ہے جو بار پیمائش کی بناوٹ میں استعمال ہو سکتا ہے حالانکہ کرہ ہوائی کا دباؤ
 کسی قسم کے مانع کے استعمال سے ناپا جا سکتا ہے۔ پارہ کی کثافت پانی کی
 کثافت کا تقریباً 598 گنا ہے اور اس لئے پانی کے بار پیمائش میں پانی کے
 ستون کا ارتفاع تقریباً 33 فٹ ہوگا۔

پارہ کی کثافت پیمائش کے ساتھ بدلتی ہے اور اس لئے نہ لازماً پیمائش کا
 ایک تغاغل ہے۔

تجربہ سے یہ معلوم کیا گیا ہے کہ ہسٹنری گریڈ کے اضافہ کے لئے پارہ کا پھیلاؤ
 اپنے حجم کا $\frac{1}{50}$ گنا ہوتا ہے پس اگر پیمائش ت پر کثافت π اور پیمائش π
 پر کثافت π ہو تو

$$\pi = \pi \times (1 + \frac{\pi}{50}) = \pi (1 + 0.02) = 1.02 \pi$$

$$\pi = \pi \times (1 - 0.02) = 0.98 \pi$$

$$\pi = 1.02 \pi \times (1 - 0.02) = 1.02 \pi$$

ضابطہ $\pi = 1.02 \pi \times (1 - 0.02) = 1.02 \pi$ کی مدد سے کسی مقام پر کرہ ہوائی کے دباؤ
 کی پیمائش ہو سکتی ہے بشرطیکہ عرض بلد کی تبدیلی سے ج کی قیمت میں جو
 تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ نیز یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی
 مقام پر خواہ پیمائش بدلے یا نہ بدلے یہ دباؤ بدلتا ہے اور پہاڑوں پر چڑھنے میں
 یا کسی مقام کی ہوائی سے اوپر کسی ذریعہ سے صعود کرنے میں یہ دباؤ گھٹتا ہے۔
 یہ بات سیالات کے توازن کے نظریہ کے مطابق ہے کیونکہ اوپر چڑھنے میں

بار پیمائے کے اوپر ہوا کے ستون کا ارتفاع گھٹ جاتا ہے اور اس لئے ج پر ہوا کا دباؤ جو اس کے اوپر کی ہوا کے ستون کے وزن کے مساوی ہے گھٹ جاتا ہے اور اس لئے مٹی میں پارہ نیچے اترتا ہے۔

اب اگر پارہ کے ارتفاع اور اس ارتفاع میں جس میں کہ صعود واقع ہوتا ہے ایک ربط معلوم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں دو مقامات پر بار پیمائی ستونوں کے مشاہدات سے ہم ان مقامات کے ارتفاعوں میں فرق معلوم کر سکتے ہیں۔

اس مقصد کے لئے ہم ایک ضابطہ کی تلاش کریں گے۔ لیکن پہلے ہم ان قوانین کا بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں جو مختلف تپشوں پر ہوا اور گیسوں کے دباؤں میں ضبط پیدا کرتے ہیں اور نیز ان قوانین کا جو گیسوں کے آمیزوں سے متعلق ہیں۔

۱۱۰۔ ہم نے پچھلے رسالے کے دباؤ، کمخافت اور تپش کے درمیان اس رشتہ

$$d = m \cdot t \cdot (1 + \alpha \cdot t)$$

کو پہلے بیان کیا ہے۔ یہ تجربہ کے دو حسب ذیل نتیجوں سے اخذ کیا گیا ہے۔
(۱) اگر تپش مستقل رہے تو ہوا کا دباؤ اس کے حجم کے بالعکس بدلتا ہے۔
(کلیہ بائل)

(۲) اگر دباؤ مستقل رہے تو ہوا کی کسی کثیت کی تپش میں اسے سنٹی گریڈ کا اضافہ اس میں اتنا پھیلاؤ پیدا کرتا ہے جو اس کے صفر درجہ سنٹی گریڈ پر کے حجم کا ۳۶۹۵۔۵ گنا ہوتا ہے۔
(ڈالٹن اور گے لوک کا کلیہ)

اس طرح اگر ہوا کا دباؤ اور کمخافت ثابت ہو جبکہ تپش صفر ہے تو

$$d = m \cdot t$$

اب فرض کرو کہ تپش کو ت تک بڑھایا جاتا ہے جبکہ دباؤ وہی رہتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے فرض کرو کہ ہوا ایک اسطوانہ میں ہے جس میں ٹھیک بیٹھنے والا قابل حرکت ایک فشارہ لگا ہوا ہے۔ اور اس فشارہ پر ایک مستقل قوت لگی ہوئی ہے

اس طرح ہوا کی پچکدار قوت میں اعناؤ فشارہ کو باہر ڈھکیلنے کا اثر رکھتا یہاں تک کہ کثافت کی تخفیف سے اور اس لئے متناظر دباؤ کی تخفیف سے توازن برقرار ہو جائے۔ تب کلیہ دوم سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{ث} = (۱ + ع ت)$$

جہاں ت نئی کثافت ہے اور $ع = ۰.۳۶۶۵$

$$د = م \text{ ث} (۱ + ع ت)$$

اگر ت پشرا پہ اسی سیال کا دباؤ د اور کثافت ث ہو تو

$$د = م \text{ ث} (۱ + ع ت)$$

$$\text{اور } \frac{د}{ث} = \frac{م (۱ + ع ت)}{۱ + ع ت}$$

تمام اقسام کی کیسوں کے لئے مقدار عد تقریباً وہی ہوتی ہے، لیکن م کی قیمت مختلف کیسوں کے لئے مختلف ہوگی۔ اس لئے ہر صورت میں تجربہ کی مدد سے اس کو معلوم کرنا چاہیئے۔

۱۱۱۔ تپش مطلق۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ کیس کی تپش کو اتنا گھٹا دیا گیا ہے کہ اس کا دباؤ حجم کی تبدیلی کے بغیر معدوم ہو جاتا ہے تو ہم تپش کے مطلق صفر پر پہنچتے ہیں اور تپش مطلق اس نقطہ سے باقی جاتی ہے۔

ہاں کہ تب اس تپش کو سنٹی گریڈ تپش یا پر بغیر کرتا ہے میں مساوات $۱ + ع ت = ۰$ سے حاصل ہوتا ہے

$$ت = - \frac{۱}{ع} = - ۲۷۳$$

فارن ہایٹ کے برابر میں مطلق صفر - ۲۷۳ ہوگا۔

$$\text{مساواتوں } د = م \text{ ث} (۱ + ع ت)$$

$$۰ = م \text{ ث} (۱ + ع ت)$$

(۱۱۹)

سے حاصل ہوتا ہے $d = m \cdot \theta \cdot r$ (ت - ت)

$m \cdot \theta \cdot r$

اگر تپش مطلق ہو۔

چونکہ θ مستقل ہے اسلئے $d \propto r$ / ت بھی مستقل ہے اور یہ کلیہ مطلق
پیمانہ میں، دباؤ حجم اور تپش کے ربط کو ظاہر کرتا ہے۔
۱۱۲۔ آمیزے۔ مختلف چکدار سیالوں کے آمیزے کا دباؤ۔

دو مختلف گیسوں پر غور کرو جو دو ظرفوں میں ہیں جن کے حجم V اور P ہیں۔
اور فرض کرو کہ ان کے دباؤ اور تپشیں d اور t دونوں کے لئے ایک ہی ہیں۔
فرض کرو کہ ان دو ظرفوں میں الحاق پیدا کیا گیا یا دونوں گیسوں کو ایک
بند ظرف میں جس کا حجم $V + V$ ہے متقل کر دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ
ان میں کوئی کیمیائی عمل وقوع پذیر نہیں ہوتا یہ معلوم ہوا ہے کہ دونوں گیسوں علیحدہ
نہیں رہتیں بلکہ ایک دوسرے میں نفوذ کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے
پوری طرح لمباتی ہیں اور یہ کہ جب توازن قائم ہو جاتا ہے تو آمیزے کے دباؤ اور
تپش دونوں وہی ہوتے ہیں جو پہلے تھے۔

اس اہم تجربہ کی واقعیت سے ہم حسب ذیل مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں۔

اگر دو گیسوں کو جن کی تپش وہی ہے ایک ظرف میں جس کا حجم V ہے ملا دیا
جائے۔ اور اگر ان گیسوں کے دباؤ d اور t ہوں جبکہ ان کو فرداً فرداً حجم
 V والے ظرف میں داخل کیا جائے تو آمیزے کا دباؤ $d + d$ رہے گا۔

فرض کرو کہ دونوں گیسوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہے اور اس گیس
کے حجم میں جس کا دباؤ d ہے تپش کی تبدیلی کے بغیر اتنا تغیر کر دیا گیا ہے
کہ اس کا دباؤ d ہو جاتا ہے۔ تب کلیہ بائیل کی رو سے اس کا حجم $V + V$ ہوگا۔
اب فرض کرو کہ ان دو گیسوں کو ایک ظرف میں جس کا حجم

$$V + V \text{ یا } \frac{d}{d} \cdot V$$

ہے ایک دوسرے سے ملا دیا گیا ہے تب آمیزے کا دباؤ وہی د ہوگا اور
تپش غیر متغیر رہے گی۔ اب اگر آمیزے کو حجم ح میں دما دیا جائے تو اس کا دباؤ
کلیہ بادل کے روئے د + د ہوگا۔

یہ نتیجہ صریحاً گیسوں کے کسی تعداد کے آمیزے پر صادق آتا ہے۔

۱۱۳۔ دو مختلف گیسوں کے حجم ح ح ہیں اور ان میں کے دباؤ علی الترتیب
د + د ہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے اس طرح ملا دیا جائے کہ ان کے آمیزے
کا حجم ع ہو جائے۔ آمیزے کا دباؤ معلوم کرنا مطلوب ہے۔

دونوں گیسوں کے دباؤ جبکہ ان کو حجم ع میں محدود کیا جائے علی الترتیب

$$\frac{د}{۶}، \frac{د}{۶}$$

اور اس لئے دفعہ مابقی سے آمیزے کا دباؤ

$$\frac{د}{۶} + \frac{د}{۶} = \frac{د}{۳}$$

ہے اور اگر یہ دباؤ د سے تعبیر کیا جائے تو

$$د = ۶ = د + د$$

لانے کے بغیر اگر گیسوں کی مطلق تپشیں ت اور ت ہوں اور ملائے کے بعد
تپش مطلق ت ہو جائے اور حجم ع تو گیسوں کے دباؤ علی الترتیب ہونگے

$$\frac{د}{ت}، \frac{د}{ت}$$

پس آمیزے کا دباؤ د ان دو مقداروں کا حاصل جمع ہوگا اور اس لئے

$$\frac{د}{ت} + \frac{د}{ت} = \frac{د}{ت}$$

گیسوں کے کسی تعداد کے آمیزے کی صورت میں

$$\frac{H}{T} = \frac{P}{T}$$

۱۱۴۔ دفات ماسبق کے نتیجے اور کھینے بخارات کی صورت میں اُسی طرح صادق آتے ہیں۔ بخارات اور گیسوں کے جیلی خصوصیات میں بالفاظ ان کے کیمیائی خصوصیات کے صرف یہ فرق ہے کہ قبل الذکر آسانی کے ساتھ، تپش کی تخفیف سے، مانع میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور موزن الذکر کی تکلیف صرف بہت بڑے دباؤ یا انتہائی ٹھنڈک یا دونوں کے ایک ساتھ استعمال سے ہو سکتی ہے۔

۱۱۵۔ بخار۔ اگر ایسی فضا میں جس میں خشک ہوا ہے پانی داخل کیا جائے تو بھاپ فوراً بن جاتی ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ بھاپ کی کثافت اور دباؤ صرف تپش پر منحصر ہوتے ہیں اور ہوا کی کثافت پر منحصر نہیں ہوتے۔ پس اگر ہوا کو خلیج بھی کر دیا جائے تو بھاپ کی کثافت اور دباؤ وہی برقرار رہیں گے۔ اگر تپش میں اضافہ کیا جائے یا فضا میں وسعت پیدا کی جائے تو بھاپ کی مزید مقدار تیار ہو جائے گی۔ لیکن اگر تپش کو گھٹا دیا جائے یا فضا کو کم کر دیا جائے تو بھاپ کا کچھ حصہ کثافت ہو جائیگا۔

(۱۲۱)

۱۱۶۔ پروفیسر فیاریٹے نے کاربانک ایسڈ گیس اور دوسری گیسوں کو جن کی تکلیف کے لئے بہت بڑے دباؤ کی ضرورت تھی کثافت کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اس کے تجربہ کے نتائج سے یہ خیال پیدا ہوا کہ بہت ممکن ہے کہ تمام گیسیں، اُنات کے بخارات ہوں۔ اس کی بہت کچھ تاہم مشہور ہے میں ہوئی جبکہ ایم۔ پی کیٹ (M. Pictet) نے اُس سال کے اداکل میں ۳۰ کرہ ہوائی کے دباؤ کے زیر عمل اسکیجن کو مانع میں تبدیل کیا اور اسی سال کے ماہ دسمبر میں ایم کیللیٹ (M. Cailliet) نے نیتروجن اور ہوا کو مانع میں تبدیل کیا۔ ۱۸۸۳ء میں موب لوسکی (Wroblewski) نے ہیڈروجن کو مانع بنا دیا اور ۱۸۹۹ء میں ڈوار (Dewar) نے ٹھوس ہیڈروجن حاصل کی اور اب ہوا اور دوسری مختلف گیسوں مانع کی شکل میں تجارتی اشتہار ہیں۔

فضائیں جب تک پانی کی کافی مقدار باقی رہے جس سے بھاپ بن سکتی ہے فضا بھاپ سے ہمیشہ سیر شدہ ہوگی یعنی فضا میں اتنی بھاپ ہوگی جتنی کہ اس پیش پر اس فضا میں رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر تیش کو اتنا بڑا دیا جائے کہ تمام پانی بھاپ بن جائے تو اس پیش اور اس سے اعلیٰ پیشوں کے لئے بھاپ کا دباؤ اتنی کھلیہ کی پابندی کرے گا جس کھلیہ کی ہوا کا دباؤ پابندی کرتا ہے۔

ہر صورت میں خواہ فضا سیر شدہ ہو یا نہ ہو اگر ہوا کا دباؤ ۵ اور بھاپ کا ۵ ہو تو آمیزے کا دباؤ ۵ + ۵ = ۱۰ ہوگا۔

۱۱۴۔ کہ ہوائی میں ہمیشہ آبی بخار موجود ہوتا ہے جس کی مقدار مختلف اوقات پر مختلف ہوتی ہے کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ اگر کہ ہوائی کی فضا کا کوئی حصہ بخار سے سیر کر دیا جائے یعنی اگر بخار کی کثافت اس پیش پر جتنی بڑی ہو سکتی ہے اتنی ہو جائے تو پیش کو گھٹانے سے بخار کے کچھ حصہ کی تکلیف ہو جائے گی لیکن اگر اس پیش پر بخار کی کثافت کثافت اعظم نہ ہو تو کوئی تکلیف وقوع پذیر نہ ہوگی جب تک کہ پیش کو اس نقطہ کے نیچے تک نہ گھٹا دیا جائے جس پر فضا میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔

شبنم کی پیدائش۔ اگر کسی سطح کو جو کہ ہوائی سے تماس رکھتی ہے اتنا سرد کر دیا جائے کہ اس کی پیش اس کے نزدیک کی فضا کے سیر شدہ ہونے کے نقطہ سے نیچے ہو جائے تو آبی بخار کی تکلیف رونما ہوگی اور کثافت بخار سطح پر شبنم کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اس لئے زمین پر شبنم کی پیدائش اسکی سطح کے ٹھنڈے ہوئے پر منحصر ہے اور یہ عملی طور پر زیادہ سرعت سے اس وقت ہوتا ہے جبکہ آسان بربادل نہ ہوں اور اس لئے اشعاع کے ذریعہ حرارت کا تعامل زیادہ نقصان نہ ہوتا ہو۔

نقطہ شبنم وہ پیش ہے جس پر شبنم ابتداً پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اس کا تعین بالراست آسان ہے سے کرنا پڑتا ہے۔

(۱۲۲) مختلف پیشوں پر جو بخار کو سیراب کرنے والی کثافتیں ہیں ان کے جواب میں بخار کا دباؤ بھی تجربہ سے معلوم کر لینا چاہیئے اور اگر ایسا کیا جائے تو نقطہ شبنم

کے مشاہدے سے کہ ہوائی میں بخار کا دباؤ فوراً معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ اگر نقطہ نمک
تسا اور اس کے متناظر معلومہ دباؤ ڈ ہو تو کسی تپش ت پر جو ت کے اوپر ہے
دباؤ د سادات

$$\frac{D + 1}{D} = \frac{D + 1}{D}$$

سے معلوم ہو جائیگا۔

۱۱۷۔ کیس کی تپش اور دباؤ پر پچکاؤ یا بے ط کا اثر۔

تجربہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر ہوا کی کسی مقدار کو جو ایک ایسے ظرف
کے اندر بند ہے جس میں حرارت داخل نہیں ہو سکتی پچکا یا جائے تو اس کی
تپش بڑھ جاتی ہے اور یہ کہ اگر ہوا کی کسی مقدار کو خواہ وہ کسی قسم کے ظرف میں
بند ہو یکا یک پچکا دیا جائے اس طرح پر کہ حرارت کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے تو اس
صورت میں بھی تپش اسی طرح بڑھ جاتی ہے۔

۱۱۸۔ استعداد حرارت۔ کسی جسم کی استعداد حرارت، حرارت کی وہ مقدار
ہے جو اس کی تپش کو ایک درجہ بڑا دینے میں مطلوب ہوتی ہے۔

حرارت کی اکائی جو عملاً استعمال ہوتی ہے حرارت کی وہ مقدار ہے جو پانی
کی اکائی کیت کی تپش میں ایک درجہ کا اضافہ پیدا کر دے جبکہ پانی کی تپش
سنتی گریڈ اور ۳۲ سنتی گریڈ کے درمیان ہو۔

حرارت نوعی۔ کسی جسم کی حرارت نوعی اس کی کیت کی ایک اکائی کی
استعداد حرارت ہے یا بالفاظ دیگر حرارت نوعی وہ نسبت ہے جو حرارت کی اُس
مقدار کو جو جسم کی تپش کو اُڑ یا دینے میں مطلوب ہوتی ہے حرارت کی اُس
مقدار کے ساتھ ہو جو مساوی وزن کے پانی کی تپش کو ایک درجہ بڑا دینے میں
درکار ہوتی ہے۔

اگر حرارت کی مقدار فرق کیت کی ایک اکائی میں فروت تپش کی تبدیلی پیدا
کر دے تو حرارت نوعی کا ناپ فرق فروت ہوگا۔

گیسوں میں ۱۰ صورتوں پر غور کرنا ضروری ہے (۱) جبکہ دباؤ مستقل رہے،
اور گیس کو پھینک دیا جائے (۲) جبکہ حجم مستقل رہے۔
ان دو صورتوں میں حرارت یعنی کوہجم و موزن ج د اور ج ح سے تعبیر
کریں گے۔

یہ دیکھ لینا آسان ہے کہ ج ح سے بڑا ہے کیونکہ پہلی صورت میں
حرارت جو گیس کو دہی گئی ہے گیس کے پھیلائے میں بھی کام کرتی ہے اور اس کی
قبض کے بڑھانے میں بھی۔

۱۱۹ — حرنا گذر پھیلاؤ — گیس کی دہی ہوئی مقدار کے پچکاؤ یا بسط کا اثر دریا
(۱۱۳) کرے میں یہ ظاہر ہے کہ حرارت مطلوبہ ج د اور د کا تفاعل ہوگی اور چونکہ
ج د د د د اس سے کسی پھیلاؤ کے لئے حرارت مطلوبہ ج د اور د کا تفاعل
ہوگی۔ اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

$$\text{فرق} = \frac{\text{جفت ق}}{\text{جفت د}} + \frac{\text{جفت ح}}{\text{جفت د}}$$

اور بالعموم د = م د ع ت یا اگر گیس کی دہی ہوئی مقدار کی کمیت کو کمیت
کی اکائی مانا جائے تو

$$\text{ج د} - \text{م د ع ت} = \text{ل ت}$$

اگر دباؤ مستقل ہو تو فرق = ج د ح د

$$\frac{\text{جفت ق}}{\text{جفت ح}} = \frac{\text{ج د ح د}}{\text{ج د ح د}}$$

$$\text{اور} \quad \frac{\text{جفت ق}}{\text{جفت ح}} = \frac{\text{ج د ح د}}{\text{ل د}}$$

اگر حجم مستقل ہو تو

$$\frac{\text{جفت ق}}{\text{جفت د}} = \frac{\text{ج د ح د}}{\text{ل د}}$$

$$\text{اور } \frac{\text{ج ح}}{\text{ج د}} = \frac{\text{ج ح}}{\text{ج د}}$$

اس لئے اگر کوئی حرارت نہ پہنچائی جائے یعنی اگر فرق = ۰ تو

$$\frac{\text{ج ح}}{\text{ج د}} = \frac{\text{ج ح}}{\text{ج د}} = ۰$$

$$\therefore \frac{\text{ج ح}}{\text{ج د}} \times \text{ج د} = \text{ج ح} \text{ مستقل ہے}$$

اگر ج ح کو ج د کے ساتھ جو نسبت ہے اُس کو مستقل مانیں۔

اگر د ح تغیر یا کر د ح ہو جائیں تو حاصل ہوگا

$$\frac{\text{د ح}}{\text{ج ح}} = \left(\frac{\text{ج ح}}{\text{ج ح}} \right)$$

جہاں ج ح = ج د / ج ح اور نیز حاصل ہوگا

$$\frac{\text{ت ح}}{\text{د ح}} = \frac{\text{د ح}}{\text{ج ح}} = \left(\frac{\text{ج ح}}{\text{ج ح}} \right)$$

مساوات د ح ج = مستقل، حرکیات میں حرنا گد ر خطوط کی مساوات ہے اور یہ گیس کی کسی کمیت کے حجم اور اس کے دباؤ کے درمیانی ربط کو تعبیر کرتی ہے جبکہ حجم میں تغیر کے وقت نہ کوئی حرارت ضائع ہو اور نہ پہنچائی جائے۔ ہوا کی کسی کمیت کے یکایک پھیلاؤ یا بچکاؤ کی صورت میں بھی مساوات بالادست رہتی ہے کیونکہ حرارت کے قابل قدر نقصان یا بیرونی مآخذوں سے حرارت کے اکتساب کے لئے کافی وقت نہیں ملتا۔ یہ معلوم ہوگا کہ ربط بالا آواز کے نظریہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

۱۲۰۔ ج، د - ج ح مستقل۔ اصول توانائی کی مدد سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ (۱۲۴)

کسی گیس کے لئے ج، د اور ج ح کا فرق مستقل ہوتا ہے۔

حرکیات کے ایک کلیہ کی رو سے کسی نظام میں حرارت کے

استعمال سے جو ہوائی اٹار لی جاتی ہے وہ دروازہ کی مقدار کے مناسب ہوتی ہیں
پس اگرچہ اسے کسی اکائی کا حلی معادل غ ہو اور لیس کی اکائی کیست میں
حرارت کا اندازہ نہ ہو۔ اسے اس کے برابر لیا جاتا ہے۔

غ × ح = فرد

لیکن یہ توانائی کچھ بدلتے ہوئے حجم پر پیش لے بڑھے میں صرف ہوتی ہے
اور کچھ اس حجم کے پھیلائے میں۔

∴ غ × ج = فرد = د فرح + غ × ج = فرد

اور د فرح = ل ت

∴ غ (ج - ج) = ل

جس سے ظاہر ہے کہ ج - ج مستقل ہے۔
ہم اس مساوات سے دفعہ (۱۱۹) کا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔
کیونکہ اگر کوئی حرارت نہ پہنچائی جائے تو کوئی توانائی داخل نہیں ہوگی۔

اور ∴ د فرح + غ × ج = فرد =

لیکن ح د = ل ت = غ (ج - ج) ت

∴ د فرح + ح فرد = غ (ج - ج) فرد

اور د فرح (ج - ج) + ج (د فرح + ح فرد) =

جس سے ج، د فرح + ج × ح فرد = پہلے کی طرح۔

۱۲۱۔ گیس کے حران گذر بچکاؤ میں جو کام ہوتا ہے اس کا معلوم کرنا۔
دفعہ ۴۱ میں ہم نے یہ مان لیا تھا کہ تپش مستقل ہے یا با الفاظ دیگر یہ کہ بچکاؤ

لی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ کمیتوں کی یہ نسبت اُس نسبت سے کسی قدر کم ہے جو ایک کو دس لاکھ کے ساتھ لیتے۔

متجانس کرہ ہوائی کی بلندی

۱۳۳۔ اگر ہوا کے پورے ستون کی ہر جگہ وہی کثافت ہوتی جو زمین کی سطح پر ہے تو اس کے ارتفاع کو l اور بارہ کے ارتفاع کو f سے نمبر کرنے سے حاصل ہوگا $l = 7f$

بہاں l ہوا کی کثافت ہے۔ یہ معلوم کیا گیا ہے کہ نسبت $l : f$ تقریباً ۱۰۶۲ : ۱ ہے اور اس لئے گرتے کی طرح f کی قیمت ۲۹۵۹ استعمال کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ l ۵ میل سے کسی قدر کم ہے۔

کرہ ہوائی کے ارتفاع کی ضروری حد

ظاہر ہے کہ زمین کی سطح سے کچھ فاصلہ پر اس کی کثافت نہ ہوتی ہے اور اس لئے ہوا کی کثافت اور دباؤ ٹھٹھٹ سا ہے۔ اس امر پر نتیجہً حقیقت سے بہت بعید ہے۔ بہر کیفیت ارتفاع کی حد اس بات کو پیش نظر رکھ کر معلوم کیا جاسکتی ہے کہ زمین کے

۱۴۔ جس طرح کہ ساہو زمین کی اوسط کثافت معلوم کرنے کا سوال اکتش

Adm P 70 Ex 1993

ریبحث رہا ہے۔ جے۔ ایچ۔ پلوٹنگ کے مصوں میں زمین کی اوسط کثافت کی قیمت ۵۴۳۴ و د حاصل کی گئی ہے۔ سی۔ وی۔ بائیس

(C Brown) میں اور سی۔ بران (Phil Trans 1895)

Denkschrift d Math natur Klasse d Wiener Akad, 1896

میں اس کو ۵۴۵۵۲۰ تاتے ہیں۔ نیز دیکھو جے۔ ایچ۔ پلوٹنگ کا مصون

Gravitation constant and mean density of the Earth, Encycl Brit,

(eleventh edition)

مرکز سے ایک خاص فاصلے پر اس کی کشش ہوا کے ذروں کو دائری مدار میں رکھنے کے
ما قابل ہوگی۔ لیکن ذروں کا ان مداروں کو مرہم کرنا ضروری ہے تاکہ اضافی توازن
کی حالت قائم رہ سکے۔

خط استوا پر حملہ سہار، $\frac{ج}{۲۸۹}$ کے مساوی ہے جہاں سہ زمین کی زاوی
رفنا رہے اور اس لئے یہ ارتفاع پر وہ قوت جو ہوا کے ذرہ کیست ک کو
اپنے دائری حرکت میں رکھنے کے لئے درکار ہو ک ج (ر + ی) / ۲۸۹ کے
مساوی ہوگی۔ اسی ارتفاع پر زمین کی کشش

$$\frac{ک ج ر}{۲(ی + ر)} =$$

اور اس لئے انتہائی ارتفاع مساوات دہل سے حاصل ہوگا

$$\frac{ی + ر}{۲۸۹} = \frac{ر}{۲(ی + ر)}$$

$$یا \quad ی = ر \{ ۱ - \frac{۲}{۲۸۹} \}$$

یعنی ی، ۵ ر سے کس قدر بڑا ہے۔

ممکن ہے کہ یہ ارتفاع اصلی ارتفاع سے بہت زیادہ ہو کیونکہ غباروں میں
تجربات کی بنا پر معلوم ہوا ہے کہ اوپر چڑھتے وقت ہوا کی تیش بہت زیادہ سرعت
کے ساتھ گھٹتی جاتی ہے اور اس لئے یہ بالکل ممکن ہے کہ ۵ ر سے کم ارتفاع
پر ہوا بے سرعتی کی وجہ سے مانع میں تبدیل ہو گئی ہو اور اس لئے اسکی بیرونی سطح
ایسی صورت میں اُسی قسم کی ہوگی جس قسم کی غیر پچکدہ سیالوں کی سطحیں ہوا کرتی ہیں۔

بارہ پیمائ کے ذریعہ ارتفاعوں کا معلوم کرنا

۱۲۳۔ بارہ پیمائ کے سیابی ستون کے ارتفاع اور سطح سمندر کے اوپر اس تار کے
ارتفاع کے درمیان ربط قائم کرتے وقت ہمیں کرہ ہوائی کی تیش کے متعلق ایک
مفروضہ قائم کر لینا چاہیئے۔

اول فرض کرو کہ تپش مستقل ہے اور y ارتفاع پر دباؤ اور کثافت d ، z سے تعبیر ہوتے ہیں اور y ارتفاع پر ان کی قیمتیں z ، z ہیں۔ تب توازن کی مساواتیں ہوں گی

$$\text{فرد} = - \text{ج} \text{ ش فری}$$

$$\text{اور} \quad \frac{z}{\text{ش}} = \frac{z}{\text{ش}} = \text{م}$$

$$\text{م لوک د} = \text{م} - \text{ج ی}$$

$$\text{لوک} \frac{z}{\text{م}} = \frac{z}{\text{م}} (\text{ج ی} - \text{ی})$$

(۱۲۷) نیز اگر z ، z سے دو مقامات پر کے ماریاؤں کے ارتفاع تعبیر ہوں اور ان مقامات کے ارتفاع y اور y ہوں تو

$$\text{ج ی} - \text{ی} = \frac{z}{\text{م}} \text{ لوک} \frac{z}{\text{م}} = \frac{z}{\text{م}} \text{ لوک} \frac{z}{\text{م}} \quad (۱)$$

اگر تپش مستقل نہ ہو تو فرض کرو کہ ان دو مقامات پر تپش z ، z ہیں۔ اب اگر ان دو مقامات کی بلندیوں کے درمیان، اوسط یکساں تپش z = $\frac{1}{2}(z + z)$ کا معدوم اختیار کیا جائے تو d اور z میں ربط $d = \text{م} \text{ ش} \times (۱ + \text{ع} \text{ ت})$ حاصل ہوگا اور مساوات (۱) ہو جائیگی

$$\text{ج ی} - \text{ی} = \frac{z}{\text{م}} \left\{ ۱ + \frac{۱}{۲} \text{ع} \text{ ت} + \text{ع} \text{ ت} \right\} \text{ لوک} \frac{z}{\text{م}} \quad (۲)$$

اور اگر دونوں مقامات پر ماریاؤں کے اندرونی یاہ کی تپشوں کے فرق کو بھی ملحوظ رکھا جائے تو دفعہ (۱۰۹) سے

$$\frac{z}{\text{م}} = \frac{z}{\text{م}} \frac{(۱ - \text{ط} \text{ ت})}{(۱ - \text{ط} \text{ ت})} \quad \text{جہاں} \text{ ط} = ۱۸.۱۸ \dots$$

اور مساوات (۲) ہو جائیگی

$$ج - ی = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{1}{2} (ت + ت') \right\} \text{ لوک } \frac{ت (1 - ط ت)}{ت' (1 - ط ت')} \quad (۳۱ \dots)$$

۱۲۵۔ لیکن اگر سطح زمین کے اوپر ارتفاع کافی زیادہ ہوں تو یہ ضروری ہے کہ زمین کے مرکز سے مختلف فاصلوں پر جاذبہ ارض کے تغیر کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس لئے ہم زیادہ صحیح ضابطہ کی تلاش کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ سطح بحر پر جاذبہ ارض کا ناپ ج ہے اور زمین کا نصف قطر ہے تو ارتفاع ی پر تجاذبی قوت

$$ج \frac{r}{(r + ی)^2}$$

سے نیلی جائیگی۔ اور توازن کی مساوات ہوگی

$$فرد = ج \frac{r}{(r + ی)^2} \text{ ث فری}$$

نیز ہم جانتے ہیں کہ $م \text{ ث } (1 + ع ت)$ اور یہاں یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ درحقیقت ہوا کے دباؤ اور آبی بخار (جو ہوا میں شامل ہے) کے دباؤ کا مجموعہ ہے۔

پس اگر آبی بخار کی کثافت $ث$ ہو تو ذیل کی شکل کی دو مقداروں کا مجموعہ ہوگا

$$م \text{ ث } (1 + ع ت) + م' \text{ ث } (1 + ع ت')$$

اور اس لئے مساوات با ۱ میں مقدار $م \text{ ث}$ درحقیقت دو مقداروں $م \text{ ث}$ ، (۱۲۸)

$م' \text{ ث}$ کا مجموعہ ہے جو علی الترتیب ہوا اور آبی بخار کے جواب میں ہیں۔

اوپر کی دو مساواتوں سے ہمیں حاصل ہوگا

$$فرد = \frac{1}{1 + ع ت} \frac{ج \text{ ر فری}}{r}$$

یہ پوری صحت کے لحاظ سے یہ بہتر ہوگا کہ $م \text{ ث}$ کی بجائے $م \text{ ث}$ لکھا جائے جہاں $ث$ حالى ہوا کی کثافت ہے۔

۱۲۶۔ گزشتہ تحقیقات میں ہم نے سطح زمین کے مختلف حصوں پر جاذبہ ارض کے تعب کا کوئی لحاظ نہیں کیا ہے۔ زمین کی لہر نمائی شکل اور اپنے محور کے گرد اس کی گردش کی وجہ سے جاذبہ ارض کی قوت کی قیمت مختلف عرض بلد پر مختلف ہوتی ہے اور زمین کے چھلکے کی ساحت کے باعث زمین اور سمندر پر اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے اور نیز یہ معلوم کیا گیا ہے کہ بحر سی چھوٹے جزیروں پر براعظموں کی بہ نسبت اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔

(۱۲۹)

ج کی اوسط قیمت کے لئے ایک جدید ضابطہ

$$ج = ۹۸۵۰۴۶ + (۰.۵۳۰۲ \times ف - ۰.۰۰۰۰۰۰ \times جب ۲ ف) \text{ سمر/ثانیہ}$$

یا $ج = ۹۸۰۵۹۳۲ - (۰.۲۶۴۴ \times ف + ۰.۰۰۰۰۰۰ \times جب ۲ ف) \text{ سمر/ثانیہ}$
 حاصل ہوا ہے جہاں ف عرض بلد ہے اور خط استوا اور عرض بلد ۴۵ پر ج کی قیمتیں بالترتیب ۹۸۰۵۹۳۲ اور ۹۸۵۰۴۶ ہیں۔

اگر ہم $ج = ۹۸۰۵۹ - (۰.۲۶۴۴ \times ف + ۰.۰۰۰۰۰۰ \times جب ۲ ف)$ لیں تو ی کے لئے جو آخری جملہ ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہو جائیگا

$$م = (۱ + عت) (۱ + ی/ر) \left\{ \frac{۱}{۱ + ی/ر} + ۲ \frac{۱}{۱ + ی/ر} \right\} = ۹۸۰۵۹ - (۰.۲۶۴۴ \times ف + ۰.۰۰۰۰۰۰ \times جب ۲ ف)$$

- سطر (۲ - ۳) { ... (۳) }

ان مضابطوں میں جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے م کی قیمت ہوا کے آبی بخار کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے لیکن اگر ہوا کو خشک فرض کیا جائے تو ضابطہ ہوگا

$م = م ث (۱ + عت)$ اب اگر ہوا: سنتی گریڈ پیش پر ہو اور اس کا دباؤ ۷۶۰ ملی میٹر پارہ کے مساوی ہو تو $م ث = ۷۶۰$ ج ث،

Handbuch der Physik. A Winkelmann, Leipzig, 1908, p 479

Figure of the Earth by A R Clerk and F R یزد کیو مصوم

Helmert in the Encycl Brit Eleventh Edition

جہان نہ پارہ کی کثافت ہے۔

اور $\frac{1}{\rho} = 1.042$ لینے سے

$$\rho = 1.042 \times 10^4 \text{ ج ملی میٹر}$$

$$= 1.042 \times 10^4 \text{ ج میٹر}$$

اس سے $\rho = 980.56$ میٹر ہو جائے گا۔ لیکن اس میں

آبی بخار کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور ρ کی ایسی قیمت جو مشاہدہ کردہ حقایق کے زیادہ مطابق نتیجہ پیدا کرتی ہے 963.62 ج ہے جس سے حاصل ہوگا

$$\rho = \frac{1.042}{980.56} \text{ میٹر}$$

ضابطہ (۲) سے ρ معلوم کر کے کیلئے اول اس کی تقریبی قیمت مساوات

کے بائیں جانب میں ρ کو نظر انداز کر کے معلوم کرنی چاہیئے۔ پھر اگر اس تقریبی

قیمت کو اس مساوات کے بائیں جانب میں استعمال کیا جائے تو ρ کی زیادہ صحیح قیمت حاصل ہوگی۔ اس عمل کو منہ ط ضرورت پھر دہرایا جاسکتا ہے۔

۱۲۷۔ دوسری تصحیحات بھی ضروری ہیں جب کہ عملی طور پر باریمائے ذریعہ ارتعاعوں کا ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا مطلوب ہو۔ مثلاً ρ کی قیمت اس وجہ سے بھی بدلتی ہے کہ دی وئی تپش اور دباؤ پر آبی بخار کی کثافت خشک ہوا کی کثافت سے جو انہی حالات کے زیر اثر ہو کم ہوا کرتی ہے اور آبی بخار کا تناسب خشک ہوا کے ساتھ دو مقامات پر مختلف ہو سکتا ہے۔ (۱۳)

اور بالعموم مختلف ہوتا ہے۔

علاوہ بریں اگر اوپر والا مقام زمین کی سطح مرتفع کے کسی حصہ پر ہو تو زمین کے اس حصہ کی کشش کو بھی محسوب کرنا چاہیئے جو اس کی اوسط سطح کے اوپر ہے۔ اس کشش کا اثر یہ ہوگا کہ مقدار ρ $(r + y)$ میں ہتدر

۳ ج ی / ۲ ر کے اضافہ ہو جائے گا اس طرح ی ارتفاع پر جاذبہ کی قوت
کناپ

$$\frac{3Jy}{2r} + \frac{Jr}{2(r+y)}$$

ہوگا۔ (Routh, Analytical Statics II P 12) یا تقریباً ج { ۱ - \frac{5y}{2r} }

اس صورت میں د کے لئے مساوات حاصل ہوگی

$$فرد = ج - \left\{ 1 - \frac{5y}{2r} \right\} ف حری$$

اور اس لئے اگر نیچلا مقام سطح بحر پر ہو تو

$$م (۱ + عدت) لوک \frac{د}{د} = ج ی (۱ - \frac{5y}{2r})$$

$$یا ی = م (۱ + عدت) \frac{ج}{ج} \left(1 + \frac{5y}{2r} \right) لوک \frac{د}{د}$$

دفعہ (۱۲۵) کی مساوات (۲) کی بجائے ہیں مساوات

$$\frac{د}{د} = \left(1 + \frac{5y}{2r} \right) \left(\frac{۱ - ط ق}{۱ - ط ق} \right)$$

حاصل ہوگی۔ اور ی کے حاصل کرنے کے لئے آخری مساوات دفعہ (۱۲۶)

کی مساوات (۲) میں ۱ + ج ی کی بجائے ۱ + \frac{5y}{2r} درج کرنے سے

حاصل ہوگی۔ یہ معلوم رہے کہ لوک (۱ + \frac{5y}{2r}) تقریباً ۲ لوک (۱ + \frac{5y}{2r}) کے مساوی ہے۔

یہ قابل توجہ ہے کہ اگر ی اور ر کو میٹروں میں نایا جائے تو ج ی

$$= ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ی تقریباً$$

اس طرح بحال کو نظر انداز کرنے سے جو غلطی واقع ہوگی وہ عام طور پر چھوٹی ہوگی۔
 خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا ضابطہ سب سے پہلے لاپلاس نے بیان کیا ہے۔
 ۱۲۸ — یہ بھی معلوم رہے کہ بار پیمائے کے اندر کے پارہ کی تیش کو ہم نے وہی
 مانا ہے جو اس کے گرد کی ہوا کی ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں مثلاً جبکہ ہوائی جہاز
 میں مسابحات لئے جائیں تو یہ ممکن ہے کہ بار پیمائے ہی مقام پر اتنے عرصہ
 تک نہ رہے کہ اس کی تیش اس کے گرد کی ہوائی تیش کے مساوی ہو جائے
 پارہ کی تیش بہر حال تیش پیمائے کے ذریعہ دریافت ہو سکتی ہے جب اس کے جوہر کو
 بار پیمائے کے حوض میں رکھا جائے۔ اس طرح سے پارہ کی جو تیشیں حاصل ہوگی انکو
 وضع (۱۲۵) کی مسادات (۲) میں استعمال کرنا ہوگا۔

۱۲۸-۱- حملی توازن — متبادل مفروضہ تیش کے حملی توازن کا ہے۔
 لارڈ کیلون نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے ”جب سیال کے تمام حصے آپس میں
 آزادانہ تبادلہ کرتے ہوں اور اشتعاع و ایصال کا اثر قابل قدر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں
 کہ سیال کی تیش حملی توازن کی حالت میں ہے“ اس حالت میں یہ بات مستنبط
 ہوتی ہے کہ اگر مختلف ہموار سطحوں پر کی ہوا کی مساوی کمیتوں کو حرارت کے کسب

لے Mecanique Celeste, Livre X, Ch IV — لاپلاس کا ضابطہ حود وضع (۱۲۶)
 کے ضابطہ (۲) میں صرف عددی سرود میں استناد رکھتا ہے اس موضوع کے متعلق اساسی ضابطہ
 قرار دیا جاتا ہے۔ سر جان مور کی کتاب
 Meteorology, 1910

کے صفحہ ۱۴۹ میں اسکو درج کیا گیا ہے بار پیمائی تصحیحات کے استقامی ضابطہ کے لئے
 طبعیات کی کسی جدید کتاب کا مطالعہ کرو مثلاً (Chwolson) کی کتاب

(Lehrbuch der Physik, 1902) جلد ۳ صفحہ ۳۴۳ اور جلد اول عددی
 کے لئے دیکھو) Observer's Handbook (حسکو) Meteorological

Office ۱۹۰۸ میں شائع کیا۔

collected papers V. III P. 255

یازبان کے بصر آپس میں تبدیل کرویا جائے تو وہ صرف دباؤ کثافت اور تپش کا تبادلہ کریں گے اور بحقیقت مجموعی کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ اس لئے اس صورت میں مذکورہ بالا مساواتیں ہو جائیں گی

$$\text{فرد} = - \text{ج} \text{ ث فری} \quad (۱)$$

$$\text{جہاں} \quad \text{م} = \text{م ت ج} \text{ اور } \text{د} = \text{ل ث ت} \\ \text{ی ارتفاع پر مطلق تپش کو تباہی کرتا ہے۔}$$

$$\text{م ج ث ج} = \text{فری} = - \text{ج فری}$$

$$\text{اور تکمیل سے} \quad \frac{\text{م}}{\text{ج}} = \frac{\text{ل}}{\text{ث}} = \text{م} - \text{ج ی}$$

$$\text{جہاں} \quad \frac{\text{م}}{\text{ج}} = \frac{\text{ل}}{\text{ث}} = \text{م} - \text{ج ی}$$

$$\text{جہاں} \quad \frac{\text{م}}{\text{ج}} = \frac{\text{ل}}{\text{ث}} = \text{م} - \text{ج ی}$$

جہاں سطح بحر پر مطلق تپش کو تباہی کرتا ہے۔

$$\text{جہاں} \quad \frac{\text{م}}{\text{ج}} = \frac{\text{ل}}{\text{ث}} = \text{م} - \text{ج ی}$$

اور اگر متجانس کرہ کا ارتفاع h ہو تو

$$\text{ل ث ت} = \text{ج} = \text{ج ث ہ}$$

$$\text{جہاں} \quad \frac{\text{م}}{\text{ج}} = \frac{\text{ل}}{\text{ث}} = \text{م} - \text{ج ی}$$

اگر مساوات (۱) میں ج کی بجائے $\text{ج} \text{ ر} / (ر + ی)$ رکھا جائے تو گردش کی طرح تکمیل اور اندراج سے ہمیں حاصل ہوگا

$$\text{جہاں} \quad \frac{\text{م}}{\text{ج}} = \frac{\text{ل}}{\text{ث}} = \text{م} - \text{ج ی}$$

(۱۲۲)

۱۲۹ — ذیل کی دو مثالوں سے باب ہذا کے اصولوں کی توضیح ہوتی ہے۔
 (۱) ایک بے وزن فشارہ ایک انتصابی اسطوانہ میں ٹھیک بیٹھتا ہے۔ اسطوانہ کا قاعدہ بند ہے اور اس میں ہوا بھری ہوئی ہے۔ فشارہ ابتداً اسطوانہ کی چوٹی یا سرے پر ہے۔ اگر فشارہ کے سرے پر آہستہ آہستہ پانی ڈالا جائے تو معلوم کرو کہ باہر بہہ جانے کے پیشتر کتنا پانی ڈالا جاسکتا ہے فرض کرو کہ اسطوانہ کا ارتفاع h ہے اور فشارہ جس گہرائی تک نیچے جاتا ہے وہ y ہے۔ تب توازن کے محل میں اسطوانہ کی اندرونی ہوا کا دباؤ $\pi + \rho g y$ ہوگا۔ جہاں کہ ہوائی کا دباؤ π اور پانی کی کثافت ρ ہے۔ لیکن، یہ دباؤ $\pi = \rho h$ ہے۔

$$\pi + \rho g y = \rho h$$

فرض کرو کہ آبی بار پیماس کا ارتفاع g ہے۔

$$\pi = \rho g$$

$$g = (h - y) \rho$$

اور $y = 0$ یا $g = h$

اس لئے جب تک کہ اسطوانہ کا ارتفاع g سے بڑا نہ ہو پانی داخل نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بالفرض اگر فشارہ کو نیچے دبا کر بھی اس پر پانی ڈالا جائے تو نیچے کی ہوا کا دباؤ فشارہ کو اٹھا دیگا۔

منفی حل کو، جبکہ $g > h$ ، یوں خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ ایک مختلف سوال کا حل ہے جس سے یہی جہری مساوات قائم ہوتی ہے۔ فرض کرو کہ اسطوانہ فشارہ کے اوپر بڑھایا گیا ہے اور فشارہ کو ایک ایسی قوت سے قدری فاصلہ کے اوپر اٹھانا مقصود ہے جو اس پانی کے وزن کے مساوی ہے جو اس اسطوانہ میں y ارتفاع تک بھرا جاسکتا ہے۔

اس سے مساوات پیدا ہوتی ہے

$$\frac{1}{\pi} = \frac{\pi - \text{ج ث ی}}{\pi}$$

ی = ج - گ - و

(۲) ایک غبارہ کی حرکت معلوم کرنا مطلوب ہے یہ فرض کر کے کہ کسی محل میں اس کی ہٹائی ہوئی ہوا کی کیت متجانس ہے اور اثنائے حرکت میں تپش مستقل رہتی ہے۔

فرض کرو کہ غبارہ کی کیت کے مرکز کا ارتفاع ی اور اس کی کیت ک ہے۔ اس کا حجم ج اور ی ارتفاع پر ہوا کی کثافت ث ہے۔ تب وہ مساوات جس کے حرکت کا تعین ہوتا ہے یہ ہوگی

$$\text{ک} = \frac{\text{فری}}{\text{ث}} = \frac{\text{ج ث ی}}{\text{ج ث ح}} - \text{ک ج}$$

$$\text{ج} = \frac{\text{ر}}{\pi (1 + \text{ر})} \quad \text{جہاں}$$

لیکن مساوات فرد = ج ث فری اور د = م ث سے ہیں حاصل ہوگا

$$\frac{\text{ج فری}}{\pi (1 + \text{ر})} = \text{د}$$

اور اس لئے

$$\text{ک} = \frac{\text{فری}}{\text{ث}} = \frac{\pi \text{ ج ر}}{\pi (1 + \text{ر})} - \text{ک ج} = \frac{\text{ج ر}}{\pi (1 + \text{ر})} - \text{ک ج}$$

(۱۳۲) جس میں ک = ث ح رکھنے سے اور ۲ فری سے ضرب دیکر تکمیل کرنے سے

$$\text{ث} = \left(\frac{\text{فری}}{\text{ث}} \right) = \text{ب} - \frac{\pi \text{ ج ر}}{\pi (1 + \text{ر})} + \frac{\text{ج ر}}{\pi (1 + \text{ر})}$$

ابتدائی شرط سے ۰ = ب - ۲ - ۲ - ۲ ج ر

$$\therefore \text{ث} = \left(\frac{\text{فری}}{\text{ث}} \right) = \frac{\pi \text{ ج ر}}{\pi (1 + \text{ر})} - ۱ - \frac{\text{ج ر}}{\pi (1 + \text{ر})}$$

غبار کا زیادہ سے زیادہ ارتقاع

فرمی

قزنت

رکھنے سے حاصل ہوگا۔ اور اگر غبارہ کی اوسط کثافت اور ہوا کی اوسط کثافت میں بہت بھڑا فرق ہو تو محض چھوٹا ہوگا اور ایک تقریبی قیاس معلوم کیا جاسکتی ہے

امثلہ

(۱) - اگر ہوا کی کثافت اضافی ۰.۱۳ گرام اور بارہ کی ۹.۵۱۳ ہو اور اگر بارہ کا ارتقاع ۳۰ انچ ہو تو ثابت کرو کہ مستقل خم کی قیمت تقریباً ۸۳۶۳۰۰ ہوگی۔ بلکہ طول اور وقت کی اکائیاں فٹ اور ثانیہ ہیں۔

(۲) - ۵.۵۵ سنی گریڈ پر خشک ہوا کے ایک لٹر کا وزن ۱.۲۳ گرام ہے جبکہ بارہ کا ارتقاع ۶۰ ملی میٹر ہے۔ اس تپش پر آبی بخار کا دباؤ بارہ کے ۱۲.۵ ملی میٹر ستون کے مساوی ہے اور اس کی کثافت کو اسی تپش اور دباؤ پر کی خشک ہوا کی کثافت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ۵ کو ۸ کے ساتھ ہے۔ ایک لٹر ہوا کا وزن معلوم کرو جب اس کو مذکورہ بالا تپش اور دباؤ پر آبی بخار سے سیر شدہ کر دیا جائے۔

(۳) - ایک ناقص بارہ پیمائے ارتقاع ۲۹.۲ اور ۲۰ انچ میں جبکہ مجموعہ آگے ارتقاع ۲۹.۴ اور ۳۰.۵ ہوتے ہیں۔ ناقص بارہ پیمائے کی ملی کا وہ طول معلوم کرو جس کو اس کے اندر کی ہوا ۳۰ انچ دباؤ کے زیر اثر برقرار کر دے گی۔

(۴) - کرہ ہوائی کی ایک کعبہ گڑھ کو ایک ظرف میں جبکہ حجم ایک کعبہ فٹ ہے پچکا یا گیا ہے۔ بارہ پیمائے ارتقاع ۳۰ ہے۔ جمع شدہ توانائی کا عددی نایب تقریباً معلوم کرو جبکہ بارہ کی کثافت اضافی بلحاظ پانی کے ۹۶.۵۱۳ ہے اور پانی کے ایک کعبہ انچ کا وزن ۷.۷۲۵ گریں ہے۔

(۵) - ایک بالکل صحیح سیانی بارہ پیمائے ارتقاع ۷ اور ۷.۵ میں جبکہ

ایک ناقص بار پیمائے کے متناظر ارتفاع جس میں کچھ ہوا ہے اور ب ہیں —
ثابت کرو کہ اگر ناقص بار پیمائے کا ارتفاع ج ہو تو

$$(ع - و) (ب - و) (ب - ب)$$

$$(و - ج) (ع - و) - (ب - ج) (ب - ب)$$

کی صحت درکار ہوگی۔

(۶) — اگر تپش پیمائے ایک مانع میں جس کی تپش معلوم کرنا مطلوب ہے
جزء ڈبہ دیا جائے اور اس سے تپش کا اظہار ہو جبکہ ہوا کی تپش تہ ہو اور
تپش پیمائے کا غیر عرض شدہ حصہ م درجے ہو تو ثابت کرو کہ

$$م (ت - ت)$$

$$۹۸۴ + ت - م$$

کی صحت درکار ہوگی اگر تپش پیمائے کے اندرونی پارہ کا پھیلاؤ حرارت کے ا کے
نئے ہو۔ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہر حصہ میں پارہ کی تپش اس حصہ کو
گھیرنے والی شے کی تپش کے مساوی ہے۔

(۷) ایک بند انتہائی اسطوانہ کے اندر جبکہ تراش کا رقبہ ایک ہے و دروں کا
ایک فشار ہے۔ بعداً فشار اسطوانہ کے وسط میں ہے اور اس کے نیچے اور
اوپر کی فضا سیر شدہ ہوا سے بھری ہوئی ہے۔ اگر فشار کو اپنے حال پر چھوڑ دیا
جائے تو وہ ابتدائی ارتفاع کا نصف نیچے اتر جاتا ہے۔ ثابت کرو کہ سیر شدہ
بخار کا تناؤ ۳ - ۴ ہوگا جہاں کرہ ہوائی کا دباؤ ۳ ہے۔ اس عمل کے
اجدا اور اختتام پر تپش مری فرض کر لی گئی ہے۔

(۸) انتہائی باریک نلی بنائی گئی ہے جس کے اوپر کا حصہ سرے پر
بند کر دیا گیا ہے۔ اس حصہ کی تراش کا رقبہ ۱ ہے۔ بار پیمائے کا درمیانی حصہ
ایک جوہ ہے جس کا حجم ب ہے۔ بار پیمائے کے غلطے حصہ کی تراش کا رقبہ
ج ہے اور اس کا پیندا کھلا ہوا ہے۔ جوہ تو یارہ سے بھرا ہوا ہے لیکن
نلی کے غلطے اور اوپر کے حصوں میں پارہ جزء بھرا ہوا ہے۔ یارہ کو نیچے
سے باہر نکل پڑنے سے ایک چلتی کے ذریعہ روکا گیا ہے جو آزادانہ نیچے

(۱۳۴)

اوپر حرکت کر سکتی ہے اور جس پر ہوا کا دباؤ عمل کر رہا ہے۔ نلی کے بالائی حصہ میں حلا ہے۔ سیلابی ستون کے پچھلے اور اوپر کے سروں کے محل میں تغیر معلوم کرو جبکہ کرہ ہوائی کے دباؤ میں دیا ہوا تغیر واقع ہو۔

اگر آلہ کے اندرونی کل پارہ کا حجم ۲ ج ۲ ہو جہاں بار پیا کا ارتفاع ۲ ہے تو یہ بھی ثابت کر دو کہ اوپر کی سطح پینل کے تغیر سے غیر متاثر رہے گی۔

(۹) ایک اسطوانی ظرف غواص پانی میں ڈوبا ہے یہاں تک کہ اس کے کچھ حصہ ح میں ہو باقی رہتی ہے۔ اس محل میں ہوا کی کچھ مقدار اس میں داخل کی جاتی ہے جس کا حجم کرہ ہوائی کے برابر ۲ ح ہے۔ معلوم کر دو کہ غواص کو کتنی گہرائی تک اور پیچھے ڈوبنا چاہیے کہ اس کے اندر کی کل ہوا کا حجم اتنا ہی ہو جائے جتنا کہ محل اول میں تھا۔

نیز اس کے لئے شرط دریافت کر دو کہ محل اول میں جب ہوا زور سے داخل کی جاتی ہے تو ہوا غواص کے نیچے سے پھکر پھکنے نہ پائے۔

(۱۰) ایک ظرف ایسی سطح کی شکل کا ہے جسکی تکوین مکانی کی ایک توس کو جو اس پر ختم ہو جاتی ہے اپنے محور کے گرد کھانے سے ہوئی ہے۔ اس ظرف کو نیچے دار منہ کے ساتھ پارہ کے ایک برتن میں ڈوبایا گیا ہے۔ ثابت کر دو کہ ظرف کے اندر کی ہوا کا دباؤ اس فاصلے کے مربع کے تناسب معکوس میں ہوگا جو ظرف کے راس اور اندرونی پارہ کی سطح کے درمیان ہے۔ نیز یہ فرض کر کے کہ ظرف کے محور کے طول کو بار پیا کے ارتفاع کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ۴۵ کو ۶۴ کے ساتھ ہے ظرف کے اندرونی پارہ کی سطح کی گہرائی معلوم کر دو جبکہ ظرف عین پوری طرح غرق ہو۔

(۱۱) ایک بے وزن فشارہ ایک انقباضی اسطوانہ میں ٹھیک بیٹھا ہے۔ اسطوانہ کا قاعدہ بند ہے اور اس میں ہوا بھری ہوئی ہے۔ ابتداً فشارہ اسطوانہ کے سرے پر ہے۔ اگر باقی فشارہ کے سرے پر آہستہ آہستہ ڈالا جائے تو ثابت کر دو کہ پانی کی اوپر کی سطح زیر ترین ہوگی جب کہ پانی کی گہرائی ۴ (ف) ہو۔ ف ہو جہاں آبی بار پیا کا ارتفاع ف ہے اور اسطوانہ کا ارتفاع ۱۔

(۱۲) باریہا کا ارتفاع ۸۸، ۲۹، ۱۰۰ ہے اور تیش بہا نقطہ شبنم پر ہے۔ باریہا اور پانی کے ایک پیالہ کو قابض میں رکھ دیا گیا ہے جس سے ہوا خارج کر دی گئی ہے۔ اب باریہا کا ارتفاع ۳۶، ۵۰، ۱۰۰ ہو جاتا ہے۔ کرہ ہوائی کی ہوا کا دیا ہوا حجم جتنی جگہ گھیرتا ہے اُس کو معلوم کرو اگر اس سے اس کے دباؤ اور تیش کی تبدیلی کے بغیر اس کا بخار خارج کر دیا جائے۔

(۱۳) ایک سیسہ نلی ایک سرے پر دوسرے پر کھلی، ایک محور کے گرد جو اس کو زاویہ قائمہ پر ملتا ہے مستقل زاویہ رفتار سے گھوم رہی ہے۔ جاذبہ ارض کے عمل کو نظر انداز کر کے نلی کے اندر ہوائی کی کثافت کسی نقطہ پر معلوم کرو۔ (۱۴) یکساں سوراخ کی ایک خمیدہ نلی کے باڈ ایک دوسرے کے علی التوا ٹم ہیں۔ یہ نلی اپنے انتصابی بازو کے گرد جس کا سر پانی میں غرق ہے مستقل زاویہ رفتار سے گھوم رہی ہے۔ ثابت کرو کہ انتصابی بازو میں جس ارتفاع تک پانی چڑھیکا وہ ہوگا

$$\left(1 - \frac{2}{3} \right) \frac{\pi}{2}$$

جہاں افقی بازو کا طول ۱، کرہ ہوائی کا دباؤ ۳، پانی کی کثافت ۴ ہے اور ۵ وہ نسبت ہے جو کرہ ہوائی کے دباؤ کو اس کی کثافت کے ساتھ ہے۔ (۱۵) نصف قطر کی یکساں تیلی دائری نلی جس میں ہوا ہے ایک محور کے گرد راوی رفتار سے گھوم رہی ہے یہ محور نلی کے مستوی میں واقع ہے اور اس کا فاصلہ نلی کے مرکز سے ج ہے ہوا کے وزن کو نظر انداز کر کے کسی نقطہ پر کا دباؤ معلوم کرو۔ اگر ج ۱ سے کم ہو اور اعظم اور اقل دباؤ د اور ۲ ہوں تو ثابت کرو کہ

$$\frac{2}{3} = \frac{2}{3} (1 + \frac{2}{3})$$

(۱۶) اگر دو مغارات کے باریہائی ارتفاعوں کے لوکار توں کے فرق کو سے ضرب دیا جائے تو ثابت کرو کہ اس سے نچینا وہ فرق حاصل ہوگا

جوان مقامات کے ارتفاعوں میں ہے جبکہ ان ارتفاعوں کو کنڈیہل (Cones) میں ناپا جائے۔

(۱۷) — ح اور ح' حجم کے دو غیر موصول طرفت ہوا سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں ہوا کے دباؤ d_1 اور d_2 ہیں اور پٹنیں t_1 اور t_2 لگ ہوئی ہیں ان کیتوں کو ح حجم کے ایک غیر موصول برتن میں ملا دیا جائے تو آئینہ کا دباؤ معلوم کرو۔

(۱۸) — دو چونے جن میں ہوا ہے شیشے کی یکساں سوراخ دار افقی نلی سے ملا دئے گئے ہیں اور اس نلی کے اندر مانع کا ایک بلب، ہوا کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے جو فوں کو علی الترتیب t_1 درجے اور t_2 درجے تک گرا کر بلب کے مقام میں ہٹاؤ پیدا کیا گیا ہے اگر ہر چونے کی قیش کو بقدر t_1 درجے کے گھٹا دیا جائے تو ثابت کرو کہ بلب میں مزید ہٹاؤ پیدا ہوگا جو ابستائی ہٹاؤ کے ساتھ

$$۲ \text{ ع } ۲ : ۲ + \text{ ع } (ت + ت - ۲ \text{ ع})$$

کی نسبت رکھیں جہاں پھیلاؤ کی مندرجہ ہے۔

(۱۹) — ایک لچکدار کردی لفافہ کے گرد ہوا ہے جو بخار سے سیر شدہ ہے۔ اگر اس کی اندرونی ہوا کا دباؤ d_1 کرہ ہوائی کے دباؤ کا دوچند ہوتا تو اس کا نصف قطر اپنے اصلی نصف قطر کا دوچند ہو جاتا اور اگر اس کے اندر کرہ ہوائی کے دباؤ پر جتنی ہوا ساکتی ہے اس کے d_2 گنا ہوا ہوتی تو اس کا نصف قطر اپنے اصلی نصف قطر کا d_2 چند ہو جاتا۔ یہ فرض کر کے کہ کسی نقطہ پر کا تناؤ ایسے بدلتا ہے جیسے سطح کا پھیلاؤ ثابت کر دو کہ ہوا کے دباؤ کا $\frac{1}{3}$ حصہ بخار کے دباؤ کی وجہ سے ہے جو اس میں شامل ہے۔

(۲۰) — ایک مخروطی خول کا زاویہ θ راس θ اور ارتفاع F ہے اس میں اس کے وزن کا دوچند پانی ساکتا ہے اس کو اونڈھا کر کے (یعنی جبکہ راس اوپر کی طرف ہو) انحصاری محور کے ساتھ پانی میں ڈبوایا گیا ہے اور پھر پانی کو زاویہ θ راس θ (ج θ / ۳) سے گھمایا گیا ہے۔ گھمانے کی

وجہ سے مخروط پانی میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اس کا اس پانی کی سطح میں ہوتا ہے۔ ثابت کر دو کہ آبی بار پیمائے کے ارتفاع کو مخروط کے ارتفاع سے وہی نسبت ہے جو $\frac{3}{2}$ کے سے ہے۔

(۲۱) ایک چھوٹے غبارہ میں ہوا ہے اور ۱۰۰ گرین سیسہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اس کے غلاف کی وہی کثافت ہے جو پانی کی ہے۔ سیسہ سمیت اس کو پانی میں ڈبوایا گیا ہے۔ اگر پانی کی تپش اور کرہ ہوائی کے دباؤ پر غبارہ میں ایک کعب ایچ ہوا سا کعب تو کتنی گہرائی تک اس کو ڈبوایا پڑے گا کہ یہ غیر قائم توازن کے محل میں آجائے جبکہ آبی بار پیمائے کا ارتفاع ۳۳ فٹ ہو اور یہ دیا گیا ہو کہ

ہوا کی کثافت : پانی کی کثافت : سیسہ کی کثافت = ۱ : ۸۰۰ : ۹۱۳۰
(۲۲) ایک یکساں ٹھوس مکائی نما سے اس کا نصف حجم علیحدہ کر کے ایک پیالہ بٹ یا گیا ہے اس طور پر کہ اس کا اندرونی احاطہ ایک مساوی ہم محور مکائی نما ہے جس کا اس قبل ذکر مکائی نما کے ماسکے پر ہے۔ پیالہ سیال میں اوپر وار رہا ہے اور انتصابی محور کے ساتھ ڈبوایا گیا ہے اور نیچے سے اتنی گیس خلا میں داخل کی گئی ہے کہ اس سیال کی سطح میں اُٹھ آتا ہے اب اگر پیالے کے اندرونی احاطہ کی نصف گہرائی تک پانی ہو تو ثابت کر دو کہ سیال کی کثافت مکانی نما کی کثافت کا چوتھ ہے۔

(۲۳) اگر ہوا کا دباؤ ایسے بدلے جیسے اس کی کثافت کی $(1 + \frac{1}{m})$ میں قوت تو تپش اور جاذبہ الارض کے تغیرات کو نظر انداز کر کے ثابت کر دو کہ کرہ ہوائی کی بلندی متجانس کرہ ہوائی کی بلندی کا $(m + 1)$ گنا ہوگی۔

(۲۴) وزن کا فشار ایک انتصابی اسطوانہ میں ساکن ہے۔ اسطوانہ کی عمودی تراش ک سے اور فشار ہوا کے ستون کی گہرائی h سے متساوی ہے۔ فشار کے ڈبڈبے پر ایک انتصابی دھکرتی پڑتا ہے جس سے فشار بقدر f فاصلے کے نیچے چلا جاتا ہے۔ ثابت کر دو کہ

$$= \frac{ج ق}{و ۲} + \left\{ (۱ - \frac{ف}{و}) \right\}$$

جہاں کرہ ہوائی کا دباؤ π ہے۔

۲۵۔ ایک کردی غبارے کا نصف قطر رہے اور اس میں گیس کی کچھ مقدار ہے جسکی کثافت سطح زمین پر کے کرہ ہوائی کے دباؤ برابر نہ ہے۔ اگر غبارہ متاؤ ف کو عین سنبھالنے کے قابل ہو تو ثابت کر دو کہ یہ پھٹ جائے گا اگر اس کی رفتار اتنی ہو جائے جتنی

$$\frac{و}{۲} = \frac{۲}{ر} + م لوک (۱ - \frac{۲}{د ر} \frac{ت}{ر})$$

سے حاصل ہوتی ہے۔ جہاں غبارہ کی حرکت کی مزاحمت نظر انداز کر دی گئی ہے۔

۲۶۔ یہ فرض کر کے کہ کرہ ہوائی پوری فضا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی قبض ہر جگہ یکساں ہے ثابت کر دو کہ مریخ کی سطح پر کے کرہ ہوائی کی کثافت کو زمین کی سطح پر کے کرہ ہوائی کی کثافت کے ساتھ تقریباً $۱۰^{-۶}$ کی نسبت ہوگی۔ یہ دیا گیا ہے کہ مریخ کی کثافت دہی ہے جو زمین کی ہے اور اس کا نصف قطر زمین کے نصف قطر کا نصف ہے اور زمین پر کرہ ہوائی کا دباؤ ۱۰۳۳ گرام فی مربع سمر ہے اور ہوا کے ایک کعب سمکبیت کا وزن ۱۲۴۰۰ گرام ہے۔ زمین کا نصف قطر ۶۳۶۹۸۰۰ میٹر ہے۔

۲۷۔ اگر بار پیمائی درجہ بندی کے بعد ہوا کا ایک خیف حجم بارہ کے اوپر کے خلا میں داخل کیا جائے اور قبض غیر متغیر رہے تو ثابت کر دو کہ کسی مشاہدہ شدہ ارتفاع ف کے لئے

$$\frac{ج}{م} \times \frac{ف}{(۱ - (ف - ف))}$$

کی تصحیح کرنی پڑے گی۔ جہاں نلی کی تراش کا رقبہ $م$ ، برتن کی تراش کا رقبہ $ج$ اور $ج$ اس غلاہری خلا کا طول ہے جو ناقص بار پیمائے کے دوسرے مشاہدہ شدہ

ارتفاع ف کے جواب میں ہے۔
 ۲۸ — اگر کرہ ہوائی کی تپش بلندی کے ساتھ یکساں طور پر گھٹتی فرض کی جائے
 تو ثابت کرو کہ سطح بحر سے کسی مقام کا ارتفاع می

$$= \{ 1 - \left(\frac{f}{F} \right)^2 \}$$

جہاں اس مقام پر اور سطح بحر پر بار پیا کے ارتفاع بالترتیب ف، ف ہیں اور
 ا، م مستقل ہیں۔

۲۹ — حملی توازن کی حالت میں ثابت کرو کہ کرہ ہوائی کی تپش اوپر واریکساں
 شرح سے گھٹتی جائے گی۔ اس شرح کو سنٹی گریڈ کے درجوں میں فی ۱۰۰ میٹر معلوم
 کرو جبکہ حسب ذیل باتیں معلوم ہوں:-

بار پیا کا ارتفاع = ۷۶۵۰
 تپش (مطلق) = ۲۷۲ سنٹی گریڈ

ہوا کی کثافت = ۵۰۰۱۲۹

پارہ کی کثافت = ۱۳۶۹۰

نوعی حرارتوں کی نسبت (جہ) = ۵۴۲

(س-گ، ف نظام میں)۔

باب ششم لامن سطحوں کا تناؤ

۱۳۰۔ لامن سطحوں (Flexible surfaces) کے توازن کے عام مسئلہ پر لگراج نے (Mecanique Analytique Tom I) میں اور نیز زیادہ تفصیل سے پائسن نے (Memories de l'Institut, 1812) میں بحث کی ہے۔ ہم اس باب میں خاص قسم کے سوالات پر غور کریں گے جو عام صورت سے پیدا ہوتے ہیں یعنی ایسے سوالات پر جو لامن سطحوں پر سیالات کے عمل سے متعلق ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ سیال کا دباؤ کسی سطح پر جو سیال کے ساتھ تماس رکھتی ہو اُس سطح کی عمادی سمت میں عمل کرتا ہے اس لئے فی الحقیقت ہمیں ایسی لامن سطحوں کے توازن پر غور کرنا ہوگا جو عمادی دباؤں اور ان کو محدود کرنے والے خطوط پر کے تناؤں کے زیر عمل ساکن ہوں۔

عمومیت کی خاطر اصطلاح 'لامن سطح' ایسی چیزوں کو تعبیر کرتی ہے جیسے کپڑا اور پتلا کاغذ جن کو موڑنے میں کوئی قابل متدرج مزاحمت محسوس نہیں ہوتی اور جو موڑنے یا مڑوڑنے کے بعد اپنی ابتدائی شکل پر لوٹنے کا میلان نہیں رکھتیں۔ کمال طور پر لامن سطحوں کو خواہ وہ امتداد پذیر (Extensible) ہوں یا امتداد ناپذیر بے چلک خیال کیا جائے گا۔

دفعات ذیل میں ہم یہ فرض کریں گے کہ لامن سطح کے کسی دو حصوں کے درمیان جو زور عمل کرتا ہے اُس کی سمت سطح کے بالکلہ تماس ہے۔

تناؤ کا ناپ


ایک ملائم اور بے لچک سطح پر عوز کرو جو تناؤ کی حالت میں ہے خواہ یہ سطح استداد پذیر ہو یا امتداد ناپذیر اور فرض کرو کہ نقطہ ن میں سے گزرنے والے کسی نادیمستی سے جوتراش حاصل ہوتی ہے اس کی ایک چوٹی ٹوس ق ن ق ہے۔ اب اگر خط ق ق سے محدود ہونے والی سطح کے حصوں کے درمیان حاصل عمل ت ق ق ہو جو ماسی مستوی میں ق ق پر عمود ہے تو نقطہ ن پر کے تناؤ کا ناپ ت ہوگا۔ یہ الفاظ دیگر نقطہ ن پر کے تناؤ کی شرح ت سے یا وہ قوت جو اس شے کی ایسی تراش پر عمل کرے گی جس کا طول اکائی ہے اور جو ہر جگہ ایسی حالت تناؤ میں ہے جیسی کہ ن پر کی سطح۔

عام طور پر سطح کے ان حصوں کے درمیان جن کو ق ق علیحدہ کرتا ہے جو زور عمل کرے گا وہ ق ق کے عمود وار نہیں ہوگا اور اس لئے وہ تناؤ ت ق ق اور قوت ت ق ق کا حاصل ہوگا جہاں قوت ت ق ق مخنی ق ق کے ماس کی سمت میں عمل کرتی ہے اور یہ اسی قسم کی ایک مقدار ہے جیسی کہ ت ہے اور اس کی پیمائش بھی اسی طرح ہوتی ہے۔

۱۳۱۔ ایک ظرف قائم مستدیر اسطوانے کی شکل کا ہے جس کی مخنی سطح ملائم اور جس کا محور انحصاری ہے۔ اس ظرف میں سیال ہے۔ کسی نقطہ پر کے تناؤ اور دباؤ کے درمیان ربط معلوم کرنا مطلوب ہے۔ (۱۳۸)

فرض کرو کہ سطح کا ایک چھوٹا حصہ ن ق ہے جو دو مستویوں کے درمیان جو عمود پر عمود وار ہیں اور اسطوانے کے دو کونوں کے درمیان محدود ہے۔

فرض کرو کہ ن ق کے کسی نقطہ پر افقی تناؤ ت اور دباؤ د ہے۔ تب سطح کا عنصر ن ق ذیل کی قوتوں کے



زیر عمل متوازن ہوگا۔ - مادی دباؤ $\times$ N $\times$ N $\times$ Q ، ماسی قوتیں
ت $\times$ N $\times$ N $\times$ Q ، اور N $\times$ Q اور N $\times$ Q پر کے انتصابی تناؤ
اگر انتصابی سمت میں کوئی تناؤ عمل کریں۔
پس قوتوں کو عماد و ع کی سمتیں تحلیل کرنے سے جو نقطہ وسطی ع تک
کمینچا گیا ہے

$$Q \times N \times N \times Q = 2 \times N \times N \times Q \text{ جب } (N \times Q)$$

$$2 \times N \times N \times Q = 2 \times N \times N \times Q \text{ ، اگر نصف قطر ہو}$$

یا $Q = 2 \times N \times N \times Q$ - اگر کسی شکل کی اسطوانی ملائم سطح میں سیال ساخن ہو تو اسطوانے کے
محور کے علی القوام تراش کے کسی نقطہ پر کا تناؤ ہی ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ سطح کا ایک عنصر $N \times Q$ ہے (شکل ذہ ۱۳۱) فرض کرو کہ
پر کا مرکز انحناء Δ پر کا تناؤ T ، کب پرکات $+ M$ اور نقاط A اور
ب پر کے ماسوں کا درمیانی زاویہ M نہ ہے۔

نیز فرض کرو کہ $N \times Q$ کے سیالی دباؤ کی سمت کا میلان Δ کے ساتھ
 M سا ہے جسکو Δ ، Q کے درمیان واقع ہونا چاہیئے۔
تب A پر کے ماس کی سمت میں قوتوں کو تحلیل کرنے سے

$$(T + M) \times Q = 2 \times N \times N \times Q \text{ جب } M \text{ سا}$$

$$= 2 \times M \times Q \text{ جب } M \text{ سا}$$

اگر Δ پر کا نصف قطر انحناء رہو۔

پس بالآخر جب کہ M Q معدوم ہو جائے

$$Q = \frac{2}{r}$$

اور چونکہ تراش کے ہر نقطہ پر یہ بات صادق آتی ہے اس لئے نتیجہ نکلتا ہے کہ ت

مستقل ہے۔

سمت و ع میں قوتوں کو تحلیل کرنے سے گزشتہ دفعہ کی طرح ربط

(۱۲۹)


حاصل ہوگا جو سطح کے کسی نقطہ پر کون کے علی التوایم تناؤ، دباؤ اور انحناء کے درمیان ربط ہے۔

ت کو مستقل لینے سے مساوات در = ت سے کسی نقطہ پر کا دباؤ معلوم ہو جائیگا اگر سطح دی ہوئی ہو۔

اگر سیال پر عمل کرنے والی قوتیں دی ہوئی ہوں اور اس لئے د، سیال کے اندر کسی نقطہ کے محدود کا معلومہ تفاعل ہو تو ایسی مساوات سے مائع سطح کی اختیار کردہ شکل کا تعین ہو جاتا ہے۔

ثوبیہ اور لدنیہ

۱۳۳— ثوبیہ (Lintearia) وہ سختی ہے جو مہین کپڑے کے ایک مستقل ٹکڑے پر پانی ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے جبکہ اس کے سرے افقی طور پر تھامے گئے ہوں اور پانی بانڈوں پر سے نکلنے نہ پائے۔



اس طرح اگر کپڑے یا جہلی کے کنارے ا، ب، ع د ایک صندوق کے کناروں پر مثبت کر دئے جائیں اور اگر اضلاع ا د، ب ع صندوق پر ٹھیک بیٹھتے ہوں اور کپڑے پر پانی ڈال دیا جائے اور پھر ا د یا ب ع کے متوازی، ایک انتہائی مستوی

سے کپڑے کو تراشا جائے تو یہ عمودی تراش ثوبیہ ہوگی۔

دباؤ جو کچھ عماد کی سمت میں عمل کرتا ہے اس لئے کپڑے کا تناؤ مستقل ہے اور اس لئے اگر نقطہ ن پر کا نصف قطر انحناء ہو اور ب ع پانی کی سطح ہو

(دوسری شکل دیکھو) تو

ج ث × ن ل × ر مستقل ہے۔

تتبعاً کو ج ث م سے تعبیر کرنے سے اور ن م = م لینے سے ہمیں حاصل ہوگا۔

$$\frac{م}{ر} = \frac{ن}{ل} = \frac{ث}{م}$$

پس

$$\frac{م}{ر} = \frac{فر}{فر} = \frac{فر}{رجب ف}$$

اور $\frac{م}{ر} = \frac{م}{رجب ف} = \frac{م}{رجب ف}$ اگر ر ب پر کا انصراف عد ہو،

$$\frac{م}{رجب ف} = \frac{فر}{فر} = \frac{م}{رجب ف}$$

جو توبہ کی ذاتی مساوات ہے۔

(۱۴۰) اب اس میں جب $\frac{م}{ر} = \frac{م}{رجب ف}$ اور جب $\frac{م}{ر} = \frac{م}{رجب ف}$ کا جن ۶ رکھنے سے حاصل ہوگا

$$\frac{م}{رجب ف} = \frac{فر}{رجب ف} = \frac{م}{رجب ف}$$

$$\frac{م}{رجب ف} = \frac{م}{رجب ف} = \frac{م}{رجب ف}$$

لے ترقیم :-


$$S_n u = جن ۶$$

$$C_n u = صن ۶$$

$$D_n u = طن ۶$$

$$\begin{aligned} & \text{م} = \text{فرء} \\ & \text{س} = \text{م} + \text{مستقل} \\ & \text{یا اگر ہم س کو زیر ترین نقطہ سے ناپیں تو} \\ & \text{س} = \text{م} + \text{.....} \quad (1) \\ & \text{تب گہرائی ن ل = ف - ۱ - \frac{۲}{۳}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{م} = \sqrt{\text{ماجم ذہ} - \text{جم ع}} \\ & \text{۲ م ک ما ۱ - جن ۲} \\ & \text{یعنی ف = ۲ م ک ص ۶} \quad (2) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & \text{بہر اگر} \quad \text{د م} = \text{لا} \\ & \text{تو} \quad \frac{\text{فر لا}}{\text{فر س}} = \text{جم ذہ} = ۱ - ۲ ک ۲ جن ۲ \\ & \text{ۛ} \quad \text{لا} = \text{م نر} (۱ - ۲ ک ۲ جن ۲) \text{ فرء} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{یعنی} \quad \text{لا} = \text{م} \{ ۲ ق (حط ۶) - ۶ \} \quad (3) \\ & \text{جہاں ق دوسری قسم کا ناقصی تکملہ ہے۔} \\ & \text{حدی شرائط یہ ہیں کہ لا، ما، س سب کے سب معدوم ہو جاتے ہیں جبکہ ۶ = ۰} \end{aligned}$$

$$E. (am u) = (حط ۶) ق$$

اور ان توبہ مساوات (۲) میں استعمال کرنے سے ہمیں $b = 2m$ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اگر $a = 1$ اور $s = 1$ جب کہ $a = 1$ ف تو ان مساوات (۲) میں مندرجہ کرنے سے $s = 2$ پس معلوم ہوا کہ e کی متناظر قیمت k ہے جو ناقصی تفاعل کا حقیقی ربعی دور ہے۔ اور اس لئے (۱) اور (۳) سے ہم حاصل کرتے ہیں

$$l = m \cdot k$$

$$1 = m \{ 2 \text{ (حک) } - k \}$$

اور

اس لئے توبہ مساواتوں (۱)، (۲)، (۳) سے حاصل ہونا ہے بشرطیکہ مستقلوں کے درمیان وہ روابط ہوں جو ادیر بیان ہوئے۔
 ہم ۱۳ — لدنیہ (Elastica) وہ مسخنی ہے جو ایک پچدار ڈنڈے کو موڑنے سے پیدا ہوتا ہے یہ توبہ کے متماثل ہے۔

ڈنڈے کو b و c سے تعبیر کرو اور فرض کرو کہ توازن، b اور c پر کی قوتوں سے جو متضاد سمتوں میں عمل کرتی ہیں رقرار رہتا ہے۔

نقطہ n پر جھکاؤ کا معیار اثر (Bending moment) انحناء کے متاسب ہے۔ اور اس لئے b کے توازن پر غور کرنے سے اور نقطہ n کے گرد معیار لینے سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ نقطہ n پر کا انحناء ایسے بدلتا ہے

۱۴ Roath, *Analytical Statics*, II p 269, or Kelvin and Tait *Natural Philosophy*, 591

۱۵ For a full discussion of the *Elastica* see Kelvin and Tait,


Natural Philosophy 611 Love, *The Mathematical Theory of Elasticity*, p 384, or L. Levy, *Precis Elementaire de la Theorie des Fonctions Elliptiques*, p. 112

جیسے ن ل۔ اس طرح

$$r \times n = m^2$$

اور اس لئے لدنیہ، توبیہ کے مماثل ہے۔

۱۳۵۔ لدنیہ لپیٹون (convolutions) کی مختلف تعداد پر مشتمل ہو سکتا ہے جس طرح کہ اشکال ذیل سے ظاہر ہے



پانی کی سطح اور اس کے دباؤ کی مناسب ترتیب و تنظیم سے توبیہ کے بھی مختلف لپیٹے ہو سکتے ہیں۔

مثلاً اگر ہم ب ج کو سطح آب تصور کریں اور اس طرح کے انتظامات عمل میں لائیں کہ پانی فضا و ع میں بھردیا جائے اور پانی ب ج ع ج ع حصوں کو اوپر وار دبائے تو ہمیں ایک لپیٹے والے لدنیہ کے مماثل توبیہ مل جائیگا۔

اگر ہم یہ تصور کریں کہ ب ج، مڑے ہوئے ڈنڈے کو ب اور ج پر مس کرتا ہے جس کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ ڈنڈا لامتناہی طول کا ہو اور اگر گزشتہ کی طرح اوپر کے ماس سے الفرافٹ ناپا جائے تو

(۱۴۲)

$$r = \infty \text{ جبکہ } m = 1$$

$$\text{اور اس لئے } \frac{m}{2} = 1 + \text{جم ف}، \text{ یا } \frac{m}{2} = \frac{\text{فرس}}{\text{فر ف}} = \frac{2}{\text{جم ف}}$$

اگر س کو دسے ناپیں تو

$$س = م \text{ لوک سس } \left(\frac{11}{m} + \frac{f}{m} \right)$$

آئندہ معلوم ہوگا کہ یہ شعری منحنی ہے۔

۱۳۶ — ویرس ٹراس (Weirstrass) کے ناقصی تفاعیل کی رقوم میں بھی ہم تو بیہ کی مساواتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً دفعہ (۱۳۲) سے

$$\frac{\frac{f}{2}}{\frac{f}{2} \left(\frac{f}{2} + 1 \right)} = \frac{\frac{f}{2}}{\frac{f}{2} \left\{ 2 \left(\frac{f}{2} \right) + 1 \right\}} = \frac{1}{2} = \frac{f - 1}{2}$$

$$\therefore \frac{2f - 1}{2} = 1 - \frac{1}{\frac{f}{2} + 1} = 1 - \text{جم ف} \dots (1)$$

$$\text{تاکہ } \frac{2f - 1}{2} = 1 - \frac{f}{2m}$$

$$\text{اور } \frac{2f - 1}{2} = \frac{f}{2m} \Rightarrow \frac{2f - 1}{2} = \frac{f}{2m} \Rightarrow \frac{2f - 1}{2} = \frac{f}{2m}$$

$$\text{رکھو } 2f - 1 = \frac{f}{m} \Rightarrow 2f - 1 = \frac{f}{m} \Rightarrow 2f - 1 = \frac{f}{m}$$

$$\therefore \frac{2f - 1}{2} = \frac{f}{2m} \Rightarrow \frac{2f - 1}{2} = \frac{f}{2m} \Rightarrow \frac{2f - 1}{2} = \frac{f}{2m}$$

۱۵۔ جیس برنولی پہاخص محتاج نے نوبہ کی مساوات دریافت کی۔

اور فرض کرو کہ $y = \frac{1}{3} + (2m + f^2)$

$\frac{1}{3}(2m - f^2) - d$

تو $\frac{\text{فریلا}}{\text{فری}} = \frac{\{2m + \frac{1}{3}(2m + f^2)\} \{d - \frac{1}{3}(2m - f^2)\}}{\{d + \frac{1}{3}(2m - f^2) - \frac{1}{3}(2m + f^2)\}}$

اب فرض کرو کہ $e = \sqrt{\frac{\text{فری}}{2m}} \sqrt{(d - e_1)(d - e_2)(d - e_3)}$

جہاں $e_1 = \frac{1}{3}(2m - f^2)$ ، $e_2 = \frac{1}{3}(2m - f^2) - e$ ، $e_3 = \frac{1}{3}(2m + f^2)$

(۱۲۳) پس چونکہ (۱) سے $f^2 = 2m$ جب $e = \frac{1}{3}f$ ، $f^2 > 2m$

اس لئے $e_1 < e_2 < e_3$

اس لئے $d = f^2(2m + e)$ جہاں e مستقل ہے

اب $\frac{1}{3}f^2 > d > \frac{1}{3}f^2 - e$ ، اس لئے $y \geq \frac{1}{3}f^2$

اور $\frac{1}{3}f^2 - e > \frac{1}{3}f^2 - \frac{1}{3}(2m + f^2)$ $\Rightarrow d > \frac{1}{3}f^2 - \frac{1}{3}(2m + f^2)$

یعنی $e \geq d \geq \frac{1}{3}f^2$

پس e کو حقیقی لینے سے، e کا خیالی حصہ، خیالی نصف دور سم ہونا چاہیے اور اس کا حقیقی حصہ e کی زیرین حد کے مناسب انتخاب سے صفر لیا جاسکتا ہے۔

$\therefore d = f^2(2m + e)$

اس طرح چونکہ $\frac{\text{فریلا}}{\text{فری}} = \frac{\{2m + \frac{1}{3}f^2 - e\}}{\{d - e_1\} \{d - e_2\} \{d - e_3\}}$

$\therefore \frac{\text{فریلا}}{\text{فری}} = \frac{1}{3}f^2 - \{e + (2m + e)\}$ فری

$$\text{اور } \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \dots \quad \left(\frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots \right)$$

جہاں $\frac{1}{2}$ دیرپہ کازیتا اناعل (Zeta Function) ہے اور مستقل ہے۔

نیز جبکہ $\frac{1}{2} = 0$ تو $\frac{1}{2} = 0$ اور $\frac{1}{2} = 0$ (سم) پس $\frac{1}{2} = 0$ اور $\frac{1}{2} = 0$ (سم) پس

$$(2) \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \dots$$

اور چونکہ $\frac{1}{2} = 0$ تو $\frac{1}{2} = 0$ اور $\frac{1}{2} = 0$ اس لئے

$$(3) \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \dots$$

$$\text{نیز } \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \dots = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots \right)$$

اس طرح ابھی اندراجات سے

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \dots = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots \right)$$

$$\text{اور } \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \dots = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots \right)$$

پس $\frac{1}{2} = 0$ فر

بتریکہ $\frac{1}{2} = 0$ کو $\frac{1}{2} = 0$ جہاں $\frac{1}{2} = 0$ حساب بالا صفر ہو جاتا ہے۔


۱۱۴۱ اگر $\frac{1}{2} = 0$ اور $\frac{1}{2} = 0$ تو $\frac{1}{2} = 0$ اور $\frac{1}{2} = 0$ (سم) پس $\frac{1}{2} = 0$ اور $\frac{1}{2} = 0$ (سم) پس

اس لئے فہ (ع + سم) = ع ۲ ، پس ع کی متناظر قیمت سم ہونی چاہیے اور مستقلوں اور دوروں میں روابط ذیل ہونگے

$$ل = طا (سم) - طا (سم) - \frac{1}{4} ع ۲ سم$$

ل = ۲۲ سم کے لئے مشکلیں کھینچی ہیں جس میں پانی ہموار سطح ب ج تک بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر پانی کی مقدار اس سے کم ہو تو کپڑے کے دو حصے جن کو پانی میں نہیں کرتا مستوی ہونگے اور ف کی قیمت اس صورت میں سطح آب کے نیچے اس کی گہرائی ہوگی۔

۸ سم — تناؤ اور ماسی عمل — ایک مستوی ملائم جہلی کے توازن پر غور کرو۔ جہلی کے کسی خط پر کا زور یعنی سطح کے اُن متصلہ حصوں کے درمیان عمل جو اس خط سے محدود ہیں عام طور پر اس خط کے ساتھ میلان رکھے گا اور اس لئے ایک تناؤ و اور ایک ماسی عمل یہ سے بشیر ہوگا۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ کسی دو سمتوں میں جو ایک دوسرے پر علی التوائٹم ہوں یہ کی قیمت وہی ہوتی ہے اور یہ کہ دو سمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے لئے یہ صفر ہو جاتا ہے۔



سطح کا کوئی مربع عنصر لینے سے متقابل اضلاع کے ایک جوڑے پر کے ماسی اعمال تہ فرس اور (تہ + مف تہ) فرس اتہا میں جنت تہ مف ص ۲ بناتے ہیں اگر عنصر کا ایک ضلع مف میں ہو۔ اور چونکہ اس کی تبدیل دوسرے جنت تہ مف ص سے ہونی چاہیے اگر تہ علی التوائٹم سمت میں ماسی عمل

ہو اس لئے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ تہ اور تہ مساوی ہیں -
اب ایک چھوٹا مثلثی عنصر د ل ب ل و پر قائم الزاویہ ہے اور زوروں
کو شکل کے بموجب تعبیر کرو۔

(۱۴۵)

ب ل کے متوازی قوتوں کو تحلیل کرنے سے ہمیں حاصل ہوگا

$$\text{تہ ل ب} + \text{تہ ل و} + \text{تہ ل ج} = \text{تہ ل د} + \text{تہ ل ب} + \text{تہ ل ج} + \text{تہ ل و}$$

$$\therefore \text{تہ ل ب} = \text{تہ ل د} - \text{تہ ل و} \quad \text{جب } \text{تہ ل د} = \text{تہ ل ج} + \text{تہ ل و}$$

تہ صفر ہوگا جب کہ

$$\text{تہ ل د} = \text{تہ ل ج} + \text{تہ ل و}$$

جس سے دو علی التواضع سمتیں حاصل ہوتی ہیں -

۱۴۹۔ اگر شکل میں ہم یہ مان لیں کہ و ل اور و ب صفر ماسی عمل کی سمتیں
ہیں اور اگر قوتوں کو ب ل کے متوازی اور اس کے علی التواضع سمتوں میں تحلیل
کیا جائے تو مساواتیں

$$\text{تہ ل د} = \text{تہ ل ج} + \text{تہ ل و}$$

$$\text{تہ ل د} = \text{تہ ل ج} + \text{تہ ل و}$$

حاصل ہونگی۔

اس صورت میں مقادیر تہ اور تہ بڑے سے بڑے اور چھوٹے
سے چھوٹے یا چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے متناؤں کو تعبیر کریں گی اور
اس لئے ہم ان کو صدی متناؤ کہیں گے۔

۱۴۰۔ اگر ل ب پر کے حاصل زور م ل د کا سیلان و ل کے ساتھ نہ ہو تو

$$\text{مس فہ} = \frac{\text{تہ ل د}}{\text{تہ ل و}} = \frac{\text{تہ ل د}}{\text{تہ ل و}}$$

$$\therefore \text{مس فہ} = \frac{\text{تہ ل د}}{\text{تہ ل و}}$$

نیز $س \times ا = ت \times و + ب \times ت \times و$

$$س = ت \times ب \times ط + ت \times ج \times ط$$

اور ط کو ساقط کرنے سے ہمیں ربط ملیگا


$$\frac{س}{ط} = \frac{ت \times ب}{ت \times ج} + \frac{ت \times و}{ت \times ج}$$

اگر اب سمتوں و ا اور و ب میں نقطہ و کے صدر می تناؤ ت اور ت ہوں اور اگر و ع کا میلان و کے ساتھ ط ہو تو و ع پر کے زور کی سمت و ت مساوات

$$\frac{ت}{ت} = مس و مس ط$$

سے حاصل ہوگی اور زور کی مقدار فی اکائی طویل سمت و ت میں اس ناقص کے نصف قطر سے تعبیر ہوگی جس کے نصف محاور صدر می تناؤں سے تعبیر ہوتے ہیں۔

(۱۴۶) ۱۴۱۔ مزدوج زور۔ اگر و ع کا زور و ت کی سمت میں عمل کرے تو و ت پر کا زور و ع کی سمت میں عمل کرے گا۔



کیونکہ اگر ہم ایک ایسے عنصر کے توازن پر غور کریں جو ایک متوازی الاضلاع پ ق س کی شکل کا ہو اور جس کے اضلاع و ع اور و ت کے متوازی ہوں تو پ س اور ق س پر کے زور متعادل ہیں اور اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے

کر چکی اور سراسر پر کے زور بھی تھا دل میں ہیں اور اس لئے سمتوں و ع اور ع و میں عمل کرتے ہیں۔

۱۳۲۔ اگر و ع اور و ف میں سے مزدوج زور صا اور صا ہوں اور اگر صدی تناؤ ت کی سمت کے ساتھ و ع اور و ف کے میلان ط اور ذ ہوں تو دفعہ (۱۴۰) سے مساواتیں

$$\frac{1}{صا} = \frac{جم ذ}{صا} + \frac{جب ف}{صا}$$

$$\frac{1}{صا} = \frac{جم ط}{صا} + \frac{صا ط}{صا}$$

حاصل ہوئی ہیں۔ جہاں ط اور ذ میں ربط ہے

$$صا ذ = صا ط = صا$$

و اور ذ کو سا قط کرنے سے

$$صا صا = صا$$

پس معلوم ہوا کہ کسی نقطہ پر دو مزدوج زوروں کا حاصل ضرب مستقل ہوتا ہے اور یہ مستقل صدری تناؤں کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔

۱۳۳۔ یہی نتیجہ دو مثلثی عناصر و ا ب، و ا ب کے توازن کی شرطوں کو لکھ لینے سے حاصل ہو سکتے ہیں جہاں ا ب اور ا ب، و ع اور و ف کے متوازی ہیں۔


اس طرح ہمیں مساواتیں

(۱۴۱)

$$صا جم ذ = صا جب ط، صا جب ذ = صا جم ط$$

$$صا جم ط = صا جب ذ، صا جب ط = صا جم ذ$$

حاصل ہونی چاہئیں۔ ان سے ہم مذکورہ بالا نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔



۱۴۴۔ اب اگر ہم ایک ملائم جہلی کی صورت پر غور کریں جو سیالی دباؤ کے زیر عمل ہے اور اس کے ایک چھوٹے عنصر کے توازن پر غور کریں تو گزشتہ تین دفعات کے نتائج اس صورت پر بالکل عاید ہو جاتے ہیں کیونکہ عمادی دباؤ کے اجزائے تحلیلی انتہا میں بمقابلہ ماسی عمل کے معدوم ہو جاتے ہیں۔

۱۴۵۔ صدری تناؤ کی کسی شکل کی ایک ملائم سطح سیال کے زیر عمل ہے۔ کسی نقطہ پر کے دباؤ صدری تناؤں، اور ان تناؤں کی سمتوں میں انخاؤں کے درمیان ربط معلوم کرنا مطلوب ہے۔

فرض کرو کہ ن کے متصل نقطے ق، ق ہیں جو ن میں سے گزریوالے


لہ طالب علم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صدری تناؤں اور صدری انخاؤں کے درمیان کوئی تعلق ہے۔

مثلاً ایک ایسی جہلی پر غور کرو جو ایک اسطوانہ کے گرد لیٹی گئی ہے جہلی پر اسی گھائی کے مرفوظی خطوط (Helical lines) کی کچھ تعداد کھینچو۔

جہلی کو ان خطوط کی سمتوں میں تلیا جاسکتا ہے جو بالا خر بڑے سے بڑے تناؤ کی سمتیں بن جائیں گی اس صورت میں عمودی تناؤ صفر ہوگا اور ایک کون پر کے اندر کی سمت اس کون کے شعاعوں کی

صدری تناؤ کے خطوط ن ق ، ن ق پر واقع ہیں۔ ق اور ق میں سے عمادی
مستوی کیچو جون ف اور ن ق یر سمو دھوں اور سطح کو ا ب ، ا ک نوسوں میں
(۱۳۸) قطع کریں۔

فرض کرو کہ ق ن ، ق ن مدودہ کے متصلہ نقطوں میں سے گزرنے والی
عمادی مستوی تو میں ب ج ، ج د تراستی گئی ہیں۔



عنصر ب د ، ماسی قوتوں ت × ا ب ،

ت × ج د ، ت × ا د ، ت × ب ج اور عمادی قوت

د × ا ب × ب ج کے زیر عمل ساکن ہے۔

فرض کرو کہ مسیمیوں ن ق ، ن ق

کے نقطہ ن پر کے نصف قطر انخار ر

ہیں۔ تب ن یر عمادی سمت میں قوتوں کو

تحلیل کرنے سے ہیں بالآخر حاصل ہوگا

$$د \times ا ب \times ب ج = ۲ ت ا ب \frac{۱}{ر} + ۲ ت ب ج \frac{۱}{ر} ا ب$$

$$د = \frac{ت}{ر} + \frac{ت}{ر}$$

اگر سطح کی نوعیت اس طرح کی ہو کہ ت = ت تو مساوات بالا ہو جائیگی

$$\frac{۱}{ر} + \frac{۱}{ر} = \frac{۱}{ر} + \frac{۱}{ر} = \frac{۲}{ر}$$

جہاں سا ، سا صدری نصف قطر انخار ہیں۔

پس اگر سطح کی مساوات ی = ن (لا ۱) ہو تو

$$\frac{د}{ت} = \{ ۱ + \left(\frac{جف ی}{جف لا} \right) + \left(\frac{جف ی}{جف ا} \right) \} \frac{۲}{ر}$$


$$= \{ ۱ + \left(\frac{جف ی}{جف ا} \right) \} \frac{۲}{ر} - \frac{جف ی}{جف لا} \frac{جف ی}{جف ا} \frac{۲}{ر} + \frac{جف ی}{جف لا} \frac{جف ی}{جف ا} \frac{۲}{ر}$$

$$+ \left\{ \left(\frac{\text{جف } ۲}{\text{جف } ۱} \right) + ۱ \right\} \frac{\text{جف } ۲}{\text{جف } ۱}$$

اس مساوات کو لگراج اور پائسن لے حاصل کیا تھا۔

۱۴۶۔ کسی سمت میں تناؤ۔ اگر ت اور ت کی سمتیں وہی نہ ہوں جو صدری تناؤں کی ہیں تو مساوات میں ماسی عمل داخل ہوگا۔

سطح پر کوئی نقطہ ولو اور و ل
دب ایک دوسرے پر علی التواہم لے کر
فرض کر دو کہ ان سمتوں میں تناؤ ت، ت
ہیں اور ماسی اعمال ت، ت۔ وہ
عماد وی کھینچو۔



عمادی مستویوں (وی، اب وی
کے متوازی اور ان سے بالکل فریب جا،
مستوی کھینچو اور فرض کر دو کہ یہ مستوی سطح کو
ج، د، ع، ف، ت، ج میں
قطع کرتے ہیں۔

تب بالا تخر ج د اور ع ف کے ماسی اعمال ت، ت، ج، د اور ت، ع ف
ایک دوسرے کے مساوی گہرمت میں مخالفت ہیں، یہی حال ع د اور ج ف پر کے
ماسی اعمال کا ہے۔

(۱۴۹)

پس وی کے گہر معیار انفریسنے سے دفعہ ۱۳۸ کی طرح، یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ت = ت۔
اگر مینجی ج د کے نقطہ ایر کے ماس کا میلان مستوی لاما کے ساتھ طہ ہو تو

$$\text{مس } \frac{\text{جف } ۲}{\text{جف } ۱} \times \frac{\text{د}}{\text{و}}$$

لے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں

$$\text{مس } \text{ف} = \text{ف} (\text{د}) = \text{ف} (\text{و}) + \text{ف} (\text{ت} \times \text{و}) + \dots$$

اور اسی طرح نقطہ (۱۲۷)

$$\text{مس لہ} = \frac{\text{جف ای}}{\text{جف لاجف ا}} (-) (۱۲۸)$$

یہ سمت وی میں اعمال دت × ج د اور دت × ع ف کا مجموعہ

$$= \text{دت} \times \text{ج د} \frac{\text{جف ای}}{\text{جف لاجف ا}} (-) \text{دت} \times \text{ع ف} \frac{\text{جف ای}}{\text{جف لاجف ا}} (-) (۱۲۹)$$

$$= \text{دت} \times \text{ج د} \times \text{ع د} \times \frac{\text{جف ای}}{\text{جف لاجف ا}}$$

اور اسی طرح کی رقم عمل دت سے حاصل ہوگی۔

وہی کی سمت میں تحلیل کرنے سے اب ہمیں حاصل ہوگا

$$ر \times ح د \times د \times ع = ۲ \times \text{جت} \times ج د \frac{۱}{ر} + ۲ \times \text{جت} \times ع د \frac{وب}{ر} + ۲ \times \text{جت}$$

$$\times ح د \times د \times ع \frac{\text{جف ای}}{\text{جف لاجف ا}} = ۲ \times \frac{وب}{ر} + \frac{۲}{ر} \times \text{جت} \frac{\text{جف ای}}{\text{جف لاجف ا}}$$

۱۲۷ — دفعات (۱۳۹) اور (۱۴۵) سے بھی یہی نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے


اور اگر یہ یہ طریقہ بہت طویل ہے لیکن اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں صدی تناؤ کی سمتوں اور
صدی انحناء کی سمتوں کے درمیان تمیز کرنے کی اہمیت ایسے طور پر واضح ہو جاتی
ہے۔

بقیہ نوٹ صفحہ ۱۲۷ — جہاں (۰) = مس لہ کی قیمت دیرینی ویر جف ای کی قیمت اور (۰) =

$$\frac{\text{جف لاجف ا}}{\text{جف ای}} (-) یا \left(\frac{\text{جف ای}}{\text{جف لاجف ا}} \right) کی قیمت ویر۔$$

یہ علامتوں کے توازن کے عام مسئلہ پر ڈبل، ایچ، بیسٹ نے

س بحث کی ہے۔ *Quarterly Journal of Mathematics Vol IV 1800*



(۱۵۰) اگر کسی دو علی القوائم سمتوں والا، واما میں تناؤ تھا، تہا ہوں اور ان میں سے کسی ایک سمت میں حماسی عمل تھا، ہوا سمتوں ون، ون میں صدری تناؤ تھا، تہا ہوں اور زاویہ ن والا = ط، تو دفعہ (۱۳۹) کی رو سے

$$ت = تجم\ ط + دت\ جب\ ط$$

$$تہا = تجم\ ط + دت\ جب\ ط$$

$$ت = (ت - دت) جب\ ط جم\ ط \quad \text{اور}$$

اب اگر صدری انخما کی سمتیں وج، وج ہوں اور زاویہ ج والا = فہ، اور انخما کے صدری نصف قطر مرا، مرا ہوں اور والا، واما ون، ون میں سے گزرنے والی عمادی تراشوں کے نصف قطر لہ، لہ، ر، ر ہوں تو

$$\frac{1}{ر} = \frac{جم\ فہ}{مرا} + \frac{جب\ فہ}{مرا} ، \quad \frac{1}{لہ} = \frac{جم\ فہ}{مرا} + \frac{جب\ فہ}{مرا}$$

$$\frac{1}{ر} = \frac{جم\ (ط - فہ)}{مرا} + \frac{جب\ (ط - فہ)}{مرا} ، \quad \frac{1}{لہ} = \frac{جم\ (ط - فہ)}{مرا} + \frac{جب\ (ط - فہ)}{مرا}$$

$$\frac{f^2}{r^2} + \frac{t}{r} = (t \text{ جم } \phi + t \text{ جب } \phi) \left(\frac{\text{جم } \phi}{r} + \frac{\text{جب } \phi}{r} \right)$$

$$+ (t \text{ جب } \phi + t \text{ جم } \phi) \left(\frac{\text{جب } \phi}{r} + \frac{\text{جم } \phi}{r} \right)$$

$$= \left\{ \frac{\text{جم } \phi^2}{r} - \frac{\text{جب } \phi \text{ جم } \phi}{r} + \frac{\text{جب } \phi^2}{r} + \frac{\text{جب } \phi \text{ جب } \phi}{r} \right\}$$

$$+ \left\{ \frac{\text{جب } \phi \text{ جم } \phi}{r} - \frac{\text{جم } \phi^2}{r} + \frac{\text{جب } \phi \text{ جب } \phi}{r} + \frac{\text{جب } \phi^2}{r} \right\}$$

$$= \frac{t}{r} + \frac{t}{r} - (t - t) \text{ جب } \phi \text{ جم } \phi \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r} \right)$$

$$= \frac{t}{r} + \frac{t}{r} - t \text{ جب } \phi \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r} \right)$$

$$\therefore \frac{f^2}{r^2} + \frac{t}{r} = (t \text{ جب } \phi) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r} \right) + \frac{t}{r} + \frac{t}{r} = \frac{t}{r} + \frac{t}{r}$$

کس د کے قرب و جوار میں سطح کی مساوات اس طرح لکھی جاسکتی ہے

$$y^2 = \frac{f^2}{r^2} + \frac{t}{r} \text{ اگر } \phi \text{ و } \phi \text{ کے عماد کو محور مانا جائے و لاؤ } \phi$$

وی کئے حوالے سے یہ مساوات ہوگی $y^2 = f^2 + 2f \phi + \phi^2$

اور چونکہ محوروں کے ان دونوں کا درمیانی زاویہ ϕ ہے اس لئے

$$\text{جب } \phi = \frac{f^2}{(1 - \phi)^2 + f^2}$$

$$\text{اور } (1 - \phi)^2 + f^2 = (1 + \phi)^2 - f^2 \text{ (ب - ف)}$$

$$= \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r} \right) - \frac{f^2}{r^2}$$

$$= \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right)^2$$

(۱۵۱) اور ف مرکباً دہر $\frac{\text{جف}^2 \text{ی}}{\text{جف لاجف}^2}$ کی قیمت ہے۔

$$\therefore \text{جب } 2 \text{ ف} = \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right)^2 = \frac{\text{جف}^2 \text{ی}}{\text{جف لاجف}^2}$$

$$\therefore \frac{t}{r} + \frac{t}{r'} + \frac{t}{r} = \frac{\text{جف}^2 \text{ی}}{\text{جف لاجف}^2} = d$$

۱۴۸— ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انتخاب شدہ سمتیں دلاوا، صدی انہما کی سمتوں پر منطبق ہو جائیں تو $d = 0$ اور ضابطہ بالا

$$d = \frac{t}{r} + \frac{t}{r'}$$

میں تحول ہو جاتا ہے۔ پس یہ ضابطہ درست رہتا ہے جبکہ منتخبہ سمتیں صدی تناؤ کی سمتیں ہوں یا صدی انہما کی سمتیں۔

۱۴۹— اگر ہم ایک ایسی سطح کا تصور کریں جس کی نوعیت اس طرح کی ہو کہ اس کے کسی نقطہ پر کا تناؤ اس نقطہ میں سے گزرنے والے ایک خط تقسیم پر ہمیشہ عمود وار عمل کرے تو یہ بتایا جاسکتا ہے کہ کسی نقطہ پر کا تناؤ ہر سمت میں دہی ہوتا ہے۔


اگر ایسی سطح کے ایک چھوٹے مثلثی حصہ پر غور کیا جائے تو ماسی مستوی کے اندر کا توازن مثلث کے ضلعوں کے تناؤ سے پوری طرح متعین ہو جاتا ہے کیونکہ ماسی مستوی میں کے قوار عالم (اگر کوئی ہوں) بمقابلہ تناؤں کے بالاتر معدوم ہو جاتی ہیں اور چونکہ ضلعوں کے تناؤ اضلاع پر عمود وار ہیں ان کو ضلعوں کے طولوں کے متناسب ہونا چاہیے اور اس لئے تمام سمتوں میں تناؤ کے ناب دہی ہیں۔

نیز سطح پر تناؤ ہر جگہ دہی ہو گا کیونکہ اگر ایک چھوٹے مستطیلی عنصر پر غور کیا جائے تو متقابلہ ضلعوں پر کے تناؤ مساوی ہونے چاہئیں۔

اس قسم کی سطح کا تصور کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کال استوار جسم یا ایک سیال کال کا تصور کرنا ہے تاہم ایسی سطحوں کے قریب ترین نونے مانع جمیلوں کی

صورت میں ملتے ہیں۔ مثلاً صابونی ببلہ کی صورت میں یا اُن جھیلوں کی صورت میں جو شیشے کی بوتل میں نظر آئیں گی۔ جبکہ اس کے اندر کے مائع کو خوب ہلایا جائے۔
الٹ جھیلوں کی بحث کو ہم آئندہ باب تک ملتوی رکھتے ہیں۔

۱۵۰۔ ایک ظرف جو مائع اور امتداد پذیر شے سے بنایا گیا ہے گردش سطح کی شکل کا ہے۔ اس کو انتصابی محور کے ساتھ پکڑ کر متجانس مائع سے (۱۵۲) بھر دیا گیا ہے۔ کسی نقطہ پر مائع میں تناؤ معلوم کرنا مطلوب ہیں۔
فرض کرو کہ وظف کا زیر ترین نقطہ ہے۔ وکو مبدأ قرار دو۔



لا کو انتصابی اوپر وار دایا اور
فرض کرو کہ کوئی افقی تراش
ن ع ق ہے۔ اوپر کا
کنارہ ا ج ب ہے
جوابت ہے۔

افقی تراش ن ق
کے تمام نقطوں پر دباؤ صریحاً
ایسی ہے۔

فرض کرو کہ نصف الہیاری تھا۔ اس سے یعنی وہ تناؤ جو منحنی ا ن کے
نقطہ ن پر کے تماس کی سمت یہ نقطہ ن پر آتا ہے اور فرض کرو کہ نقطہ ن پر
اسی تناؤ ت ہے۔ یہ صدر می آتا ہے۔ تراش ن ق کے ساتھ ساتھ تناؤ ت
کا انتصابی حاصل سطح ن و ق پر۔ کے حاصل انتصابی دباؤ کی تبدیل کرتا ہے۔
پس اگر

$$و ع = لا ، ع ن = ا ، ا و = ن ت و ط$$

ت ن ا م ت جم ط = ک ج ث ا م ا د لا ج ث ا م ا (م - لا) اگر ج = م

اس مساوات سے ت کا تعین ہو جاتا ہے۔ اور ت مساوات

$$\frac{t}{r} + \frac{t}{r} - \frac{t}{r} = 0 \quad \text{دفعہ (۱۳۵)}$$

سے حاصل ہوتا ہے جہاں $d = j$ ت (م - لا) -
یہ یاد رہے کہ شعنی ان کے نقطہ ن پر نصف قطر انخار رہے اور اس کے
عمود وار جو عمادی تراش ہے اس کا نیم قطر انخار یعنی ن گ ہے۔
۱۵۱۔ اس سے زیادہ عام مسئلہ تبدیل ہے۔

ایک لامن ظرف گرنشی سطح کی شکل کا ہے اور سیالی دباؤ کے
زیر عمل ہے اس طرح پر کہ کسی دائری تراش کے تمام نقطوں پر سیالی
دباؤ وہی ہے۔ کسی نقطہ پر اسکے صوری تناؤ معلوم کرنا مطلوب ہے۔
رض کر کہ ن ع ق، ن ح ق دو متصل دائری تراشیں ہیں اور
نقطہ ن پر کا نصف النہاری تناؤ ت ہے۔

اگر ن = سی نو دائرہ ن ق پر محور لے موازی حاصل تناؤ


$$= 2 \pi r \frac{d}{r} = 2 \pi d$$

ن ق پر ولا کے موازی حاصل تناؤ

$$= 2 \pi r \frac{d}{r} + 2 \pi r \frac{d}{r} = 4 \pi r \frac{d}{r} = 4 \pi d$$


یہ مساوات اس صورت کے لئے اس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہے ایک جھوٹا غصہ روجا انخار کے
خطوط سے محدود ہو یہی نصف النہاروں اور افقی دائروں سے۔ یویر (Meunier)
کا مسئلہ استعمال کرے اور اس کا خیال رکھو کہ انخار کے خطوط کے شعنی عماد پر عمادی مستوی
ہیں ہوتے۔

اس دونوں کا فرق، دائروں
ن ق، ن ق کے درمیان
سطح کی جو بیٹی ہے اس کے دلا
کے متوازی حاصل دباؤ کی
تعدیل کرتا ہے۔ یہ حاصل دباؤ
۲۴ × ۴۴ ماس فرما
ن ق کے مساوی ہے۔ اگر دائرہ
ن ق کے کسی نقطہ پر کا داؤ
و ہے۔



$$\frac{\text{فرما}}{\text{ماس}} = \left(\frac{\text{فرما}}{\text{ماس}} \right) \text{ دباؤ} = \frac{\text{فرما}}{\text{ماس}}$$

اور دیکھ لاکا ایک دیا ہوا تعامل ہے اور اسلئے
س کا تعامل ہے اس لئے یہ مساوات تناؤ
کا تعین کرتی ہے اور ت گشتہ کی طرح مساوات



$$\frac{\text{ت}}{\text{ر}} = \frac{\text{ت}}{\text{ر}}$$

سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۵۲۔ د کو سا قط کرنے سے ہیں ت اور ت
میں ایک ربط حاصل ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ ربط
بالراست حاصل کیا جائے۔

ایک جھوٹا عنصر ن ق ماس جو نصف النہار
قوسوں ن ق، ماس ماس کے اور دائری قوسوں
ن م، ن م کے محدود ہے، فرض کرو کہ

نصف انہاری مستویوں کا درمیانی زاویہ ϕ ہے اور نصف انہاروں کے
نقاط α اور β پر کے ماسی خطوط کے درمیان زاویہ 2ϕ ہے۔

تب $\alpha = \beta = \phi$ اور $\alpha = \beta = \phi$
 α اور β سمت کی تنصیف کرے والے نصف انہار کی سمت کے
متوازی قوتوں کو تحلیل کرنے سے

$$\frac{F}{\alpha} (\alpha = \beta) = 2\phi \sin \phi \text{ جب } \phi = \alpha$$

$$= \frac{2\phi \sin \phi}{\alpha} = \frac{2\phi \sin \phi}{\alpha}$$

اور چونکہ

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\phi} \text{ ، شکل دفعہ (۱۵۰)}$$

اس لئے مساوات ذیل حاصل ہوتی ہے (۱۵۱)

$$\frac{F}{\alpha} - (\alpha = \beta) = \phi$$

اور چونکہ $\alpha = \beta$ اقطار اس لئے

$$\frac{F}{\alpha} + \frac{F}{\beta} = 2\phi$$

اور اس لئے ان دو مساواتوں سے α اور β معلوم ہو جاتے ہیں۔
پہلی مساوات سے ظاہر ہے کہ اگر کسی افقی ترائش پر α اعظم یا اقل ہو

اور اس لئے $\frac{F}{\alpha}$ صفر ہو جائے تو

$$\alpha = \beta$$


لیکن اگر α ہی اعظم یا اقل ہو تو یہ نتیجہ برآء نہیں ہوتا کیونکہ ہم یہ نتیجہ نہیں
نکال سکتے کہ $\frac{F}{\alpha}$ صفر ہے۔

پھر اگر نقطہ r = $\frac{d}{r}$ = $\frac{1}{r}$ اور اس سے d مستقل ہے۔

۱۵۳۔ مثلہ - (۱) ایک مخروطی شکل کے کامل طور پر طائر اور پکڑا ہوا تھیلے کو نیچے وار منہ کے ساتھ ایک افقی مستوی پر کور سے جوڑ دیا گیا ہے اور اس پر کے ایک چھوٹے سوراخ کے ذریعہ اس کو مانع سے بھریا گیا ہے جس سے سکون کی حالت میں اس کی شکل قائم مستدیر اسطوانہ کی شکل ہوتی ہے۔ اگر مستوی سے اس کا الحاق توڑ دیا جائے اور مانع باہر نکل پڑے تو اس شکل کی مساوات معلوم کرو جو یہ اختیار کریگا اگر اس کے وزن کو نظر انداز کر دیا جائے۔

فرض کرو کہ نقطہ n پر کمون on کے عمود وار سمت میں تناؤ t ہے اور سمت on میں تناؤ t ہے اور مخروط کا زاویہ راس 2α ہے۔

$$nb = \frac{t}{r} + \frac{t}{r} \text{ سے (اگر دلی) حاصل ہوگا}$$



$$ج \text{ ث لا} = \frac{t}{n} = \frac{t}{\text{لا سے قطعہ}}$$

یا $t = ج \text{ ث لا سے قطعہ}$

لیکن $n = 2 \text{ ث ل}$ جمع = on فیہ حاصل انتصابی دباؤ

$$= \frac{1}{2} ج \text{ ث لا سے}$$

ت = $\frac{1}{3}$ ج ت لاسر عم قطع
 فرض کرو کہ مانع نکل جانے کے بعد سطح جس گردش سطح کی شکل اختیار کرتی ہے
 اس کا تکوینی منحنی و ن قی ہے، اور ولی = ضا، ن ل = عا، اور ت
 لفظ ن کا جواب ہے۔



اگر ن قی = مف س، منحنی کی ایک چھوٹی توس

تو مف لاقط عم = مف س $(1 + \frac{ت}{ل})$

اور لاسر عم = عا $(1 + \frac{ت}{ل})$

لچک کے مقیاس کو دونوں سمتوں میں مختلف لینے سے۔

ت اور ت کی حاصل شدہ قیمتوں کو استعمال کر کے لا کو ان دو مساواتوں
 سے ساقط کیا جاسکتا ہے اور اس طرح ضا اور عا میں ایک ربط حاصل ہو جاتا ہے۔

(۱۵۵)

پہلی مساوات میں ج ت لاسر عم قطع = $\frac{1}{3}$ رکھو اس طرح حاصل ہوگا

$$\frac{1}{\frac{ل}{۲} + 1} = \frac{مف س}{جم عم}$$

∴ $\frac{س}{۱} جم عم = مس - \frac{ل}{۱}$ ، اگر س کو د سے نایا جائے

یا $\frac{ل}{۱} = مس - (\frac{س}{۱} جم عم)$

لا کی یہ قیمت دوسری مساوات میں مندرج کرنے سے حاصل ہوگا

لاسر عم مس $(\frac{س}{۱} جم عم) = عا (1 + \frac{ج ت لاسر عم قطع مس}{ل})$ $(\frac{س}{۱} جم عم)$
 جو منحنی کی تفرقی مساوات ہے۔

اگر لہ = کہ تو اس سے = عالم (س) جم (س) + س مس (س) جم (س) {
 (۲) ایک لامٹم جہلی زنجیرہ مار (Catenary) کی شکل کی ہے یعنی ایسی سطح
 کی شکل کی ہے جس کی تکوین ایک زنجیرہ کو اس کے مرتب کے گرد گھمانے
 سے ہوتی ہے۔ اس جہلی کے سرے نصف قطر کے دو مساوی
 دائری تختوں سے ثابت کر دئے گئے ہیں لہذا وہی ہوائی دباؤ کا اضافہ
 بیرونی ہوائی دباؤ پر د معلوم ہے۔

اس صورت میں انحناء متقابل سمتوں میں ہیں اور اگر ن پر کا عماد ن گ
 ہو تو ہر ایک نصف قطر انحناء ن گ کے مساوی ہوگا اور توازن کی مساواتیں ہونگی

$$ت - ت = و - ن گ \quad اور \quad ت = \frac{فر}{(۱۱۱۱)}$$

اور چونکہ $ن گ = \frac{۱}{۲} ر ک \frac{فر}{(۱۱۱۱)} = دما$ جہاں ک زنجیرہ کا مستقل ہے

$$۲ ک (ت - ت) = د (۱ - ک)$$

جہاں ت، راس پر کا نصف انحناء ہی تناؤ ہے

$$اور \quad ت = ت + \frac{۳}{۲ ک} (۱ - ک)$$

ان میں سے پہلی مساوات حصہ ۱ ن کے توازن پر غور کرنے سے فوراً
 حاصل ہو سکتی ہے جہاں زنجیرہ کے راس کو ۱ تعبیر کرتا ہے اور پھر ت کی قیمت
 مساوات ت - ت = د سے حاصل ہو جاتی ہے۔
 اگر تختوں کے وزن کو نظر انداز کیا جائے اور یہ فرض کیا جائے کہ

اندرونی ہوا کے دباؤ سے توازن برقرار رہتا ہے تو

$$۲۲ \text{ و } ۲ = \left\{ \frac{۲}{۲} (۲ - ۲) \right\} \frac{۲}{۲} = \frac{۲}{۲} \text{ و } ۲$$

جس سے


$$۲ = ۲ \text{ و } ۲$$

اور پھر تناؤ ہو جاتے ہیں۔

$$۲ = \frac{۲}{۲} \text{ و } ۲ \text{ اور } ۲ = \frac{۲}{۲} \text{ و } ۲$$

۱۵۔ ہم نے اب تک صرف یکساں موٹائی کے بہتروں پر غور کیا ہے لیکن ایسی صورتوں کو بھی شامل کرنے کی خاطر جن میں بہترے متغیر موٹائی کے ہوں۔ تناؤ کا زیادہ عام ناپ دریافت کیا جاسکتا ہے۔

فرض کرو کہ کسی متجانس مادے کی سلاخ ا ب سے وزن و لٹکایا گیا ہے اور سلاخ کی تراش کا رقبہ کہ سے ت ب ن میں سے گزرنے والی تراش پر کا تناؤ، وزن و اور سلاخ کے حصہ ن ب کے وزن کو تھامے ہوئے ہے۔



اور اگر ان اوزان کا مجموعہ یہ کہ ہو تو نقطہ ن پر تناؤ کا ناپ فی اکائی رقبہ یہ ہوگا۔

یہ معلوم رہے کہ ت کی بسبب یہ کا بقد ر ایک کے کم ہے۔

درحقیقت اگر کسی نقطہ پر ایک ملائم بہترے کی موٹائی ع ہو اور اس پر کا تناؤ ت ہو جو معمولی ترقی سے تراش کی فی اکائی طول کے لئے معلوم کیا گیا ہے تو

$$ت = ع \text{ و } ت$$

$$ت = ع$$

یا

۱۵۵۔ اس باب کے مسائل عموماً اُن سطحوں پر قابل استعمال نہ ہونگے جو غیر ملائم یا جن کی مائٹ ناقص ہے۔ لیکن اگر کسی خاص صورت میں سطح کے متصلہ حصوں کا درمیانی عمل کچھ ماسی ستوی میں ہو تو تناؤ اور عادی دباؤ کے درمیان محصلہ ردابط برقرار رہیں گے۔

مثلاً اگر ایک انقباضی مسدیر یا سطوانہ کسی غیر ملائم شے سے بنا ہوا درسیں سیال بھر دیا جائے تو کسی نقطہ پر کا عمل کچھ ماسی سمٹ میں ہوگا اور اس کی نوعیت تناؤ کی سی ہوگی۔

امثلہ

۱۔ یہ فرض کر کے کرنا کہ تھکے کے اسطوانے ایک سی مادی سے سے سے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اندر رد (stress) اسی ہے اسطوانوں کی موٹائیوں میں نسبت معلوم کرو۔

۲۔ ایک اسطوانی تیرہ (۱۰) موٹے دھات کے پیر سے بنایا گیا ہے اور اسی دھات کا ایک ڈنڈا جس کی تراش کا رقبہ ۱۰ مربع انچ ہے بغیر ٹوٹے کے وزن ۱۰ کو میں سنبھال سکتا ہے۔ اگر اسطوانہ کو انقباضی محور کے ساتھ رکھا جائے تو معلوم کرو کہ اس میں کتنا سیال ڈالا جاسکتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے۔

۳۔ ڈھلے ہوئے لوہے کی تناؤی (Tensile) طاقت تراش کے فی مربع انچ کے لئے ۱۶۰ پونڈوں پر ایک ڈھلے ہوئے لوہے کے پانی کے ایسے نل کی موٹائی معلوم کرو جس کا اندرونی قطر ۱۲ ہے کہ اس پر کا زور اس کی انتہائی مقبوضی کا صرف ۱/۱۰ ہو جبکہ پانی کا ارتقاع ۳۸ ڈیگری ہو۔

۴۔ ایک محب محروم کو جس کا اس سے بچے دار ہے پانی سے بھر دیا گیا ہے۔ معلوم کرو کہ وقتی تناؤ سب سے زیادہ کہاں ہے۔

یہ معلوم کرو کہ کون کی سمت میں تناؤ کی قیمت سب سے زیادہ کہاں ہے۔

۵۔ ایک مستطیل صندوق کے اوپر کا رخ یکساں پچھلا رہندہ (Band) کو (۱۵) اس کے متقابل ضلعوں پر مادہ دے دے سے نہ کر دیا گیا ہے بندھن دوسرے اصنلاع پر

ٹھیک بیٹھی ہے۔ اگر صندوق سے ہوا بتدو ج خارج کر دی جائے تو پچکدار بدھن جو شکلیں اختیار کرنی ہیں ان کو معلوم کرو۔ اور جب بدھن صندوق کی تہ کو عین مس کرے تو اُس وقت کرہ برائی کے اندرونی دبیرونی دباؤں میں جو فرق ہوگا اس کو معلوم کرو۔

۶۔ دائری سوراخ کی ایک پچکدار نیلی، مربع سوراخ کی ایک سدا نیلی میں رکھ دی گئی ہے جس میں وہ بغیر تنے ہوئے ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ لیاں لاتما ہی طول کی ہیں۔ اگر نیلیوں کے درمیان ہوا نہ ہو اور کسی دباؤ کی ہوا پچکدار نیلی میں داخل کی جائے تو ثابت کرو کہ یہ دباؤ اُس نسبت کے متناسب ہوگا جو پچکدار نیلی کے اس حصہ کو جو سدا نیلی کو مس کرتا ہے اُس حصہ سے ہے جس کی شکل کا ہے۔

۷۔ ایک طرں جو کسی پتلی سے سے بنایا گیا ہے مخروطی شکل کا ہے اس کا راس نیچے دار اور محور انصافی ہے۔ اس کو مانع سے بھر دیا گیا ہے اور اس کا سدا کر دیا گیا ہے اگر اس کو اپنے محور کے گرد یکساں رفتار سے گھمایا جائے تو کسی نقطہ کے صدر سی تناؤ معلوم کرو۔

۸۔ ایک کر دی پچکدار لغافہ کے گرد اور اس کے اندر ہوا ہے جو کرہ ہوائی کے دباؤ (۳) پر ہے۔ اس کے اندر ہوا کی سدا ہی مقدار داخل کر دی گئی ہے۔ ثابت کرو کہ لغافہ کے کسی نقطہ پر کا تناؤ $\frac{2}{3} (2 - r^2) / 2$ ہو جاتا ہے جہاں ابتدائی اور انتہائی نصف قطر کے ر، ر' تغیر کرتے ہیں۔

۹۔ ایک پچکدار کر دی لغافہ میں جس کا قدرتی نصف قطر $\frac{1}{2}$ ہے ہوا داخل کی گئی ہے جس سے اس کا نصف قطر ہو جاتا ہے پھر اس کو ایک قالمہ میں جس میں سے ہوا خارج کر دی گئی ہے رکھ دیا گیا ہے جس سے اس کا نصف قطر $\frac{1}{2}$ ہو جاتا ہے۔ ہوا کی مقدار معلوم کر دو جو اس میں داخل کی گئی ہے۔ یہ مرض کر لیا جائے کہ تناؤ سطح کے اضافہ کے متناسب ہے۔

۱۰۔ نصف قطر کا ایک پچکدار کر دی لغافہ ہوا سے بھر دیا گیا ہے جس کی تمش (ت) اور دباؤ وہی ہیں جو گرد کی ہوا کے ہیں۔ تناؤ سطح کے اضافہ کے متناسب ہے اور اگر اندرونی ہوا کی مقدار دو چندان کر دی جائے تو نصف قطر $\frac{1}{2}$ ہو جاتا ہے اور پھر اگر اندرونی تمش کو $\frac{1}{2}$ تک بڑا دیا جائے تو نصف قطر $\frac{1}{2}$ ہو جاتا ہے۔ ثابت کرو کہ

$$\frac{(2m-2)(1-2)^2}{(1-2)^2} + 2 = \frac{1}{2}$$

۱۱۔ نصف قسط کے نصف کردی پھیلے کو اس کی کر سے تھا کہ یانی سے بھر دیا گیا ہے۔
تات کر دو کہ لاگہرائی بر صدر تی تہاؤں میں نیست ہوگی

$$r_1 - u_1 r + u_2 r_2 \quad r_2 + u_1 + u_2$$

یہ بھی معلوم کرو کہ افغانی تنازعہ کہاں سے جڑا ہے اور پھلے کے ایک حصہ پر اس کے سفی ہونے کے کیا اسباب ہیں۔

۱۲—ایک نصف کروی تھیلے کا مادہ ایک استوار مستوی سے، جس کی کوریر مادہ دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے اور اس کو اندھا روئیا گیا ہے۔ ثابت کر کہ لاگتھائی ٹریصدری تناؤں میں سے ہوتی

$$U_{r-1} q : U_{r-1} r'$$

۱۳۳۔ نصف قطر کا راس عادات فحاشی کے مانع سے عین بھرا دیا گیا ہے۔
یہ نغاذ ایک خط کہہ کر اُدھسٹاں رادھی رفتار سسر سے گھوم رہا ہے۔ حادثہ کو نظر انداز کر کے
سات کر دو کر دوش کے چور سے رادھی فاعلے ذرہ صدری ستاؤ ذرہ ہیں

۱۔ ت سہ اُج ب ا و اور ۳۔ ت سہ اُج ب ا و

۱۴۔ محدود موتائی کا ایک استخوانی خول ایسی اڑی شے سے پایا گیا ہے جس کا ایک ڈنڈا ایک مربع انچ راس کا بیئر ٹوٹنے کے تاؤء سبب نال سکتا ہے۔ اگر یہ خول ادرونی سیالی دباؤ کے زیر حمل ہو حاستوانہ کو توڑے کے عین ناکافی ہے تو نالت کر دو کہ

۵۔ = تہ لوک $\frac{1}{2}$ جہاں حول کے بیرونی دائرہ کی نصف قطر اور ہا ہیں۔

۱۵۔ ایک مخروط میں درن وارائج ہے۔ اگر کونوں کی سمت میں تمام نقطوں پر مخروط کا ساؤ دہی چڑھتا ہے تو ثابت کرو کہ مانع کی کثافت ، اس کے اوپر اس کے ارتفاع کے مربع کے تناسب معکوس میں ہے۔

۱۶۔ ایک محب امتداد نایذیر لائم لفاذ گردستی سطح کی شکل کا ہے اور اس کے گردتس کا محور انتصابی ہے۔ یہ لفاذ ادر سے آئی داؤ کے زیر عمل ہے۔ ثابت کرو کہ نصف النہاروں کی سمت میں سب سے چورے حصہ یر کا سناؤ اعظم یا اقل ہوگا۔ بموجب اس کے کہ یہ تناؤ نصف النہاروں کے عمود و ارتناؤ سے کم یا زیادہ ہو۔

۱۷۔ قائم مسند یر مخروط کی شکل کا ایک لائم تھیلہ مانع سے عین بھر دیا گیا ہے اور اس کے قاعدے کی کور ایک استوار ستومی کے ساتھ ثبت کر دی گئی ہے۔ قاعدے کے مرکز سے دایع قوتیں مانع پر عمل کرتی ہیں جو ایسے بدلنی ہیں جیسے فاصلہ۔ کسی نقطہ یر صدر می تناؤ معلوم کرو۔

اگر استوار ستومی میں ایک سوراخ کر دیا جائے اور اس میں فشار لگا دیا جائے اور پھر اس فشار یر ایک ضرب لگائی جائے تو کسی نقطہ یر صدر می دیکھا تناؤ معلوم کرو۔
۱۸۔ اگر دند (۱۵۱) میں، ظرف مکانی شکل کا ہو اور اس کے مرکز سے گزرنے والی افقی تراستس کے ہر نقطہ یر صدر می تناؤ مساوی ہوں تو ثابت کرو کہ محور کا طول وتر خاص کا $\frac{1}{2}$ ہوگا۔

۱۹۔ مانع کی کچھ مقدار جو ایک پتلے کر دی خول میں ہے انتصابی قطر کے گرد یکساں نفاذ سے محکوم رہی ہے۔ کسی نقطہ یر صدر می تناؤ معلوم کرو اور گھومنے کی رفتار میں اضافہ کے اثرات کی حاجت کرو۔

۲۰۔ ایک لائم سطح اس قسم کی ہے کہ اس کے کسی نقطہ یر کا تناؤ ہر سمت میں وہی ہوتا ہے اور جس کی شکل مساوات $y = f(x)$ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سطح سیال کے زیر عمل ہے۔ کسی نقطہ یر کے دباؤ کو تناؤ کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو معلوم کرو۔

ثابت کرو کہ یہ نسبت سطح $m = 3$ یا $(2 + \sqrt{2})$ کے ایسے نقاط پر $1:3$ ہے جہاں $2 = m = 3$

۲۱۔ ایک قائم مسند یر اسطوانہ پگھلا رادے سے بنایا گیا ہے اور اس کے سرے استوار ستویوں کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ اس کو سیالی داؤ سے تنایا گیا ہے۔ یہ مانکر کہ نصف النہار می اور دائری تراستوں میں تناؤ ہنگ کے کلیہ (Hooke's law) کے تابع ہیں ایسی مساواتیں معلوم کرو جو اسطوانہ کی اختیار کردہ شکل کو پوری طرح معین

کرنے میں کافی ہوں۔ اگر وہ د مستقل ہو تو ثابت کرو کہ نصف الہیاری معنی ہے

$$۱ + ۱ = \left(\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} \right) \left(\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} \right) - \left(\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} \right) \left(\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} \right) \left(\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} \right)$$

جہاں ابتدائی نصف قطر ۱، لچک کا ایک مقیاس ۱، اور مکمل کے مستقل (ب) ج ہیں۔

۲۲۔ ایک لچکدار چلی جبکہ وہ نئی ہوئی نہ ہو نصف قطر ۱ کے اسطوانے کی معنی شکل اختیار کرتی ہے۔ اگر اس کے سرے ثابت کر دئے جائیں اور اس میں ہوا داخل کی جائے اور پھر اس کے سرے بند کر دئے جائیں تو ثابت کرو کہ محور میں سے گزرنے والی کسی تراش کو محو و کرنے والا معنی مساوات

$$(۱ + ۱) \left(\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} \right) = (۱ - ۱) (۱ - ۱)$$

سے حاصل ہوگا۔ جہاں ف وہ زاویہ ہے جو ماس محور کے ساتھ بناتا ہے۔ محور پر کا عمود ما، بیرونی و اندرونی دباؤں کا فرق د، اور لچک کی شرح ل ہے۔ مستقل ف، ک اور ایک تیسرے مستقل جو مساوات کے مکمل سے حاصل ہو کس طرح معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

۲۳۔ ایک طرف نہیں ملائم اور امتداد پذیر مادہ سے بنایا گیا ہے۔ اس کی شکل ایسی سطح کی ہے جو ایک زنجیر (catenary) کو سکا سکل ک ہے اپنے محور کے گرد گھمانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر محور سے لا فاصلہ بیرونی صدر ہی سن د ت، ت ہوں تو ثابت کرو کہ

$$۲ - ت = ت = ۲ - ت = لا / ک : حسر ۲ لا / ک$$

جبکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ اندرونی و بیرونی دباؤں کا فرق مستقل ہے۔

۲۴۔ اگر ایک ملائم طرف جس لی سکھیں، حطاد ویر کو اپنے فاعدے کے گرد گھمانے سے ہوتی ہے مائع سے عن ہوا ہو جو بیغ کسی بیرونی قوتوں کے عمل کے محور کے گرد یکساں رفتار سے گھوم رہا ہو تو ثابت کرو کہ نصف الہیاری

منغنیوں کی سمت میں اور ان کے علی القوائم سمت میں تاؤں کی نسبت ۲ ۷ ہے۔
یہ مان لیا گیا ہے کہ دباؤ محور پر صفر ہو جانا ہے۔

۲۵۔ ایک کامل طور پر ملائم ظرف کی تکنین خطہ دیر کو اپنے محور کے گرد گھلے سے ہوئی ہے اس کا محور انقباضی ہے۔ اگر طر یاتی سے تقریباً بھرا ہوا ہو تو مات کر کہ ایسے نقطہ پر کا افقی تناؤ جہاں ماسی مستوی، افق کے ساتھ ۲۵ ماسیلاں

رکھا ہے ریر ترین نقطہ پر کے تناؤ کا ۲۱ (۲۳ - ۲۳) ہے۔ ظرف بالکل

بھرا ہوا کیوں نہ ہونا چاہیے۔

۲۶۔ مانع کے ۲۱ ایک طرف اس طرح بنایا گیا ہے۔ ایک بے وزن تختی کے ساتھ، کیڑے کا ایک ملائم ٹکڑا جس کی شکل نیم قطر ۱ کے کرہ کے منطبق کی ہے لگا دیا گیا ہے اس کٹے کی ایک مستوی تراش تختی پر ٹھیک آ جاتی ہے اور دوسری کرہ کے مرکز میں تھے گزرتی ہے۔ اس ظرف کو بڑی تراش کی کور سے تمام کر غیر متجانس مانع سے عہد دیا گیا ہے جس کی کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے ی (۱-۲) جہاں ی گہرائی ہے۔ صدری تناؤ کی نسبت معلوم کرو۔

۲۷۔ ایک استاد نا پذیر ملائم لفاذ کی شکل گردستی مکانی منا (دو تر خاص م ۱) کی ہے۔ یہ لفاذ ک نصف قطر کے ایک ثابت افقی دائرہ سے لٹک رہا ہے۔ اس میں کثافت کا سیال ہے جو فافنے کے انتصابی محور کے گرد زاویائی رفتار

(ج/۲ ب) سے گھوم رہا ہے۔ ثابت کر د کہ لفاذ کے کسی نقطہ پر محور سے

ر فاصلہ پر افقی تناؤ ہوگا

$$\frac{\left\{ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right\}}{\frac{1}{2}(a + b)} \left\{ k^2 (r^2 + a^2) - (r^2 + b^2) \right\}$$

۲۸۔ ایک ملائم جلی گردشی سطح کی شکل کی ہے نصف الہاری منغنی اس طرح کا ہے کہ کسی نقطہ پر کا عماد، نصف قطر انحناء کا ن گنا ہے۔ جلی کو مانع سے عین بھر دیا


گیا ہے۔ پورا نظام ٹھوس جسم کی طرح محور کے گرد یکساں راوی رفتار سے گھوم رہا ہے
اگر مان کر دنیٰ بیرونی تو ہیں مثل نہ کریں اور محور پر دائرہ سم پر دو تار است کو
کسی نقطہ پر صدی تناؤ کی نسبت ۳ - ن - ۱ ہوگی۔

باب

(۱۶۰)

استوار یا کچھدار پترا سیالی دباؤ کے زیر عمل

۱۵۶۔ اب ہم اسطوانی پترے کی صورت پر غور کرتے ہیں جو سیالی دباؤ کے زیر عمل ہے اس طرح کہ کسی کمون کے ہر نقطہ پر یہ دباؤ وہی ہے۔ اگر کمونوں کے علی القوام ایک عمودی تراش افقی لی جائے تو ان میں سے گزرنے والے اور کاغذ کی سطح پر عمود وار کمون سے جو دو حصے جدا ہونگے ان کے درمیان کا زور ایک مساوی قوت، ایک جڑی قوت، اور ایک جھٹ پھٹل ہو گا۔



کمون کا اکائی طول لیکر ہم ان مقداروں کو ت، لی، ہگ سے تعبیر کریں گے۔ یہ ذہن نشین رہے کہ عنصر ن ت کے نقطہ ن پر عمل کرنے والے زور ت، لی، ہگ ہیں اور مخالف سمتوں میں عنصر ن ت کے

جہاں نقطہ نیر کا لطف فط انخدا ہے۔
اس صورت میں تیسری مساوات ہو جائیگی

$$\frac{ل}{ر} = \frac{ع}{ر} - \frac{فر}{فرقہ}$$

اور اس لئے پہلی مساوات سے

$$\frac{مرت}{فرقہ} = \frac{ع}{ر} - \frac{فر}{فرقہ}$$

اس طرح

سک۔ ع، جہاں ک مستقل ہے۔

دوسری مساوات میں ان قیمتوں کو مدرج کرنے سے

$$\frac{ح}{ر} - \frac{فر}{فرقہ} = \frac{ع}{ر} - \frac{فر}{فرقہ} + ک = \frac{ع}{ر} = در$$

اس مساوات سے پتہ چلے گی اختیار کردہ شکل کا تعین ہو جائے گا
جبکہ دبا کا قانون دیکھا رہا اور دبا کا قانون معلوم ہو جائے گا جبکہ اختیار کردہ
شکل دی گئی ہو۔

ایسی صورت میں جبکہ مستقل ہو یا ر کا ایک دیا ہوا تفاعل ہو تو

$$\left(\frac{فر}{فرقہ} \right) = می رکھنے مساوات بالا کا پہلا تکمیل حاصل ہو سکتا ہے اور اس طرح ہم$$

فرقہ کو ر کی رقوم میں معلوم کر لیتے ہیں۔

۱۵۸ — اگر قدرتنا پتہ چلے ہوئی اسطوائی شکل کا ہو اور اس کو قدرتی شکل سے
جھکایا جائے تو جھٹ گ جو چھکاؤ کا جھٹ ہے انخدا کے تغیر کے متناسب
ہوگا۔ اس طرح اگر ن پر صدری نصف قطر انخدا ہو تو

$$ک = ع \left(\frac{۱}{ر} - \frac{۱}{ر} \right)$$

اس مساوات کی صداقت اس معروضہ پر مبنی ہے کہ اوسط ایشہ کا طول کمونوں کے علی انصوائم غیر متغیر رہتا ہے۔ ہم نے یہ بھی مان لیا ہے کہ یہ دینی سیالی دباؤ کے وجود سے مساوات پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔

۱۵۹۔ ناقصی اسطوان۔ ان مساواتوں کے استعمال کی توضیح کے لئے

ہم ناقصی اسطوان کی صورت پر غور کرتے ہیں جو کسی پتلی اسوارٹھ سے بنا ہوا ہے سزوں پر مبدعے اور ہوا سے بھرا ہوا ہے جس کا دباؤ بیرونی ہوا کے دباؤ سے لغد و کے زیادہ ہے۔

لی کو سا قط کرنے سے حاصل ہوگا

$$\frac{F_z}{F_z} + t = \text{در}$$

مزدوج محور کے ایک سرے سے ص اور ذہ کو ناپنے سے

$$= \frac{J_z}{I_z} - \frac{(I_z + J_z)}{I_z}$$

اور مبدلوں کو بدلنے کے طریقہ سے یہ معلوم ہوگا کہ

$$t = d(I_z + J_z) - (I_z + J_z) = I_z + J_z$$

$$L = (J_z - I_z) - d(I_z + J_z) - (I_z + J_z)$$

تشاکل کی رو سے اور نیز عمل و رد عمل کے مساوی ہونے کے کلیہ کو استعمال کرنے سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ او جین (Apes) پر لی صفر ہو جاتا ہے یعنی جبکہ ذہ = ۰ اور جبکہ ذہ = ۱۱۔

پس یہ معلوم ہوگا کہ ۱ = ۰ اور ۰ = ۱ اور اس لئے

$$ت = \frac{د ا ب}{ج د} \text{ اور } ل = \frac{د ا - ب ا}{ج د} \text{ جب } د \text{ حجم } ف$$

$$\text{نیر} = \frac{ف ر گ}{ف ر د} = \frac{ل}{ر} = \frac{د (ا - ب ا)}{د (ا جب ا ف + ب ا حجم ا ف)} \text{ جب } د \text{ حجم } ف$$


$$\text{گ} = \frac{۱}{۲} د (ا جب ا ف + ب ا حجم ا ف + \frac{ب ا}{۲} \text{ مستقل})$$

$$= \frac{۱}{۲} د (ج د + \text{مستقل})$$

$$\text{اس طرح گ - گ} = \frac{۱}{۲} د (ج د - ج د)$$

۱۴۰ - ثوبیہ -

ہم نے دفعہ (۱۳۴) میں یہ بتا دیا ہے کہ ثوبیہ اور لدنیہ متماثلتا وہی منحنی ہیں۔
اگر ایک پتلی بھگدار تختی کے مقابل کے کناروں کو ایک دوسرے کی طرف
کھینچ کر ایک پت یا تنی ہوئی چادر کے دریعہ ملا دیا جائے تو منحنی پیدا شدہ دفعہ
(۱۳۳) کا ثوبیہ ہوگا۔



اس صورت میں د = ۰ اور مشق کے طور پر یہ دیکھ لینا مفید ہوگا کہ دفعہ (۱۵۶)
کی مساوات کے تکمیل سے ثوبیہ کی ذاتی مساوات حاصل ہوتی ہے۔
اگر ملائے والی چادر کا تناؤ ق ہو اور ن پر کا تناؤ اور حزی قوت
علی الترتیب ت اور ل ہوں تو پترے کے حصہ ن ب کے توازن پر
غور کرنے سے یہ مساواتیں حاصل ہوتی ہیں

ت = - ق جم ف، ل = - ق جب ف

۱۶۱۔ ایک پتلا پچکدار پتلا و متوازی ثابت ملاخوں پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر دباؤ ڈالکر اس کو ثوبیہ کی شکل میں تبدیل کرنا مقصود ہے۔ دباؤ کا قانون معلوم کرو۔
مقادیر ت اور گ دونوں ان خطوں پر صفر ہو جائے ہیں جس ملاخوں کو مس کرتے ہیں۔ اور اس لئے ان خطوں پر نصف قطر انخلا متناہی ہوگا۔
پس مساوات

$$ت = ک - \frac{ع}{\frac{۲}{۲}}$$

میں ہم دیکھتے ہیں کہ ک = اور اس لئے

$$ت = - \frac{ع}{\frac{۲}{۲}}$$

ثوبیہ کی ذاتی مساوات ہے

$$ر = م = (جم ف - جم ع) \frac{۱}{۲}$$

اور دباؤ و مساوات، بن سے حاصل ہوتا ہے

$$در = \frac{ع}{\frac{۳}{۲}} - \frac{ع}{\frac{۳}{۲}} - \frac{ع}{\frac{۳}{۲}} - \frac{ع}{\frac{۳}{۲}}$$

عمل انداز سے یہ معلوم ہوگا کہ (۱۶۲)

$$در = \frac{ع جم ع}{\frac{۲}{۲}}$$

اب ثوبیہ میں دفعہ (۱۳۳)

$$ر = \frac{م}{ن}$$

$$اس طرح د = ن ل \times \frac{ع جم ع}{م}$$

اور اس لئے مطلوبہ دباؤ، ث کثافت کے مانع کو ڈالنے سے حاصل ہو سکتا ہے

ایسا کہ $\text{ح جم عہ} = \text{ج ث م}^۲$

پس توبیہ کی شکل مساوات بالا سے حاصل شدہ کثافت کے مانع کو سلاخوں کی ہمارے سطح تک ڈالنے سے برقرار رکھی جاسکتی ہے۔

مزید براں $\text{ل} = \frac{\text{ج}}{\text{ر}} \times \frac{\text{فرق}}{\text{فرق}} = \frac{\text{ج}}{\text{ر}} \times \frac{\text{فرق}}{\text{فرق}}$ جب ف

لی = ج ث م^۲ × جب ف قطعہ جہاں بائیں طرف کے حصہ کی دائیں طرف کے حصہ پر جی قوت لی ہے جو نقطہ ثانی پر اند کی طرف عمل کرتی ہے۔ اس طرح لی بائیں طرف کے حصہ پر کے عمل کو تعبیر کرتا ہے۔ اس لئے ب اور ج یر

لی = ج ث م^۲ مسد

اس آخری نتیجہ کی جانچ اس امر کے معائنہ سے ہو سکتی ہے کہ سلاخوں کے تعامل مانع کے وزن کو تھامتے ہیں۔

اس طرح

۲- $\text{ج ث م} = ۲ \times \text{ج ث م} \times \text{فرق}$

$\text{ج ث م} = ۲ \times \text{ج ث م} \times \frac{\text{فرق}}{\text{فرق}}$

$\text{ج ث م} = ۲ \times \text{ج ث م} \times \frac{\text{فرق}}{\text{فرق}}$ جب ع

۱۶۲۔ اگر ایک دئے ہوئے پترے کو موڑنے سے لدنیہ حاصل کیا جائے اور سرے پر گئے کوئوں کو ایک ہی افقی مستوی میں ثابت کر دیا جائے تو ب

مس = مک مس نہ ہے۔ اس پترے کے مقعر حصہ پر ہوا کا دباؤ بیرونی ہوا کے دباؤ سے عدد د کے زیادہ ہے اور پترے زنجیرہ کے محور کے متوازی دو مساوی قوتوں سے تھا گیا ہے۔ یہ قوتیں راس سے زاویائی فاصلہ پر عمل کرتی ہیں۔ ثابت کرو کہ

$$\frac{ن}{دک} = \text{جم ذ قطع} - ۱ + د - د لوک مس \left(\frac{ن}{د} + \frac{ن}{د} \right)$$

$$\frac{لی}{دک} = \text{جب ذ قطع} - مس ذ - \text{جم ذ لوک مس} \left(\frac{ن}{د} + \frac{ن}{د} \right)$$

$$\frac{مگ}{دک} = \text{قط ذ قطع} - \frac{۱}{د} \text{قط ذ} - \frac{۱}{د} \left\{ \text{لوک مس} \left(\frac{ن}{د} + \frac{ن}{د} \right) \right\} + ک$$

$$\text{جہاں } ک = \frac{۱}{د} \left\{ \text{لوک مس} \left(\frac{ن}{د} + \frac{ن}{د} \right) \right\} - \frac{۱}{د} \text{قط ذ}$$

نیز ثابت کرو کہ تبا سے ۱۰ لی ہر قوت

$$= \text{دک لوک مس} \left(\frac{ن}{د} + \frac{ن}{د} \right)$$

۵۔ ایک مستوی لچکدار پترے دو متوازی افقی ڈنڈوں پر ٹکا ہوا ہے اور برکی ہوائے متقل دباؤ سے اس کو ڈنڈوں کے درمیان پیچے کی طرف موڑا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ نصف قطر احنیٰ اور انصراف مساوات

$$\left(\frac{فر}{ذد} \right) = ک - ۱ - \frac{۲}{د} - \frac{۲۲}{ع} و$$

سے مربوط ہونگے۔

۶۔ دباؤ کا کلمہ معلوم کرو جو اس پترے کو زنجیرہ کی شکل میں جھکا دے۔

۷۔ اگر اسی پترے کو ایک مکانی اسطوانے کی شکل میں جھکا دیا جائے تو ثابت کرو کہ راس سے زاویائی انصراف فرسیالی دباؤ ایسے بدلتا ہے جیسے

$$\text{جم ذ} (۷ \text{ جم ذ} - ۶)$$

(۱۶۶)

باب

قوت شعری

۱۶۳۔۔۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ اگر چھوٹے سوراخ کی ایک شیشہ کی نلی پانی میں ڈبو دی جائے تو نلی کے اندر پانی کی سطح بیرونی پانی کی سطح سے اونچی ہو جاتی ہے۔

یہ بات بھی اتنی ہی مشہور ہے کہ اگر نلی پارہ میں ڈبو دی جائے تو اندرونی پارہ کی سطح بیرونی پارہ کی سطح سے بھی ہوگی۔ اگر شیشہ کے آبخورے میں پانی ہو تو اس کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ خط تماس پر رائج کی سطح کا انحناء پر دار ہے اور یہ شیشہ کو ایک خاص نادیہ پر جمی ہوئی نظر آتی ہے۔


اگر آبخورے کو احتیاط سے پورا بھر دیا جائے تو پانی کی سطح آبخورے کی جوئی یا سر کے مستوی کے اوپر تک چڑھ جائے گی اور پانی سرے کے گول کنارے کے اوپر ابھرا ہوا دکھائی دیگا۔

اگر میز پر پانی گر جائے تو اس کے حدود معین ہوتے ہیں اور منحنی کنارے میز سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔

ان واقعات اور ان کے مثل دوسرے اور بہت سے واقعات کی توجیہ ان قوتوں کے وجود سے ہوتی ہے جو سیالوں کے خود سالمات کے درمیان اور نیز ٹھوس اور سیالوں کے سالمات کے درمیان عمل کرتی ہیں جیکہ ٹھوس اور سیال ایک دوسرے سے تماس رکھتے ہوں۔ کسی خاص

سالمہ کی قوت کے عمل کا میدان لا انتہا بھوٹا ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ سالمی قوتیں بہت چھوٹے چھوٹے فاصلوں پر عمل کرتی ہیں، اس لئے جہاں تک کہ سالمی قوتوں کا تعلق ہے متجانس جسم کا ہر عنصر بشرطیکہ وہ جسم کو محدود کرنے والی سطح کے نزدیک نہ ہو ایک ہی قسم کے حالات کے تحت ہو گا۔ لیکن خود سطح پر کسی خاص سالمہ کا کرہ عمل نامکمل ہو گا اور یہ سالمہ محدود کرنے والی سطح کے بیرونی جانب جس قسم کے مادہ کے سالمات ہوں ان کے میدان عمل میں آ جائیگا۔

نیز اگر ہم یہ مان لیں کہ میدان عمل کے خطی ابعاد بمقابلہ سطح کے نصف قطر اختلا کے لا انتہا چھوٹے ہیں تو جہاں تک سالمی قوتوں کا تعلق ہے دو متجانس اشیاء کی سطح فاصل کے تمام حصے ایک ہی قسم کے حالات کے تحت ہونگے۔ سطحی توانائی یا ہتھوہ



جو سالمی قوتوں کے باعث پیدا ہوئی وہ سطح کے قریب کے ساتھ ایک مستقل نسبت رکھنے والی مستقل تناسب رکھنے والی اشیاء کی نوعیت پر منحصر ہو گا۔
۴۶ — ایک متجانس سطح ایک طرف میں جائے ارض کے زیر عمل ساکن ہے اس صورت پر اصول توانائی کا استعمال ہے۔
توازن کی صورت میں توانائی یا ہتھوہ کی قیمت ساکن یا اچل ہونی چاہیئے۔

۵۰ میدان میں شعری قوتیں عمل کرتی ہیں لا انتہا چھوٹا ہوتا ہے (Quineke) نے ایک سسٹم کی بنیاد پر چارہ کی ۵۴۲ ... والی میٹر (مثالیہ تھا یا نی) کے تحت ہر ایک اور پھر کسی چارہ کی نی میں پانی ڈال کر تجربہ کیا۔ ہر صورت میں ایک ہی قسم کے نتائج متاثر ہوتے ہیں۔
Pogg Ann CXXXIX (1870) p 1

یہ توانائی باقیہ چاہے حصول پر مشتمل ہوگی یعنی تھلی توانائی ج تا کر کے فراموشی
جہاں عنصر فراموشی کا ارتقاء ہی ہے، اور فاصلہ سطحوں کی توانائیاں (ع)
تابع اور ہوا ہے، مانع اور ظرف (ج) ہوا اور ظرف کو مدد کرتی ہیں۔
پس یہ ضروری ہے کہ

ج تا کر کے فراموشی، فراموشی، افس + ب میں + ج میں
ساکن ہو جہاں میں، میں، میں سے اترتے سطحیں (ع) (ج) (ب) (ا) (ب)
ج سے ا کی توانائیاں کی اگلی رسم تعبیر ہوتی ہیں، جس شرط کے تابع کہ
تھم کر کے فراموشی مستقل رہتا ہے۔

تابع اور ہوا کی درمیانی سطح فاصلہ میں، کے خفیہ ساؤ کی صورت میں اگر سطح
میں، کہ ہوا کے عنصر کو سطح تعبیر کرے جو میں، کے قدیم اور مدد محلوں میں
اسکے متناظر عناصر کے درمیان واقع ہے تو پہلی رقم کا تہہ، ج تا کر کے فراموشی میں،
ہوگا۔

اولاً فرض کر کے مانے جس خط پر ظرف کو مس کرنا سے وہ نہیں بدلتا اس صورت
میں میں، اور میں مستقل رہیں گے اور میں، بدلتے ہو جائے گا۔ میں کے
ایک ایسے عنصر فراموشی، فراموشی، پر غور کرو جو خطوط انحناء سے محدود ہے۔ اس عنصر کے

لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ان کی کمات، سطح کے لا انتہا، ایک سالمی عمل کی وجہ سے بدلتی ہو لیکن چونکہ
متغیر کمات کی وہ کی توانائی بمقابلہ سطح کے لا انتہا چھوٹی ہوگی اس لئے استدلال کو متاثر
کئے بغیر اس تعبیر کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

حدود میں سے گزرنے والے عماد سطح سے کو غصہ قریس، قریس میں قطع کرینگے اور اگر سہا، سہا صدری نصف قطر اخنایوں تو

$$\text{قریس} = (1 - \frac{\text{مفع} }{\text{سہا}}) \text{قریس} = (1 - \frac{\text{مفع} }{\text{سہا}}) \text{قریس}$$

$$(128) \quad \text{قریس} - \text{قریس} = \text{قریس} - \text{قریس} = \text{قریس} - \text{قریس} = (1 - \frac{1}{\text{سہا}} + \frac{1}{\text{سہا}}) \text{مفع} \text{قریس}$$

$$\text{مفع} \text{قریس} = (1 - \frac{1}{\text{سہا}} + \frac{1}{\text{سہا}}) \text{مفع} \times \text{قریس}$$


لیکن یہیں مطلوب ہے

$$\text{ج ث لری مفع} \text{قریس} + \text{مفع} \text{قریس} =$$

$$\text{یا یہ کہ لری ج ث ی} = (1 - \frac{1}{\text{سہا}} + \frac{1}{\text{سہا}}) \text{مفع} \text{قریس} =$$

اس مشروط کثرت کے حجم مستقل رہتا ہے یعنی لری مفع قریس = پس

$$\text{لری ج ث ی} = (1 - \frac{1}{\text{سہا}} + \frac{1}{\text{سہا}}) \text{مفع} \text{قریس} =$$



جہاں ن مستقل اور مفع اختیاری ہے

$$\text{ج ث ی} = (1 - \frac{1}{\text{سہا}} + \frac{1}{\text{سہا}}) \text{مفع} \text{قریس}$$

$$\text{ج ث ی} = (1 - \frac{1}{\text{سہا}} + \frac{1}{\text{سہا}}) \text{مفع} \text{قریس}$$

$$\text{یعنی} \quad \text{ج ث ی} = (1 - \frac{1}{\text{سہا}} + \frac{1}{\text{سہا}}) \text{مفع} \text{قریس}$$

لے مستقل کا π کے مساوی ہونا اس طرح ظاہر ہے کہ اگر سطحی ذراتی لا صفر ہوتی تو تابع کے اندر کا داؤ داخل اور ہوا کی سطح فاصل کے نزدیک کرہ ہوائی کے داؤ کے مساوی ہوتا۔

جہاں کرہ ہوائی کا دباؤ π اور سطح کی سطح کے عین اندر کا دباؤ دے اس سے معلوم ہوا کہ اثر وہی ہے گویا سطح تناؤ کی حالت میں ہے اس طور پر کہ کسی نقطہ پر کا تناؤ مستقل اور توانائی کی اکائی رقبہ کے مساوی ہے۔

ناساً فرض کر دو کہ سطح اور طرف کا سطح تماس s سے s تک ہٹ جاتا ہے۔ اگر ہم خط s کے تمام نقطوں

پر سطح s کے عماد کھینچیں تو یہ

عماد سطح s کو خط θ پر قطع کرے

اور سطح s دو حصوں پر مستقل خیال

کیجا سکے گی۔ ایک s جو خط θ

سے محدود ہے اور دوسرا s جو خط θ

اور s کے درمیان ہے۔

گذشتہ کی طرح ہمیں حاصل ہوگا

$$ص - س = \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \text{مفع فرس}$$

(۱۶۹) اور اگر مفع L سے عناصر فرس، فرس کا درمیانی ماحصلہ تقسیم ہو تو $ص$ کو سطح s پر طرف کی سطح کے عناصر مفع L فرس کا اظہار تصور کیا جاسکتا ہے پس اگر سطح s اور سطح s کے عمادوں کا درمیانی زاویہ آ ہو تو

$$ص = \text{جرم آ مفع ل فرس}$$

$$\text{فرس مفع س} = \text{مفع س} = \text{جرم ل فرس}$$

اب چونکہ توانائی بالقوہ ساکن ہے اس لئے

$$\text{مفع} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \text{فرس فرما فری} + \text{اس} + \text{ب س} + \text{ج س} = 0$$

اس شرط کے ماتحت کہ کیت مستقل ہے۔ یا


ان کلیوں کو مان کر ہم قوت شعری اور مانع جھیلوں سے متعلق مختلف مظاہر کی توجہ کر سکتے ہیں۔

۱۶۶۔ دو تختیوں کے درمیان مانع کا چڑھاؤ۔

اگر سطحی تناؤ مت ہو اور مستقل راویہ عہ ہو جبہ مانع کی سطح ہر سطحی سے ملتی ہے اور جس کو ہم قوت شعری کا راویہ کہیں گے اور وسطیہ ڈھاؤٹ اور تختیوں کا درمیانی فاصلہ د ہو تو اکائی عرض کے مانع کے توازن پر حوز کرنے سے

۲ حجم عہ = ج ڈف د

پس تختیوں کے درمیانی فاصلے کو گھٹانے سے مانع کا چڑھاؤ بڑھتا ہے۔



یہ مشاہدہ طلب ہے کہ کسی نقطہ ق پر کا دباؤ والی پر کے دباؤ سے بقدر

ج ث × ق ل کے کم ہے

اور $\pi = \text{ج ث} \times \text{ق ل}$

اب چونکہ ن پر کہ جوائی کا دباؤ برونی سطح آب پر کے دباؤ کے تقابلاً مساوی ہے اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عنصر ن ل کے وزن کو اس کے اوپر کے حدود کے سطحی تناؤں کا حاصل تھا ہے ہوے ہے۔

۱۶۷۔ دائری نلی میں مانع کا چڑھاؤ۔

اس صورت میں مانع کے ستون کو وہ تناؤ تھا میگا جو ستون کے اوپر کے
حدود کے گرد ہے اور اس لئے اگر اندرونی نصف قطر ہو تو

$$۲۲ رت جم ع = ج ث ۲ ر ف$$

$$۲ ت جم ع = ج ث ر ف$$

یا

اس طور پر تھے ہوئے ستون کے کسی نقطہ پر کا دباؤ چونکہ کرہ ہوائی
کے دباؤ سے کم ہو گا اس لئے اگر ستون کافی طور پر بلند ہو تو یہ دباؤ تناؤ کی
حالت میں ضم ہو جائے گا مگر پھر بھی سیالی دباؤ کے اس کلیہ کی پابندی
کرے گا کہ ہر سمت میں دباؤ مساوی ہوتا ہے۔


یہ مشاہدہ طلب ہے کہ توانائی بالقوہ حوسنوں کے صعود کی وجہ سے پیدا ہوتی
ہے نصف قطر پر منحصر نہیں ہوتی۔

(۱۶۱)

۱۶۸۔ شعاری تختی۔ شعاری منحنی وہ شکل ہے جو مانع انتصابی دیوار کے ساتھ

تماس میں اختیار کرتا ہے۔

ہم ایسی صورت پر غور کریں گے جس میں مانع اور دیوار کا زاویہ تماس حادہ
ہو مثلاً جب پانی سیشے کی ایک انتصابی تختی کے ساتھ تماس رکھتا ہے۔



اگر انتصابی دیوار و ف ہوا یعنی کی درستی سطح و ان میں سے گزرنے والی دیوار کے عمود و ارتعاش کا نصف قطر اختیار اور سطح بننا و تہ ہو تو دفعہ (۱۴۴) کی مساوات (۱) سے

$$\frac{ت}{ر} = ۵ - \pi = ج ث ما$$

س ہم ت = ج ث ک ۲ رکھے سے

$$\frac{۲}{م} ک = ر ما$$

اور دفعہ (۱۳۵) کی شکل کو انا دیے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شعاری معنی لرنیہ کی ایک خاص صورت ہے۔

خاص صورت اس لئے ہے کہ ولایتی کاماس ہے، پس فرما/ فرلا = ۰۔ جبکہ ما = ۰۔

اور اس طرح کارٹیری مساوات حاصل ہو سکتی ہے شکل سے ظاہر ہے کہ فرما/ فرلا = ۰۔ (۱۴۴)

۲/۳ + ذکا کاماس ہے منفی ہے اور بعد ازاں گھٹتا ہے اس لئے نتیجہ نکلتا ہے کہ فرما/ فرلا منفی ہے اور مساوات ہم ر ما = ک ۲ ہو جاتی ہے

$$\frac{فرما}{فرلا} = \left[۱ + \left(\frac{فرما}{فرلا} \right)^۲ \right]^{\frac{۳}{۲}} = \frac{۲}{م} ک$$

فرلا کی بجائے ع فرلا رکھ کر مکمل کرنے سے [ع = فرلا]

$$\frac{۲}{م} ک = \frac{۱}{۴(۲۶+۱)} = ۱ - \frac{۲}{م} ک اور : \frac{فرلا}{فرلا} = \frac{۲}{م} ک - \frac{۲}{م} ک$$

اب جو کہ کاماس انتصابی ہوتا ہے جبکہ ما = ۲۶ = ک اور چونکہ منفی،

انتصابی مستوی کو حادہ راویہ پلتا ہے اس لئے تمام نقاط زیر بحث پر ما = ۲۶، ک سے کم ہوگا اور

$$\therefore \frac{\text{فرلا} - ۲\text{ک}}{\text{فرلا} - ۲\text{ک} - ۲\text{ما}} =$$

اس مساوات کے مکمل سے اور مبداء کو ایک نئے مقام پر لینے سے اس طرح
پُرکلا =۔ جبکہ ما = ک، حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{لا} + \text{ما} - ۲\text{ک}}{\text{ک} + \text{ما} - ۲\text{ک} - ۲\text{ما}} = \frac{\text{ک}}{۲}$$

$$\text{یا } \frac{\text{ک}}{۲} = \text{قطر} \left\{ \frac{\text{لا} + \text{ما} - ۲\text{ک}}{\text{ک} + \text{ما} - ۲\text{ک} - ۲\text{ما}} \right\} \quad [\text{Sech}]$$

اگر ما =۔ تو لا، لامتناہی ہوتا ہے اور دلف (۱۳۵) کی شکل لینے سے لہذا
شعاری منحنی کے مائل ہو جاتا ہے جبکہ ب ج، ب اور ج پر ماس ہو لیکن یہ
اُسی صورت میں ممکن ہے جبکہ طول بہت بڑا ہوا۔
اگر عمودہ زاویہ ہو جس پر مانع دیوار سے ملتا ہے تو ہم فرلا کی بجائے
معمورہ رکھنے سے ارتفاع و ف حاصل کر سکتے ہیں اس طرح

$$\frac{\text{ک}}{۲} = \text{قمر مد}$$

اور $\therefore$ و ف = ک جب $\left(\frac{۱۱}{۲} - \frac{۱۱}{۲} \right)$

ایسے مانع کی صورت میں جس کے لئے زاویہ تماس منفرج ہو (مثلاً
پارہ) یہ بہتر ہوگا کہ ما کو بیچ وارنا پا جائے۔

۱۶۶۔ ذاتی مساوات حاصل کرنے کے لئے قوس کو ف سے ناچو اور
الضراف ذ کو ف سے۔ تو

$$\frac{\text{ک}}{۲} - \frac{\text{فر}}{\text{فرذ}} = \frac{\text{فرلا}}{\text{فرذ}} = \text{رجم ذ}$$

اس صورت میں محور و ما کو تختوں کے درمیانی فاصلے کے وسط میں اور مبداء و کو مانع کی قدرتی سطح میں لینا اور انصراف فہ کو اپر کے حماس سے اپنا سہولت پیدا کرے گا۔ (۱۰۴)

گذشتہ صورت کی طرح

$$\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳}$$

اور

$$\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳} \left\{ ۱ + \left(\frac{۲}{۳} \right)^۲ \right\} = \frac{۲}{۳}$$

اس لئے حاصل ہوگا

$$\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳} \left\{ ۱ + \left(\frac{۲}{۳} \right)^۲ \right\} = \frac{۲}{۳}$$


جم فہ جہاں مستقل ہے۔

اس طرح م۔ جم فہ مثبت ہونا چاہیئے اور اسلئے م < ۱

نیز

$$\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳}$$

$$\frac{۱}{۲} = \frac{۲}{۳}$$



فہم صہ = ۲ع = فہم سم ، اور اس لئے

$$نمہ = سم = سم = سم [سم = سم]$$

$$اور و = فہم (ع + سم)$$

$$نیز \frac{فرلا}{فرس} = جمفہ = و + \frac{۱}{۴} ع$$

$$\therefore \frac{۲۲}{۲۲} \frac{فرلا}{فرع} = فہم (ع + سم) + \frac{۱}{۴} ع$$

$$\therefore \frac{۲۲}{۲۲} لاک + مستقل = طا (ع + سم) + \frac{۱}{۴} ع$$

$$اور لا = جبکہ ع = پس$$

$$\frac{۲۲}{۲۲} لاک = \frac{۱}{۴} ع - طا (ع + سم) + طاسم \dots (۱)$$

$$نیز ۲ لاک = م - ی = ع - و$$

$$یعنی ۲ لاک = ع - فہم (ع + سم) \dots (۲)$$

حل کو مکمل کرنے کے لئے اگر تخمینوں کے درمیان فاصلہ ۱۲ ہو تو لا = ۱ کے جواب میں ع کی قیمت اس مساوات سے حاصل ہوگی

$$جب ع = ی = فہم (ع + سم) + م/۳$$

$$اور چونکہ \frac{فہم (ع + سم) + ع - (ع - ۲ع) (ع - ۲ع - ع)}{فہم - ع - ع}$$

$$\therefore جب ع = ۱ + \frac{(۱ - م) ۲}{فہم - ع - ۱ + م/۳}$$

لے طا = ۵ (Weierstrass' Zetafunction)

$$\text{یعنی فہد } ۶ = \frac{\text{مر (۵ + جب عد) } ۳ - (۱ + جب عد)}{۳ (۱ - جب عد)}$$

مزہ براں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ربط (۳) کی جہ سے ربط (۲) اس شکل میں لکھا جاسکتا ہے

$$۲ \text{ تا کرک } ۱ = \text{مر} - (۱ - \frac{\text{فہد } ۶ = \text{عہ}}{\text{فہد } ۶ = \text{عہ}})$$

یہ کہ نقاط اور ب کے ارتفاع علی المرتبہ تا کرک ۱ = مر - ۱

اور مر جب عد سے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۷۱ - دائری ٹلی - انتصابی دائری ٹلی کے اندہ فی مان کی سطح کی

شکل کے لئے تفرقی مساوات حاصل کرنا جبکہ فی مان میں جزء حرق ہو۔

۱۷۲ (۱۷۱) کی شکل کو سطح کی نصف النہاری تراش کر دیکھیں۔ سے فہد ۱۶۴ (۱۷۲) سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{۱}{ر} + \frac{۱}{ر} = \frac{\text{ج ثا}}{\text{ت}} = \frac{۳۴}{۲۰}$$

جہاں کہ ہوائی کا دباؤ مانع کی سطح کے سین نیچے راع کے دباؤ سے بقدر ج ثا کے بڑا ہے۔

اب چونکہ ر = لاقم فہد ۱۶۴ ہیں مساوات

$$\frac{۳۴}{۲۰} = \frac{\frac{\text{فہد}}{\text{فہد}}}{\frac{۱}{۲} \left\{ ۲ \left(\frac{\text{فہد}}{\text{فہد}} \right) + ۱ \right\}} + \frac{۱}{۲} + \frac{\frac{\text{فہد}}{\text{فہد}}}{\frac{۱}{۲} \left\{ ۲ \left(\frac{\text{فہد}}{\text{فہد}} \right) + ۱ \right\}}$$

حاصل ہوتی ہے جو شکل

$$\frac{۳۴}{۲۰} = \frac{\frac{\text{فہد}}{\text{فہد}}}{\frac{۱}{۲} \left\{ ۲ \left(\frac{\text{فہد}}{\text{فہد}} \right) + ۱ \right\}} + \frac{\text{فہد}}{\text{فہد}}$$

میں لکھی جاسکتی ہے۔

نیز اگر نلی کا اندرونی نصف قطر ρ ہو اور مائع نلی کی سطح کو جس حادہ زاویہ پر ملتا ہے وہ θ ہو تو

$$\frac{F}{A} = \frac{2\sigma \cos \theta}{r} \quad \text{جبکہ } \rho = r$$

اگر زاویہ تماس منفی ہو تو مائع نلی میں نیچے دبا ہوا ہوگا اور اگر ہم ماکو نیچے دار ناپیں تو مائع کی سطح کے عین نیچے اس کا دباؤ گڑھ ہوائی کے دباؤ سے بقدر ج ث ماکے بڑا ہوگا۔

زیر بحث صورت چونکہ بارپہا کے اندرونی پارہ کی آزاد سطح پر بھی مشتمل ہے اس لئے اس مضمون برکائی تحت تحقیق ہونی رہی ہے چنانچہ نصف النہاری منحنی کی تقریبی مساوات کا حل (Lohnstein) نے ایک سلسلہ کی شکل میں حاصل کیا جو مستحق رہتا ہے جب تک کہ منحنی کا تماس انتصافی نہیں ہو جاتا۔ (C. Rung) نے تقریبی مساواتوں کو حل کرنے کے عددی طریقہ کے ضمن میں مثال کے طور پر اس مساوات پر غور کیا۔ لارڈ کیلوں نے رسالہ (Nature) میں شعاعی سمجھنیوں کی تقریبی شکل دریافت کرنے کے ایک ہندسی طریقہ کی نشان دہی کی جس پر بالتفصیل (C. V. Boys) نے بحث کی۔ (K. Neumann) نے بھی معلوم کیا ہے۔

۱۷۲ — مائع کا قطرہ۔ اگر مائع کا ایک قطرہ ایک افقی میز پر رکھ دیا جائے تو

Dissert Berlin, 1891

Math Annalen 46 (1895), p 167

Nature, July and August, 1886.

Phil Mag Series 5, Vol 36, p 75, 1898

Vorlesungen über die Theorie der Capillarität Leipzig 1894

۱

۲

۳

۴

۵

توازن کی مساوات ہوگی


$$\frac{\text{ضنہ}}{\text{ت}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r}$$

جہاں سطحی متاوت ہے اور اندر نی دباؤ اور کرہ ہوائی کے دباؤ کے درمیان فرق ضنہ ہے۔

عام طور پر قطرہ ایک گرد تہی سطح کی شکل اختیار کرے گا۔
اس صورت کو لیکر فرض کرو کہ مانع کے اندر بلند ترین نقطہ پر دباؤ π ہے
اور کرہ ہوائی کا دباؤ π ہے۔ سب لا کو بلند ترین نقطہ سے نیچے وارنا ہے سے

$$\text{ضنہ} = \pi + \text{ح} - \text{لا}$$

$$\frac{\pi - \pi + \text{ح} - \text{لا}}{\text{ر}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r}$$



پس اگر بلند ترین نقطہ پر نصف قطر اخفا ہو تو

$$\frac{\pi - \pi}{\text{ت}} = \frac{2}{d}$$

$$(1) \quad \frac{\text{لا}}{\text{ر}} + \frac{2}{d} = \frac{\text{ح} - \text{لا}}{\text{ت}} + \frac{2}{d} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r}$$

اگر ہم شیئہ پر پارہ کے قطرہ کی یا فولا دہر پانی کے قطرہ کی صورت لیں
تو مشاہدہ سے معلوم ہو گا کہ فرما/فولا اس سے نیچے دار گھٹتا جاتا ہے

(۱۰۰)

اور نصف النہار ہی منحنی کی تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$\frac{f}{r} + \frac{2}{r} = \frac{1}{\left\{ \left(\frac{f}{r} + 1 \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}}} + \frac{\frac{f}{r}}{\left\{ \left(\frac{f}{r} + 1 \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{f}{r} + \frac{2}{r} = \frac{1}{\left\{ \left(\frac{f}{r} + 1 \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}}} + \frac{f}{\left\{ \left(\frac{f}{r} + 1 \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{f}{r} = \frac{f}{r}$$

پس اگر نصف النہار ہی منحنی کے کسی نقطہ پر ماس کا میلان محور لاکے
ساتھ ہو تو $\frac{f}{r} = \frac{f}{r}$ اور

$$\frac{f}{r} + \frac{2}{r} = \left(\frac{f}{r} + 1 \right)$$

اگر قطرہ اتنا بڑا ہو کہ ہم اس کی چوٹی کو چپٹا تصور کر سکیں اور اگر افقی
تراشوں کے انحناء کو نظر انداز کیا جائے تو مساوات (۱) ہو جائے گی

$$\frac{f}{r} = \frac{1}{r}$$

$$\frac{f}{r} = \frac{f}{r}$$

$$\frac{f}{r} = \frac{f}{r} \quad \text{اس طرح}$$

$$\frac{f}{r} = \frac{f}{r}$$

اس مساوات کا تکمیل کرنے کے لئے رکھو $\frac{f}{r} = \frac{f}{r}$ جب ط

اس طرح فرا = ک (نمط - ۲ جب ط) فرط

۱ + ب = ک لوک مس ط + ۲ ک جم ط

$$۱ + ب = ک لوک \frac{۲ ک - ۲ لا}{۱۱} + \frac{۲ ک - ۲ لا}{۱۱}$$

جہاں ب مستقل ہے۔
اُس نقطہ پر جہاں ماس انضمامی ہے ع = - اور

$$۲۷۵ = ک$$

اگر نصف النہاری منحنی اور افقی مستوی کے درمیان حادہ زاویہ ع ہو
یعنی یارہ مستوی کو جس زاویہ پر ملتا ہے وہ ۲۷۵ - ع ہو اور اگر قطرہ کا ارتفاع
ف ہو تو


$$ف = - (۲۷۵ - ع) جبکہ لا = ف$$

$$۲۷۵ = ف = ک جم ع$$

۳۷۱ — متوازی تختیوں کے درمیان قطرہ - اگر بارہ کا ایک قطرہ
شیبے کی دو متوازی افقی تختیوں کے درمیان رکھ دیا جائے جو ایک
دوسرے سے اس قدر نزدیک ہیں کہ جاذبہ ارض کا عمل نظر انداز
کیا جاسکتا ہے تو قطرہ کے اندر دباؤ مستقل ہوگا اور اگر سطح گردش سطح
ہو تو ہمیں مساوات

$$\frac{ض}{ت} = \frac{۱}{ر} + \frac{۱}{ر}$$

حاصل ہوگی جہاں اندرونی دباؤ کا اضافہ کرہ ہوائی کے دباؤ پر صہ ہے۔



اس صورت میں لا کو اس مستوی سے نیچے وارنا پنا مناسب ہوگا
جو کنبوں کی دونوں سطحوں کے وسط میں واقع ہے اور تب ہمیں مساوات

$$-\frac{ع}{\frac{1}{2}(ع+۱)} = \frac{ص}{\frac{1}{2}(ع+۱)} = \frac{ب}{ل} \quad (\text{فرض کرو})$$

حاصل ہوگی۔
بکمل کرنے سے اور $ل = ۱$ ، جبکہ $لا = ۰$ یعنی سے

$$\frac{ب}{ل} = ۱ + ل - ب - ل$$

$$\frac{۱ + ل - ب - ل}{۱ + ل - ب - ل} = \frac{فرا}{فرا} \quad \text{اس طرح}$$

۱۸۰ رکھو $لا = ی$ تو

$$\frac{۱ + ل - ب - ل}{۱ + ل - ب - ل} = \frac{فرا}{فرا}$$

اگر ہم لکھیں $ی = ۰$ و $۱ + ل - ب - ل$ تو حاصل ہوگا

پس فلا = {فہ (۶ + سم) + ۱/۲ (ب + ل - ل')} فرع

اور مکمل سے لا + مستقل = طا (۶ + سم) + ۱/۲ (ب + ل - ل')

لیکن ۰ = جبکہ ی = ل'

یا جبکہ ۰ = - ۱/۲ ل' + ۱/۲ (ل - ب) = ع = فہ (سم)
اس طرح لا کی اس قیمت کے لئے ۶ کو صفر ہونا چاہیئے۔

۰ : لا = طا (۶ + سم) - طا (سم) + ۱/۲ (ب + ل - ل')

اور ۱ = فہ (۶ + سم) + ۱/۲ (ل - ل' - ل ب + ب)

سے کارٹیزی محدود کی قیمتیں مبدل ۶ کی رقوم میں حاصل ہوتی ہیں۔

اگر قطرہ اس قدر بڑا ہو کہ ہم ۱/۲ کو نظر انداز کر سکیں تو ر = ۱/۲ صند اور

اس طرح نصف انہاری مخنی دائرہ ہوگا۔

اس صورت میں اگر تختیوں کے درمیان فاصلہ ۲ ف ہو تو شکل سے
ظاہر ہے کہ

ر = ف قطع

جہاں عہ وہ حادہ زاویہ ہے جو پارہ اور ہر تختی کی سطح کے درمیان باہر
کی طرف بنتا ہے۔

۴۱۔ اگر کششے کی دو متوازی افقی تختیوں کے درمیان پانی کا ایک

(Antielastic)

قطرہ گردش سطح کی شکل اختیار کرے تو سطح صند انحنائی


ہوگی کیونکہ پانی اور کششے کا زاویہ تماس حادہ ہے۔

اس صورت میں اگر کہ ہوائی کا دباؤ II اور قطرہ کے اندر پانی کا دباؤ

۲۲ ہو اور اگر نصف النہا، سی منحنی کا نصف قطر انخار ہو اور پہلی اقواس عمادی تراش کا نصف قطر انخار سی عماد کا وہ طول جو سطح کے محور سے قطع ہوتا ہے تو توارن کی مساوات ہوگی

$$\frac{\text{صند}}{\text{ت}} = \frac{\text{۲۲} - \text{۲۲}}{\text{ت}} = \frac{۱}{ر} + \frac{۱}{ر}$$

کوئکہ اگر ہم عماد کی سمت میں قوتوں کو تحلیل کریں نو نزادوں کا حاصل سمت میں باہر کی طرف ہوگا اور دوسرے دو تئوں کا حاصل اندر کی طرف -



حسب سابق لاکو تختیوں کے درمیان وسطی سطح سے نیچے دارنا بننے سے مساوات بالا ہو جائے گی

$$\frac{\text{ع فرع}}{\text{فرع}} = \frac{۱}{\frac{۱}{۲}(۲ع+۱)} - \frac{\text{صند}}{\text{ت}} = \frac{۲}{ب} \quad \text{فرض کرد}$$

جس سے مساوات

$$\frac{ب}{ا} = \frac{۲}{۲(۲ع+۱)} - \frac{۲}{ب} + ل - ا$$

حاصل ہوگی اور اس سے گذشتہ دفعہ کی طح ہم اذکر سکتے ہیں

لا = طا (سم) - طا (ع + سم) + $\frac{1}{2}$ (ع - سم) (ل + ل ب - ب)

اور ما = فھ (ع + سم) + $\frac{1}{2}$ (ل + ل ب + ب + ب)

بڑے قطرے کے لئے حسب سابق


ر = ف قطع

جہاں پانی کی سطح اور ہر تختی کی سطح کے درمیان حادہ زاویہ عم ہے۔

۱۷۵۔ تیرنے والی سوئی۔ پانی کی سطح پر سوئی کے تیرانے کے مشہور

تجربہ کی توجیہ سطح کے قوانین کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔

منکل سوئی کی تراش کو اور اس کے محور کے علی القواعم پانی کی سطح کی تراش کو تعبیر کرتی ہے سوئی پر عمل کرنے والی قوتیں ہیں ن اور ف پر کے تناؤ اور حصہ ن اف پر پانی کا دباؤ جو پانی کے حجم ن اف کے وزن کے مساوی ہے۔ یہ سب قوتیں سوئی کے وزن کو تھامتی ہیں۔



مزید براں ن پر کے تناؤ کا افقی جزو تحلیل اور ب د پر کا افقی آبی دباؤ مرکب

پر کے تناؤ کے مساوی ہیں جہاں ن د افقی اور ب د انتصابی ہے۔

ان شرائط سے توازن کی تعین ہوتی ہے اور حسب ذیل مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔

۲ ت جب (ط - ع) + ج ث ک (ک ط + ک جب ط جم ط - ۲ ف جب ط) = و

۴ ت جب $\frac{1}{4}$ (ط - عد) = ج ت (ک جم ط - ف)

جہاں قوت شعری کا زاویہ عد، سوئی کے اکائی طول کا وزن و، یا نی کی ترقی سطح کے اوپر سوئی کے محور کا ارتفاع ف اور رادیان وق $\frac{1}{4}$ ط ہے۔

۴۶۔ مانع کی جہلیاں۔ مانع کی جہلیاں مختلف طریقوں سے پیدا کی جاتی ہیں۔ صابونی بلبلہ ایک عام مثال ہے۔ صاف شیشے کی بوتل کو جس میں کچھ لزج مانع ہو لانے سے یا صابون اور پانی یا صابون اور گلیسرین کے محلول میں مار کا آب فریم ڈبو کر اس کو بتدریج باہر نکال لینے سے مانع کی جہلیاں پیدا کی جاسکتی ہیں اور ان کی خصوصیات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

جھیلوں کا ظاہر استومی کی شکل میں حاصل ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ جاوہ ارض کا عمل بمقابلہ جلی کے تنازعے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت چھوٹے ماسی عمل سے بھی جھلی بھٹ جاتی ہے جس سے یہ متنبط ہوتا ہے کہ اس کے کسی خط پر کا دور کل اس خط کے مجموعی سمت میں ہوتا ہے اس سے دفعہ (۱۴۹) کی طرح یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تنازعہ ہر سمت میں ہی ہوتا ہے۔

۴۷۔ مستومی جلی کی توانائی۔ لزج مانع کے اندر سے اگر ایک مستومی ہسل

نکال لی جائے تو کچھ کام کیا جاتا ہے۔ یہ کام جلی کی توانائی بالقوہ کو تعبیر کرتا ہے۔

ایک مستطیلی جلی اب ج د کا تصور کرو جو سیدھے تاروں ا د ب ج سے محدود ہے۔ اب مانع کی سطح میں ہے اور ج د حرکت پذیر ہے۔

جلی کو باہر نکال لینے میں جو کام ہو گا وہ ت د اب د کے سادی ہو گا اور اس لئے اگر سطحی توانائی فی ایکائی رقبہ س ہو تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

س = ت
یہ یاد رہے کہ جس چیز کو ہم نے یہاں جلی کا تنازعہ کہا ہے وہ جلی کے

کسی رخ کے سطحی تناؤ کا دو چند ہے۔

۱۷۸۔ انتصابی مستوی میں کسی شکل کا ایک تار ہے جس کے دو نقطوں پر دوئے ہوئے وزن اور طول کا تاگا باندہ دیا گیا ہے۔ مانع کی ایک مستوی جہلی کے حدود تار اور تاگا ہیں۔

تاگے کی اختیار کردہ شکل کو معلوم کرنے کے لئے ہم یہ شرط بیان کریں گے کہ اس نظام کی توانائی بالقوہ اقل ہے۔

اگر رقبہ و ا ب ج، ا ہو تو جہلی کی توانائی

$$= س ا - کس مافرا$$

اور اگر تاگے کے اکائی طول کا وزن و ہو تو نظام کی توانائی بالقوہ اقل ہوگی جبکہ

$$کس مافرا + و ک مافرس$$

اعظم ہو بشرطیکہ

$$ک فرس = ل$$

پس ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کس شرط کے تحت جملہ

(۱۸۲)

$$ک ا س م + (و م + ل) م + ا + ع ا فرلا$$


کا تغیر صفر ہو جاتا ہے۔

احصاء، تغیرات کی مدد سے اس شرط سے مساوات حاصل ہوتی ہے

$$\frac{و م + ل}{س م} = \frac{ع ا + ا}{س م}$$

۱۸۲۔ فرلا کی شکل $\frac{و م + ل}{ع ا + ا + م + ج م}$ ہوگی

اس کو آسانی مکمل کر سکتے ہیں۔



۱۷۹۔ تاگے کے ایک مصر کے تواریں پر غور کرنے سے بھی اس سوال کو حل کیا جاسکتا ہے۔

و سے دس گونا پ کر فرض کرو کہ ت پر کے ماس کا میلان و اے ساتھ ہے۔

ب اگر ت پر تاگے کا تناؤ ت اور جلی کا تناؤ نہ ہو و مساواتیں

$$\text{مف ت} + \text{مف س} \times \text{جب د} = \text{و}$$

$$\frac{\text{ب مف ت}}{\text{و}} = \text{مف س} + \text{مف س} \times \text{جم د}$$

حاصل ہوئی ہیں جہاں نقطہ ت پر تاگے کا نصف قطر انحناء ہے۔

$$\text{پس} \quad \frac{\text{فرت}}{\text{فرما}} = -\text{و} \quad \text{ت} = \text{و} (1 - \text{و})$$

$$\text{اور} \quad \frac{\text{ع} - \frac{\text{فرع}}{\text{فرما}}}{\frac{1}{4}(2\text{ع} + 1)} = \frac{1}{\text{و}(1 - \text{و})} \left(\frac{\text{و}}{\frac{1}{4}(2\text{ع} + 1)} + \text{و} \right)$$

$$\text{اس لئے} \quad \frac{1}{\text{و}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}(2\text{ع} + 1) - \frac{1}{4}(2\text{ع} + 1) \frac{\text{فرع}}{\text{فرما}}$$

$$\text{پس } \frac{1-a}{1+a} = \frac{1-a}{1+a} + \frac{1-a}{1+a}$$

یہی شکل دفعہ ماسبق میں حاصل کی گئی ہے۔

اگر ہم یہ مان لیں کہ $z = \text{عہ جیکہ } a =$ اور $z = \text{بہ جیکہ } a =$ $b =$ م
تو ہر مسادات کے دو نامعلوم مستقلوں کی تعین ہو جاتی ہے اور چونکہ
 $z =$ میں اس لئے ہر مسادات سے c کی قیمت a کی رقوم میں وہی حاصل
ہوتی ہے۔

۱۸۰۔ صابون کے کروی بلبے کی توانائی۔ صابون کے بلبے کی

توانائی وہ کام ہے جو اس کو پیدا کرنے میں ہوا۔ یہ کام وہ حصوں پر مشتمل ہوگا
ایک تو وہ کام جو جہلی کو لٹے سے کھینچ لینے میں ہوا اور دوسرے وہ کام جو بلبے کے
اندروں کی ہوا کو بچکانے میں ہوا۔

اگر سطحی تناؤ T ہو تو اول الذکر حصہ T s ہوگا (جہاں s کو s
تعبیر کرتا ہے) کیونکہ ایک چھوٹے مستوی عنصر کی توانائی T s ہے۔
دوسرے حصے کے لئے فرض کرو کہ اندرونی ہوا کا دباؤ p ہے جب

نصف قطر r اور r ہوائی کا دباؤ p ہے تو $d - \pi = \frac{2}{r}$ اور اگر ہوا کی

کیست اتنی ہو کہ اس کا حجم دباؤ p پر s ہوتا ہے تو

$$\pi r^2 = \frac{4}{3} \pi r^3 p = d - \pi \quad (\text{فرض کرو})$$

اور دفعہ (۱۴) سے h ہوا کو حجم H سے حجم H میں بچکانے میں جو کام ہوتا ہے

$$H = \pi r^2 \text{ لوک } \frac{H}{r} - \pi (H - r)$$

$$= \frac{4}{3} \pi r^3 p + \pi \left(\frac{2}{r} \right) \text{ لوک } \left(1 + \frac{2}{r} \right) - \frac{2}{r}$$

اگر ہم یہ مان لیں کہ لمبے کے اندرونی و بیرونی دباؤں کا فرق بمقابلہ کرہ ہوائی کے دباؤ کے جھڑا ہے تو $\frac{2}{\pi} \times$ کو ہم چھوٹا ذص کر سکتے ہیں اور اسلئے آخری حل سوجا ہے

$$\left\{ \frac{2}{\pi} + \pi \right\} \left(\frac{2}{\pi} - \left(\frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} \right) \right) = \frac{2}{\pi}$$

$$\frac{2}{\pi} \times \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi} \times \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

پس ہوا کو یکساں کرنے میں جو کام ہوا وہ اس کام کے ساتھ $2 \times \pi$ کی نسبت رکھیں گے جو جلی کو باہر پھینچنے میں ہوا۔

۱۸۱۔ مائع کی جلیوں کی شکلیں۔ اگر جلی کے دونوں رتنوں پر ہوا کا دباؤ وہی ہو تو توازن کی شرط یہ ہوگی کہ

$$0 = \frac{1}{r} + \frac{1}{r}$$

یابہ کہ اوسط انحناء صفر ہے۔

(Catenoid) اور (Helicoid)

۱۔ سطرہ بنیہ نما (Catenoid) اور مریخ نما (Helicoid) کی صورتوں میں پوری ہوتی ہے جو اس لئے مائع کی جلیوں کی ممکنہ اشکال ہیں۔ کارٹیزی محمد دوں میں یہ مساوات دفعہ (۱۲۵) کے بموجب ہو جائیگی

$$\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r} \right) \left(\frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} \right) + \frac{2}{\pi} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} \right) = \frac{2}{\pi}$$

بڑے بڑے علماء ریاضی نے متعدد مقالوں میں اس مساوات پر بحث کی ہے چنانچہ اس مساوات کے چند مشہور خاص حل حاصل ہو چکے ہیں۔ مثلاً

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r} \text{ اور } \frac{1}{r} = \frac{1}{r} \text{ جنہر لا جنہر لا}$$

جن میں سے ہر ایک ایسی سطح ہے جس کا اوسط انحناء صفر ہے۔
پلاٹو (plateau) کی تصنیف

Sur les liquides Soumis aux seules forces moléculaires, 1873

میں علمایا صنی نے اس مضمون پر جو محنتیں کی ہیں ان کا شاندار تذکرہ کیا گیا ہے اور اس نے خود اپنے تجربات بھی اس کتاب میں درج کئے ہیں۔ ڈاربو

Theorie Generale des surfaces کی کتاب Darbou

minima Surfaces کے حصہ اول باب سوم میں قائل سطحوں

کی پوری تفصیل موجود ہے یعنی ایسے سطحوں کی جو متذکرہ بالا شرط کو پوری کرتی ہیں۔

۱۸۲۔ اگر چلی کی شکل گردشی سطح کی ہو تو سطح کے محور کو محوری قرار دینے سے

$$r^2 = r_1^2 + r_2^2 = f(y)$$

اس صورت میں اوسط انحناء کے صفر ہونے کی شرط سے حاصل ہوگا

$$\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_1^2} = \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_2^2} = 0$$

$$r^2 = \frac{r_1^2}{1 + \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2}$$

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} \text{ اور } \frac{1}{r^2} = \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2}$$

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2}$$

خط پر عموماً وار ہوں تو تاروں کو مانع کی جہلی سے ملانا ہمیشہ ممکن نہیں۔ بعض صورتوں میں دو میں سے ایک زنجیرہ منا سے تاروں کو ملانا ممکن ہے لیکن اوپر کے زنجیرہ کو نگھانے سے جو زنجیرہ نمایاں ہوتا ہے اُس کی صورت میں توازن قائم ہوگا اور دوسرے زنجیرہ منا کی صورت میں غیر قائم۔ (۱۸۸)

جب صرف ایک زنجیرہ منا ہو تو توازن غیر قائم ہوگا۔ اس مسئلہ کا ایک غیر مسلسل حل بھی ہے جس میں دو دائروں کو ان نقطوں کے معینوں کو نگھانے سے حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے مرکز ایک لا انتہا سبک اسطوانے سے ملائے جاتے ہیں۔

انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا (Britanica)

میں کلرک میکسویل Clerk Maxwell نے وقت شعری پر

ایک مضمون میں اس مسئلہ پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ جب دو زنجیرے جن کا مرتب وہی ہو دو دئے ہوئے نقطوں میں سے کھینچے جاسکیں اور مرتب کے گرد ان کو نگھانے سے دو زنجیرہ منا حاصل کئے جائیں تو ہر زنجیرہ منا کا اوسط انحناء صفر ہوتا ہے۔

اگر ان دو زنجیروں کے درمیان ایک دوسرا زنجیرہ انہی نقطوں میں سے گدزنا ہوا کھینچا جائے تو اس کا مرتب اُن دونوں کے مرتب کے اوپر ہوگا اور اسلئے کسی نقطہ پر اس کا نصف قطر انحناء اُس فاصلے سے کم ہوگا جو عماد کی سمت میں اس نقطہ اور پہلے مرتب کے درمیان ہے۔

اس لئے گردشی سطح کا اوسط انحناء محوریہ محب ہوگا اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی زنجیرہ منا کو دونوں زنجیرہ مناؤں کے درمیان کے کسی زنجیرہ منا پر ہٹا دیا جائے تو جہلی محور سے ہٹ جائیگی۔

پھر اگر ایک زنجیرہ منا دونوں زنجیرہ مناؤں کے باہر لیا جائے تو اس کا اوسط انحناء محوریہ کی طرف متغیر ہوگا اور اس لئے اگر اوپر کا زنجیرہ منا اوپر ہٹایا

۱۸ انسائیکلو پیڈیا کی گیارہویں اشاعت میں لارڈ ریالے نے اس مضمون کی نظر ثانی کی ہے۔

جائے اور نیچے وار تہ صورت میں جبلی ہر کسٹف حرکت کر گئی۔
 پس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر دنی جانب کا زنجیرہ ماقائم ہے اور اندرونی
 جانب کا غیر قائم۔
 یہ استدلال کسی دوسری طرح کے ہاؤر صفاق نہیں آتا اور اسلئے
 قاضیت کے مکمل ثبوت کے لئے احصائے تغیرات کے طریقوں سے مدد لیا
 ضروری ہے۔
 ۱۸۴۔ اگر جبلی کے دونوں جانب دباؤ مختلف ہوں اور ان کا فرق د ہو تو
 توازن کی شرط ہوگی

$$\frac{d}{dt} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r}$$

یہ کہ اوسط انجم مستقل ہوگا۔
 گردشیں سطحوں کی صورت میں اس ربط کو ثابت کرنے کے لئے ہم
 (۱۸۹) اصول توانائی کا استعمال کریں گے۔
 د کا مستقل ہونا اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ سرے بند کردئے
 گئے ہیں اور اندرونی ہوا کا حجم مستقل ہے۔
 اس طرح جلد

$$k(2\pi a f) + (2\pi a f)$$

کا تغیر صفر ہوگا۔

جس سے پتہ چلتا ہے کہ

$$\frac{m}{r} - \frac{m}{r} = \frac{m}{r} \text{ اور } \frac{m}{r} = \frac{m}{r} \text{ اور } \frac{m}{r} = \frac{m}{r} \text{ اور } \frac{m}{r} = \frac{m}{r}$$

پس اگر ن گ عماد ہو تو

$$\frac{1}{r} \pm \frac{1}{r} = \frac{1}{r} \text{ کیونکہ } \frac{m}{r} = \frac{m}{r}$$

بوجب اس کے کہ منحنی محور لاکہ طرف محذب یا مقعر ہے، یعنی اوسط انحنا مستقل ہے۔ عام صورت میں ہمیں یہ شرط بیان کرنی پڑیگی کہ دئے ہوئے حجم کے لئے سطح اعظم سے باقی اقل اس سے وہی عام نتیجہ مستنبط ہوگا۔

۱۸۵۔ اگر چہلی گردشی سطح کی شکل کی ہو تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نصف النہاری منحنی ایک ایسی مخروطی کے مانند کا طریق ہوتا ہے جو ایک خط مستقیم پر لڑک رہی ہو۔ اگر مخروطی کا نصف قطر انحنا اور اس کے طریق کا نصف قطر انحنا رہو تو

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{s \cdot n} - \frac{r \cdot s \cdot n \cdot g}{s \cdot n^2} \quad (\text{شکل دیکھو اگلے صفحہ پر})$$

$$\frac{1}{s \cdot n} - \frac{n \cdot g}{n \cdot l \cdot s \cdot n} = \frac{1}{s \cdot n} - \frac{g}{l \cdot s}$$

$$\frac{1}{s \cdot n} - \frac{n}{s \cdot m \cdot a}$$

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{s \cdot n} = \frac{1}{s \cdot n} - \frac{n}{s \cdot m \cdot a}$$

مکانی کی صورت میں یہ صفر ہو جاتا ہے اور اسلئے $r = -s \cdot n$ ۔

$$\frac{1}{s \cdot n} = \frac{1}{s \cdot m \cdot a} - \frac{b \cdot j}{s \cdot n \cdot h \cdot n} \quad (19)$$


جہاں h دوسرا اسکہ ہے اور اس لئے $\frac{1}{r} + \frac{1}{s \cdot n} = \frac{1}{a \cdot j}$

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{s \cdot n} = \frac{1}{a \cdot j}$$


لے دیکھو جیل کا (Calculus of Variations) یا ٹاڈ ہرٹر کا تکمیلی احصا۔

Roulettes and Glissettes

لے دیکھو



یہلا زبغیرہ کا (Catenoid) ہے دوسرے اور تیسرے کو پلاٹو (Plateau) نے موج نما (Unduloid) اور عقدہ نما (Nodoid) کہا ہے کہ ان کے اول الذکر سے ایک لہر نما مغنی اور بوخر الذکر سے عقدوں کا ایک تواتر تعبیر ہوتا ہے۔



عقدہ نما (Nodoid) کی تکوین کا ایسا اندازہ کرنے کیلئے یہ تصور کرنا ہوگا کہ جیسے نامہ کی ایک شاخ لڑکتی جاتی ہے نقطہ تماس لاقتنا ہی فاصلے پر جلا ہوتا ہے تب خط مستقیم دونوں شاخوں کا متقارب بن جاتا ہے اور دوسری شاخ لڑکتا شروع کرتی ہے اس طرح شکل میں مکمل تسلسل پیدا ہوتا ہے۔

ماثع کی جہلیوں کے مضمون پر مختلف تصانیف و مقالوں کا مکمل تذکرہ

Encyclopaedia

(Platau) کی تصنیف اور

پلاٹیو

(Britanica) میں پروفیسر کراک میکویل کے مضمون میں ملے گا۔ اور قوت

شعری کے مضمون پر عموماً حسب ذیل کتابیں مفید ثابت ہوئیں گی

(۱۹۱)

Mathieu, *l' Theorie de la Capillarite*, 1883

F Neumann, *Vorlesungen uber der Theorie der Capillaritat*, 1894

Poincaré, *Capillarite*, 1895

The articles *Kapillaritat* by H Minkowski in *Encyklop der Math Wissensch* Bd v 1907, and by F Poekels in *Winkelmann's Handbuch der Physik*, Bd 1 1908, both of which contain a full bibliography of the subject

مشال — ایک صابونی بلبلہ اپنے ثابت حدود سے بڑھتا ہے اس طرح کہ ان حدود کے ساتھ اس سے ایک بند نفا پیدا ہوتی ہے جس کا حجم ج ہے اس میں گیس دباؤ د پر ہے جس کی پیش مطلق ط ہے۔ گیس کی پیش میں بند رنج اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر جہلی کا رقبہ ل ہو جبکہ پیش ط اور دباؤ د ہے تو ثابت کر دو کہ

$$د ط \frac{ز}{ر} = د ح (1 - \frac{ط}{ز} \frac{د}{ر})$$

جہاں سطحی تناؤ ت کو مستقل فرض کر لیا گیا ہے اور دیر دنی دباؤ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

د اور ط میں ربط حاصل کر دو جبکہ بلبلہ کی شکل کا ہو۔

توانائی کا تغیر = ت منف ل

$$= د منف ح$$

لیکن $د ح = ک ط$ ، جہاں کہ مستقل ہے
 $\therefore د م ف ح = ک م ف ط - ح م ف د$

$$\therefore ت ف ر ا = ک - ح \frac{ف د}{ف ط}$$

$$= ک (۱ - \frac{ط}{د} \frac{ف د}{ف ط})$$

$$= \frac{د ح}{ط} (۱ - \frac{ط}{د} \frac{ف د}{ف ط})$$

کرہ کے لئے $۱ = ۴۴$ اور $د = \frac{۲}{۲}$
 $\therefore ۱ = ۴۴ ت ۲ / د$

پس مساوات مالا سے

$$- ۴۴ \frac{۲}{د} \frac{ف د}{ف ط} = ک (۱ - \frac{ط}{د} \frac{ف د}{ف ط})$$

$$- ۲ \frac{ا ت}{د} \frac{ف د}{ف ط} = ک (۱ - \frac{ط}{د} \frac{ف د}{ف ط})$$

لیکن $د ح = ک ط$

$$\therefore \frac{۱}{۴} در ا = ک ط یا \frac{۲}{۳} ت ا = ک ط$$

$$\therefore - \frac{۲ ک ط}{د} \frac{ف د}{ف ط} = ک - ک ط \frac{ف د}{ف ط}$$

$$\therefore = ۱ + \frac{ط}{د} \frac{ف د}{ف ط}$$

$$\therefore د ا ط = مستقل$$

امثلہ

(۱۹۲)

۱ — دو کردی صاونی بیٹے ایک یانی سے اور دو سر یانی اور الکمل کے آمیزے سے

اُٹھائے گئے ہیں۔ اگر تناؤ فی خطی اینچ علی الترتیب ایک گرین اور $\frac{1}{11}$ گرین کے اوزان کے مساوی ہوں اور نصف قطر $\frac{1}{4}$ اینچ اور $\frac{1}{16}$ اینچ ہوں تو دونوں صورتوں میں کل اندرونی دباؤ کا کل بیرونی دباؤ پر براعنا و سوان کا مقابلہ کرو۔

۳۔ اگر راور نصف قطر کے دو صابونی بلبے ایک ہی مانع سے اُٹھائے جائیں اور دونوں ملکر نصف قطر کا ایک بلبہ بن جائیں تو ثابت کرو کہ تناؤ

$$\frac{\pi}{2} \times \frac{r_1^2 - r_2^2}{r_1^2 + r_2^2}$$

کے مساوی ہے جہاں π کرہ ہوائی کا دباؤ ہے۔

۴۔ یانی اور ہوا کی سطح فاصل کا سطحی تناؤ ۲۵ و ۸۰، یانی اور پارہ کی سطح فاصل کا ۶ و ۴۴، اور پارہ اور ہوا کی سطح فاصل کا ۵۵ ہے۔ بارہ کی سطح پر پانی کا قطرہ رکھنے سے کیا اثر ظہور پذیر ہوگا۔

۵۔ تیل کے ایک قطرہ کو پانی کی سطح پر رکھے ہی وہ فوراً انہائی ریتق پرست میں پھیل جاتا ہے تیل کے اس پھیلاؤ کے سبب کی تشریح کرو۔ اور منظر کے مشاہدے سے ثابت کرو کہ پرت کی موٹائی اینچ سے کم ہو سکتی ہے۔

تیل کا دوسرا قطرہ سطح پر ڈال دینے سے کیا بات واقع ہوگی۔

۵۔ اگر ایک ہلکا سا جکے سرے ایک دوسرے سے باندھ دئے گئے ہیں مانع کی جہلی کے اندرونی حدود کا ایک جزو ہو تو ثابت کرو کہ تاگے کے بر لفظ پراختا مستقل ہوگا۔

اگر تاگہ وزنی ہو اور جہلی ایک انحصاری محور کے گرد گردش کرے ہو تو ثابت کرو کہ محل توازن میں تاگے کا تناؤ ہوگا

$$\frac{L}{\pi r} \sqrt{r_1^2 - r_2^2}$$

جہاں اس کا طول L ، اس کا وزن فی اکائی طول w اور جہلی کا تناؤ T ہے۔

۶۔ صابون آئیز یانی کے ذخیرے سے مانع کی ایک مستوی جہلی اُٹھائی گئی ہے ثابت کرو کہ توانائی (ع) فی اکائی رمل کی عددی قیمت، تناؤ (ت) فی اکائی

۱۲۔ باریک سید نے تار، ایک مربع ذوار بعتہ اسطوح یا چار سطحی کی شکل کا ہے اس کو سابلون اور پانی کے نسلول میں داخل کر کے اوپر کھینچ لیا گیا ہے جس سے بعض صورتوں میں مستوی جہلیاں پیدا ہوتی ہیں جن کی ابتدا کناروں سے ہوتی ہے اور جو ایک نقطہ پر آ کر ملتے ہیں۔ تاہم، کروکہ ہر چار سطحی کے لئے توازن کی یہ شکل ممکن نہیں ہے اور کہ یہ اس دقت ممکن ہے جبکہ ایک رخ مساوی الاضلاع مثلث اور دوسرے رخ مساوی الساقین مثلثات ہوں جن کے زوایا اس میں سے ہر ایک 120° (۱۲۰) سے کم ہو۔

۱۳۔ سینیٹے کی دو متوازی تختیوں کے درمیان بہت ہی کم فاصلہ دے۔ اس کے درمیان پانی داخل کیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ تختیاں ایک دوسرے کی طرف ایسی قوت سے کھینچ آئیں گی جو

$$۲ \left\{ \text{تجم} \right\} + \text{ب ت جب} =$$

کے مساوی ہے۔ جہاں جہلی کا رقبہ A اور اس کا گھیراؤ P ہے۔
 ۱۴۔ سینیٹے کا ایک کھوکھلا قائم مستدیر مخروط متجانس مائع میں رکھا گیا ہے اسطرح کہ ایک محور انتصابی اور اس اوپر وار ہے۔ مخروط میں کس بلندی تک مائع چڑھ سکا۔ اندرونی مائع کی سطح کی نثری مساوات معلوم کرو۔ اسطوانہ کی صورت میں نتائج افذرو۔
 ۱۵۔ ایک سوئی پانی پر تیر رہی ہے اس طور پر کہ اس کا محور پانی کی قدرتی ہموار سطح میں واقع ہے اگر غولاد کی کثافت اضافی بلحاظ پانی کے Δ ہو اور قوت شعری کا زاویہ θ ہو اور ρ زاویہ ϕ ہو جو پانی کو مس کرنیوالی عمودی تراشش کی قوس محور کے محاذی بناتی ہے تو ثابت کرو کہ

$$(\theta - \phi) \text{ جب } \frac{1}{P} = (\theta - \phi) = \text{تجم} \text{ عم } \frac{1}{P} (\theta + \phi)$$

۱۶۔ ایک شعاری نلی گردش سطح کی شکل کی ہے اس کو انتصابی محور کے ساتھ ایک مائع میں جزو غرق کر دیا گیا ہے نکو یہی معنی کی مساوات معلوم کرو اگر مائع توازن میں رہے خواہ اس کا ارتفاع نلی میں کچھ ہی ہو۔

۱۷۔ ایک جاملونی بلبہ کو ایک گیس کی کمیٹک سے جھروایا گیا ہے جس کا زاویہ پرتش پتس پر $m \times$ (اس کی کثافت) ہے۔ بلبہ کا نصف قطر $2a$ ہے جبکہ اس کو ہوا میں پھینکا گیا اس کے بعد مار پیٹا کا ارتقاع پڑھتا ہے اور پتس پر یہ تمام رسی سے۔ تمام کیو کہ بلبہ کا نصف قطر پڑھتا ہے یا گھٹا ہے موصلاً اس سے کہ جاملونہ

$$\frac{9}{8} \frac{mk}{2a} \text{ سے زیادہ باکم ہو۔}$$

۱۸۔ ثابت کرو کہ مساوات

$$m = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

بائع کی جہلی کی ایک ممکن شکل کو تعبیر کرتی ہے جبکہ دونوں طرف دباؤ دہی ہو۔

۱۹۔ اگر دو سونیاں جاملونی رتیر ہیں جن میں متشاکلا ایک دوسرے کے متوازی رکھ دی جائیں تو ثابت کرو کہ وہ لفظ ایک دوسرے کی طرف کھینچ آئیں گی اور یہ کہ یہ عمل کشش سطحی تناؤ کی وجہ سے ہو گا۔

۲۰۔ ایک جھوٹا کعبہ بائع میں تیرا سے اس شور پر کہ کعب کی سطح کے ساتھ بائع کا زاویہ تاس منفرد ہے اور $\frac{\pi}{2}$ ۔ عہ کے مساوی ہے اور کعب کا زاویہ کعب کا زاویہ افقی سے۔ اگر بائع کی کثافت m اور کعب کی خور ہو اور اگر سطحی تناؤ $\frac{1}{2} \pi$ ہو تو ثابت کرو کہ کعب تیرے کا اگر

$$\frac{m}{2} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \text{ جب } \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

۲۱۔ نصف قطر کے دو دائری قرص اس طرح رکھے گئے ہیں کہ ان کے مسہوی ان کے مرکزوں کو ملانے والے خطیر عمود ہیں۔ ان قرصوں کے محیطوں کو صابوں کی ایک جہلی سے ملایا گیا ہے جس کے اندر اتنی کمیٹ کی ہوا ہے جتنی کہ اُسی کرہ ہوائی میں ج نصف قطر کے ایک کرہ کی لسلہ کو عین پھر سکتی ہے۔ اگر جہلی اسطوارہ کی شکل کی ہو جبکہ قرصوں کے درمیان فاصلہ b ہو تو ثابت کرو کہ قرصوں کے درمیان

فاصلہ کو $2b$ تک ٹھکانا ہو گا تاکہ جہلی کرہ کی شکل اختیار کرے جہاں

$$y = (2a + 2b) \left\{ \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \right\} + \frac{2ab}{a^2 + b^2} \left\{ \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \right\}$$

$$= \frac{2ab}{a^2 + b^2} (a^2 - b^2)$$

۲۲۔ تاروں کا ایک فریم ب ارتفاع کے منشور کی شکل کا ہے جس کے قاعدے صلیع و کے متساوی الاضلاع مثلث ہیں۔ اگر اس فریم کو عابون آمیز بانی میں ڈب دیا جائے تو توازن کی حالت میں مستوی چلیوں کی ترتیب کی نشتر رخ کرو۔ مستوی چلیوں کی صورت میں توازن کے امکان کے لئے ثابت کرو کہ ب، اور تار سے بڑا ہوا چاہیئے۔

۲۳۔ سیال کی ایک جہلی دو ایسے تاروں کو چپکی ہوئی ہے جس میں سے ہر ایک مرغول (Horse) کا ایک پیہر (Turn) ہے۔ دونوں مرغولوں کے محور ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں۔ دوران کے محاور (Steps) مساوی ہیں۔ ثابت کرو کہ جہلی کے توازن کی شرط پوری ہوگی اگر محور میں سے کڑہ نیوالی جہلی کی کسی تار کی تقریبی مساوات

$$f = \frac{a}{b} \left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} \right)$$

کی شکل کی ہو جبکہ ۲۲ عدد ہر مرغول کا کام یعنی دو متضاد چوڑیوں (Threads) کا درمیانی فاصلہ۔

۲۴۔ تار کے ایک مرغول کی گھمائی ہے اور اس کا طول بمقابلہ اس کے قطر کے بہت بڑا ہے اس لئے محور کے سروں سے ایک پچکدار ڈوری (چپک کی قدر ع) باذہ دی گئی ہے تار کے ہر سروے کو نصف قطر کی سمت میں موڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ محور سے جالے۔ ڈوری جب سیدھی دیتی ہے نوچست لیکن بے تنی ہوئی ہوتی ہے اگر مرغول اور ڈوری کو عابون کے محلول میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو ایک جہلی تار اور ڈوری سے چپکی ہوئی نکلتی ہے ثابت کرو کہ سروں کے نزدیک کے حصوں کے سوا ڈوری نصف قطر کے ایک مرغول میں گھنچ جاتی ہے جہاں مساوات (۱۶) ف ۲ ت ۲ - ۲۴ ع ۲ (۲۴ + ۲۳) ف ۲ ت ۲

کرہ ہوائی سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک ہم مرکز جوف ہے جو ہوا سے بھرا ہوا ہے جس کا حجم اس کرہ ہوائی کے دباؤ پر $\frac{2}{3}\pi r^3$ ہوتا ہے۔ مانع کا سطحی تناؤ T ہے۔ ثابت کرو کہ توازن کی صورت میں جوف کا نصف قطر لا مساوات

$$\pi \left(1 - \frac{2}{3}\right) r^3 = \left\{ \frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho'} \right\} \left\{ \frac{2}{3}\pi r^3 + \frac{2}{3}\pi r'^3 \right\} - \frac{2}{3}\pi r^3$$

سے حاصل ہوگا۔

۲۹۔ اگر کثافت T کے مانع کی کچھ کثیت قوتوں کے ایک بقائی نظام کے زیر عمل توازن میں ہو جن کا وہ کسی نقطہ پر رہے ہے جہاں r ایک ثابت نقطہ و سے فاصلہ ہے اور اگر شیشے کی دو متوازی تختیاں جن کے نزدیک زرخوں کے درمیان بہت چھوٹا فاصلہ $\frac{1}{2}$ ج ہے مانع میں د کے متقابل جانبوں میں رکھ دی جائیں اور اگر ان تختیوں میں د کے متقابل چھوٹے سوراخ ہوں جن میں سے مانع بہہ کر جاسکتا ہے تو ثابت کرو کہ ایک بوجہ دو تختیوں کے بھیجے ہوئے دائری رقبوں کے اندرونی و بیرونی نصف قطر ہیں مساوات

$$m \text{ ج } T \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho'} \right) = m \text{ جم } m$$

سے مربوط ہونگے۔ جہاں m وہ مادہ ہے جو ماہوائی سطح شیشے کے ساتھ بناتی ہے اور m شکاری مستقل ہے۔

۳۰۔ شیشے کی ایک بڑی تختی ایک مانع کی سطح سے اٹھائی گئی ہے اس طرح مانع F اور کفار تک اوپر کھینچا جاتا ہے اور تختی کی پچھلی سطح کے ساتھ زاویہ تماس کا متمم θ ہے ثابت کرو کہ مانع سے بھیجے ہوئے دائری حصہ کا نصف قطر تقریباً

$$\frac{1}{2} b^2 (1 - \frac{1}{\rho}) / (F - b^2 \text{ جب } \frac{1}{2} \rho)$$

ہے۔ جہاں $b^2 = m^2 T / \rho$ T سطحی تناؤ T اور مانع کی کثافت T ہے۔
۳۱۔ مانع کی ایک جہلی ایک گردشی سطح کی شکل میں ٹنک رہی ہے اس کا محور انحصاری ہے۔ اس کی اوپر کی حد یا احاطہ ایک دائری تار ہے جو انفاٹھا گیا ہے

اور بجلی حد ایک دزنی یکدم لگا رہے جو نصف قطر کے ایک افقی دائرہ کی شکل میں آزادانہ ٹپک رہا ہے۔ تاگے کا قدرتی طول ۴۲' اس کے پچک کی قدر ۱۰' اس کا وزن ۱۰۲' اور جہلی کا تناؤ ۱۰' ہے۔ ثابت کر دو کہ مساوات

$$(۱۰' - ۱۰' ت) (۲ - ۲) = ۲۰' + (۱۰' + ۱۰') = ۲۰' .$$

کو پورا کرتا ہے۔

۴۔ مائع کی ایک جہلی بیرونی طرف سے ایک اسے سداستوار سے محدود ہے جس کے (تار کے) منحنی کا ایک ہی مستوی میں ہونا ضروری نہیں جہلی کی اندرونی حد ایک بدلائم تھاگاہ ہے۔ ثابت کر دو کہ کسی سطح پر تاگے کا نصف قطر انحناء مستقل ہے اور یہ کہ مرٹز (Torsion) کا نصف قطر جہلی کے اس نقطہ پر کسی ایک صدی نصف قطر انحناء کے عددًا مساوی ہے۔

۵۔ تار کے ایک دائرہ کو (نصف قطر) صابون آمیز پانی کی سطح میں رکھ کر آہستہ آہستہ اٹھایا گیا ہے تاکہ اس کے ساتھ ایک جہلی اُٹھ آئے۔ اس کے وزن کو نطر انداز کر کے ثابت کر دو کہ جہلی کی نصف انہاری قواش ایک ربعیرہ ہے۔ جہلی پانی کی ہوا سطح کو جس راویہ یر ملتی ہے اس کو معلوم کرو۔ یہ ثابت کر دو کہ نصف انہاری منحنی کا مبدل جبکہ جہلی کا رقبہ ۴۲' کے مساوی ہو ۱۰' رہے جہاں ہی

$$جزئی + ی (ی - ۱) = ۱ = ی$$

سے حاصل ہوتا ہے۔

(۱۲۶)

۶۔ ستارہ نلی کا سر اجب پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے تو پانی ف ارتفاع تک اس میں چڑھ جاتا ہے۔ نلی کو پانی سے ہٹا لیا جاتا ہے اور نصف قطر کا ایک قطرہ اس کے سرے پر نمودار ہوتا ہے اگر نلی میں تیل ہو سکے پانی کا طول قطرہ کی تہ سے نلی کے اندرونی آبی ستون کی چوٹی تک ف ہو تو ثابت کر دو کہ سطحی ٹانہ

$$۲ ف / ج ث = (ف - ف) - ۱۰' ر$$

۳۸۔ مانی کا ایک قطرہ شیشے کی ایک انقح تختی کی پختی سطح سے نکلتا رہا ہے اگر سطحی تناؤ کو یانی کے ذہنی وزن کے ساتھ نسبت منہ ہو اور $\frac{1}{4} = \frac{1}{6}$ (فرزہ/فرس) جہاں قطرہ کے نصف الہاری منحنی کی قوس سے ہے اور وہ زاویہ ہے جو نصف الہاری مسحی کا اس افقی سے بنا ہے تو ثابت کرو کہ

$$(ج ب ذ + ع) (۲ جب ذ + ۳ = ۲ ع مس ذ + ۳ ق ط ذ + ۳ ع + ع)$$

$$\left(\frac{۲ + ۳ ق ط ذ}{۲ ع مس ذ} - \frac{۲ + ۳ ق ط ذ}{۲ ع مس ذ} \right)$$

جہاں $\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳}$ $\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳}$ $\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳}$ اور یہ کہ مربع قطرہ انداز کر دیا جائے تو ثابت کرو کہ نصف الہاری منحنی کے انحناء مربع ہے

$$\frac{\frac{۲}{۳} \frac{۲}{۳} \frac{۲}{۳}}{\frac{۲}{۳} \frac{۲}{۳} \frac{۲}{۳}}$$

جہاں $\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳}$ اور نقطہ انعطاف پر لا کی قیمت لا ہے۔

۳۹۔ دیہ راس ۲ کا ایک طویل فاصلہ مانی میں تیر رہا ہے اس طور پر کہ اس کا قاعدہ افقی اور اس کا اوپر کا کنارہ انی کی مدد سے ہوا سطح میں ہے۔ اگر سرور پہ شعاعی سطح قطرہ انداز کر دیا جائے تو ثابت کرو کہ

$$و = ۲ = ۲ \text{ متقطعہ (جب ع + جم ج)}$$

جہاں فائدہ کارن فی اکائی طول و اس کے مساوی حجم کے بانی کا وزن و سطحی تناؤ مت اور وقت شعری کے راویہ کا کلمہ ہے۔

۴۰۔ حجم کے یارہ کا ایک قطرہ بعبیر ونی قوتوں کے عمل کے شیشے کی دو (۱۹۶) ہارزی جھتیوں کے درمیان دھایا گیا ہے۔ قوتوں کا درمیان فاصلہ سطحی تناؤ مت شیشے از یارہ کے لئے راویہ تماس نہ ہے۔ ثابت کرو کہ مطلوبہ دہان کی مقدار

$$۲ = ۲ \text{ متقطعہ / (۱ - م)}$$

باب یازدہم

گھومنے والے مائع کا توازن جس کے ذرات ایک دوسرے کو جذب کرتے ہیں

۱۸۶۔ اگر مائع کی کچھ کمیت جس کے ذرات ایک معین قانون کے بموجب ایک دوسرے کو جذب کرتے ہیں یکساں رفتار سے ایک تاب محور کے گرد گھومنے تو آزاد سطح کی کسی خاص شکل کے لئے یہ قرین قیاس ہے کہ مائع کے ذرات اصفانی نوارن کی حالت اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ کیفیت چرکہ کسی درہ یکل کمیت کی حاصل کشش عام طور پر اس کی شکل پر منحصر ہوگی جو غیر معلوم ہے اس لئے اس مسئلہ کا مکمل حل حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

کشش کے کسی اختیاری طور پر مقرر کردہ قانون کی صورت میں یہ مسئلہ محض لٹری دیکھی کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ قانون تجاذب کا قانون ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ طبیعی ہیت کے ایک مسئلہ سے اس کا تعلق ہے۔

ہم سیال کو متحاض خیال کرینگے اور اپنی توجہ صرف دو صورتوں تک محدود رکھیں گے۔ پہلی صورت میں متحاضی قوتوں کا فاصلے کے متناسب ہونا اور دوسری صورت میں یون کے کلیہ کی باندی کرنا فرض کر لیا جاتا ہے۔

۱۸۷۔ متحاض مائع کی کچھ کمیت اپنی کمیت کے مرکز میں سے گزرنی والے ایک محور کے گرد یکساں رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اس کے ذرات ایک دوسرے کو ایسی قوت سے جذب کرتے ہیں جو ایسے بدلتی ہے جیسے فاصلہ آزاد سطح کی شکل متعین کرنا مطلوب ہے۔

کسی درہ مرکز حاصل کشش اس فاصلے کی مدد میں اور اس کے متناسب ہے

جو ذرہ اور کیت کے مرکز کے درمیان ہے، اور اگر سیال کی کل کیت کا ناپ
 وہ ہو تو نقطہ لا، لا، ی پر کے سیالی ذرہ پر حاصل گردش کے اجزائے ترکیبی
 محوروں کے متوازی، مہ لا، مہ ما، مہ می سے تعبیر ہو سکتے ہیں۔
 مہ لا کو مرکز ثقل پر لینے سے اور گردش کے محور کو محوری قرار دیتے ہیں
 توازن کی مساوات ہے

$$\text{فرد} = \{ (\text{سہ لا} - \text{مہ لا}) \text{فرلا} + (\text{سہ ما} - \text{مہ ما}) \text{فرما} - \text{مہ می فرمی} \}$$

اور اس لئے

$$د = \text{مہ} + \text{پا} \{ (\text{سہ لا} - \text{مہ لا}) (\text{لا} + \text{ما}) - \text{مہ می} \}$$

آزاد سطح پر د صفر یا مستقل ہے اور آزاد سطح کی مساوات ہے

(۱۹۹)

$$(ا - \text{سہ}) (\text{لا} + \text{ما}) + \text{مہ می} = \text{ل}$$

مستقل لی سیال کی کیت پر اور سہ پر منحصر ہوگا۔

سہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو آزاد سطح تقریباً گردی ہوتی ہے اور جیسے
 سہ صفر سے مہ تک بڑھتا ہے تو گردی سطح قطبین پر زیادہ ترجیحی ہوتی جاتی ہے۔
 جب سہ = مہ تو آزاد سطح دو مستویوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کو ممکن بنانے
 کے لئے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ سیال ایک اسطوانی سطح کے اندر گھرا ہوا ہے جس کا محور
 گردش کے محور پر منطبق ہوگا۔

جب سہ = مہ تو آزاد سطح زائد نفاذ چادری ہوتی ہے جو سہ کی ایک
 خاص قیمت (سہ) کے لئے مخروط بن جاتی ہے اور سیال اس نفاذ کو پر کرتا ہے جو
 مخروط اور اسطوانے کے درمیان ہے۔ سیال کے حجم کو محسوب کرنے کے لئے یہ دیکھنے
 سے سہ کی تعین ہو سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں مہ لا، مہ ما، مہ می معدوم ہو جاتا ہے۔
 اگر سہ < مہ تو آزاد سطح زائد نفاذ چادری ہوتی ہے جو جیسے سہ بڑھتا ہے
 اسطوانہ کی شکل کے قریب آتی ہے اور اس لئے سہ کی بڑھی قیمتوں کے لئے یہ
 قیاس کرنا ضروری ہے کہ اسطوانہ جس کے اندر سیال ہے اسے سرور پر بند ہے۔

اس دفعہ کے نتائج غیر متجانس سیال پر بھی صادق آتے ہیں خواہ متواتر طبقات میں کثافت کے تغیر کا قانون یکساں ہی ہو۔

۱۸۸ — متجانس مائع کی یکجہیت جس کے درات کلیہ یون کے بموجب ایک دوسرے کو جذب کر لے ہیں امانی توازن کی حالت میں اپنی کمیت کے ساتھ میں سے گزرے والے ایک سو کے گرد یکساں رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ سطح کی ممکن شکل معلوم کرنا مطلوب ہے۔

اس مسئلہ کا ایک حل درج کرنا ممکن نہیں جس کی وجہ پر ملا دی گئی ہے لیکن یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ یہاں (Oblate) کرہ توازن کی ممکن شکل ہے۔
فرمیں کرہ کرہ نما کی مساوات سے

$$1 = \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2(1 + \frac{a^2}{b^2})}$$

جہاں گردش کا محور محور ی ہے۔
تب نقطہ (۱، ۰، ۰) پر کے ذرہ پر مباد کی سب میں محاور کے متوازی حاصل کششیں بالترتیب

$$F_x = \frac{2\pi \rho a^2 b^2}{3} \left\{ \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right\} x$$

$$F_y = \frac{2\pi \rho a^2 b^2}{3} \left\{ \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right\} y$$

$$F_z = \frac{2\pi \rho a^2 b^2}{3} \left\{ \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right\} z$$

سے تعبیر ہو چکی۔

۱۹ — ایلاس کی (Elastic Mechanique) یا بس کی (Mechanique Meranique) ڈیویل کی (Mechanique) اور ٹاؤنہنر کی سکویات میں۔ جملے جملے۔ موجد الکر کتاب میں کہ ما کی مساوات (۱، ۰، ۰) + ۱/۲ = ۱ - ۱/۲ = ۱ لیکن ۱ - ۱/۲ = ۱/۲ (۱ + ۱/۲) رکھنے سے تذکرہ بالا جملے حاصل ہوتے ہیں۔

توازن کی مساوات ہے

$$\text{فرد} = \text{ث} \left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ لا} - \text{لا} \\ (2) \text{ لا} - \text{لا} \\ (3) \text{ لا} - \text{لا} \end{array} \right\}$$

لیکن کردہ نفا کی مساوات سے

$$\text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} = \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا}$$

$$\text{سہ} - \text{کا} / \text{ما} = \text{سہ} - \text{ما} / \text{ما} = - \text{سے} / \text{لا} + \text{لا} + \text{لا}$$

پس پھر حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{سہ} - \text{کا} / \text{ما}}{\text{لا}} = \frac{\text{سہ} - \text{ما} / \text{ما}}{\text{لا}} = \frac{\text{سے} / \text{لا} + \text{لا} + \text{لا}}{\text{لا}}$$

$$\frac{\text{سہ} - \text{کا} / \text{ما}}{\text{لا}} = \frac{\text{سہ} - \text{ما} / \text{ما}}{\text{لا}} = \frac{\text{سے} / \text{لا} + \text{لا} + \text{لا}}{\text{لا}} \quad (1)$$

اگر سہ در ث دئے جائیں تو اس مساوات سے لا متعین ہو جاتا ہے اور پھر کردہ ما کے پھر محوروں کی باہمی نسبت معلوم ہو جاتی ہے۔
اصلی حل دریافت کرنے کے لئے فرض کرو کہ

$$\text{لا} = \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} \quad (2)$$

مس لا کی بجائے اس کے سلسلے کو بند بن کر دے تے جسے ہم جانتے ہیں کہ مستحق

ہے جبکہ لا > ۱ حاصل ہوتا ہے

بقیہ نوٹ صفحہ (۳۰۶) کے استعمال سے پھر منطق متداول مسائل ہیں ۴ میں مسائل اشکال
کیلون اور ٹیٹ (Natural Philosophy) کے دہ ۵۲۰ میں اور دوسرے کی تحلیل سکونیات
حصہ دوم صفحہ ۲۱۹ میں مذکور ہیں۔

$$(ج) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1$$

$$\text{نیز } \frac{1}{n} = \frac{(n+1) - (n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

$$(گم) \quad \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right\} = \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= \frac{1}{n(n+1)} \quad (ف)$$

جہاں

$$ف (ن) = \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اشکال (ج) اور (ب) سے ظاہر ہے کہ بالترتیب $1/n = 0$ اور $1/n = \infty$ کے لئے
 امدوم ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ جیسے $1/n$ صفر سے بڑھتا ہے تو $1/n$ ایک
 اور صرف ایک نوبت اعظم اختیار کرتا ہے۔

نیز $\frac{1}{n}$ کی علامت صرت $f(n)$ کی علامت پر منحصر ہے،

$$1/n = 0 \quad \text{تو} \quad f(n) = 0$$

$$1/n = \infty \quad \text{نو} \quad f(n) = -\infty$$

یہ نہیں حاصل ہوتا ہے


$$f(n) = \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اور یہ $1/n = 0$ سے $1/n = \infty$ تک مثبت ہے اور اس سے بڑی لاکھوں مقامات پر
 کے لئے منفی ہے۔ پس $f(n)$ مثبت ہونے سے ابتدا کرتا ہے اور اس وقت
 تک بڑھتا ہے جب تک $1/n = 0$ نہ ہو جائے۔ لیکن اس سے بڑی نہیں کیلئے
 $f(n)$ مسلسل گھٹتا ہے۔ اس لئے $f(n)$ لاکھوں ایک ایسی مثبت کے

لئے معدوم ہوتا ہے جو اس سے بڑھی ہے۔ جدولوں کی دیکھ کر ہم باسانی دیکھ سکتے ہیں کہ (۲) مثبت ہے اور (۳) منفی، اس لئے مطلوبہ قیمت ۲ اور ۳ کے درمیان واقع ہے۔ نیز $f(2.5) = 0.025$ تقریباً اور

$$\text{نیوٹن کے طریقہ تقریب سے } 2.5 - \frac{f(2.5)}{f'(2.5)} = 2.5 - \frac{0.025}{0.293} = 2.5293$$

$$2.5293 =$$



پس $\frac{f(x)}{f'(x)}$ صرف اس وقت معدوم ہوتا ہے جبکہ $2.5293 \dots$ اور اس وقت λ اعظم ہے اور اس کی قیمت 2.224 ہے۔ اس لئے مساوات (۲) کی ترمیم اس شکل ہوگی جو زیر میں دکھائی گئی ہے لیکن اس میں معین کا پیمانہ فضلہ کے پیمانہ سے بڑا لبا گیا ہے۔

پس ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اگر $\frac{f(x)}{f'(x)} < 2.224$ تو چٹا کرہ نما توازن کی ممکن شکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر $\frac{f(x)}{f'(x)} > 2.224$ تو دوکرہ نمائی اشکال ممکن ہیں کیونکہ 2.224 سے کم، معین کی ہر قیمت کے جواب میں فصل کی دو حقیقی قیمتیں λ ، λ حاصل ہوتی ہیں۔

۸۹- کرہ نمائی اشکال کی ہیلیجیت - جب λ کی دو حقیقی قیمتیں λ ، λ (۲۰۲)

ہوں تو ایک 2.5293 سے بڑی اور دوسری اس سے کم ہوگی۔ فرض کرو کہ $\lambda < \lambda$ تو جیسے $\frac{f(x)}{f'(x)} \rightarrow 0$ گھٹتا ہے اور λ بڑھتا ہے (دیکھو شکل)

اور چونکہ لمبے ۲۵۲۹۳ اس لئے $۱۱ + ۱$ لمبے < ۲۵۶۲ لیکن نیم محوروں میں نسبت $۱۱ : ۱$ سے اس لئے کہ لکڑی قیمت ہمیشہ بہت زیادہ چھپے کرہ نما کو تعبیر کرتی ہے اور $۲/۲$ سے ۲۲ ٹھکانا زیادہ چھوٹا لیں وہ کرہ نما زیادہ تر جیٹا ہو جاتا ہے جو اصل لمبے کے متناظر ہے۔
 نیز $۲/۲$ سے ۲۲ ٹھکانا کی جیوڈیٹ قیمتوں کے لئے اصل لمبے چھوٹی ہوگی اور اگر وہ کرہ نما کی پبلیشیت کو تعبیر کرے تو

$م (۱ + ص) = م (۱۱ + ۱)$ اس طرح $ص = \frac{۱}{۱۱}$ تقریباً اور اس لئے مساوات (ج) سے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{۱}{(۳ + ۲ن)(۱ + ۲ن)} = \frac{۱}{۱۵} = \frac{۱}{۱۵}$$

سہ کی پہلی تہ تک - !

ص = ۱۵ سے $۲/۲$ سے ۲۲ ٹھکانا تقریباً

میکانک پہلا شخص تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ سنجاس سیال کی کمیت جبکہ وہ گرم رہی ہو تو نازن کی نما شکل پیدا کرے گا ہوتی ہے اور اس لئے ان کرہ نماؤں کو عام طور پر میکلائڈن کے کرہ نما کہتے ہیں۔

۴۰۔ ایسے جان کی صورت میں اس مسئلہ کا استعمال جس کی کثافت زمین کی اوسط کثافت کے مساوی ہے۔

اگر ہم فی الحال زمین کو نصف قطر کا ایک کرہ مابین اور اس کی اوسط کثافت کو ۳ سے تعبیر کریں تو اس کی سطح پر کی کثافت ۳ سے تعبیر ہوگی۔
 اس سے قطب پر جاذبہ ارض کی قوت (ج) کی بھی پیمائش ہو جاتی ہے۔

لے ڈارن کی کتاب Scientific Papers خلاصہ کے صفحہ ۲۳ میں $۲/۲$ سے ۲۲ ٹھکانا کی قیمت پبلیشیت کی تیسری قوت تک حاصل کی گئی ہے۔

س۔ گ۔ میں نظام کی اکائیوں میں ج = ۹۸۰ تقریباً اور ۲۲ = ۴ × ۱۰ سنٹی میٹر۔
اس لئے ہیپنی اکائیوں میں

$$\text{ث} = ۳ / ج = ۲۲ / ۳ = ۳۶۶۵۵ = ۹۶۰$$

اگر ہم کرہ نمائی شکل کے لئے $۲۲ / ۳$ ث کو اس کی انتہائی قیمت ۲۲۲۷ کے مساوی لیں اور ث کی شدہ کرہ بالا قیمت کو استعمال کریں تو محوری گردش کا وقت ۲۲ / ۳ = ۲ گھنٹے ۲۵ منٹ حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے یہ قلیل ترین وقت ہے جس میں کچھ متجانس کیت جس کی کثافت زمین کی اوسط کثافت کے مساوی ہے یکساں رفتار سے ایک چپے کرہ نما کی شکل میں گھوم سکتی ہے۔

پھر اگر ہم سمہ کی بجائے زمین کی زاویائی رفتار $\frac{۲۲}{۳۶۰ \times ۲۴}$ استعمال کریں تو

$$\frac{۲}{\text{ث}} = \frac{۹۰ \times ۲۲}{۳۶۶۵۵ \times ۲۶۰ \times ۲۴} = ۰.۲۳ \text{ تقریباً}$$

(۲۳)

جو انتہائی قیمت ۲۲۲۷ سے کم ہے اس کثافت اور اس زاویائی رفتار کے لئے دو کرہ نمائی اشکال ممکن ہیں کیونکہ ل کی دو حقیقی قیمتیں ملتی ہیں جیسا کہ دفعہ (۱۸۱) میں واضح کر دیا گیا ہے۔ بڑی قیمت ایک بہت چپے کرہ نما کے متناظر ہے اور چھوٹی قیمت سے ایک ایسا کرہ نما حاصل ہوتا ہے جس کی ہیلیجیت دفعہ (۱۸۹) کی رو سے ہے

$$\frac{۱}{۲۳۲} = \frac{۱۵}{۸} \times ۰.۲۳ = ۰.۴۳ \text{ تقریباً}$$

علم مساحت الارض سے ہم جانتے ہیں کہ زمین اپنی شکل میں ایک کرہ سے بہت ہی کم فرق رکھتی ہے کیونکہ اس کی ہیلیجیت $\frac{۱}{۲۴۹۱۵}$ ہے یعنی کرہ نما

ملے دیکھو انسائیکلو پیڈیا ری ٹابیکا میں (A R Clarke) اور (F R Helmeit) کا

مضمون (Figure of the Earth)

کے محوروں میں نسبت $۳۰۰/۱۵ : ۲۹۹/۱۵$ ہے۔
اب یہ واقعہ کہ متجانس سیال کے ایک کرہ نما کے محورس کی کثافت میں کی اوسط کثافت کے مساوی اور جس کی گردش کا وقت زمین کی گردش کے وقت کے مساوی ہو $۲۳۳ : ۲۳۲$ کی نسبت رکھتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل خارج از امکان ہے کہ زمین اپنے دور حیات میں کسی وقت ایک متجانس سیال کی کثافت تھی۔
۱۹۱۔ البوترا کرہ نما ممکن شکل نہیں۔ یہ معلوم رہے کہ ہم نے امانی توازن کی حالت میں گھومنے والے سیال کی شکل کے عام مسئلہ کو حل نہیں کیا ہے بلکہ

صرف یہ دکھایا ہے کہ اگر $۲۲/۲$ ث > ۲۲۲۴ تو جیسے کرہ نما ممکن شکل ہے اور ہم دیکھے ہیں کہ یہ نتیجہ سیال کی مقدار کثافت پر منحصر نہیں بلکہ صرف

کثافت اور زاویہ رفتار پر منحصر ہے۔ اگر $۲۲/۲$ ث < ۲۲۲۴ تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ توازن ناممکن ہے بلکہ صرف یہ کہ اس صورت میں جیسے کرہ نما کی شکل ممکن نہیں ہے۔

اب یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آیا البوترا کرہ نما ممکن شکل ہے یا نہیں ہم دفعہ (۱۸) میں لہ کی بجائے لہ لکھتے ہیں جہاں لہ ہونا چاہیے > ۱ ۔ تب اس دفعہ کی (ع) اور (ج) مساواتوں سے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(3+n^2)(1+n^2)} = \frac{1}{2}$$

جو ناممکن ہے کیونکہ مساوات کے طرفین مختلف العلامت ہیں۔ پس البوترا کرہ نما توازن کی ممکن شکل نہیں ہو سکتا۔

۱۹۲۔ پائسن (Tomc II p 547) یہ بتایا ہے کہ بیرونی قوتوں کے زیر عمل ساکن سیال کی مساوی دباؤ کی سطحوں اور ایسے سیال کی مساوی دباؤ کی سطحوں کے درمیان ضروری فرق ہوتا ہے جو اپنے درات کی ایک دوسرے کو جذب کرنے والی قوتوں کے زیر عمل ساکن ہے یا ان کے زیر عمل ثابت محور کے گرد نیکیاں رفسار سے

گھوم رہا ہے۔

فرض کرو کہ Δ ب ج آزاد سطح اور Δ ع ف مساوی دباؤ کی کوئی سطح ہے تب پہلی صورت میں Δ ع ف کے کسی نقطہ پر کی حاصل قوت اس نقطہ پر سطح کے عمود وار ہے اور Δ ب ج اور Δ ع ف کے درمیانی سیال کے وجود سے غیر متاثر رہتی ہے۔ اس لئے اگر اس سیال کو نکال دیا جائے تو اس سیال کے توازن پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑیگا جو Δ ع ف سے محدود ہے۔ دوسری صورت میں Δ ع ف کے کسی نقطہ پر کی قوت اگر یہ کہ اس نقطہ پر سطح کے عمود وار ہے لیکن Δ ع ف کے اندرونی سیال کی کثیت کی اور Δ ع ف اور Δ ب ج کے درمیانی سیال کی کثیت کی کششوں کا حاصل ہے، حاصل قوت کے ان دو اجزا ترکیبی کا سطح کے عمود وار ہونا ضروری نہیں اور عام طور پر Δ ع ف کے اندرونی سیال کو بقیہ سیال کے توازن پر اثر ڈالے بغیر علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔

لیکن اگر سیال متبائن ہو اور ذرات کلیہ نیوٹن کے بموجب ایک دوسرے کو جذب کرتے ہوں اس طرح کہ آزاد سطح کرہ نما ہو تو مساوی دباؤ کی سطحیں متشابہ کرہ نما ہوں گی اور ایسی صورت میں چونکہ دو ہم مرکز متشابہ اور متشابہ واقع ناقص نماؤں سے گھرے ہوئے ناقص نمائی خول کی حاصل کشش اس کے اندرونی نقطہ پر صفر ہوتی ہے اس لئے Δ ب ج اور Δ ع ف کے درمیانی سیال کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ گردش کی رفتار غیر متغیر رہے۔

مزید براں ہم نے دفعہ (۱۸۸) میں یہ دیکھا ہے کہ سید کی کسی سی ہوئی قیمت کے لئے جو ایک مسینہ حد سے تجاوز نہیں کرتی دو کرہ نما اشکال ممکن ہیں۔ فرض کرو کہ آزاد سطح Δ ب ج ان میں سے ایک شکل اختیار کرتی ہے۔ سیالی کثیت کے اندر ایک ہم مرکز کرہ نما گھگھکیچو جو دوسرے کرہ نما کے متشابہ ہو۔ تب Δ ب ج اور گھگھ کے درمیانی سیال کو سیالی کثیت گھگھ پر کسی قسم کا اثر ڈالے بغیر علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔

سطح گھگھ کے نقطہ نیر کے ذرہ پر خول کا عمل نقطہ نیر پر سطح کے عمود وار نہیں ہے لیکن یہ عمل، کثیت گھگھ کی کشش اور مفروضہ قوت

سمتہ ر کے ساتھ ملکر نقطہ ن پر اس کرہ مانع کے عمود وار ہے جو نقطہ ن سے گزرتا ہے اور سطح ا ب ج کے ہم مرکز اور متناہ ہے۔

دوسرے الفاظ میں سطح کے ایک درہ کا وزن اس مساوی دما کی سطح کے عماد کی سمت میں عمل کرتا ہے اور کسی اندرونی درہ کی صورت میں اس مساوی دما کی سطح کے عماد کی سمت میں عمل کرتا ہے جو درہ سے گزرتی ہے۔

اسی طرح اگر آدھ سطح ا ب ج کی شکل ممکن اشکال میں سے ایک ہو تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ مانع کا ایک ہم مرکز خول کیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جس کی بیرونی سطح اسی شکل کی ہے جسے ا ب ج یا درہ کی شکل کی سطح ہے۔

پہلی صورت میں ا ب ج مساوی دما کی سطح بھی ہوگی لیکن دوسری صورت میں ا ب ج مساوی دما کی سطح نہیں ہوگی۔ کیونکہ مساوی دما کی سطحیں بیرونی سطح کے متناہ اور متناہ واقع ہوگی۔

۱۹۴۰ — اگر سیال کی کچھ کیت اپنے مرکز قتل میں سے گزرنے والے ایک محور کے گرد ایک ایسی زاویہ رفتار سے گھما دی جائے کہ سمتہ ر ۲۲ ڈیگری کی قیمت دفعہ (۱۸۸) میں حاصل شدہ حد سے متجاوز نہ رہے تو اس سے یہ مستنبط نہیں ہوتا کہ سیال کرہ مانع کی شکل میں متوازن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ کیت طرف میں بلجناؤ محور کے پھیل جائیگی اور زیادہ چھٹی صورت اختیار کرے گی حتیٰ کہ اس کی زاویہ رفتار اس قدر گھٹ جائے کہ کرہ مائل کا امکان ہو جائے۔

اگر کیت سیال کال یہ متناہ ہو تو اس کی شکل توازن کے کرہ مائل میں سے ہوتا ہے کہ کیت کی شکل اگرچہ تمام معلوم سیالوں کی صورت میں ہوتا ہے، ذرات کے انسانی مثلاً سے لگا پیدا ہونا بہتر ذرات بتدریج گھٹنے چاہیں گے اور بالآخر وارن کا ایک محل روم ہوگا۔ اب یہ اصول استعمال کر کے کہ کل نظام کا زاویہ معیار حرکت تلخ ظہور کے مستقل رہیگا ہم اہم اتہائی زاویہ رفتار اور اختار کردہ اہم اتہائی شکل معلوم کر سکتے ہیں۔

عام سوال یہ سخت کرنے کے لئے فرض کرو کہ سیال کی کیت کو کسی طرح حرکت دیدی گئی ہے اور پھر اسکو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا ہے تو کیت کا مرکز یا توازن ہوگا یا یکساں

رفتار سے ایک خط مستقیم میں حرکت کر لینگا۔ اس حرکت میں محور کرنا ہو گا جو کمیت کے مرکز کے لحاظ سے ہے۔

کمیت کے مرکز میں سے ایک ایسا مستوی کھینچو جس کی سمت میں زائدی معیار حرکت اعظم ہے۔ تب یہ مستوی جبکہ مبیاری مستوی کہا جاسکتا ہے ثابت رہے گا خواہ حرکت کا بعد میں سیال کے ذرات ایک دوسرے پر کسی طرح کا عمل کریں اور جب ذرات کی اضافی حرکت اُن کی باہمی رگڑ سے فنا ہو جائیگی تو اضافی توازن کی حالت میں اس مستوی پر کا عمود وار محور سال کی کمیت کا گرد دستس کا محور ہو گا۔ فرض کرو کہ نظام کا دیا ہوا زائدی معیار حرکت ہے اور بالآخر اسکی زائدی رفتار صفر ہے۔

(۲۰۶)

توازن کے کردہ فنا کے محوروں کو ج اور ج ۱ + لآ سے اور کمیت کو ک سے تعبیر کریں تو زائدی معیار حرکت کے لئے حل ۱/۲ ک ج ۱ + لآ سے حاصل ہو گا۔

$$\therefore \frac{1}{2} \text{ ک ج } (1 + \text{لآ}) = \text{ہ}$$

$$\text{نیز } \frac{3}{2} \text{ ج } (1 + \text{لآ}) = \text{ک}$$

ان دو مساواتوں اور مساوات

$$\frac{\text{سہ}}{2} = \frac{(3 + \text{لآ}) \text{ مسن لہ}}{3} \dots \dots \text{دفعہ (۱۹۸)}$$

سے ج ۱ + لآ اور لہ کی قیمتیں دریافت کیجا سکتی ہیں۔ پہلی دو مساواتوں سے

$$\frac{\text{سہ}}{2} = \frac{(3 + \text{لآ}) \text{ مسن لہ}}{3} = \frac{(3 + \text{لآ}) \text{ مسن لہ}}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{(3 + \text{لآ}) \text{ مسن لہ}}{2}$$

$$\frac{(3 + \text{لآ}) \text{ مسن لہ}}{2} = \frac{(3 + \text{لآ}) \text{ مسن لہ}}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{(3 + \text{لآ}) \text{ مسن لہ}}{4}$$

جس سے لہ کی قیمتیں ہو جاتی ہے۔

اس مساوات کی ہمیشہ ایک اصل وجود کہتی ہے کیونکہ داہنی طرف کا جملہ

لہ کے ساتھ صفر اور لا تباہی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو ایک ایسی قیمت اختیار کر لی جیسا کہ جو سزاورہ کے درمیان لہ کی کسی خاص قیمت کے لئے بائیں طرف لے مثبت مستقل کے مساوی ہو۔ مزید برآں یہ بتایا جاسکتا ہے کہ اس مساوات کی صرف ایک اصل مثبت ہے کیونکہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہی طرف کے ملا کا متعلق ہمیتہ مثبت ہے۔ اس لئے ہ اور ک کو وہی ہوں متعدد میں سمجھ لیں ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ایک اور صرف ایک کرنا شکل ہوگی جس کی طرف اجتہاد کرنے والا سیال مسلسل داخل ہوتا جائیگا

Mécanique Céleste, Tome, II

یہ قسمت لاپلاس کی کتاب

Système du Monde, Tome II

کے صفحہ ۱۰۱ میں بائیں کولان کی

Mécanique Céleste Tome, II

کے صفحہ ۲۰۹ میں اور لاپلاس کی

کے ۹۶۵ میں مل سکیں گی۔

۱۹۴ — جیولوجی کا ناقص نمبر — جیولوجی نے یہ روایت کیا کہ زمین میرے مساوی محوروں والا نامس مانگھوسے والے مانع کی کیت کے لئے اصلی توازن کی ممکن شکل ہے۔

جنگم کی کے

سنگ کا حسب ذیل توت

Journal de l'Ecole Polytechnique,

سے لیا گیا ہے۔ نو

Tome XIV میں شائع ہوا۔

آتش کے محور کو پوری لیسکر فرض کرو (اگر ممکن ہو) کہ مانع کی سطح اس شکل کی ہے جو مساوات

$$z = y + \frac{a^2}{r^2 + 1} + \frac{b^2}{r^2 + 1} \quad (1)$$

— حاصل دتی ہے۔

تب اگر مانع کی کیت ک ہو تو سطح کے لفظ (لا، ما، ی) پر کے خدو یہ کی مائل کشنیں علی الترتیب (لا، ب، ما، اور ج) ہیں۔ جہاں

$$ا = \frac{\int \frac{مک}{ج^2} \cdot \frac{ع^2 فرع}{(1 + ل^2 ع^2) ه}$$

$$ب = \frac{\int \frac{مک}{ج^2} \cdot \frac{ع^2 فرع}{(1 + ل^2 ع^2) ه}$$

$$ج = \frac{\int \frac{مک}{ج^2} \cdot \frac{ع^2 فرع}{ه}$$

جن میں ہر جملہ

$$\sqrt{(1 + ل^2 ع^2)(1 + ل^2 ع^2)}$$

کو تغیر کرتا ہے۔

آزاد سطح کی تفرقی مساوات ہے

$$(ا - لا - س^2 لا) فرلا + (ب - ما - س^2 ما) فرما + ج ی فری = ۰$$

اور اسلئے اگر آزاد سطح ناقص ما (۱) ہو تو

$$(ا - س^2 لا) (ا + لا) = (ب - س^2 ما) (ا + لا) = ج = (۲)$$

س^2 کو ساقط کرنے سے

$$(ا + لا) (ا + لا) (ا - ب) = ج (لا - لا)$$

اور 'ا'، 'ب'، 'ج' کی قیمتیں اس میں مندرج کرنے سے یہ

$$(ا + لا) (ا + لا) \int \frac{(لا - لا) ع^2 فرع}{ه} = (لا - لا) \int \frac{ع^2 فرع}{ه}$$

Mécanique C. leste, Tome, II ,

Cours de Mecanique

Statics, Vol II, p 306

نوٹ متعلقہ صفحہ (۱۰) دیکھو

(Duhamel)

(Minchin)

ڈھیل
یا مچن

میں تحویل ہو جاتا ہے۔

حل لہ = لہ کو جس سے چپا کر نہ حاصل ہوتا ہے مسترد کر کے اقسام کو
داہنی طرف منتقل کرنے سے

$$\int \frac{2x^2(1-x^2)(1-x^2-2x^2)}{3} = \dots (3)$$

اس مساوات سے لہ کی تین ہوتی ہے جبکہ لہ معلوم ہو۔

لہ کو مثبت قیمت دینے سے مساوات کی داہنی طرف کا جملہ مثبت
ہوگا اگر لہ = ۰ اور منفی اگر لہ = ∞ پس لہ کی ایک قیمت کثبت ہوگی جو
مساوات کو پورا کرے گی۔

مزید راس مساواتوں (۲) کی رو سے

$$سہ = 1 - \frac{ج}{لہ + 1}$$

$$(4) \quad \frac{3}{ج} \int \frac{2x^2(1-x^2)(1-x^2-2x^2)}{(1+x^2)(1+x^2)} =$$

اور اسلئے سہ ایک مثبت مقدار ہے۔

(۲۰۸)

پس اس کی پوری طرح تحقیق ہو گئی کہ تین غیر مساوی محوروں والا ناقص نما
آزاد سطح کی ممکن شکل ہے جس کے تینوں محور غیر مساوی ہیں اور سب سے چھوٹا
محور گردش کے محور پر منطبق ہوتا ہے۔

مساوات (۳) سے یہ ظاہر ہے کہ لہ لازماً < ۱ اور نہ مشکل شکل
کی پوری دست میں مثبت ہوگا اور اس لئے معدوم نہ ہو سکے گا۔ اس لئے
لہ لازماً < ۱

اور اس لئے / ر ج یا ب / ر ج ۱/۲ سے بڑا ہونا چاہیے۔ اس لئے
جیکو بی ناقص نما کی دونوں پیتیں چھوٹی نہیں ہو سکتیں۔

۱۹۵۔ سطح پر جاذبہ کا حاصل عمل قوتوں (ا - سہ) لا (ب - سہ) اور جی کا حاصل ہے اور اس لئے اس عمود کے بالعمک متناسب ہے جو مرکز سے ماسی مستوی پر کھینچا جائے۔

نیز اندرونی ذرہ پر مانع کی کششوں (لا، ب، ا) اور جی کو ذہن میں رکھ کر اور لیپ نیز کے مسئلہ سے استفادہ کر کے یہ بہ آسانی ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی مرکزی مستوی تراش پر کا حاصل زور اس مستوی کے عمود وار اور اس کے رقبہ کے متناسب ہے۔

۱۹۶۔ مٹرٹاؤ ہٹرنے اس طرف توجہ دلائی ہے اور حسب دیل طریقہ پر اس کی تشریح کی ہے کہ گھومنے والے ناقص نما کا اضافی توازن برقرار نہیں رہ سکتا جبکہ گردش کا محور صدی محور پر منطبق نہ ہو۔

صدی محور کے لحاظ سے فرض کرو کہ گردش کے محور کی سمتی جیوب التمام ل، م، ن ہیں کیت کا کوئی نقطہ (لا، ما، ی) ہے اور ل اس عمود کا پایہ ہے جو مرکز سے محور پر کھینچا گیا ہے۔

تب $ول = ل + م + ن$ ی
اور اگر $ول = ۰$ تول کے محدود ہیں ل، م، ن
اسراع سہ ل کو محوروں کے متوازی تحلیل کیا جائے تو اجزائے تحلیل حاصل ہوتے ہیں

سہ (لا - ل، ۰) سہ (ما - م، ۰) سہ (ی - ن، ۰)
اس لئے آزاد سطح کی تفرقی مساوات ہے

{سہ (لا - ل، ۰) - {لا} فرا + {سہ (ما - م، ۰) - {ب} ما} فرا + {سہ (ی - ن، ۰) - {ج} ی} فرا۔
پس آزاد سطح کی شکل مساوات

سہ (لا + ما + ی) - سہ (ل + م + ن) - {لا - ب - ما - ج} ی = مستقل سے
حاصل ہوتی ہے اور یہ مساوات صدی محوروں کے لحاظ سے ایک ناقص ناکو

تعبہ نہیں کر سکتی جب تک کل، م، ن میں سے دو مقداریں معدوم نہ ہو جائیں۔

(۲۰۹) مسٹر گرین بل نے یہ بیان کیا ہے کہ گردش کے محور کے سرے پر مانع کا ذرہ صرف مانع کی کشش کے زیر عمل ساکن رہے گا کیونکہ اس نقطہ پر جلد سے زرمعدوم ہو جائے گا۔ پس ذرہ برقی کشش سطح کے عماد کی سمت میں ہونی چاہیے جو صرف محور کے سرے کی صورت میں درست ہے۔

۱۹۶ — جیکوبی کے مسئلہ کا حسب ذیل ثبوت اے۔ اسمتھ نے ۱۸۳۵ء میں

(The C Mathematical Journal) کی پہلی جلد صفحہ ۹۰

میں دیا ہے۔

اگر مانع کی کچھ کیت اسٹوآجیم کے مانند زاویاتی رفتار سے محوری کے گرد گھومے اور اگر نقطہ (لا، لا، ی) پر کشش کے اجزاء ترکیبی لا، ما، سے ہوں تو آزاد سطح کی مساوات ہوگی

$$(لا - سلا) فرلا + (ما - سلا) فرما + سے فری = ۰$$

اب اگر آزاد سطح ناقص بنا ہو تو

$$لا = لا، ما = ب، ما، سے = ج ی$$

جہاں (ب، ج) مختصر نہیں ہیں لا، لا، ی پر۔

پس اگر لا، ب، ج ناقص بنا کے نصف محور ہوں تو مساواتوں

$$(لا - سلا) لافرلا + (ب - سلا) لافرما + ج ی فری = ۰$$

$$\frac{لا}{لا} فرلا + \frac{ب}{ب} فرما + \frac{ج ی}{ج ی} فری = ۰$$

کو بشرط امکان متطابق کرنا ہے۔ اس لئے مساواتیں

$$(لا - سلا) = \frac{لا}{لا}، ب - سلا = \frac{ب}{ب}، ج - سلا = \frac{ج ی}{ج ی}$$

پوری ہونی چاہئیں جن سے لا اور سلا کو ساخط کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{و}^{\text{ا}}\text{ب}^{\text{ا}} (\text{ب} - \text{ا}) - (\text{و}^{\text{ا}} - \text{ب}^{\text{ا}}) \text{ج}^{\text{ا}} = 0 \dots\dots (ع)$$

$$\text{ا ب اگر } \Delta = \{ (\text{و}^{\text{ا}} + \text{و}^{\text{ا}}) (\text{ب}^{\text{ا}} + \text{و}^{\text{ا}}) (\text{ج}^{\text{ا}} + \text{و}^{\text{ا}}) \}^{\frac{1}{3}}$$

اور اگر مانع کی کیت ک ہو تو

$$\text{ا} = \frac{\text{و}^{\text{ا}} \text{ج}^{\text{ا}}}{\Delta (\text{و}^{\text{ا}} + \text{و}^{\text{ا}})} \quad \text{ب} = \frac{\text{و}^{\text{ا}} \text{ب}^{\text{ا}}}{\Delta (\text{و}^{\text{ا}} + \text{و}^{\text{ا}})}$$

$$\text{ج} = \frac{\text{و}^{\text{ا}} \text{ج}^{\text{ا}}}{\Delta (\text{و}^{\text{ا}} + \text{و}^{\text{ا}})}$$

تب مساوات (ع) ہو جاتی ہے

$$0 = \left\{ \frac{\text{و}^{\text{ا}} \text{ج}^{\text{ا}}}{\Delta (\text{و}^{\text{ا}} + \text{و}^{\text{ا}})} - \frac{\text{و}^{\text{ا}} \text{ب}^{\text{ا}}}{\Delta (\text{و}^{\text{ا}} + \text{و}^{\text{ا}})} \right\} \text{و}^{\text{ا}} \text{ج}^{\text{ا}}$$

اگر و، ب سے مختلف ہو تو محوروں کے درمیان جو ربط ہے اُس سے مساوات

(۲۱۰)

$$\text{و}^{\text{ا}} \text{ج}^{\text{ا}} = \left(\frac{1}{\text{و}^{\text{ا}}} + \frac{1}{\text{ب}^{\text{ا}}} - \frac{1}{\text{ج}^{\text{ا}}} + \frac{1}{\text{و}^{\text{ا}} \text{ب}^{\text{ا}}} \right) = 0 \dots\dots (ب)$$

پوری ہوئی چاہیے۔

اگر و اور ب معلوم ہوں تو اس مساوات سے ج کا تین ہو جاتا ہے

اور چونکہ داہنی طرف کا جملہ منفی ہے جبکہ ج = 0 اور مثبت ہے جبکہ ج = ∞

اس لئے ج کی ایک قیمت حقیقی ہونی چاہیے جو مساوات بالا کو پورا کرے۔

چونکہ $\frac{2}{6}$ مثبت ہے اور چونکہ

$$\frac{1}{\text{و}^{\text{ا}}} + \frac{1}{\text{ب}^{\text{ا}}} - \frac{1}{\text{ج}^{\text{ا}}} + \frac{1}{\text{و}^{\text{ا}} \text{ب}^{\text{ا}}}$$

مثبت ہے اگر و کافی بڑا ہو اس لئے نتیجہ نکلتا ہے کہ جب و چھوٹا ہو تو یہ آخری

جملہ منفی ہونا چاہیے۔

پس یہ معلوم ہوتا ہے کہ

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} < \frac{1}{c}$$

اور اس لئے مقادیر a اور b میں سے جو مقدار چھوٹی ہے اس سے c چھوٹا ہے۔
زاویائی رفتار معلوم کرنے کے لئے ہم جانتے ہیں کہ

$$s = (a - b) \cdot t$$

$$= \frac{6}{(a+b)} \cdot t$$

اور اس لئے اگر a ب سے مختلف ہے تو

$$s = \frac{6}{(a+b)} \cdot t$$

اور چونکہ یہ جملہ ایک سب مقدار ہے اس لئے s کی ایک ممکن قیمت حاصل ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ ناقص بنا، آزاد سطح کی ایک ممکن شکل ہے جبکہ اس ناقص بنا کے تینوں محور غیر مساوی ہوں اور ناقص بنا سے چھوٹے محور کے گرو گھوم رہا ہے۔

۹۸ — c کا سب سے چھوٹا محور ہونا اس طرح بھی ظاہر ہے

$$s = \frac{6}{(c-a)} \cdot t$$

$$= \frac{6}{(c-a)} \cdot t$$

$$= \frac{6}{(c-a)} \cdot t$$

جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ s کے حقیقی ہونے کے لئے یہ سرورسی ہے کہ $c > a$ اور

اسی طرح ج > ب۔

۱۹۹ — ہم دیکھتے ہیں کہ دفعہ ۱۹۴ میں (۱) ب، ج کے لئے جو جملے
 دئے گئے ہیں وہ ان جملوں میں تحویل ہو سکتے ہیں جو دفعہ (۱۹۳) میں مندرج
 ہیں اگر (۱) کی بجائے ج (۱ + ۱) (۱) ب کی بجائے ج (۱ + ۱) (۱) اور ج (۱ + ۱) + ۶
 کی بجائے ج (۱ + ۱) / ۶ لکھا جائے اس طرح دفعہ (۱۹۴) کی مساواتیں (ب) (ج) (د)
 وہی ہیں جو دفعہ (۱۹۳) کی مساواتیں (۳) اور (۴) ہیں۔ اگر سیال کی کثیت
 ک دی جائے تو ایک اور مساوات $\frac{1}{3} \rho \frac{d}{dt} \int \rho \mathbf{r}^2 dV = 0$ حاصل ہوتی
 ہے۔ اس مساوات اور دفعہ (۱۹۴) کی مساواتوں (ب) (ج) سے (۱) ب، ج،
 کا تئیں ک، ث اور سہ کی رقوم میں ہو سکتا ہے۔

ان مساواتوں کو سی۔ او۔ تیسر (C O Mayer) نے دریافت کیا
 اور تیسرینڈ (Tisserand) کی کتاب *Traite de Mecanique*

Celeste Tome II کے باب ہفتم میں بھی ان کی پوری تشریح موجود ہے جس میں یہ
 بتایا گیا ہے کہ $\frac{1}{2} \rho \frac{d}{dt} \int \rho \mathbf{r}^2 dV$ ث کی اعظم قیمت ۱۸۴۰۹ ہے جو جیکوبی ناقص نما کو
 توازن کی ایک ممکن شکل بناتی ہے اور اس خاص قیمت کے لئے ناقص نما ایک
 گردشہ ناقص نما ہے جو میٹارن کے ایک کرہ نما پر منطبق ہوتا ہے۔ مزید برآں
 یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دفعہ (۱۹۴) کی مساوات (ج) کے بائیں جانب کا تفاعل
 اس قیمت سے ایک یکانہ قیمت اعظم اختیار کرتا ہے اور اس سے چھوٹی قیمتوں
 کے لئے ایک اور صفت ایک ناقص نما حاصل ہوتا ہے۔
 میٹارن کے کرہ نماؤں اور جیکوبی کے ناقص نماؤں سے متعلق نتیجوں کا خلاصہ اس طرح
 لکھ سکتے ہیں :-

اگر $\frac{1}{2} \rho \frac{d}{dt} \int \rho \mathbf{r}^2 dV < 2246$ ہو تو کوئی کرہ نما یا ناقص نما نہیں

۱۰ *Crelle's Journal*, Tome XXIV (1842)

۱۱ اس تشریح کے علامہ کے لئے دیکھو *Traite de Mecanique Rationnelle*, Tome

اگر ۲۲۴۰ د $\leq$ $۲۲/۱۸۶۰۹$ ت $\leq$ ۱۸۶۰۹ د تو د چپے کرہ نما،
اگر ۱۸۶۰۹ د $\leq$ $۲۲/۱۸۶۰۹$ ت $\leq$ ۱۸۶۰۹ د تو د چپے کرہ نما اور ایک ناقص نما
جس کے تیزوں محاور غیر مساوی۔

۲۰۰۔ ہم نے دفعہ (۱۹۴) میں دیکھا ہے کہ جیکوبی کے ناقص نما کی درجہ اولیٰ جیسے
چھوٹی نہیں ہو سکتیں۔ درحقیقت ایک محور بر صورت میں گردش کے محور کا کم از کم ۲۲
گنا ہے۔ جیکوبی کے ناقص نماؤں پر تفصیلی بحث کرنے ہوئے آخر میں مدعی جداول اور
اشکال شامل ہیں ڈارون یہ بتاتا ہے کہ ناقص نما جیسے نما ہوتا جائیگا ویسے اس کے
گھومنے کی رفتار سست پڑتی جائے گی اور جب زاویہ رفتار مسلسل گھٹتی رہاتی ہے
تو معیار حرکت کا معیار مسلسل بڑھتا جاتا ہے اس لیے یہ بھی بتایا ہے کہ لمبے ناقص نما
تقریباً گردش کے ناقص نما میں جن کے گردش کا محور گھومنے کے محور پر علی القوائے ہے
۲۰۱۔ ناقصی اسطوانہ۔ ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ اطری ٹو۔ پیرمتھالس
تجاذبی اائع کی لاتنا ہی کیت کی سطح کی ایک ممکن جمل ناقصی اسطوانہ ہے حکماً اائع متوار
جسم کے مانند اسطوانے کے محور کے گرد گھوم رہا ہو۔

اگر ۱ اور ۲ ہم خود ہوں تو کسی اندر کوئی نقطہ (لا، ما) پر کشش کے اثر اس
ترکیبی ہیں

$$\frac{۲۲}{۱+۲} \text{ ت } \frac{۲۲}{۱+۲} \text{ د } \frac{۲۲}{۱+۲} \text{ ت } \frac{۲۲}{۱+۲} \text{ د}$$

(کیلول اور ٹیسٹ، دفعہ ۴۹) اور اسلئے آزاد سطح کی مساوات ہے

$$\left(\frac{۲۲}{۱+۲} \text{ ت } \frac{۲۲}{۱+۲} \text{ د } - \frac{۲۲}{۱+۲} \right) \text{ لافز لا } + \left(\frac{۲۲}{۱+۲} \text{ ت } \frac{۲۲}{۱+۲} \text{ د } - \frac{۲۲}{۱+۲} \right) \text{ لافز لا } =$$

اس مساوات کو

۱۹۔ دیکھو 'On Jacobi's Figure of Equilibrium for a rotating mass of fluid'

Proc Royal Soc Vol XLI (1887) p 319, or Scientific Papers,

Vol III p 119

$$= \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

کے ساتھ متماثل کرنے سے ہیں حاصل ہوتا ہے

$$2 = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \quad \text{ث } 1 \text{ (ب + 1)}$$

اس سے سہ کی تعین ہوتی ہے اگر ث، 1، ب دے گئے ہیں۔ لیکن اگر سہ، ث دے جائیں تو چونکہ

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c}$$

اس لئے ہمیں ہر طور پر توازن کی ممکن شکل نہیں ہوگا سوائے اس صورت کے جبکہ

$$2 > \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

۲۰۲۔ یونانکارے کا مسئلہ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیکو بی کا نقص نہ، اصنافی توازن کی ایک ناممکن شکل ہوتا ہے اگر

$$2 > \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

ایک چٹیا کرہ مانا ممکن شکل ہوتا ہے اگر سہ/۲ ث < ۲۲۴۷ اور ایک نانسی سطواہ ناممکن شکل اگر سہ/۲ ث < ۵۔ یونانکارے نے ثابت کیا کہ اگر سہ/۲ ث < ۱ تو توازن کی کوئی شکل ممکن نہیں۔ کیونکہ توازن کی ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آزاد سطح کے ہر نقطہ پر کشش اور مرکز گریز قوت کے حاصل کی سمت اندرونی جانب ہو ورنہ ایک حصہ جدا ہو جائے گا فرض کرو کہ تجاذبی قوتوں کا قوتہ فہ ہے اور محور سے فاصلہ ر ہے اور فرض کرو کہ

$$۶ = ۴ + \frac{۱}{۲} \text{ سہ } ۲$$

(۲۱۳) بیرونی جانب حاصل عادی قوت $\frac{\text{جف } ۶}{\text{جف } ۴}$ ہے اور توازن کے لئے آزاد سطح کے ہر نقطہ پر $\frac{\text{جف } ۶}{\text{جف } ۴}$ منفی ہوا چاہیے مگر اس کے مسئلہ سے

$$\left\| \frac{\text{جف } ۶}{\text{جف } ۴} \right\| \text{ فرس} = \left\| \text{لف } ۶ \right\| \text{ فرلا فرما فری}^۱$$

جہاں پہلا تکمیلی سطح پر اور دوسرا سیال کے کل حجم کے اندر لیا گیا ہے۔ اور

$$\text{لف } ۶ = \text{لف } ۲ + \text{سہ } ۲ = - ۴ \pi \text{ ث } ۲ + \text{سہ } ۲$$

$$\text{اس لئے } \left\| \frac{\text{جف } ۶}{\text{جف } ۴} \right\| \text{ فرس} = ۲ (\text{سہ } ۲ - ۴ \pi \text{ ث}) \times \text{حجم}$$

اور اگر $\text{سہ } ۲ < ۴ \pi \text{ ث}$ تو دہائی جانب کا جملہ مثبت ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ سطح کے چند نقطوں پر حاصل قوت کی سمت بیرونی جانب ہے اور اس لئے توازن ناممکن ہے۔

۲۰۳ — توازن کی اور شکلیں۔ ان استکال کے علاوہ جن پر ہم نے غور کیا ہے حلقہ نما (Annulus) پر سب سے پہلے لاپلاس نے غور کیا جس کا تعلق زحل کے چہلوں سے ہے اور اس وقت سے اس مضمون پر بہت سی تحقیقات ہو چکی ہے۔

کیلون اور ٹیٹ کی (Natural Philosophy) طبع دوم کے دفعہ ۸۷۷ میں نتجوں کی ایک تعداد جو مذکورہ بالا اشکال کی قائمیت سے متعلق ہیں بغیر ثبوت

$$\text{لف } ۶ = \nabla^2 u$$


لے (Mecanique Celeste, Tome II p 155) نیز (Tisserand) کی

(Mecanique Celeste) جلد دوم کے ابواب نہم، دہم، دوازدہم دیکھو جن میں لاپلاس

کلرک میکول، اور (Mme Kowalewsk) کی تحقیقاتوں پر بحث کی گئی ہے۔

کے درج کی گئی تھی۔ ان نتیجوں کو قائم کرنے کی کوشش میں یوہانکارے نے ایک مشہور و مقبول مقالہ لکھا جو ۱۸۸۵ء میں (Stockholm) میں شائع ہوا۔ اس مقالہ میں توازن کی شکل کے مسئلہ پر زیادہ عام طریقہ سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ توازن کی ممکنہ اشکال قطعی سلسلہ بناتی ہیں یعنی ایسا سلسلہ جو ایک تنہا تبدیل پر منحصر ہوتا ہے، مثلاً زاویائی رزق یا دور ایسا کہ تبدیل کی ہر قیمت کے جواب میں ایک اور صرف ایک شکل یا اشکال کی ایک محدود تعداد حاصل ہوتی ہے اور جبکہ اشکال ایک مسلسل طریقہ سے بدلتی ہیں جب کہ تبدیل بدلا جاتا ہے۔ اس طرح میکلا رن کے کرہ نما ایک قطعی سلسلہ بناتے ہیں اور جیکوبی کے ناقص نمادوں پر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شکل دو مختلف سلسلوں سے تعلق رکھے۔ اس طرح کی شکل دو شاخگی کی ایک صورت ہے۔ مثلاً کرہ نماؤں کے سلسلہ کا ایک خاص رکن ایسا ہے جو جیکوبی کے ناقص نماد کے سلسلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یوہانکارے نے اس مقالہ میں توازن کی اشکال کی قایت کے مسئلہ پر بھی بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر اشکال کا ایک سلسلہ دو شاخگی کی شکل کی حد تک قائم ہو تو اس نقطہ کے بعد اشکال غیر قائم ہو جاتی ہیں۔ قائم اشکال اب دوسرے سلسلہ سے متعلق ہو جاتی ہیں جو دو شاخگی کی شکل میں متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح میکلا رن کا کرہ نما اس وقت تک قائم ہوتا ہے جب تک کہ انکا خروج المرکز ۸۱۲۷ سے کم ہو جو دو شاخگی کا نقطہ ہے اور اس نقطہ سے جیکوبی کے ناقص نماد قائم ہو جاتے ہیں۔ جیکوبی کے ناقص نمادوں کے سلسلہ میں دو شاخگی کے نقطہ (Lame) کے تغا علوں کی مدد سے معلوم کرنے کی کوشش میں یوہانکارے نے دریافت کیا کہ توازن کی اشکال کے سلسلوں کی تعداد لامتناہی ہے تمام اشکال لمجاظ ایک مستوی کے جو گردش کے محور پر عمود وار ہوتا ہے متشکل ہوتی ہیں۔ تمام اشکال کم از کم ایک تشاکل کا مستوی رکھتی ہیں جو محور سے گزرتا ہے اور ان میں سے بعض گردش کی اشکال ہیں۔ ان اشکال میں صرف ایک قائم ہوتی ہے اور اس صورت میں تشاکل کے صرف دو مستوی ہوتے ہیں۔ یہ وہ شکل ہے جو جیکوبی کے ناقص نمادوں کے سلسلہ میں پہلی دو شاخگی سے پیدا ہوتی ہے اور ان کو توازن کی ناسپاتی متاشکل کہا گیا ہے

کیونکہ پواسکال کے مقالہ میں جو شکل کھینچی گئی ہے وہ ناسپاتی کے متشابه ہے۔ مرید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ شکل ناسپاتی سے اتنی مشابہت نہیں رکھتی جتنی کہ پہلے فرض کی گئی تھی۔ ڈارون نے اس پر دو مقالات میں بحث کی ہے اور دوسرے تقریباً اس کی شکل کا قیاس کیا ہے۔ دو شاخوں کے نقطہ پر بیکیوبی ناقص نما کے محوروں میں نسبت $۶۵۰۶۶ : ۸۱۴۹۸ : ۱۹۵۸۳$ ہے اور $۲/۲۲$ لٹ = ۱۴۲۰ اور ناسپاتی نما شکل جیکوبی کے اس ناقص نما سے وراسا صرف رکھتی ہے



جو اپنے سب سے لمبے محور کے ایک سرے پر ابھرا ہوا اور دوسرے پر گوند ہوتا ہے۔

Lo. p 347, also *Figures d'équilibre d'une masse fluide*, p 161
 "On the pear shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid," *Phil Trans* Vol. 198 A (1901), p 301 or *scientific papers*, Vol III p 288 and "The stability of the pear shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid," *Phil Trans* Vol 200 A (1902), p 251, or *Scientific Papers* Vol III p 317

ان اشکال کی تائید برائیک ملیس اور دچمپ مصنون *The Genesis of Double Stars*

میں بہت آسان بحث کی گئی ہے۔ یہ مصنف *Darwin and Modern Science* کے

باب ہست و ہشتم میں اسی مصنف کا لکھا ہوا ہے۔

اشکال بالا میں جن کو بالا جازت متذکرہ صدر ڈاروں کے دوسرے مقالہ سے لیا گیا ہے نقطہ وار خط جیکو بی ناقص ناکو تعمیر کرتا ہے اور دوسرا مغنی ناسپاتی ناشکل کو۔ اوپر والی شکل استوائی تراش اور پچلی نصف النہاری تراش ہے تشاغل کے مستوی میں۔

۲۰۴۔ جھوٹی ایللیجیبتوں کے ٹھوس متجانس ناقص ناک کی کشش کے لئے حسب ذیل جملے گھوننے والے مانع کی کمیتوں کی اختیار کردہ اشکال کی محبت میں اگر مفید ثابت ہوتے ہیں یعنی اگر، ب، ج نیم محور ہوں ایسے کہ $b = (1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2})$ اور $c = (1 - \frac{1}{2})$ (ش) تو کسی اندرونی نقطہ (لا، لا، ی) پر کشش کے اجزائے ترکیبی ہیں

ا، ث، لا، ب، ث، ا، ج، ث، ی

جہاں

$$a = \frac{1}{2} \pi (1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2})$$

$$b = \frac{1}{2} \pi (1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2})$$

$$c = \frac{1}{2} \pi (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2})$$

ان جملوں کو متشاکل صورت میں اس طرح بھی لکھا جاسکتا ہے

$$a = \frac{1}{2} \pi (1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}) \text{ وغیرہ}$$

$$b = \frac{1}{2} \pi (1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}) \text{ یا اس طرح ، وغیرہ}$$

$$c = \frac{1}{2} \pi (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}) \text{ جہاں}$$

۲۰۵۔ مثال۔ متجانس مانع کی کمیت ک اور ک کمیت کا ایک دُور رکھا ہوا کرہ اضافی توازن میں اپنے مرکز ثقل کے گرد چھوٹی یکساں زاوی زئارسہ سے گھوم رہے ہیں۔ ثابت کر دو کہ مانع کی آزاد سطح صغیر ایللیجیبتوں کا ناقص ناک ہے جس کا سب سے

لمبا محورک کی طرف ہے اور سب سے چھوٹا محور۔ یک کے مستوی پر علی السواء ہے۔ اور اجسام کے مرکز نقل کو لانے والے خط میں سے گزرنے والی سدھری تراستوں کی پیمائش کی نسبت ہم ک + ک : ۳ ک ہے۔
(Math Tripos 1888)

اگر اجسام کے درمیان فاصلت ہو تو کیت ک کے مرکز نقل و کا اسراع $\frac{مک}{ن}$ ہے اور و کو ساکن کر دیا جاسکتا ہے اگر مانع کی کیت کے ہر عنصر پر۔
اسراع متعادل سمت میں لگا دیا جائے۔

اگر کیت ک کا مرکز نقل λ ہو اور مانع کی کیت میں کوئی نقطہ n ہو تو n پر عمل کرنے والی قوتیں ہیں $\frac{مک}{ن}$ اسی سمت میں $\frac{مک}{ا و}$ اور کے متوازی، وہ قوت جو مانع کی برخورد کستس سے پیدا ہوتی ہے، اور مرکز گریز قوت۔ اب n کی سمت میں عمل کرنے والی قوت $\frac{مک}{ن}$ معادل ہے

n و کی سمت میں عمل کرنے والی قوت
 $\frac{مک}{ن} \times x$ و کے دور و کے متوازی عمل
کرنے والی قوت $\frac{مک}{ن} \times x$ و کے۔

اول الذکر

$$\frac{مک}{ن} = \frac{مک}{ن} \frac{(2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + \dots)}{2} = \frac{مک}{ن} \frac{1}{2}$$

۱۔ کے پہلے رتبہ تک۔

$$\begin{aligned} & \text{ثانی الذکر} \frac{\text{مہک}}{۱۰} \text{ کے ساتھ مل کر} \\ & \frac{\text{مہک}}{۱۰} - \frac{\text{مہک ف}}{(۱۰+۲-۲۰ \text{ فرجم طہ})} = \\ & \frac{\text{مہک}}{۱۰} - \frac{\text{مہک}}{(۱۰+۲-۲۰ \text{ فرجم طہ})} = \\ & \frac{۳ \text{ مہک رجم طہ}}{۱۰} = \end{aligned}$$

و ا کے متوازی -
اگر ہم ناقص نماں شکل بان لیں اور و ا کو محور لا اور گردش کے محور کو محوری
قرار دیں تو

$$\begin{aligned} & \text{فجی} = \text{سہ} (لا فرلا + افرا) - (اٹ لا فرلا - بٹ افرا - ج ٹ ی فری) \\ & - \frac{\text{یک ر فر}}{۱۰} + \frac{۳ \text{ مہک لا فرلا}}{۱۰} = \end{aligned}$$

اور آزاد سطح کی شکل ہونی چاہیے

$$\begin{aligned} & لا (سہ - اٹ + \frac{۳ \text{ مہک}}{۱۰} - \frac{\text{مہک}}{۱۰}) + ما (سہ - بٹ - \frac{\text{مہک}}{۱۰}) \\ & - ی (جٹ + \frac{\text{مہک}}{۱۰}) = \text{مستقل} \\ & \therefore لا (اٹ - \frac{۲ \text{ مہک}}{۱۰} - سہ) = ب (بٹ + \frac{\text{مہک}}{۱۰} - سہ) \\ & = ج (جٹ + \frac{\text{مہک}}{۱۰}) \end{aligned}$$

اب چونکہ کیتیں اپنے مرکز نقل ث کے گرد زائوی زقارہ سے گھوم رہی ہیں

$$\therefore سہ \times وٹ = \frac{\text{مہک}}{۱۰}$$

لیکن

(ک + ک) وٹ = ک ف

$$\frac{(ک - ک)}{ک} = سٹ$$

$$۱ - ب^۱ = سٹ \left\{ \frac{ک}{ک + ک} - \left(\frac{ب^۱ - ک}{ک + ک} \right) \right\}$$

$$\frac{سٹ}{ک} = \frac{ک}{ک + ک}$$

کیونکہ سٹ/ک اور (ب - ک) چھوٹے ہیں۔

$$۱ - ب^۱ = سٹ \left\{ \frac{ک}{ک + ک} - \left(\frac{ب^۱ - ک}{ک + ک} \right) \right\}$$

$$\frac{سٹ}{ک} = \frac{ک}{ک + ک}$$

لیکن دفعہ گزشتہ سے

$$۱ - ب^۱ = سٹ \left\{ \frac{ک}{ک + ک} - \left(\frac{ب^۱ - ک}{ک + ک} \right) \right\}$$

$$= \frac{سٹ}{ک} \left\{ \frac{ک}{ک + ک} - \left(\frac{ب^۱ - ک}{ک + ک} \right) \right\}$$

اور صغیر فرق ۱ - ب کے پہلے رتہ تک صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لئے ہم آری حروف صغیر میں کہ ۱ - ب = ۱ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح

$$۱ - ب^۱ = سٹ \left\{ \frac{ک}{ک + ک} - \left(\frac{ب^۱ - ک}{ک + ک} \right) \right\}$$

$$۱ - ب^۱ = سٹ \left\{ \frac{ک}{ک + ک} - \left(\frac{ب^۱ - ک}{ک + ک} \right) \right\}$$

$$\frac{سٹ}{ک} = \frac{ک}{ک + ک}$$

پس

اشکلہ

۱۔۔۔ نصف قطر کا ایک چلا کر دسی خول ٹ کثافت کے تجاذبی مانع سے عین بھرا ہوا نہیں ہے۔ اگر مانع اتنا فی تودن میں ایک قطر کے گرد زادی رفتاری سے گھوم رہا ہو تو ثابت کرو کہ گردش کے محور کے علی الاصول خول ہا جو بڑا دائرہ ہے اس کے کسی نقطہ پر سطح دائرہ فی علی التواضع سب سے تاؤ سے دائرہ کے مساوی ہے۔

۲۔۔۔ ایک استوار کروسی خول تجاذبی سیال سے عین بھردیا گیا ہے۔ یہ ایک مرکزہ ہے جو ایک دوسرے ملے سیال کے خول سے گھرا ہوا ہے۔ کل نظام کو ایک قطر کے گرد گھمایا گیا۔ ثابت کرو کہ ایک چٹا کرہ مناسط فاصل کی ممکن شکل ہے۔

۳۔۔۔ ایک استوار کروسی خول میں دو مائعات ہیں جو آمیز نہیں ہوتے اور کل نظام استوار جسم کی مانند خول کے مرکز میں سے گزرنے والے ایک محور کے گرد گھومتا ہے۔ سب سے بڑی زاوی زقار معلوم کرو جس کے لئے مشترک سطح کروسی ہو جائے اور خول کو مس یہ کرے اور ثابت کرو کہ جب زاوی زقار اس قیمت سے متجاوز ہوتی تو کرہ نما کا خروج مرکز خول کے نصف قطر پر محتم نہیں ہوتا۔

۴۔۔۔ ث کثافت کے مانع کی کچھ کثافت ٹ کثافت کے مانع کی کچھ کثافت سے گھری ہوئی ہے اور کل کثافت یوری طرح ایک غلاف میں بھر جاتی ہے جسکی شکل صغیر بللیجیت صہ کا ایک چٹا کرہ نما ہے۔ اگر غلاف اپٹ محور کے گرد میز زادی رفتار سے گھومتا ہو تو ثابت کرو کہ مشترک سطح کی ممکن شکل صغیر بللیجیت کا ایک چٹا کرہ نما ہے جہاں صہ

$$۱۵ \text{ سہ } / ۱۶ = \text{صہ } \text{ٹ} + \text{پہ } (\text{صہ} - \text{صہ } \text{ٹ})$$

سے حاصل ہوتا ہے۔

۵۔۔۔ ایک غلاف صغیر بللیجیت صہ کے ایک لمبو ترے کرہ نما کی شکل میں ہے۔ اس کو ٹ + ٹ کثافت کے ایک سیالی مرکزہ اور اس کے گرد ٹ کثافت کے سیال سے بھردیا گیا۔ اگر یہ اپنے محور کے گرد زادی رفتار (۸ ٹ صہ) سے

سے گھومے تو ثابت کرو کہ مشترک سطح کی ممکن شکل ایک کرہ ہے۔

۶ — ث کثافت کے متجانبش مانع کی کچھ کیفیت ایک غلاف کو بھر دیجی ہت

جسکی شکل ناقص نما لا/ہ + ا/ب + ی/ج = ۱ ہے، یہ غلاف استوار جسم کی

ماند خط لا/لی = ما/م = ی/ن کے گرد یکساں زاوی رقتار سد سے گھومتا ہے مگر مرکز پر کا دباؤ سطح پر کے کسی نقطہ پر کے دباؤ سے قدر ۱/۲ ل ث کے زیادہ ہو اور یہ اضافہ بڑے سے بڑا ہو تو ثابت کرو کہ

$$۰ = \frac{۲ن}{\frac{۱}{سد} - \frac{۱}{ج - ل/ج}} + \frac{۲م}{\frac{۱}{سد} - \frac{۱}{ب - ل/ب}} + \frac{۲ا}{\frac{۱}{سد} - \frac{۱}{لا - ل/لا}}$$

جہاں لا، ب، ج، کسی اندرونی نقطہ پر کی کشش کے اجزاء ترکیبی ہیں۔

۷ — ایک یکساں کرہ جو معمولی تجاذبی مادے سے بنایا گیا ہے اور جسکا نصف

قطر لا ہے جہوٹی یکساں زاوی رقتار سے دور کے ایک قوت کے مرکز کے گرد ایک

دائرہ مرتقم کرتا ہے۔ مرکزی قوت فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب ہے۔

اگر کرہ کو پوری طرح پانی سے ڈھاپ دیا جائے اور پانی کی بر خود کشش نظر انداز کر دی جائے تو ثابت کرو کہ پانی کا حجم

$$۱۰ ۲۱۰ سد ۱/۲ ج ۳$$

سے بڑا ہونا چاہیے جہاں ج کرہ کی سطح پر جاذبہ ارض کی قوت ہے۔

۸ — دو تجاذبی امانات آمیز نہیں ہوتے اور جن کی کثافتیں ث، ث (ث کے ث)

ہیں ایک استوار کر دی فاذ میں بند ہیں اور کل نظام اضافی توازن میں کرے کے ایک قطر کے گرد صغیر یکساں زاوی رقتار سد سے گھومتا ہے ثابت کرو کہ

ان دو مانوں کی مشترک سطح کی ممکن شکل ایک چٹا کرہ نما ہے جس کی ایللیجیٹ ۱۵ سد/

۲ (ث + ۲/ث) ہے۔

۹۔ — اوسط نصف قطر کا ایک لا متناہی متجانس اسطوانہ θ کثافت کے متجانسائع کی کیت سے گھرا ہوا ہے۔ اسطوانہ کی کثافت θ اور اس کی صغیر ہلیجیت حد ہے کل نظام اصنافی توازن میں خود اپنی کشش کے زیر عمل محور کے گرد یکساں زاویائی رفتار سے گھومتا ہے۔ اگر آزاد سطح کا اوسط نصف قطر ہو تو ثابت کر دو کہ آزاد سطح کی ممکن شکل ایک ناقصی اسطوانہ ہے جسکی صغیر ہلیجیت ہے

$$\pi (a^2 - b^2) / (2\pi a^2) \text{ (ث - ث)} \quad (a^2 + b^2) \text{ ث - ث} \quad (a^2 - b^2) \text{ ث - ث}$$

۱۰۔ — θ کثافت کے جاذب سیال کی دی ہوئی کیت اصنافی توازن میں زاویائی رفتار θ کے ساتھ اس طرح گھوم سکتی ہے کہ اس کی آزاد سطح ناقص نما کی شکل میں ہے جس کے ٹینون محاورہ غیر مساوی ہیں اور سب سے بڑا نیم محور a ہے۔ اب اس شکل کا ایک استوار ترین بنایا گیا ہے اور اس کے اندرونی سیال کو ظرف کے ساتھ اصنافی توازن کی حالت میں سب سے چھوٹے محور کے گرد زاویائی رفتار θ سے گھمایا گیا ہے ثابت کر دو کہ سطح کے کسی نقطہ پر کا دیاؤ ہے

$$\frac{1}{2} \theta (a^2 - b^2) \text{ (ث - ث)} \quad \frac{1}{2} \theta (a^2 - b^2) \text{ (ث - ث)} \quad \frac{1}{2} \theta (a^2 - b^2) \text{ (ث - ث)}$$

بوجب اس کے کہ θ θ سے بڑا یا چھوٹا ہو۔

۱۱۔ — اوسط کثافت θ کا ایک ٹھوس کرہ یکساں کثافت θ کے مائع کی ایک بنی چادر سے لپیٹ دیا گیا مکمل نظام کرہ کے مرکز میں سے گزرنے والے محور کے گرد صغیر یکساں زاویائی رفتار θ سے گھومتا ہے۔ ٹھوس کرہ مکھوس مربع کے قانون کی بوجب اس طرح جذب کرتا ہے گویا کہ اس کا مادہ محور کے ایک نقطہ پر منبج ہے جسکا مرکز سے فاصلہ b چھوٹا ہے۔ مائع بھی مکھوس مربع کے قانون کے بوجب جذب کرتا ہے۔ ثابت کر دو کہ مائع کی بیردنی سطح تقریباً ایک کرہ نما ہے جس کی ہلیجیت $15\pi/8$ (ث - ث) 3π ہے اور

جسکا مرکز کرہ کے مرکز سے θ ج/ (ث - ث) فاصلہ بردا ق ہے۔

۱۲۔ نصف قطر اور ث کثافت کا ایک ٹھوس تجاذبی کرہ مائع سے گھرا ہوا ہے جسکی کثافت ρ اور جبکا حجم $\frac{4}{3}\pi r^3$ (ب ۳ - ۳) ہے۔ کل نظام صغیر رادی رقتار سے سے گھرایا جاتا ہے۔ ثابت کرو کہ مائع کی آزاد سطح کی شکل رشتہ

$$r = b(1 - \frac{2}{3} \text{ صہ } \frac{r}{a})$$

سے حاصل ہوتی ہے، جہاں کرہ نما کی صغیر بلبلجیت صہ

$$\frac{15}{2} \text{ صہ } \frac{r}{a}$$

$$\{ \frac{1}{2} (1 - \frac{2}{3} \text{ صہ } \frac{r}{a}) \} \frac{1}{2} (1 - \frac{2}{3} \text{ صہ } \frac{r}{a})$$

اور $\frac{1}{2} (1 - \frac{2}{3} \text{ صہ } \frac{r}{a})$ دوسرے رتبہ کا یجنڈر کا سر ہے۔

۱۳۔ ث کثافت اور $\frac{4}{3}\pi r^3$ (ک ۳ - ۳) حجم کے متجانس مائع کی کیت جو

ث کثافت اور نصف قطر کے ایک ثابت ٹھوس کرہ کی مرکزہ کو گھیرے ہوئے ہے قطبی محور کے گرد صغیر رادی رقتار سے کے ساتھ ٹھوس کے مانند اپنی خود کشش، مرکزہ کی کشش اور ایک ذہ کی کشش کے زیر عمل گھوم رہی ہے۔ ذہ کی صغیر کیت ک ہے اور وہ قطبی محور پر کرہ کے مرکزہ سے ج خاصہ پر واقع ہے۔ آزاد سطح کی شکل کی تعین کرو کہ کرہ کا کوئی حصہ مائع سے خالی نہ ہو اور ثابت کرو کہ

(۲۱۹)

$$\frac{1}{2} (1 - \frac{2}{3} \text{ صہ } \frac{r}{a}) \frac{1}{2} (1 - \frac{2}{3} \text{ صہ } \frac{r}{a}) \frac{1}{2} (1 - \frac{2}{3} \text{ صہ } \frac{r}{a})$$

کے بڑا ہے جو اس صورت میں ہوتا جسک کہ نہ ہوتا۔

ایسی صورت میں بحث کرو جیکٹ تقریباً ث کے مساوی ہو جائے۔

۱۴۔ ایک متجانس تجاذبی سیال ایک استوار خافہ کو زیر کرنے میں عین کافی ہے۔ خافہ ایک پیچھے ناقص نما کی شکل میں ہے۔ سیال اضافی توازن میں قطبی محور کے گرد توانائی بالحرکت ع کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اگر سیال توانائی بالحرکت ع،

متفرق مثالیں

(۲۲۰)

۱۔ پیکلاریال کی کچھ مقدار جس کے اجزاء ایک دوسرے کو بوجب قانون قدرت جذب کرنے ہیں ایک گڑھ میں بھر جاتی ہے جس کے مرکز پر ایک مرکزی قوت

میں موجود ہے۔ کرہ کا نصف قطر ج اور سیال کی کثیت (۲ ک۔ - مہ) ج ہے جہاں

نٹک کہ $d =$ ثابت کرو کہ توازن کی شرطیں پوری ہوتی ہیں اگر ت، راکے بالکس متناسب ہو۔

۲۔ ایک کرہ (نصف قطر ص) پانی سے عین بھرا ہوا ہے اور اقمصابی محور کے گرد زار پانی رفتار ص کے ساتھ گھومتا ہے اس طرح کہ ص ص = ۲ ج۔ ثابت کرو کہ سادی دباؤ کی جو سطح کرہ کو علی التوا تم قطع کرتی ہے اس میں دباؤ ۳ ج ت ع/۴ ہے جہاں ت پانی کی کثافت ہے۔

۳۔ مانع کی کچھ کثیت تین محدودوں کے مستویوں کے درمیان واقع ہے ان مستویوں میں سے ہر ایک ایسی قوت سے مانع کو جذب کرتا ہے جو فاصلے کے متناسب ہے اور کشش کی مطلق توتیں مہ، مہ، مہ سلسلہ موسیقہ میں ہیں۔ ایک نصف ناقص مانع اس طرح ثابت کرو یا گیا ہے کہ اس کا مستوی رخ ایک مستوی پر واقع ہے اور اس کی منحنی سطح دوسرے دو مستویوں کو مس کرتی ہے اس کے محور محدودوں کے محوروں کے متوازی ہیں اور

مہ، مہ، مہ

کے بالکس متناسب ہیں۔

اگر ناقص نما کو ڈھاب دینے کے لئے سیال ناکافی ہو تو غیر ڈھنپا ہوا حصہ ایک دائرہ سے محدود ہوگا۔

۴۔ مانع کی کچھ کثیت اپنے ذرات کے باہمی جذب کے مانع ہے اور ایک دھامی قوت مانع کے مرکز میں سے گدرے والے ایک مستوی سے پرے ہٹانے کا اثر رکھتی ہے اور ایسے بدلتی ہے جیسے اس مستوی سے عمودی فاصلہ۔

تائیت کرد کہ توازن کی شرطیں پوری ہونگی اگر سطح ایک خاص ہلیجیت کا ملبہ ترا کرہ نما ہو بشرطیکہ دفاعی قوت بہت زیادہ بڑی نہ ہو۔

۵۔ ایک مثلثی رقبہ سیال میں اس طرح ڈوبیا گیا ہے کہ اس کا ایک ضلع سیال کی سطح میں ہے۔ اس مثلث میں سب سے بڑے ممکن رقبہ کا قطع ناقص بنایا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ مثلث کے بقیہ حصہ کے دباؤ کے مرکز کی گہرائی اس کے

نیز ترین نقطہ کی گہرائی کا $\frac{18-34}{34-112} = \frac{16}{82}$ ہے۔

۶۔ سیال برکلیہ نیوٹن کے بموجب جاذب بالذات ہے ایک طرف میں عن

بھر جاتا ہے۔ یہ نظرت ناقص نما $\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{f}$ کی شکل کا ہے۔ کسی نقطہ پر کا دباؤ اور غزف پر اعظم اور اقل دباؤ کے نقطے معلوم کرو۔

۷۔ اگر ایک ذوار بقتہ الا ضلّاح بقیے کے راسوں کی گہرائیاں ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸،

$$\frac{1}{p} - (e + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} + \frac{1}{s} + \frac{1}{t} + \frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}) \frac{1}{p} - \frac{1}{p}$$

۴۔ ارتفاع کا ایک مخروطی ظرف، اس نیچے وارے مانع سے بھردیا گیا ہے مانع کی کثافت نہ لگے جہاں لاگہرائی ہے۔ اس کو دوسرے ظرف میں جو ایک گردوشی سطح کی شکل کا ہے ڈال دیا گیا ہے جس میں یہ معلوم ہوا کہ اس کی کثافت نہ لگے۔ ثابت کر دے کہ ظرف کی شکل اس مساوات

$$أ + ی = \frac{ر}{ر} لا (ف - \frac{ر}{ر} لا) ميس ع$$

سے حاصل ہوتی ہے۔

۹۔ شلتی تراش (بج کا ایک بند، ضلع بج پر پانی کا دباؤ تھا تا
ہے۔ ایسی شے معلوم کرو کہ زاویہ کے گرد یہ بند الٹ نہ جائے جبکہ پانی

ثلث کے راس ب تک پہنچ جائے۔

(۲۲۱) اگر مثلث کے رتبہ کو کم سے کم کر دیا جائے اس طور پر کہ پانی کی دی موئی گہرائی کے لئے قائم مقام رہے تو ثابت کر دو کہ

$$\text{سس ج} = \frac{\text{راس}^2 + ۲ \text{س} + ۹}{۳ - \text{س}}$$

$$\text{سس ا} = \frac{\text{راس}^2 + ۳ \text{س} + ۹}{۱ - \text{س}}$$

جہاں بند کی کثافت نوعی س ہے۔

۱۰۔ سیال کی کچھ کمیت ایسی خود کشش کے زیر عمل توازن میں ہے ثابت کر دو کہ کسی نقطہ (لا، ا، ی) پر کا دباؤ اس مساوات

$$\text{جف لا} \left(\frac{۱}{\text{جف لا}} \right) + \text{جف ا} \left(\frac{۱}{\text{جف ا}} \right) + \text{جف ی} \left(\frac{۱}{\text{جف ی}} \right) = ۲۴ \text{ ن}$$

سے حاصل ہوتا ہے جہاں ن نقطہ (لا، ا، ی) پر کی کثافت ہے۔

سیال کی لاتنا ہی کیت (ایسی کہ د = ک ن ا جہاں کہ مستقل ہے) ایک استوار کرومی خول کو گھیرے ہوئے ہے اور خود اپنی کشش کے زیر عمل توازن میں ہے لاتنا ہی پر دباؤ ۳ ہے۔ کسی نقطہ پر کا دباؤ معلوم کر دو۔

۱۱۔ کششوں کا ایک بل، ایک ستوی استوار راستے (ب کو افقی محل میں تھا متا ہے اگر ایک چھوٹا متحرک بوجھ نقطہ گ رکھا جائے تو بل یکساں طور پر نیچے دتا ہے۔ جب بوجھ نقطہ ج پر رکھا جاتا ہے تو سراسر اپنے محل میں غیر متغیر رہتا ہے، جب نقطہ د پر تو سراسر اپنے محل میں غیر متغیر رہتا ہے، اور جب نقطہ ن پر تو راستہ کا نقطہ ق اپنے محل میں غیر متغیر رہتا ہے۔

ثابت کر دو کہ اگ × گ ج = بگ × گ د = نگ × گ ق

اور یہ کہ نقطہ ن پر کے ایک بوجھ سے نقطہ م پر جو انحراف پیدا ہوتا ہے وہ اس انحراف کے مساوی ہے جو اسی بوجھ کو نقطہ م پر رکھنے سے ن پر پیدا ہوتا ہے۔

۱۲۔ ایک پالہ تیل میں سید پتیر رہا ہے اور اس کے اندر پانی ہے۔ اس کی شکل معلوم کرو اور اس کا نقشہ کھینچو جب دونوں مائعات کی سطحوں کا فرق اغراق کے تمام درجوں کے لئے وہی ہو۔

۱۳۔ کسی شکل کے ظرف میں کچھ مائع ہے اور اسکو مختلف شکل کے دوسرے ظرف میں بہنے دیا جاتا ہے۔ اگر علی القوائم محدودوں کے لحاظ سے جو ظروف پر منحصر ہیں (یعنی نقطہ لا، ما، می) پر کسی ظرف میں دباؤ نہ ہو تو اگر فلا فرامی کی دونوں قیمتوں کے درمیان فرق اس کام سے جو مائع نے اور دالے ظرف سے پچھلے ظرف میں بہانے میں کیا ہے اس قدر فرق رکھتا ہے جو اس کام کے مساوی ہے جو پچھلے ظرف میں سیال کی سطح کو اسی اتنی مستوی پر لانے میں درکار ہوتا ہے جو اوپر دالے ظرف میں سیال کی ابتدائی سطح تھی۔

۱۴۔ گردشی مکان کی شکل کے ایک ظرف میں کچھ سیال ہے جو مکانی نما کے انتصابی محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ دوئی رفتار معلوم کرو جبکہ میا، عین ڈھلکنا شروع کرے۔ اور ثابت کرو کہ اگر یہ زاوی زقار راجع ہو تو ظرف سیال پر نصف بھرا ہوا ہونا چاہیے۔

اگر مکانی نما گردشی نہ ہو بلکہ می = $\frac{لا}{لی} + \frac{با}{لی}$ کی شکل کا ہو اور محور (می) انتصابی ہو اور اگر سیال کی سطح جس مغنی کظرف کو ملتی ہے اس کے اعظم اور اقل ارتفاع می، می ہوں تو ثابت کرو کہ

$$\frac{1}{می} - \frac{1}{می} = \frac{سنی}{لی - لی}$$

جہاں دونوں مکانی نماؤں کے ماسوں کے درمیان فاصلہ ک ہے۔
۱۵۔ ایک اسطوانی ظرف خواص انتصابی محور کے ساتھ اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ پانی ظرف کے نصف حصہ تک چڑھ جاتا ہے۔ ظرف کی اوپر کی سطح کے مرکز سے اس کے مرکز ثقل کا اقل فاصلہ معلوم کرو جو اس شرط کے مطابق ہو کہ توازن محور کے زاوی ہٹاؤ کے لحاظ سے قائم ہو سکے۔

(۲۲۲)

۱۶۔ بے چمک سیال، توڑوں

$$\frac{ملا}{۱} = \frac{میرا}{۲} = \frac{ری}{۳}$$

کے زیر حمل ساکن ہے جو علی الترتیب محوروں کے متوازی ہیں۔ ایک ذرہ جس کی کثافت سیال کی کثافت سے کم ہے سطح

$$\frac{۱}{۱} + \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۶}$$

میں کسی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ مزاحمت نظر انداز کر کے ثابت کرو کہ ذرہ کی رفتار سطح (جسکی تھیں مقدار ک سے ہوتی ہے) سے گزرتے وقت ایسے بڑھتی ہے جیسے
ماکت۔ ک۔

۱۷۔ ایک چمکدار کردی فاذ توازن کی حالت میں ہے جبکہ اس میں کردہ ہوائی کے دو چند کثافت کی ہوا ہے اور اس کا نصف قطر قدرتی نصف قطر کا دو چہد ہے۔ اگر بار چمکا ارتفاع $\frac{۱}{۲}$ اونچ اتر جائے تو فاذ کے ناپ میں صغیر ہستہراز کا وقت دریافت کرو۔

۱۸۔ ایک قائم مخروط ایک طرف میں جکے اندر دو دئے ہوئے سیالوں کی گہرائیاں مساوی ہیں اس طرح ٹکا ہوا ہے کہ اس کا محور انتہائی ہے اور اسکا راس طرف کی تہ کے ساتھ بانڈ دیا گیا ہے۔ قائم توازن کی شرط معلوم کرو۔

۱۹۔ ایک سیدھا عیساں ڈنڈا ایسے مادہ پر مشتمل ہے جس کی کشش (فاصلہ) کے متناسب ہے۔ اس کے گرد ساکن سیال ہے جو صرف اس کی کشش کے ماتحت ہے۔ ثابت کرو کہ مساوی دباؤ کی سطحوں کی نصف النہاری تراشوں کی تفرقی مساوات اس شکل

$$\frac{فری}{فری} = \frac{سا + لوک}{فری} =$$

میں رکھی جاسکتی ہے جہاں ڈنڈے کے سروں سے نقطہ (لا، ا) کے غاصلے ر، ت ہیں اور ڈنڈے کے محاذی اس نقطہ پر زاویہ سا بنتا ہے۔

۲۰۔ مکافی نما کا ایک حصہ، وتر خاص ۴ و ۱ ایک مستوی سے جو اس سے ۳ و ۱ فاصلہ پر محور پر عمود وار ہونے کاٹ لیا گیا ہے۔ اگر مکافی نما کا راس ایک مانع کی سطح کے نیچے $\frac{۳}{۴}$ و گہرائی پر ثابت کر دیا جائے تو ثابت کرو کہ یہ ساکن رہے گا ایسے کہ اس کا ماسک مانع کی سطح میں ہوگا اگر مانع کی کثافت کو مکافی نما کی کثافت سے نسبت ۷۹ : ۲۳۲ ہو۔

۲۱۔ سیال کی کچھ کثیت (ک) ایک ثابت محور کے گرد دی ہوئی مستقل زاویہ رفتار کے ساتھ گھومتی ہے اور محور کے ایک نقطہ کی طرف دی ہوئی قوت سے جذب ہوتی ہے جو فاصلہ کے تناسب سے۔ سیال کی کثافت کسی نقطہ پر ایک دی ہوئی مستقل مقدار اور ایک ایسی مقدار کا مجموعہ ہے جو اس نقطہ پر کے دباؤ سے دی ہوئی مستقل نسبت رکھتی ہے۔ آزاد سطح کی شکل معلوم کرو اور ثابت کرو کہ اس کا اقل نصف قطر (ب) اس مساوات

$$k = m \cdot \frac{h}{g} \cdot \frac{1}{r} \quad \text{یا} \quad \frac{h}{r} = \frac{g}{m \cdot k}$$

سے متعین ہوتا ہے جہاں m اور g مستقل ہیں۔

۲۲۔ ایک مانع قوت فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب ہے اور اس کا مرکز این متجانس بے پچک سیال کی آزاد سطح کے نیچے واقع ہے۔ یہ سیال ساکن ہے اور جاؤبہ ارض کے زیر عمل بھی ہے قوت کی شدت اس نقطہ پر جو سیال کی آزاد سطح میں قوت کے مرکز سے انتہا با اوپر واقع ہے جاؤبہ ارض کی شدت کے مساوی ہے۔ ثابت کرو کہ سیال کی بیرونی سطح ایک افقی متعارف مستوی رکھتی ہے اور قوت کا مرکز ایک اندرونی جوف سے محصور ہے جس کی چوٹی سیال کی بیرونی سطح میں ہے۔ جوف کا حجم اس کے طول کے رقوم میں معلوم کرو۔

۲۳۔ مربع قاعدے کے ایک قائم منشور کے ساتھ دوسرا منشور جس کا قاعدہ بھی مربع ہے چپکا دیا گیا ہے اس طرح کر کے جو منطق ہیں اور اضلاع متوازی۔ یہ کل نظام ایک سیال میں اس طرح قیرتا ہے کہ ان کا مشترک مستوی تیراؤ کے مستوی میں ہے۔ اگر منشوروں کے قاعدوں کے اضلاع ۲ : ۱ کی نسبت میں ہوں تو

ان کے انتہائی ارتفاع معلوم کرو تاکہ توازن قائم ہو سکے۔
 ۲۴۔ ایک وزنی مکعب ایک ایسے محور کے گرد حرکت کر سکتا ہے جو ایک رخ کے مقابل صانوں میں سے گزرتا اور ان کی تنصیف کرتا ہے۔ اس محور کو انتہائی طور پر ایک خالی طرف میں ثابت کر دیا گیا ہے اس طرح کہ مکعب توازن کے محل میں ٹہما ہوا ہے۔ کس گہرائی تک سیال کو ظرف میں ڈالا جائے کہ توازن غیر قائم ہو جائے۔ مکعب اور سیال کی کثافتوں کی بڑی سے بڑی نسبت معلوم کرو کہ یہ ممکن ہو سکے۔

یہ فرض کر کے کہ مکعب نصف غرق ہے اور توازن قائم ہے، صغیر ذریعہ کا وقت معلوم کرو۔

۲۵۔ ایک اسطوانہ جس کا محور انتہائی ہے ایک سیال میں تیر رہا ہے جس میں کسی نقطہ پر ایک کثافت ایسے بدلتی ہے جیسے گہرائی کی کن دیں تو اسے توازن کو اتنا نیچے دبا دیا گیا ہے کہ اس کا اوپر والا رخ سیال کی سطح پر عین منطبق ہوتا ہے اور جب اسطوانہ کو چھوڑ دیتے ہیں اسطوانہ سیال کے عین باہر اٹھ آتا ہے۔ ثابت کرو کہ جب اسطوانہ تیر رہتا تو غرق شدہ گہرائی کو اسطوانہ کے ارتفاع سے درجی نسبت ملے گی جو

$$\frac{1}{2} \left(2 + \frac{1}{n} \right)$$
 سے ہے۔

۲۶۔ ایک یکساں گردشی مکانی فنا کا ارتفاع f اور وتر خاص r ہے۔ اس کی کثافت استانی بجاظ اس سیال کے جس میں یہ تیر رہا ہے میں۔ یہ ثابت کرو کہ غرق شدہ راس کے ساتھ توازن کا صرف ایک محل یقیناً ہوگا اگر

$$f > \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{n} \right) r$$

۲۷۔ رقیق مادہ کا ایک ظرف گردشی مکانی فنا کی شکل کا ہے اور اس میں مائع سے ثابت کرو کہ توازن ہمیشہ قائم ہوگا بشرطیکہ اندرونی سیال کی کثافت بیرونی سیال کی کثافت سے بڑی ہو۔ ظرف کا وزن نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

۲۸۔ ایک ناقص مخروط انتہائی محور کے ساتھ ایک مائع میں جسکی کثافت اسکی

کناف کا دو چند ہے تیرتا ہے۔ ثابت کرو کہ توازن قائم ہوگا اگر

$$ف^2 > \frac{(ب-ب')}{۱-۲} ، جہاں م = \frac{\frac{۱}{۲}(ب+ب')}{\frac{۱}{۳}(ب+ب')}$$

جہاں ناقص مخروط کا ارتفاع ف اور اسکے رخوں کے نصف قطر اب ہیں۔
تیر ناقص مخروط افقی محور کے ساتھ تیرتا ہو تو توازن قائم ہوگا اگر

$$ف^2 < \frac{۳(ب+ب')(ب'+ب)}{۲+۳(ب+ب')}$$

۲۹۔ مکعب کی شکل کے ایک خرٹ میں مانے ہوئے مکعب کا ضلع ۱۲ ہے۔
اس کو نصف قطر کے ایک کمال کمرے سے ثابت کر کے سر پر اس طرح رکھو یا
گیا ہے کہ وہ ٹکرا رہے۔ خرٹ کے وزن کو نظر انداز کر کے ثابت کرو کہ اگر انتصابی
رخوں کے متوازی مستویوں میں ہٹاؤ پیدا کئے جائیں تو توازن قائم ہوگا بشرطیکہ
مانع کی گہرائی ۴ اور ۶ کے درمیان ہو۔

۳۰۔ ایک متساوی اساقین مثلثی پتہ جس کے اضلاع اب، ج، مساوی
ہیں ایک مانع میں جس کی کناف گہرائی کے متناسب ہے نیچے وار راس کے
ساتھ تیرتا ہے۔ اگر اد، ب ج پر عمود ہو اور اگر پتہ اس طرح تیر سکتا ہو کہ خط اد
انتصابی سمت سے زاویہ ط بنائے تو ثابت کرو کہ ط اس مساوات

$$۸۱ \sin^2 ط = ۶۴ \cos ط (ج ب' - ج ب' ع)$$

سے حاصل ہوتا ہے۔ جہاں زاویہ ب ج' ۲۰° ہے اور پتے کی کناف ۴،
اور اب یا ج کے مساوی گہرائی پر مانع کی کناف ۴ ہے۔

۳۱۔ ایک گردبشی مجسم انتصابی محور کے ساتھ تیرتا ہے۔ اس کے محور کے
ایک ثابت نقطہ پر اوزان رکھ کر اس کو مختلف گہرائیوں تک ڈبو یا گیا جسکی شکل معلوم
کر دو اگر توازن ہمیشہ تبدیل رہے۔ (۷۲۴)

۳۲۔ اگر ایک مجسم سکون میں تیرے تو ثابت کرو کہ کسی ہٹاؤ کے لئے سیال کی

سطح کے نیچے جسم کے اور ہٹائے ہوئے سیال کے مرکز ثقل کے فاصلوں کا فرق عام طور پر اعظم یا اقل ہو گا۔ بموجب اس کے کہ توازن غیر قائم یا قائم ہو بشرطیکہ ہٹائے ہوئے سیال کا وزن تیرنے والی شے کے وزن کے سادے ہو نیز اگر یہ فرق صفر ہو اور جسم ایک انتہائی مستوی کے لحاظ سے متشاکل ہو جو اس خط پر عمود ہے جس کے گرد گزرتا ہے بالہٹاؤ پیدا کیا گیا ہے اور اگر ایک ثابت خط کا میلان ہو جس کے اور اس مستوی کے اندر واقع ہے انتہائی مستوی کے ساتھ طے ہو تو چھوٹے ہٹاؤ کا وقت وہی ہو گا جو سادہ رقاہ کا ہوتا ہے جس کا طول $\frac{2\pi}{\omega}$ ہے۔ یہاں کہ اس خط کے گرد گردش کا نصف قطر ہے جو جسم کے مرکز ثقل میں سے گزرتا ہے اور ہٹاؤ کے محور کے متوازی ہے۔

۳۳ — ان شرطوں کو بیان کر دو جو ان مسائل کی عمومیت کو محدود کرتے ہیں۔ ایک خاص نما ایک سیال میں جس کی کثافت اس کی کثافت کا دو چند ہے سطح تیرتا ہے کہ اس کا اقل محور (۵۲) انتہائی مستوی میں ایک نقطہ کے گرد جو ثابت محور انہم (۵۲) میں واقع ہے چھوٹے ہٹاؤات کرتا ہے۔ ثابت کر دو کہ دور

$$\sqrt{\frac{2}{15}} \frac{5}{2} \frac{2 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}{2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5}}$$

ہے جہاں ثابت نقطہ کا مرکزی فاصلہ ہے۔

۳۴ — ایک رقیق ریل گاڑی ایک زمین دوز راستہ میں جس میں یہ ٹھیک سا سکتی ہے آزادانہ حرکت کر سکتی ہے۔ اس کو ایک سرے پر ساکن رکھا گیا ہے اور ایک انجن دوسرے سرے پر راستہ کے اندر کی ہوا کو خالی کرنا شروع کرتا ہے اور مساوی وقتوں میں مساوی حجم کی ہوا خارج کرتا ہے۔ ثابت کر دو کہ وقت ت پر گاڑی کا فاصلہ اس سرے سے جہر ف کہ یہ جارہی ہے شکل دلیل کی مساوات سے معلوم ہوتا ہے۔

$$\frac{2}{3} \frac{v}{g} + \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} + \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} = \frac{1}{2} \frac{v^2}{g}$$

۳۵ — ایک گردش جسم میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ اگر اس کا ایک حصہ

ایسے مستوی سے کاٹ لیا جائے جو اسکے محور پر عمود وار ہے اور اگر اسکو نیچے وار
 راس کے ساتھ ائغ میں غرق کر کے ایک جھوٹے زاویہ میں بہا دیا جائے تو اسے واوی میاں
 کہتے ہوئے حصہ کی مقدار پر منحصر نہیں ہوتا۔ ثابت کرو کہ اگر $\alpha = \phi$ (لا) تلوینی
 منحنی ہو تو ϕ کو معین کرنیوالی مساوات ہے

$$[ن(لا)] = [ث] + [ف(لا)] + [ب(لا)] + [ن(لا)] + [ت(لا)] + [ا]$$

جہاں مجسم کی کثافت بلحاظ سیال کے θ ہے۔
 ۳۶ — نصف قطر کے ٹھوس نیم کرہ سے ایک حصہ علیحدہ کر لیا گیا ہے یہ حصہ قائم
 اسطوانہ کی شکل کا ہے جس کا ارتفاع θ ہے اور جس کا محور کرہ کا محور اور جس کے قاعدہ
 کا مرکز کرہ کا مرکز ہے۔ کرہ کے اس حصہ میں ایک پتلی ملی رکھی گئی ہے جو اس میں
 ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کو نیچے وار راس کے ساتھ ایک سیال میں رکھ کر
 نئی میں θ کثافت کا سیال ڈالا گیا ہے۔ معلوم کرو کہ کس قدر سیال اس میں
 ڈالا جائے کہ توازن تبدیل ہو جائے۔ اگر نئی میں ϕ ارتفاع تک سیال
 داخل کیا جائے تو ثابت کرو کہ

$$\frac{\theta}{\phi} = \frac{\rho - \rho_2}{\rho_2}$$

جہاں ٹھوس جسم کی کثافت θ ہے۔
 ۳۷ — ایک جسم متغیر کثافت کے ائغ میں تیر رہا ہے۔ اس کے محل میں ذرا سی
 تبدیلی کر دی گئی ہے اس طرح پرکہ ہٹائے ہوئے ائغ کی کمیت غیر متبدل رہتی ہے۔
 اگر محلی گہرائی پر کثافت θ (ی) ہو اور جسم کی غرق شدہ سطح میں کے کسی نقطہ
 کے محدود (لا، لا، ی) ہوں جبکہ سطح کو حوالے کا مستوی لا فرض کیا جائے
 تو ثابت کرو کہ تیراؤ کے مستوی میں کا وہ نقطہ جسکے گرد جسم گھومتا ہے اس مستوی
 کا مرکز ثقل ہے جسکو ایک پتھر کے مانند خیال کیا گیا ہے جسکی کثافت
 نقطہ لا، لا، ی (ی) ہے۔

(۲۲۵)

۳۸ — ایک بالہ کی بیرونی سطح α و تر خاص کا ایک مکافی نما ہے اور

اسکی موٹائی اتنی ہستیں ہر نقطہ پر ایک ہی ہے اور بقابل کے بہت چھوٹی ہے۔ یہ پیالہ راس کے اوپر ارتفاع پر دائری کورر کہتا ہے اور نصف قطر کے ایک کرہ کے بلند ترین نقطہ پر لٹکا ہوا ہے۔ اگر اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ اس کی سطح پیالہ کے محور کو راس سے $\frac{1}{2}$ فاصلہ پر قطع کرے اور اگر پانی کا وزن بیانیے کے وزن کا چار گنا ہو تو ثابت کر دو کہ توازن قائم ہوگا اگر

$$\frac{r}{r + \frac{1}{2}l} > \frac{h}{l}$$

۳۹ — ایک متساوی الساقین مثلثی پتہ ۱ ب ج ساکن ہے اس طرح کہ اس کا مستوی انتصابی ہے اور راس ج مانع کی سطح کے نیچے گ گہرائی پر ثابت ہے۔ مانع کی کثافت گہرائی کے متناسب ہے۔ اگر پتہ سے کی کثافت اسی ہو جتنی کہ مانع کی کثافت گہرائی دیر ہے اور مثلث کا ارتفاع ف، سمت انتصابی کے ساتھ زاویہ ط بنا ہے تو ثابت کر دو کہ

$$1 \text{ د ف }^2 \text{ جم }^2 (\text{ط} + \text{ع}) \text{ جم }^2 (\text{ط} - \text{ع}) = 3 \text{ گ }^2 \text{ جم }^2 \text{ ع جم ط}$$

جہاں زاویہ ا ج ب = ط - ع -

۴۰ — ۲ ارتفاع اور ۱ نصف قطر کے مجوف اسطوانہ کے اندر پانی ہے اور اسطوانے کے سرے بند ہیں اسکو نصف قطر کے ایک گہر درے کرہ پر سطح رکھا گیا ہے کہ اس کے قاعدے کا مرکز کرہ کے بلند ترین نقطہ کو مس کرتا ہے۔ پانی کا وزن اسطوانے کے وزن کے مساوی ہے۔ ثابت کر دو کہ توازن قائم ہوگا اگر اسطوانہ میں پانی کے ارتفاع کا طول مساوات

$$2 \text{ لا}^2 - 3 (2 \text{ ر} - \text{ف}) \text{ لا} + 1 = 0$$

کی اصولوں کے درمیان واقع ہو۔

۴۱ — گروشی مکائی نما کی شکل کا ایک بے وزن خول ایک متناہ خول میں لٹکا ہوا ہے جسکا مبدل قبل الذکر کے مبدل کا دو چند ہے اس کے اندر سیال ہے

ثابت کرو کہ زمین کے مرکز سے رفاصلہ پر دباؤ د ہے ایسا کہ

$$\text{لوک} \frac{d}{d} = \frac{g \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right)}{(n-1) \cdot \frac{1}{r^2}}$$

جہاں زمین کا نصف قطر ہے۔

اگر $n=1$ تو ثابت کرو کہ ایک کروی غبارے کا حجم جبکہ مادہ تمام سمتوں میں مساوی طور پر امتداد پذیر ہے ایسے سے بڑا ہوگا جب اس مساوات

$$g \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right) = \frac{g}{r} \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right)$$

سے معلوم ہو جہاں $m = \frac{g \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right)}{d}$ ، ٹپک کی قدر d ، اور غبارے کا قدرتی نصف قطر k ہے۔ یہ معلوم ہے کہ جب غبارہ زمین سے اٹھتا ہے تو عین بجز دباؤ رہتا ہے۔ کنگ نصف قطر قدرتی ہوتا ہے۔

۴۶ — ایک غبارہ کسی خاص لمحہ میں ف بلندی پر ہے، اس رفتار سے نیچے اتر رہا ہے اور افقی سمت میں اس رفتار سے حرکت کرتا ہے جو اس بلندی پر ہوا کی رفتار ہے۔ اگر ہوا کی رفتار بلندی کے متناسب ہو اور اگر کسی خاص مقام پر اترنے کے مقصد سے گیس کو اس طرح خارج کیا جائے کہ اُتار کی رفتار مستقل رہے تو ثابت کرو کہ ابتدائی بلندی کے انداز سے میں فر ف کی خطا واقع ہونے سے جس نقطہ پر غبارہ پہنچتا ہے اس نقطہ میں

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} = \frac{1}{r} - \frac{1}{r'} + \frac{1}{r} - \frac{1}{r'}$$

کی خطا پیدا ہو جائے گی جہاں $k = \frac{g \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right)}{d}$

۴۷ — ثابت کرو کہ سیمٹن (Smeaton) کے ہوا پمپ کی (ن ۱۴) دیں

ضرب میں جو کام ہوتا ہے وہ

$$\pi \left(\frac{1}{2} \text{ ب} \right) \left(\text{ن} + \text{ب} + \text{ل} \right) \text{ لک } \left(\frac{1}{2} \text{ ب} \right) + \text{ب} \text{ ل}$$

کے مساوی ہے اگر ہوا کے پھیلاؤ کو ہم تپشی فرض کر لیا جائے جہاں ل قابلہ کا اوزر ب نالی کا حجم ہے۔

۴۸۔ اگر آگنکشیف ہم تپشی ہو تو ایک کشف کی ن دیں ضرب میں جو کام ہوتا ہے اس کو معلوم کرو۔

۴۹۔ حجم کے ایک قابلہ میں اگر ب گنجایش کے ایک کشف کرنے والے پمپ سے ہوا اس قدر تیزی سے داخل کی جائے کہ ایصال سے حرارت کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو نظر انداز کیا بنا سکتا ہے تو ثابت کرو کہ ن فریوں کے بعد قابلہ میں ہوا کا دباؤ کرہ ہوائی کے دباؤ کا (۱ + ن ب / ل) چہ گنا ہوگا۔ یہ معلوم کرو کہ قابلہ میں تپش کیا ہے اور پمپ کے میں جو کام ہوا اسے دریافت کرو۔

نیز قابلہ میں ہوا کا دباؤ معلوم کرو جبکہ ایصال سے تپشی توازن پھر برقرار ہو جائے۔

۵۰۔ دی ہوئی کثیت اور نصف قطر کا ایک ٹھوس کر دی مرکزہ لچکدار سیال (د = ک ث) کے تجاذبی کرہ ہوائی سے گھرا ہوا ہے۔ ثابت کرو کہ دباؤ کا تعین کرنیوالی مساوات ہے

$$\text{فہ} - \left(\frac{1}{2} \frac{\text{فد}}{\text{د}} \right) + \frac{\pi^2}{2} \frac{\text{ر}^2}{\text{ک}} = ۰$$

کن شرطوں کے تحت دباؤ کی شکل لکھ ہو سکتی ہے۔

۵۱۔ اگر یہ ماں لیا جائے کہ زمین کے اندر مساوی کثافت کی سطحیں ہم مرکز کرے ہیں اور دباؤ اور کثافت میں ربط د = کپ (ث - ث۱) ہے جہاں ث سطح پر کی

کثافت ہے تو ثابت کرو کہ

$$\text{مث} = \frac{\text{واجب } ۲۲۴۲ \text{ ر کر } ۲}{\text{رجب } ۲۲۴۲ \text{ م کر } ۲}$$

جہاں زمین کا نصف قطر ہے اور مرکز سے زیر بحث نقطہ کا فاصلہ۔
کیست کی تجاویز کا کائی یہاں استعمال کی گئی ہے اور زمین کی فوری گردش کا
اثر نظر انداز کیا گیا ہے۔

۵۴ — ایک ٹھوس جسم دو کعبوں میں مشتمل ہے جو متشاکلاً باہم ملائے گئے ہیں
لیکن مختلف مادے اور مختلف جسامت کے ہیں۔ یہ دونوں ایک سیال میں اس طرح
تیرتا ہے کہ مشترک سطح مستوی سیال کی سطح پر ہے۔ تائید کی شرط معلوم کرو۔

۵۵ — ایک ٹھوس جسم گردش کی مکافی نما کی شکل کا ہے اور انتصابی محور کے
ساتھ تیرتا ہے۔ اگر مرکز نقل مرکز مابعدی بر منطبق ہو تو ثابت کرو کہ توازن قائم ہے۔
۵۶ — ایک ٹھوس جسم گردش کی مکافی نما کی شکل کا ہے اور ایک مائع میں جس کی
کثافت مائع کی کثافت کا n گنا ہے تیرتا ہے۔ اگر مکافی نما کا ارتفاع f
ایسا ہے کہ اس کا مرکز نقل مرکز مابعدی کے اوپر تک بلندی پر ہے تو ثابت کرو کہ توازن
کا ایک محل ایسا ہے جس میں محور انتصابی نہیں ہوتا اور قاعدہ پوری طرح مائع کے
مابہر رہتا ہے اگر $\rho > n$ (۱-ن) ۲۔

۵۵ — ایک جہاز کے پہلو پانی کے قریب انتصابی ہیں اور ہٹائے ہوئے پانی کا
مرکز نقل ہی گہرائی پر ہے۔ جہاز کی کیت k ہے۔ ایک چھوٹا بوجھ h ک
جہاز پر متشاکلاً رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے جہاز بقدر r گہرائی کے اور
ڈوب جاتا ہے۔ اور h + h معنی ہی ہو جاتا ہے۔ صغیر مقادروں کے مریضوں
کو لحاظ رکھ کر ثابت کرو کہ

$$\text{معنی} = \frac{h}{r} + \frac{h}{r} - \frac{h}{r}$$

۵۶ — ایک متجانس ناقص نما مائع میں اس طرح تیرتا ہے کہ اس کا اصل محور

ج و ج انتظامی ہے اور وزن (و ناقص نما کے وزن کا $\frac{3}{5}$) اوپر کے سرے
ج پر نسبت کر دیا گیا ہے اس طور پر کہ تیز او کا مستوی مرکز جس سے گزرتا ہے۔ اگر ناقص نما کو اوسط
محور ب کے گرد ایک مجدد و زاویہ ط میں گھما دیا جائے تو ثابت کرو کہ جنت کا معیار
جو اس کو اس محل میں رکھے گا

د { ج - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ } جب ط

ہوگا جہاں تراش (۱/۲) کا خروج المکرز ہے۔

۵۷ — جہاز کے عرشہ پر کے وسطی خط سے ج اصلہ پر وسط مسک ٹی کیت کھدی گئی
ہے جسکی وجہ سے جہاز ایک طرف بقدر چھوٹے زاویہ ط کے جھک جاتا ہے۔
جہاز کا کل ہٹاؤ مہ ٹن ہے۔ ثابت کرو کہ اس کیت کی عدم موجودگی میں مرکز ثقل
کے اوپر مرکز البعد کی بلندی تقریباً $\frac{1}{2}$ ک ج کے مساوی ہوگی اور اس جملہ کو دوسرے
رتبہ تک صحیح بنانے میں مقدار

ک (ب - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶) فرج

کا اس میں امتداد کرنا پڑے گا۔ جہاں خط آب کے اوپر ک کے مرکز ثقل کی
بلندی ب ہے پسندے کی گہرائی ٹک ہے خط آب کی تراش کا رقبہ $\frac{1}{2}$ اور جو د کا
معیار ج ہے جن کا تقریباً معلوم ہونا فرض کر لیا گیا ہے۔

۵۸ — تجاؤ فی کیت میں ایک چھوٹا کردی جوت (نصف قطر $\frac{1}{2}$) ہے جس کو
متجانس بے پچک سیال سے بھر دیا گیا ہے اور کہ کے مرکز پر کی کشش بالکل
معدوم ہے۔ ثابت کرو کہ مرکز برک سیالی دباؤ - $\frac{1}{2}$ ج مرا سے کم اور جوت کی سطح

پر کل دباؤ - (ج + $\frac{1}{2}$ ۲ ۲ ۲) ۲ ۲ ۲ مرا سے کم نہیں ہو سکتا۔ جہاں سیال
کی کثافت $\frac{1}{2}$ ہے اور تجاؤ فی کیت کے تہ کو ذ سے قبیر کریں تو عنصر فرس کے
لئے جو مرکز سے کسی سمت میں کھینچا گیا ہے مرکز پر $\frac{1}{2}$ کی اقل جبری قیمت ج ہے۔

۵۹ — پانی کا ایک اسطوانی حوض ایک افقی محور پر جھول سکتا ہے۔ یہ محور حوض کی ایک عمودی تراش کا قطر ہے اور اسطوانہ کے ارتفاع کے وسطی حصہ کے نیچے واقع ہے۔ ثابت کرو کہ پانی باہر نکل پڑنے کے پیشتر حوض میں پانی کی مقدار اگر اس کی سطح آزاد ہو (یعنی اگر حوض بڑھ نہیں نہ ہو) بہ نسبت اس پانی کی مقدار کے کم رہ سکے گی جو اس میں رہتی اگر اس بڑھ نہیں ہوتا۔ اگر قبل الذکر صورت میں گردش کے محور کے اوپر فاصلہ بلندی تک پانی چڑھ سکتا ہو تو ثابت کرو کہ موخر الذکر صورت میں اس کی اس بلندی میں (فاصلہ ۲۰ کھ) فاصلہ کا امتداد ہو سکتا ہے جہاں گردش کے محور کے لحاظ سے اقباعہ کی عمودی تراش کا وجود کا معیار لکھا ہے۔

۶۰ — مساوی وزن اور صفت تیل کے دو کردی بند غباروں کے اندر ایک ہی قسم کی گیس کرہ موائی کے دباؤ π پر مساوی مقداروں میں ہے ایک غبار تو امتداد پذیر مادے سے بنایا گیا ہے اور دوسرا امتداد پذیر مادے سے تسلی لچک کی تدرع ہے۔ ان غباروں کو ایک ہی بلندی پر ایک ہلکی رسی کے سرورں پر تھما گیا ہے جو ایک چکنی چرخ پر سے گزرتی ہے اگر رسی کو کاٹ دیا جائے تو ثابت کرو کہ غباروں کی بلندیوں میں فرق جب وہ توازن میں ہوں

$$\frac{\pi}{\rho} \text{ لوک } \frac{1}{\rho} \text{ ہوگا جہاں مساوات } \pi - \rho \frac{\pi}{\rho} = \frac{\pi}{\rho} \text{ کی}$$

حقیقی اصل ہے۔ رسی کا تناؤ π ہے اور دباؤ π پر ہوا کی کثافت ρ ہے۔

تبش کو مستقل فرض کر لیا گیا ہے۔

۶۱ — ایک چکدار بے تنی ہوئی دائری جہلی کے محیط پر ایک استوار انگوٹھی ثبت کر دی گئی ہے۔ اس کے ایک رخ پر سیالی دباؤ عمل کرتا ہے جس سے جہلی ایک گردشی سطح کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ معلوم کیا گیا کہ کوئی جھوٹا مربع جو بے تنی ہوئی حالت میں جہلی پر بنا جا جائے اور جس کا ایک ضلع ایک نصف قطر یا ربع ہو تو سیالی حالت میں ایک مستطیل میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے ضلعوں کی نسبت مستقل ہے۔ ثابت کرو کہ جہلی کی یہ نئی شکل مخروط ہونی چاہیے۔ اس پر کے سیالی دباؤ

کا قانون معلوم کرو۔

۶۲۔ اگر یہ دیا جائے کہ پانی کا سطحی تناؤ ۲۰.۱ مئی پر ۸۱ ڈاؤن فی منٹ میٹر ہے اور $\frac{فرق}{ثابت} = \frac{تغیر}{توازیوں}$ کے ایک جملے کے پھیلاؤ کی شرح دریافت کرو جیسے پیش ت جڑتی جائے۔

۶۳۔ زوج سیال کا ایک قطرہ اپنے مرکز میں سے گرنے والے ایک محور کے گرد یکساں رفتار سے گھومتا ہے اور سطحی تناؤ کے سوا کسی قوت کے زیر عمل نہیں ہے اس کی شکل کو ایک گردشی سطح کی شکل مان کر اور ماکو گردش کے محور پر مرکز سے ناپنے سے ثابت کرو کہ نصف الہاری مشنہی اس مساوات

$$\frac{فرق}{فرق} = \frac{لا(لا + ک)}{لا(لا + ک) - لا(لا + ک)}$$

سے حاصل ہوتا ہے جہاں لا استوائی نصف قطر ہے۔

۶۴۔ ایک نئی قدرتی نصف قطر لا کے قائم مستدیر اسطوانہ کی شکل کی ہے اور کامل طاقم مادے سے بنی ہے جو مکوں کی سمت میں امتداد نا پذیر ہے لیکن مکونہی دائروں کی سمت میں یکجہاں ہے۔ ٹھیک جیٹھے والی دو تہالیاں اس کے سروں پر اچھی طرح ثبت کر دی گئی ہیں اور پھر دئے ہوئے دباؤ کی گیس اس میں داخل کی گئی ہے۔ تہالیاں آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے قریب آسکتی ہیں تاہم کہ نصف الہاری تراش کی تفرقی مساوات ہے

$$\frac{فرق}{فرق} + \frac{فرق}{فرق} = م(لا - لا) \left(\frac{فرق}{فرق} \right)$$

جہاں م لچک اور دباؤ کا تفاعل ہے۔

تمام دباؤں کے لئے نلی کے صدی نصف قطر تخت تہالیں پر ۲ اور ا کی نسبت میں ہوتے ہیں۔

نلی کے مختلف ابتدائی طولوں کے لئے سب سے چوڑے نقطہ پر نصف الہاری

تراش کا اٹھائے اعظم $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right)$ ہے اور دوسرا صدی اٹھا ہے
 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right)$

۶۵۔ ک کیت کے صابونی جیلے میں ہوا ہے جو کھیلے بال کی پابندی کرتی ہے۔
 اور جلی کا تناؤ (ت) نصف قطر کی چھوٹی تبدیلیوں سے متغیر نہیں ہوتا۔ جلی کل لکڑی
 کے گرد چھوٹے ابتر ازات کر رہی ہے۔ اگر جلی کی گردی شکل میں کوئی تبدیلی
 واقع نہ ہو تو ثابت کر دو کہ ابتر ازات کا وقت $\frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right)$ ہے جہاں ہوا کا جمود نظر انداز کیا
 گیا ہے اور بیلہ خلا میں رکھا گیا ہے۔

۶۶۔ ج مبدل کے ایک ذخیرہ کو ایک وتر کے گرد جو مرتب کے متوازی
 اور اس سے ک فاصلہ پر ہے ٹھاکرا ایک بند سطح حاصل کی گئی ہے۔ اگر اس میں
 ذ کثافت کا مانع بھر دیا جائے جو یکساں زاویہ رفتار سے محور کے گرد گھوم
 رہا ہے اور اس کو اسی قسم کے مانع میں ڈوب دیا جائے اور اگر اس میں ایک سوراخ
 ہو جس میں سے بیرونی دائروں کی مانع کی آمد و رفت ہو سکتی ہے تو ثابت کر دو کہ
 محور سے فاصلے پر صدی تناؤ ہونے

$$\frac{\text{ذ سے } r_2 \text{ (ک-ر)}}{\text{ذ سے } r_1 \text{ (م-ک-ر)}} \text{ اور}$$

۶۷۔ اگر ایک صابونی جیلے کے ذرات فاصلے کے محکوس مر ج کے قانون
 کے بموجب ایک دوسرے کو دفع کریں اور اگر ذوہ ہو تو ثابت کر دو کہ
 ذ $14 = 2$ رت ہواں جیلے کا نصف قطر اور ت تناؤ ہے۔

۶۸۔ پیل کے ایک گردی خول میں (نصف قطر ۱) اتنا پانی زور سے داخل کیا گیا
 کہ اس کا نصف قطر تک پھیل جاتا ہے۔ اگر خول کی چپک کی شرح کنجھنے میں
 مہرہ اور پانی کے چپکاؤ کی شرح لہ تو ثابت کر دو کہ خول میں پانی کی مقدار ہے

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \quad \text{اور} \quad \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \quad \text{اور} \quad \frac{1}{8} - \frac{1}{16} = \frac{1}{16}$$

جہاں $\frac{1}{2}$ پانی کی کثافت ہے جبکہ اسکو نہ بچکا یا گیا ہو۔

اس سوال میں حسب ذیل باتیں معلوم ہیں

۱۔ ۲ سم، ۵ سم، ایک کرہ ہوائی (۱۰ لاکھ ڈالین فی مربع سنٹی میٹر) کے لئے پانی کا پچکاؤ = 5×10^5 ، غول کی موٹائی = ۵ ملی میٹر اور ایک مربع ملی میٹر تراش کے پتلی ۱۰ کے ٹیول کو دو چند کرنے کے لئے ۹۰۰ لاکھ ڈالین کی قوت درکار ہوتی ہے اگر اس کی ٹپک مستقل رہے۔ پھر معلوم مقداروں کو منہ بیکہ اس نظام میں معلوم کرہ اور ثابت کرہ میں پانی کی گتیت = ۵۰۵ گرام تتریا۔

۶۹۔ ایک نصف کرہی فیبلہ پانی پر تیرا ہے اس کا نصف قطر ایسا ہے کہ اندرونی و بیرونی دباؤں کے فرق کو ہیر ذنی دباؤ سے نسبت ہے وہ ایک صغیر مقدار ہے جسکا مربع نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ پیلے کے اندر پانی کی سطح کی شکل دریافت کرہ اور ثابت کرہ کی بیرونی آبی سطح کے نیچے اس کی بڑی سے بڑی گہرائی ہے

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \quad \text{اور} \quad \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \quad \text{اور} \quad \frac{1}{8} - \frac{1}{16} = \frac{1}{16}$$

جہاں پیلے کا نصف قطر ہے اور بیرونی رقبہ ای اور ہوا کے لئے جو سطحی توانائی ہے اس کو پانی کے اکائی حجم سے ورانے کے ساتھ نسبت دیا ہے۔

۷۰۔ گلفڈر (Gaffard) کی اجمادی تین سالہ اسطوار نے ہوئے ہیں اور ایک بڑا ہوا کا ذخیرہ جس کی بہت سی خارجی ہوا کی شے کے ساوی رکھی جاتی ہے۔ اسطواروں کے فشار کے ایک دہرے پرے پرے دو کرہوں (Cranks) کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور اسے کٹاؤت کے خارجی اندر سے چھڑا جاتا ہے۔ پیلے اسطوارے میں ہوا اس قدر پچکا لی جاتی ہے کہ اس کا دباؤ ہی ہو جائے جو حرانہ میں ہے اور پھر مکملند کھلتے ہیں اور ہوا خانہ میں ۱۰ اخل ہوتی ہے جسے ایک فنر سے کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا چھوٹا اسطوارہ ایجن کی طرح عمل کرتا ہے جس میں پچکی

ہوئی ہو ضرب کے اس حصہ عمل میں خزانہ سے داخل ہوتی ہے اور ضرب کے بقیہ حصہ عمل میں پھیل کر کہ ہوائی کے دباؤ پر خارج ہو جاتی ہے۔ خارج ہونے وقت اس ہوائی پیش کشی ہوتی ہوتی ہے مگر اسطوانوں کے حجم ج اور ج ہوں اور اگر پچکاؤ اور پھیلاؤ کو حرنا کر فرض کر لیا جائے تو ثابت کر دو کہ ہر ضرب میں پہلے اسطوانہ میں جو کام ہوتا ہے وہ $\frac{H}{J} - \frac{H}{J} = \frac{H}{J}$ ہے اور دوسرے اسطوانہ میں

$$\frac{H}{J} - \frac{H}{J} = 0 \text{ ہے۔ } H \text{ کہ ہوائی کا دباؤ ہے۔ (ڈاکٹر ایکسن)}$$

۱۔ غمت کردی عجائس ٹھوس زمین پایاب سمندر سے گھری ہوئی ہے (۲۳۰) جو دور کے ایک جسم کے زیر کشش ہے۔ اگر ہوائی پر خود اس کی کشش نظر انداز کر دی جائے تو ثابت کر دو کہ سمندر کی سطح کوئی ریختی لیکن اس کا مرکز زمین کے مرکز سے بقدر اس فاصلے کے ہٹا جائیگا جو اس کے نصف قطر کو تھا ذی جسم کی کشش سیال کے ایک عنصر پر یہ ضرب دیتے سے حاصل ہوتا ہے۔

زمین کی کشش اسی عنصر پر
۲۔ اگر زمین کو گردی فرض کر لیا جائے اور اس کے گرد کم گہرائی کا ایک سمندر ہو اور اگر ہوائی کے ذرات کی کشش ایک دوسرے پر نظر انداز کر دی جائے تو ثابت کر دو کہ گردی سمندر کی سطح پر سادات

استوار پر مرکز گردی نہ ہوتی

$$= 0 \text{ زمین کی سطح پر باؤ پر اصل کی خواست}$$

سے حاصل ہوگی۔

۳۔ سیال کی کچھ مقدار ایک اادی لمبو ترے کر نما کی سطح پر پھیلا دی گئی ہے۔ ثابت کر دو کہ سیال کی آزاد سطح بھی کر نما ہے (۱۱۰) اور سیال کی گہرائی کو جو نسبت قطب پر کی گہرائی سے ہے وہی نسبت کر نما کے محور اعظم کو محور اسفر سے ہے۔

۴۔ اگر زمین کے گرد کم گہرائی کا ایک سمندر ہو تو ثابت کر دو کہ عرض بلد ہی ہے

قطع ناقص ہے جسکے محاور ۲ اور ۲ ب ہیں۔ مانع اور اسطوانہ دونوں اسطوانہ کے محور کے گرد یکساں راہی رزقار سہ سے گھومتے ہیں۔ ثابت کر دو کہ آزاد سطح کی ممکن شکل ہم ماسکی ناقصی اسطوانہ ہے جسکے محاور ۲ اور ۲ ب ہیں ایسے کہ

$$\text{سہ} (و + ب) = ۲ = ۴ ت (ا ب - و ب)$$

۷۹۔ متجانس مانع کی کمیت (ک) اضافی توارن میں ایک ثابت محور کے گرد یکساں زاویہ رزقار سے گھوم رہی ہے اس طرح کہ اس کی سطح کی ہیلیجیت (حصہ) چھوٹی ہے۔ اگر کمیت کا مہک حصہ مرکز پر ایک لانتا ہی کثف مادی نقطہ کی سطح میں منجمد ہو جائے اور نقیہ حصہ (۱- مہ) گ کی کثافت کو نسبت ۱- مہ مہ میں گھٹا دیا جائے تو توازن کی صورت میں اس نئی سطح کی ہیلیجیت کہا ہوگی اگر گردش کا وقت دہی مرص کما جائے جو پہلے تھا۔

۸۰۔ یکساں کثافت کا ایک ٹھوس ناقص نما اپنے اقل محور کے گرد گھومتا ہے اور اس کے گرد مختلف کثافت کے متجانس مانع کا ایک غلاف ہے جسے یہ ساتھ لے رہتا ہے کل کمیت قانون قدرت کے بموجب کشش رکھتی ہے۔ ان شرائط کا معلوم کرنا مطلوب ہے جن کے پورا ہونے پر آزاد سطح ناقص مائی شکل اختیار کر سکے (Prof. Townsend Math of Ed. Tinus Vol. xxv)

۸۱۔ ت + ۲ کثافت کے ٹھوس کروں کی کچھ تعداد کثافت کے سیال میں متوازن ہے کل نظام ایک جوف کرہ میں ہے۔ اگر کل کمیت متجاذبی ہو تو ثابت کر دو کہ کروں کی کمیت کا مرکز جوف کرہ کے مرکز پر ہونا چاہیے۔ نیز اگر صرف دو کرے ہوں تو نقطہ تماس پر ان کے درمیان دباؤ ہوگا

$$\frac{۱۶}{۹} ت + ۲ ب = ۲ \left\{ \frac{۲}{۲ - (ا ب + ب)} + \frac{۲}{(ا ب + ب)} \right\}$$

جہاں ۱۶ ب کروں کے نصف قطر ہیں۔

۸۲۔ ایک ٹھوس متجانس ناقص نما کے اندرونی حصہ میں ایک ہم مرکز کرہ کی خول ہے جو بے پچک متجانس سیال سے بھرا ہوا ہے۔ کل مادہ قانون قدرت کی

بموجب کشش رکھتا ہے۔ ثابت کر دو کہ مساوی دباؤ کی سطحیں مخروطی نما ہیں اور اگر اس نظام کی ایک معین سطح پر کوئی نقطہ ن ہو تو مرکز و میں سے گزرنے والی اور ن و پر علی اقوام سطح مستوی پر کا حامل دباؤ $h + \frac{1}{2} \rho h^2$ ہوگا جہاں h ایک مستقل ہیں جو مساوی دباؤ کی منتخب شدہ سطح پر منحصر ہیں۔

۸۳ — اگر ظرف غواص کو ایک ریخیر کے ذریعہ پانی میں لٹکایا جائے اور وہ پانی میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہو تو ثابت کر دو کہ اس کا محور انتصابی نہ رہیگا جب تک کہ

$$(1 - \frac{1}{s})g - \frac{1}{2}k^2 \frac{1}{h}$$

مثبت نہ ہو جہاں g ظرف غواص کا وزن ہے، h اندرونی ہوا سے بٹائے ہوئے سیال کا وزن، s اندرونی ہوا کا حجم، s ظرف غواص کے مادے کی کثافت اضافی، k^2 اندرونی مائع کی ہوا سطح کی عمودی تراش کے جوہر کا معیار، g اور k^2 ظرف غواص اور حجم s کے مراکز نقل کی گہرائیاں اس نقطہ کے نیچے جس پر ریخیر باندھ دی گئی ہے۔

۸۴ — ایک ظرف غواص اندر کی طرف سے ایک گردشی مکافنی نامشکل سے محدود ہے اس کا ارتفاع b اور قاعدہ کا نصف قطر a ہے۔ اگر پانی کی سطح کے نیچے ظرف کے قاعدے کی گہرائی l ہو تو ثابت کر دو کہ ظرف میں n لمبی تک پانی چڑھ جائیگا جہاں

$$f(n) = (l - n)(b - n) = 2$$

f آبی بار پیکا ارتفاع ہے۔

نیز اگر ظرف غواص پوری طرح غرق ہو اور اس کو ایک چھوٹے زاویہ ط میں گھمایا جائے تو ثابت کر دو کہ استرداد میاں ہے

$$\{k - n \frac{1}{2} (b - n) (2b - 2 + n) + 3\} \frac{1}{2} b^2$$

جہاں k مستقل ہے جو f پر منحصر نہیں اور n پانی کی کثافت ہے۔

۸۵ — $t_1, t_2, t_3, \dots$ ثن کثافتوں کے اعداد کی ایک تعداد

قوت کے مجاذبی میدان میں متوازن ہے۔ اگر ایک ٹھوس کرہ ابتداءً سب سے اوپر کے مانع ثن میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہو اور پھر اسکو آہستہ آہستہ نیچے ڈھکیلا جائے یہاں تک کہ یہ پوری طرح سب سے نیچے مانع ثن میں پوری طرح غرق ہو جائے اور اگر کرہ کا حجم بمقابلہ ہر مانع کے حجم کے چھوٹا ہو تو ثن ثابت کر دے سیالی دباؤ کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ تقریباً

$$C \{ (C_1 - C_2) \text{ ث} + (C_2 - C_3) \text{ ث} + \dots + (C_n - C_{n+1}) \text{ ث} \}$$

$$+ (C_{n+1} - C_{n+2}) \text{ ث} \}$$

کے مساوی ہے جہاں C اور C کرہ کے ابتدائی اور آخری محلوں میں اس کے مرکز

پر کے قوتے ہیں اور $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ ، حاصل سطحوں پر کے قوتے ہیں۔

۸۶ — دبتمجاس کرے ث کثافت کے بے پچک متباسب سیال میں غرق اور ساکن ہیں۔ کروں کے نصف قطرب اور b اور کثافتیں ρ اور ρ' ہیں۔ میتوں کی پیمائش مجاذبی اکائیوں میں کی گئی ہے۔ کل کثیت کو ایک استوار کردی لغاؤ میں بند کر دیا گیا ہے جس سے وہ عین بھر جاتا ہے۔ ثابت کر دے ث کثافت کے کرہ پر

عمل کینویالی کشت اور دایک سب قوتیں اعمی قوت $\frac{4}{3}\pi r^3 \rho$ ث (ث - ρ) b ج اور

دفاعی قوت $\frac{4}{3}\pi r^3 \rho' (\rho' - \rho) b$ میں تحویل ہو سکتی ہیں جبکہ قبل الذکر

دفاعی قوت لغاؤ کے مرکز سے اور مؤخر الذکر دوسرے کرہ کے مرکز سے باہر دایم کرے ج لغاؤ کے مرکز سے اور d دوسرے کرہ کے مرکز سے زیر بحث کرہ کے مرکز کے فاصلے ہیں۔

۸۷ — کچھ مجاذبی کثیت جسکی سطح ہم قوہ سطح ہے سیال سے گھری ہوئی ہے۔ سیال کی کشش بالذات نظر انداز کیا جاسکتی ہے ثابت کر دے کسی نقطہ پر کا دباؤ سطح پر کے

دباؤ سے بقدر

۱۴۲۲ ح ۱ فرلا فرما فری

کے کم ہے جہاں ح حاصل قوت، ک کل جاذب کیت، مک کشش کا مستقل ہے اور مکمل مساوی دباؤ کی دونوں سطحوں کے درمیانی کل حجم پر لیا گیا ہے۔

۸۸ — ایک متجانس جاذب ٹھوس کا حجم $\frac{1}{2} \pi r^2 h$ اور کثافت ρ ہے۔ اس کی شکل تقریباً کروی ناقص نما

$$s = \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho + \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho \frac{1}{2} h = \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho \left(1 + \frac{1}{2} h \right)$$

کی ہے اور یہ $\frac{1}{2} \pi r^2 h \rho$ (ح - ۳) حجم کے جاذب سیال سے گھرا ہوا ہے جس کی کثافت ρ ہے۔ ثابت کرو کہ آزاد سطح کی ممکن شکل جیک نظام توازن میں ہو یہ ناقص نما

$$\left\{ \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho + \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho \frac{1}{2} h \right\}$$

ہے جہاں

$$h = \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho / \left(\frac{1}{2} \pi r^2 h \rho + \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho \frac{1}{2} h \right)$$

۸۹ — سیال کال کے ہر نقطہ پر صغیر اختیاری ہٹاؤ پیدا کیا گیا ہے۔ کسی نقطہ پر ہٹاؤ کے اجزائے تحلیل محوروں کے متوازی δx ، δy ، δz ہیں جہاں δx ، δy ، δz متوازی متفاعل ہیں لا، ما، می کے ثابت کرو کہ کل حجم میں دباؤ جو کام کرتا ہے وہ کل کام

$$\left(\frac{1}{2} \pi r^2 h \rho + \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho \frac{1}{2} h \right) \left(\frac{1}{2} \pi r^2 h \rho + \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho \frac{1}{2} h \right)$$

ہے جہاں کسی نقطہ پر دباؤ ہے اور مکمل کل حجم میں لیا گیا ہے۔ اس طرح ثابت کرو کہ سیال کے توازن کیلئے شرط ہے

$$\frac{1}{2} \pi r^2 h \rho + \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho \frac{1}{2} h = \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho + \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho \frac{1}{2} h$$

جہاں ρ سیال کی کثافت اور لا، ما، می کے اجزاء ترکیبی فی اکائی کیت ہیں۔

فہرست اصطلاحات

نوٹ اں اصطلاحات کو اردو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔

Water line area	آب خط رقبہ
Centre of buoyancy	اچہال کا مرکز
Surface of buoyancy	اچہال کی سطح
Calculus of variations	احصائے تغیرات
Inferior limits	ادنیٰ حدود
Flying wheel	اڑ پیم
Restorative moment	استردادعی معیار
Thermal capacity	استعداد حرارت
Meridional section	استوائی تراسترس
Radiation	اشعاع
Relative equilibrium	اضافی توازن
Superior limits	اعلیٰ حدود
Extensible	استدادپذیر

Inextensible	استدادنا پذیر
Freezing machine	انجمادی مشین
Deflection	انحراف
Upward pressure	اوپر وار دباؤ
Apses	اوجین
Mean centre	اوسط مرکز
Conduction	ایصال
Load	بار
Barometer	بار پیم
Upper limit	بالائی حد
Vapour	بخار
Evolute	برپیچ
Dilatation	لبسط
Incompressible	بے پچک
Lamina	پہنزا
Compression	پچکاؤ
Compressible	پچک پذیر
Metacentre	پس مرکز، مرکز مابعد
Paddle steamer	پنکھائی جہاز
Lune	پہانک
Turn of a helix	پہیر (مروند کا)
Hold of a ship	پٹیا (جہاز کا)
Screw	پیچ
Screw-steamer	پیچ بانی جہاز
Constant of gravitation	تجاذب کا مستقل

Gravitating solid	تجاذبی ٹھوس
Configuration	تشکیل
Counterbalance	تقدیل کرنا
Variation	تغیر
Righting moment	نقوی می معیار
Line of contact	تماسی خط
Tension	تناؤ
Tensile	تناوی
Kinetic energy	توانائی بالفعل
Potential energy	توانائی بالقوہ
Line of floatation	یرو کا خط
Plane of floatation	تیراؤ کا مستوی
Surface of floatation	تیراؤ کی سطح
Floating bodies	تیرنے والے اجسام
Lintearia	نوبیہ
Self-attracting	جاذب بالذات
Life-belt	جان بٹی
Algebraical moment	جبری معیار
Couple	جفت
Product of Inertia	جمود کا حاصل ضرب
Film, membrane	جہلی
Oblate spheroid	چپٹا کرہ منہا
Annulus	چنبر
Thread	چوڑی (سیچ کی)

Boundary conditions	حدودی شرطین
Terminal conditions	حدی شرطین
Specific heat	حرارت نوعی
Adiabatic	ترناگذر
Convective equilibrium	حلی توازن
Water line	خط آب
Cycloid	خط تدویر
Line of action	خط عمل
Line of greatest slope	خط میلان اعظم
Sheli	نول
Period	دور
Bifurcation	دو شاخگی
Shaft	دبیرا
Impulsive tension	دعکاتناؤ
Wall-sided ship	دیوار پهلو جہاز
Sheet iron	ڈھلا ہوا لوہا
Intrinsic pot energy	ذاتی توانائی بالقوہ
Intrinsic equation	ذاتی مساوات
Quarter-period	ربعی دور
Areal section	رقبئی تراشش
Wrench	رنج
Hyperboloid	زائید نما
Hyperboloid of one sheet	زائید نما اک چادری
Hyperboloid of two sheets	زائید نما دو چادری
Saturn	زحل

Catenary	رنجیرہ
Catenoid	رنجیرہ نما
Stress	رد
Lower limit	ردن حد
Stern	سکاتن
Trilinear co-ordinates	سہ لائنی مختصات
Fluid	سیال
Perfect fluid	سیال کامل
Capillary curve	سیرابی منحنی
Soap bubble	صابون کی ببل
Principal curvature	معدنی انحناء
Principal axes	معدنی محاور
Principal tension	معدنی کشش
Anticlastic	معدنی
Necessary & sufficient conditions	ضروری اور کافی شرائط
Normal mode	طبعی مہیت
Strata	طبقات
Longitudinal	طولی
Deck	عشرہ (جہاز کا)
Transverse	موضعی
Nodoid	عقدہ نما
Element	عصر جز
Water-section	بیہ شجاس
Separability	فاصل آب
	مصل بذیری

Astronomical density

فلکی کثافت

Fathom

فیدم

Receiver

قابلہ

Rectangular hyperbola

قائم الزاؤ

Hinge

قبضہ

Bow

قدامہ

Divisibility

قسمت پذیری

Parabola

قطع مکافئ

Force function

قوتی تفاعل

Force to a point

قوت مائل بہ نقطہ

Constraint

قید

Constraining forces

قید کرنیوالی قوتیں

Bibliography

کتبیات

Spheroid

کرہ نما

Crank

کرنیک

Centre of mass

کیت کا مرکز

Step (of a helix)

گام (مروکہ کا)

Radius of gyration

گردش کا نصف قطر

Surface of revolution

گردشی سطح

Roulette

گرد دنیہ

Pitch

گھائی

Periphery, perimeter

گھیرا

Elastica

لدنیہ

Convolutions

لففہ

Anchor-ring

لنگر چلا

Smuous	لہریلا
Hydrodynamical	ماحرکی
Hydrostatics	ماسکونیات
Focal conic	ماسکی مخروطی
Parameter	مبادل
Homogeneous	متجانس
Equilateral Hyperbola	مساوی الساقین اور زائد
Isosceles prism	مساوی الساقین منشور
Similar and Similarly situated	متساویہ اور متشابهہ واقع
Variable	متغیر
Variable density	متغیر کثافت
Convex	محدب
Position	محل
Axial plane	محوری مستوی
Helix	مہربولہ
Helicoid	مہربولہ نما
Metacentre	مکابچہ
Nucleus	مرکزہ
Centroid	مرکزہندسی
Torsion	مڑاؤ
Surfaces of equipressure	مساوی دباؤ کی سطحیں
Plane	مستوی
Momental ellipsoid	معیاری ناقص نما
Concave	مقعر

Modulus

مقیاس

Bodies under constraint

مقید اجسام

Paraboloid

مکافی بنا

Flexible surface

ملائم سطح

Unduloid

موج نما

Ellipsoid

ناقص بنا

Elliptic Integral

ناقصی تکمیل

Elliptic paraboloid

ناقصی مکافی بنا

Synclastic

بد انحنائی

Dew point

نقطہ شبنم

Downward pressure

نیچے وار دباؤ

Medial line

وسطی خط

Trim of a ship

وضع (جہاز کی)

Displaced fluid

ہٹایا ہوا سیال

Isothermal

ہم تپشی

Level

ہموار سطح

Air-tight

ہوا بند



p = pressure

د = دباؤ

p = perpendicular

ع = عمود

$$p = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

ع = $\frac{دباؤ}{فترلا}$

$P \propto p^{1/2}$

ن = نقطہ

$P_{11} =$ Lagrange's nth coefficient

ع = لیجنڈر کا n واں سر

P = power

ط = طاقت

ρ = density

ت = کثافت

ρ = radius of curvature

ن = انحناء کا نصف قطر

σ = density

ت = کثافت

f = acceleration

س = اسراع

f = function

ف = تفاعل

F = force

ق = قوت

k = constant

ک = مستقل

k = radius of

س = گردش کا نصف قطر

K = quarter period

ک = ربعی دور

v = volume

ح = حجم

V = volume

ح = حجم

V = potential fn

ف = قوت تفاعل

W = weight

د = وزن

m = mass

ک = کمیت

$M = \text{mass}$

$M = \text{metacentre}$

$g = \text{acc due to gravity}$

$G = \text{centre of gravity}$

$S = \text{Surface}$

$s = \text{length of an arc}$

$C = \text{constant}$

$C = \text{centre}$

$C' = \text{centroid}$

$C = \text{point}$

$c = \text{capacitv}$

$c = \text{semi-axis}$

$W = \text{weight}$

$r = \text{radius}$

$r = \text{distance}$

$r, \theta, \phi = \text{polar co-ordinates}$

$r, \theta, z = \text{cylindrical co-ordinates}$

$R = \text{resultant}$

$R = \text{reaction}$

$t = \text{temperature}$

$T = \text{tension}$

$T = \text{absolute temperature}$

$t = \text{time}$

$h = \text{height}$

$h = \text{depth}$

ک = کیت

م = مرکز ثقل

ج = اجزاء - اجزاء - اجزاء - اجزاء

ث = مرکز ثقل

س = سطح

م = مرکز ثقل

م = مرکز ثقل

ج = مرکز

ث = مرکز ثقل

ج = نقطہ

ک = گنجائش

ج = نیم محور

ر = شعاع

ر = شعاع

ف = فاصلہ

ر = شعاع

ر = شعاع

ر = شعاع

ر = شعاع

ر = شعاع

ر = شعاع

ر = شعاع

ر = شعاع

ر = شعاع

$H P$ = Horse power

e = eccentricity

I = moment of Inertia

n = normal

x, y, z

λ, γ, Z

a, u, z

u, v, w

F (Elliptic Integral of the first kind)

E (" " second kind)

۱۔ p = ایسی طاقت

z = خروج المركز

مح = جمود کا معیار

c = عماد

λ, μ, γ

λ, μ, γ

λ, μ, γ

u, v, w

F

E

$$\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x}$$

δx

$$\int_{x=x_1}^{x=x_2} y dx$$

Γ Gamma function

ζ - Weierstrass's Zeta function

ω

e

e_1, e_2, e_3

λ, μ, γ

β, γ

δ

$$\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x}$$

δx

$$\int_{x=x_1}^{x=x_2} y dx$$

Γ = گاما فنکشن

ζ = ویئر اسٹراس کا زٹا فنکشن

ω

e

e_1, e_2, e_3

λ, μ, γ

β, γ

δ

ε
ψ
ω
π
Σ
ζ, η, θ
ο
ς

Sn u

en u

dn u

Am u

Colam u

ص
سا
سه
π
Σ
ضا، طا
ط
ه

جن ء

عن ء

طن ء

حط ء

حم ء

ترقیم کی مختلف مجالس میں حسب تفصیل ذیل طریقہ ترقیم منظور ہوا۔

ا	ب	ج	د	ع	ف	گ
A	B	C	D	E	F	G
ح	آ	ث	ک	ل	م	ن
H	I	J	K	L	M	N
ط	پ	ی	ر	س	ت	ع
O	P	Q	R	S	T	U
و	ھ	لا	ما	ے		
V	W	X	Y	Z		

انگریزی کے بڑے (Capital) حروف بالعموم ترجمہ میں بخط عربی لکھے جائینگے اور چھوٹے (Small) حروف بخط فارسی۔ معہذا بڑے حروف کے لئے پیمانہ بھی ترا ہوگا۔

a	b	c	d	e	f	g	h	...
ا	ب	ج	د	ع	ف	گ	ح	...
A	B	C	D	...				
ا	ب	ج	د	...				
A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	...				
ا	ب	ج	د	...				

یونانی حروف

α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	κ	λ	μ
ا	ب	ج	د	ه	ز	ح	ط	ک	ل	م
ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ
ن	ط	ه	پ	ر	س	ت	ث	ف	خ	پس

یونانی بڑے حروف چھوٹے حروف کی طرح لکھے جائیں گے لیکن ان کے آخر میں بجائے ہ کے ل ہوگا، مثلاً عا، با، جا وغیرہ

