

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224666

UNIVERSAL
LIBRARY

سلسلہ شریعت اسلامیہ

صغاری احصاء

جلد اول

تصنیف

ہوریں لمب ایم۔ اے ایل ایل ڈی، ایس سی۔ ڈی، ایف۔ آر۔ ایس

ترجمہ

قاضی محمد حسین ایم۔ اے وکشن چند ایم۔ اے

پروفیسر ان کلمیہ جامعہ عثمانیہ

۱۳۴۷ھ م ۱۳۲۸ھ ف م ۲۹ ۱۹۷۶ء

لاہور: جامعہ عثمانیہ، لاہور

یہ کتاب سرسزیکلن اینڈ کمپنی کی اجازت سے جن کو
حق اشاعت حاصل ہے اردو میں ترجمہ کر کے
طبع و شایع کی گئی ہے

دیباچہ (از مصنف)

اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے دیباچہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس میں احصائے ان حصوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو زیادہ تر اس مضمون کے اطلاقات کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت اس کی ترتیب کچھ غیر معمولی سی تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ سہولت بخش ثابت ہوئی ہے۔

اس ایڈیشن کی مکمل نظر ثانی کی گئی ہے اور اس میں متعدد تبدیلیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ علاوہ معمولی ترمیمات اور ترتیب کی تبدیلیوں کے ایک دو ماقول کا ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

ایک خاص باب قوت نما اور اس سے متعلق تفاعلوں کے لئے وقف کر دیا گیا ہے۔ قوت نما تفاعل کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ مساوات

$$\frac{فر}{لا} = ما$$

کا معیاری حل ہے۔ اس تفاعل کی اہمیت کربانیات میں صرف اسی خاصیت کی وجہ سے ہے اور اس لئے اس کی ابتدا اس خاصیت سے کرنا ہی واجب معلوم ہوتا ہے۔ سلسلہ قوت نما کا کوئی نظریہ جو باضابطہ کہلائے جائیگا کچھ مستحق ہو سکتا ہے بالکل ابتدائی نہیں کہا جاسکتا لیکن یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ طریقہ جس کی یہاں پابندی کی گئی ہے علم احصائے تعلق کے منظر

کسی اور طریقہ سے زیادہ مشکل نہیں اور ہر لحاظ سے قابل ترجیح بھی ہے۔
 لاتینائی سلسلوں کی بحث میں خاص طور پر ان کے تفرق اور عمل کے متعلق کئی تبدیلیاں عمل
 میں لائی گئی ہیں پہلی مشاعتوں میں ان سوالوں پر یکساں اسناد قاق کے نظریہ کی
 مدد سے عام طریق پر بحث کی گئی تھی، احصا کی کتاب میں اسوقت اس نظریہ
 کا داخل کر لینا شاید کچھ بیجا نہ تھا جبکہ کسی انگریزی مقالہ میں اس کا ملنا محال تھا
 لیکن کتاب کے باقی حصہ کے ساتھ موضوع کے لحاظ سے ذرا بے جوڑ ہو گیا
 وجہ سے اب اسکو ترک کر دیا گیا ہے۔ اسکی بجائے وہ بحث داخل کی گئی ہے
 جو صرف قوتی سلسلوں سے متعلق ہے اور زیادہ تر اسی نمونہ کے سلسلوں
 سے طالب علم کو واسطہ پڑے گا جب تک کہ وہ مضمون میں زیادہ اعلیٰ مدارج
 تک ترقی نہ کر جائے۔

کمیت کے مرکوزوں، دو درجی معیاروں، اور اسی قسم کی دیگر چیزوں میں
 اختصار کیا گیا ہے یا انکو ترک کر دیا گیا ہے اور ان کا بیشتر حصہ مصنف
 کی دوسری کتابوں میں منتقل کر دیا گیا ہے فقط
 جون ۱۹۱۹ء

ہورس لییب

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ
	پہلا باب	
	سلسلہ تفسیر منطقی انتہا	۱
۱	توانہ کی علوی یا سفلی انتہا	۲
۳	لا متناہی سلسلوں پر استعمال - مثبت رقموں والے سلسلے	۳
۷	توانہ میں انتہائی قیمت -	۴
۱۰	لا متناہی سلسلوں پر استعمال	۵
۱۵	تفاعل کی عام تعریف	۶
۲۰	تفاعلوں کی ہندسی تعبیر	۷
۲۲	سلسلہ تفاعل کی تعریف	۸
۲۴	سلسلہ تفاعل کی خاصیت	۹
۲۵	سلسلہ تفاعل کی ترکیب	۱۰
۲۷	عدم تسلسل	۱۱
۲۹	سلسلہ تفاعل سے متعلق مسائل	۱۲
۳۱	جبری تفاعل - منطق صحیح تفاعل	۱۳
۳۴	منطق کسری	۱۴

۱۴۲	اعظم اور اقل قیمتیں	۵۱
۱۴۹	جبریت طبریہ	۵۲
۱۵۱	متعدد متغیروں والے تفاعلوں کی اعظم اور اقل قیمتیں	۵۳
۱۵۲	تغزقوں کی ترتیم	۵۴
۱۵۴	چھوٹی تصبیحات کا محسوب کرنا	۵۵
۱۵۶	اوسط قیمت کا مسئلہ - نتائج	۵۶
۱۶۰	متعدد متغیروں والے تفاعل کا پورا تفسیر	۵۷
۱۶۳	چھوٹی تصبیحات میں استعمال	۵۸
۱۶۵	تفاعلوں کے تفاعل کا تغزق اور تصمیعی تفاعلوں کا تغزق	۵۹
۱۶۶	مشق تفاعل کے ہندسی استعمال - کارٹیری محدود	۶۰
۱۶۹	ایک متبدل کی رقوم میں محدود -	۶۱
۱۷۰	منتخنی کے کسی نقطہ پر کے ماس اور عباد کی مساواتیں	۶۲
۱۷۳	قطبی محدود	۶۳
۱۷۷	امثلہ نمبری ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰	
پانچواں باب اعلیٰ رتبہ کے مشتقات		
۱۹۵	تعریف - ترتیم	۶۴
۱۹۸	حاصل ضرب کے متواتر مشتقات - لیب نیز کا مسئلہ	۶۵
۲۰۰	حرکیات کی مثالیں	۶۶
۲۰۲	تقعر اور تحدب - نقاط انعطاف	۶۷
۲۰۵	اقل اور اعظم قیمتوں میں مشق کا استعمال	۶۸
۲۰۶	مساواتوں کے نظریہ میں متواتر مشتقات	۶۹
۲۰۷	رد سے متعلق کی ہندسی تعبیر	۷۰
۲۱۲	اجزائے متناسب کا نظریہ	۷۱
۲۱۴	امثلہ نمبری ۲۱، ۲۲	

پہلا باب

تسلسل

۱۔ سلسل تغیر کے ہر سلسلے میں ہمیں مقداروں کی ایک نہ ایک تعداد سے واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے بعض مستقل ہو سکتی ہیں اور باقی تغیر بھی جاتی ہیں اور (مزید بریں) سلسل تغیر کو قبول کرتی ہیں۔

مثلاً ہندسہ کے سلسلوں میں زیر بحث مقداریں طول، زاوے، رقبے، حجم وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ حرکیات میں یہ مقداریں کمیتیں، اوقات، رفتاریں، قوتیں، وغیرہ ہو سکتی ہیں۔

جبر و مقابلہ کے ذریعہ اس قسم کی کسی مقدار کو ایک حرف سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً $\frac{a}{b}$ یا $\frac{a}{b}$ جس سے وہ نسبت مفہوم ہوتی ہے جو اس مقدار کو اسی قسم کی ایک معیاری یا اکائی مقدار سے ہے۔ یہ نسبت ایک صحیح عدد ہو سکتی ہے یا ایک کسر یا ایک عدد متباہن جس سے مراد یہ ہے کہ ایسے عدد کو کسی ایسی کسر سے تعبیر نہیں کر سکتے جس کا شمار کنندہ و نسب نما دونوں محدود صحیح اعداد ہوں۔ تاہم ایسی تباہن مقدار کے لئے جو حرف استعمال کیا جائے اس پر جبر و مقابلہ کے تمام معمولی قوانین جاری ہو سکتے ہیں۔

مستقل مقدار کسی دے ہوئے عمل میں وہ مقدار ہوتی ہے جو اپنی قیمت

نہیں بدلتی۔ ایسی مقدار جو کسی دے ہوئے عمل کے دوران میں مختلف قیمتیں اختیار کرتی ہے، تغیر کہلاتی ہے۔ حروف ابجدی حروف 'ا'، 'ب'، 'ج'، ... کو ہم عام طور پر مستقل مقادیر کے تعبیر کرنے میں اور آخری حروف 'د'، 'ھ'، 'لا'، 'نا'، 'ی' کو تغیر مقداروں کے تعبیر کرنے میں استعمال کریں گے۔

بعض مقادیر اس قسم کی ہیں کہ وہ علامت کے تغیر کو قبول نہیں کرتیں مثلاً طول، کمیت، کثافت وغیرہ۔ اور بعض مثبت یا منفی دونوں ہو سکتی ہیں مثلاً ارتفاع، گردش، رفتار وغیرہ۔ جب ہمیں دوسری جماعت کی کسی مقدار کی مطلق قیمت سے بلا لحاظ علامت سروکار ہوتا ہے تو تعبیر کرنے والے حرف کو ہم دو چھوٹے انقباضی خطوط کے درمیان بند کر دیتے ہیں مثلاً

|| 'ا' جب لا | 'لوک | لا |

یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر 'ا' اور 'ب' ہم علامت ہوں تو

| 'ا' + 'ب' = | 'ا' | + | 'ب' |


لیکن جب وہ مختلف علامت ہوں تو

| 'ا' + 'ب' > | 'ا' | + | 'ب' |

صفاری احصا کی ابتدا ہندسہ کے مسئلوں سے ہوئی مثلاً مخنیوں کے محاسن کھینچنا، مخنیوں کے طول اور قے معلوم کرنا، ٹھوس اجسام کے حجم و فہرہ دریافت کرنا۔ اس لئے یہ قدرتی بات ہے اور احصا کے اکثر استعمالوں کو پیش نظر رکھ کر ضروری بھی ہے کہ مقدار کے ہندسی تخیل کو بنیاد کے طور پر اختیار کر لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان جملہ عام مفروضات کو بھی مان لیا جائے جو اس تخیل میں واضح یا مضمن طور پر شریک ہوتے ہیں۔

مقادیر کے کسی گروہ کی ہندسی تعبیر اس طرح عامل ہو سکتی ہے۔ ایک الاستناہی خط مستقیم کا 'لا' 'لو' اس میں ایک ثابت مبدا و مقرر کردہ اور زیر بحث

مختلف مقداروں کے متناسب کسی متناسب پیمانہ پر طول و عرض پانچ بے علامت
مقادیر (مثلاً کیتوں) کی صورت میں ان طولوں کو و کے صرف ایک ہی جانب
لینا چاہئے لیکن ایسی صورتوں میں یہاں مقادیر کی علامتیں مختلف ہوں و
کو و کے سیدھے یا بائیں جانب لکھ دینا چاہئے بموجب اس کے کہ تعبیر کھانے والی
مقدار مثبت یا منفی ہو۔ اس طرح ہر قسم کی مقدار زیر بحث کے جواب میں لکھ لا
میں ایک خاص نقطہ ہر لیگا۔



جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مقدار مسلسل تغیر قبول کرتی ہے تو اس سے ہمارا
یہ مطلب ہوتا ہے کہ نقطہ ہر خط لکھ لا میں ایک خاص وسعت (جو دیکھا سکتی
کے اندر کوئی محل اختیار کر سکتا ہے۔
یہ معلوم رہے کہ زیر بحث خاص قسم کی مقداروں کے لحاظ سے ہم نے دو باتوں
کو اصول ہر موعہ کے طور پر بیان کیا ہے یعنی اس قسم کی ہر قسم کی مقدار ہر خط لکھ لا
کے کسی نہ کسی نقطہ سے تعبیر ہوتی ہے اور ہر قسم (اس کے) ایک خاص وسعت
کے اندر خط پر کام ہر نقطہ کسی نہ کسی مقدار کا جواب ہوتا ہے۔ یہ شرطیں مقدار کی ان
تمام قسموں سے پوری ہوتی ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے خواہ وہ ہندسہ سے
متعلق ہوں یا ریاضی طبیعیات سے۔ امتحان کرنے سے یہ معلوم ہو گا کہ یہ تمام
مقداریں لحاظ اپنی تخصیص کے بالمرست یا بالواسطہ خطی مقدار کے تعلق کرتی
ہیں۔ مثلاً قریب ایک متماثل مستطیل کے ارتفاع سے تعبیر ہو سکتا ہے جو ایک
دئے ہوئے (اکائی) قاعدے پر بنایا گیا ہے۔ رفتار اس طول سے تعبیر ہو سکتی
ہے جو اکائی وقت میں طے ہوا اور علیٰ ہذا القیاس۔
۲۔ تو اتر کی غلوئی یا سفلی انتہا۔ انتہا یا انتہائی قیمت، کا تخیل مختلف
صورتوں میں احصا کے تمام حصوں میں رونما ہوتا ہے اور یہ بنیادی اہمیت
رکھتا ہے۔ اس کی ابتدائی صورت سے جس پر اب غور کیا جائیگا طالب علم

نہیں بدلتی۔ ایسی مقدار جو کسی دے ہوئے عمل کے دوران میں مختلف قیمتیں اختیار کرتی ہے، متغیر کہلاتی ہے۔ حروف تہجی کے ابتدائی حروف 'ا'، 'ب'، 'ج'، ... کو ہم عام طور پر مستقل مقادیر کے تعبیر کرنے میں اور آخری حروف 'د'، 'ڈ'، 'ڈھ'، 'ڈھا'، 'ای' کو متغیر مقداروں کے تعبیر کرنے میں استعمال کریں گے۔

بعض مقداریں اس قسم کی ہیں کہ وہ علامت کے تغیر کو قبول نہیں کرتیں مثلاً طول، کمیت، کثافت وغیرہ۔ اور بعض مثبت یا منفی دونوں ہو سکتی ہیں مثلاً ارتفاع، گردش، رفتار وغیرہ۔ جب ہمیں دوسری جماعت کی کسی مقدار کی مطلق قیمت سے بلا لحاظ علامت سروکار ہوتا ہے تو تعبیر کرنے والے حرف کو ہم دو مجموعے انتہائی خطوط کے درمیان بند کر دیتے ہیں مثلاً

|| 'ا' جب لا | 'لوک | لا |

یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر 'ا' اور 'ب' ہم علامت ہوں تو

| 'ا' + 'ب' = | 'ا' | + | 'ب' |


لیکن جب وہ مختلف علامت ہوں تو

| 'ا' + 'ب' > | 'ا' | + | 'ب' |

صفاری احصا کی ابتدا ہندسہ کے مسئلوں سے ہوئی مثلاً مخنیوں کے ماس کیخینپنا، مخنیوں کے طول اور رقبے معلوم کرنا، ٹھوس اجسام کے حجم وغیرہ دریافت کرنا۔ اس لئے یہ قدرتی بات ہے اور احصا کے اکثر استعمالوں کو پیش نظر رکھ کر ضروری بھی ہے کہ مقدار کے ہندسی تخیل کو بنیاد کے طور پر اختیار کر لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان جملہ عام مفروضات کو بھی مان لیا جائے جو اس تخیل میں واضح یا مضمن طور پر شریک ہوتے ہیں۔

مقادیر کے کسی گروہ کی ہندسی تعبیر اس طرح عامل ہو سکتی ہے۔ ایک لائن یا خط مستقیم کا لا لا لو اس میں ایک ثابت مبدا و مقرر کردہ اور زیر بحث

مختلف مقداروں کے متناسب کسی متناسب پیمانہ پر طول و عرض پانچ بے علامت
مقادیر (مثلاً کیتوں) کی صورت میں ان طولوں کو و کے صرف ایک ہی جانب
لینا چاہئے لیکن ایسی صورتوں میں جہاں مقادیر کی طاقتیں مختلف ہوں و
کو و کے سیدھے یا بائیں جانب کھینچنا چاہئے بموجب اس کے کہ تعبیر کچانے والی
مقدار مثبت یا منفی ہو۔ اس طرح ہر قسم کی مقدار زیر بحث کے جواب میں کھلا
میں ایک خاص نقطہ ملے گا۔



جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مقدار مسلسل تغیر قبول کرتی ہے تو اس سے ہمارے
یہ مطلب ہوتا ہے کہ نقطہ ہر خط کھلا میں ایک خاص وسعت (جو دیکھا جاسکتی ہے)
کے اندر کوئی محل اختیار کر سکتا ہے۔
یہ معلوم رہے کہ زیر بحث خاص قسم کی مقداروں کے لحاظ سے ہم نے دو باتوں
کو اصول ہر موضوع کے طور پر بیان کیا ہے یعنی اس قسم کی ہر قسم کی مقدار خط کھلا
کے کسی نہ کسی نقطہ سے تعبیر ہوتی ہے اور ہر قسم کے (ایک خاص وسعت
کے اندر خط پر کا ہر نقطہ کسی نہ کسی مقدار کا جواب ہوتا ہے۔ یہ شرطیں مقدار کی ان
تمام قسموں سے پوری ہوتی ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے خواہ وہ ہندسہ سے
متعلق ہوں یا ریاضی طبیعیات سے۔ امتحان کرنے سے یہ معلوم ہو گا کہ یہ تمام
مقداریں لحاظ اپنی تخصیص کے بالکل است یا بالواسطہ خطی مقدار سے تعلق رکھتی
ہیں۔ مثلاً رقبہ ایک متماثل مستطیل کے ارتفاع سے تعبیر ہو سکتا ہے جو ایک
دئے ہوئے (اکائی) قاعدے پر بنایا گیا ہے۔ رفتار اس طول سے تعبیر ہو سکتی
ہے جو اکائی وقت میں طے ہوا اور علیٰ ہذا القیاس۔
۲۔ تو اتر کی غلوئی یا سفلی انتہا۔ انتہا یا انتہائی قیمت کا تخیل مختلف
صورتوں میں احصاء کے تمام حصوں میں رونما ہوتا ہے اور یہ بنیادی اہمیت
رکھتا ہے۔ اس کی ابتدائی صورت سے جس پر اب غور کیا جائیگا طالب علم

کے ہر نقطہ کے بائیں جانب واقع ہوتا ہے پس کوئی نقطہ ضرور ہونا چاہئے
ایسا کہ ہر کے بائیں جانب کے تمام نقطے اول الذکر جماعت سے متعلق ہوں اور
اس کے دائیں طرف کے نقطے مؤخر الذکر جماعت سے۔ پس اگر ہم $m = 0$ و
رکھیں تو m متذکرہ بالا 'علوی انتہا' کی تعریف کو پورا کرتا ہے۔
اسی طرح اگر مقداروں کا ایک لامتناہی نزولی توانز

$$l_1, l_2, l_3, \dots, l_n \quad (3)$$

ہو یعنی ہر مقدار اپنی پہلی مقدار سے کم ہو اس طور پر کہ فرق

$$l_1 - l_2, l_2 - l_3, \dots, l_{n-1} - l_n$$

تمام مثبت ہوں اور تمام مقادیر کسی محدود مقدار b سے تجاوز نہ ہوں تو ہم
ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک سفلی انتہا m کا وجود ہوگا اس طرح کہ توانز کی ہر مقدار
 m سے بڑی ہوگی حالانکہ توانز کے ارکان کسی مقررہ مقدار سے جو m سے
بڑی ہے آخر الامر کم ہو جائیں گے۔

۴ استدلال بالا صریحاً اس وقت بھی درست رہتا ہے جبکہ توانز کی دو یا دو سے زیادہ
متعلق مقادیر مساوی ہوں۔ اس صورت میں بھی توانزوں کو علی الترتیب صعودی
یا نزولی کہا جاسکتا ہے اگر جبکہ 'نہ گھٹنے والا' یا 'نہ بڑھنے والا' کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔
نوٹ، حال میں انگریزی اصطلاح (Monotonic) وضع ہوئی ہے جس میں دونوں طرح کے
توانز شامل ہوتے ہیں ان توانزوں کو 'یک رنگ' کہا جاسکتا ہے۔
مثال ۱۔ توانز

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{1+n} \quad (4)$$

صعودی ہے اور اس کی علوی انتہا ۱ ہے۔ کیونکہ

$$\frac{n}{1+n} - 1 = \frac{1}{1+n}$$

$$(۸) \dots\dots\dots \frac{1}{1+\lambda_n} + 1 > \frac{1+\lambda_n}{1+\lambda_n} > \frac{1+\lambda_n}{1+\lambda_n} = \frac{\lambda_n}{1+\lambda_n}$$

اور چونکہ $\frac{\lambda_n}{1+\lambda_n} < 1$ اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ n کی تمام قیمتوں کے لئے $\frac{\lambda_n}{1+\lambda_n} > 0$ اس لئے توانر کی ایک علوی انتہا ہے۔ اس کو m سے تعبیر کریں تو (۶) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ m مساوات

$$(۹) \dots\dots\dots 1 + \lambda = \lambda^2$$

کی مثبت اصل ہے۔

(۶) سے علی طور پر محسوب کرنے سے سلسلہ کے پہلے چند ارکان چار ہندسوں تک

$$1, 1.5718, 1.5712, 1.5598, 1.5552, 1.5512, 1$$

حاصل ہوتے ہیں۔ آخر میں لکھا ہوا عدد مطلوبہ تقرب کے درجہ تک m کی صحیح قیمت ہے۔

$$(۱۰) \dots\dots\dots \lambda^2 = 1 + \lambda = \lambda^2$$

کی ترسیمات سے اس سوال کو ترسیمی طور پر تعبیر کیا جاسکتا ہے

شکل سے ظاہر ہے کہ (۶) سے حاصل شدہ λ_n کی متواتر

قیمتیں کس طرح نقطہ تقاطع پر λ کی قیمت کی طرف

مستند ہوتی ہیں۔ ترسیم کا صرف ایک حصہ دکھایا گیا ہے۔

صریحاً ہم اسی نتیجہ پہنچیں گے اگر λ کے بجائے λ کی کسی


مثبت قیمت سے ہم ابتداء کریں۔ اگر λ (۹) کی مثبت

اصل سے بڑا ہو تو صرف اس صورت میں توانر نزولی ہوگا

طریقہ بالا کا استعمال مساواتوں کے عددی حل دریافت

کرنے میں بہت وسیع ہے خواہ مساواتیں جبری ہوں یا اولیائی۔

۳۔ لامتناہی سلسلوں پر استعمال مثبت رقموں والے سلسلے



مذکورہ بالا مسئلہ احصا کا بنیادی مسئلہ کہلاتا ہے۔ لامتناہی سلسلوں کے نظریہ سے جنگی تمام زمیں ہم علامت ہوں اسکی اچھی توضیح ہوتی ہے۔ درحقیقت لامتناہی سلسلے کی ارقام کا مجموعہ بے معنی چیز ہے کیونکہ جن اعمال پر مشتمل ہے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک خاص شرط کے تحت ایک مخصوص مقدار کی تعریف ایک سلسلے سے ہو سکتی ہے۔

سلسلہ

(۱) $۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + \dots + n + \dots$ پر غور کرو جس کی تمام ارقام مثبت ہیں اور فرض کرو کہ

(۲) $۱ = ۱$ ، $۲ = ۱ + ۱$ ، $۳ = ۱ + ۱ + ۱$ ، $۴ = ۱ + ۱ + ۱ + ۱$ ، $۵ = ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱$ ، $\dots$ ، $n = ۱ + ۱ + ۱ + \dots + ۱$ ، $\dots$ ان مقداروں کو ہم ”جزوی مجموعے“ کہیں گے۔ اگر تو اتر

(۳) $۱ = ۱$ ، $۲ = ۱ + ۱$ ، $۳ = ۱ + ۱ + ۱$ ، $۴ = ۱ + ۱ + ۱ + ۱$ ، $۵ = ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱$ ، $\dots$ ، $n = ۱ + ۱ + ۱ + \dots + ۱$ ، $\dots$ کی علوی انتہا n ہو تو سلسلہ (۱) کو ”مستحق“ کہتے ہیں۔ اور مقدار n کو عام طور پر اس سلسلہ کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ پھر اگر (۱) مثبت ارقام کا ایک ایسا سلسلہ ہو جس کا مستحق ہونا معلوم ہے اور اگر

(۴) $۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + \dots + n + \dots$ مثبت ارقام کا ایک دوسرا سلسلہ ہو جس کی ارقام سلسلہ (۱) کی متناظر ارقام سے چھوٹی ہیں یعنی $n > ۱$ کی تمام قیمتوں کے لئے تو (۴) بھی مستحق ہوگا۔ کیونکہ اگر n ، (۴) کی پہلی n رقموں کا مجموعہ ہو تو $n > ۱$ اور بموجب فرض چونکہ مقادیر n کی علوی انتہا ہے اس لئے مقادیر n کی بھی ایک علوی انتہا ہوگی۔

سب سے پہلے یہ واضح ہے کہ اگر تواتر (۱) کی انتہا ہے تو n کی ایک قیمت ہمیشہ معلوم کیا جاسکتی ہے اس طرح کہ سلسلہ کے ارکان جو Δ_n کے بعد آتے ہیں یعنی

$$\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots, \Delta_n, \dots$$

سے اس قدر فرق

رکتے ہیں جو صہ سے متجاوز نہیں ہوتا جہاں صہ کوئی اختیاری مقدار ہے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہو۔ برعکس اس کے اگر یہ شرط پوری ہو تو سلسلہ کی ایک معین انتہا ہوتی ہے۔

اس کو ثابت کرنے کے لئے پہلے ہم ایک ایسا نزولی تواتر بناتے ہیں جو مثبت مقادیر صہ، صہ، صہ، ... پر مشتمل ہے اور جس کی انتہا صفر ہے۔ اس قسم کا تواتر بنایا جاسکتا ہے مثلاً ہر رکن کو اپنے پہلے رکن کا نصف لینے سے۔ یہ وجہ فرض ایک عدد n معلوم کیا جاسکتا ہے ایسا کہ سلسلہ کے تمام ارکان جو Δ_n کے بعد آتے ہیں قیمتوں

$$صہ = \Delta_n - صہ \text{ اور } صہ = \Delta_n + صہ$$

کے درمیان واقع ہوتے ہیں اسی طرح ایک عدد m ($m < n$) معلوم کیا جاسکتا ہے ایسا کہ تمام ارکان جو Δ_m کے بعد آتے ہیں $صہ = \Delta_m - صہ$ اور

$$صہ = \Delta_m + صہ \text{ کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ پس } \Delta_m \text{ کے بعد آنیوالے}$$

تمام ارکان ایک خاص وقفہ میں واقع ہوتے ہیں جس کی وسعت (فرض کرو) $صہ$ سے $صہ$ تک ہے اور یہ $صہ$ سے $صہ$ والے وقفہ کے اندر شامل ہے اور اس طرح کا ہے کہ

$$صہ - صہ > ۲ صہ$$

اور علیٰ ہذا القیاس۔ مقادیر $صہ$ ، $صہ$ ، $صہ$ ، ... ایک صعودی تواتر بناتی ہیں اور چونکہ وہ تمام $صہ$ سے کم ہیں اس لئے ان کی ایک علوی انتہا (فرض کرو)

نفل میں ترسیم کا ضروری حصہ دکھایا گیا ہے۔

اس مثال میں اور دفعہ (۲) کی مثال (۳) میں تقرب کے ایسے طریقہ کی ہم نے سادہ مثالیں دی ہیں جو دو شخصوں کے تقاطع سے متعلق ہیں۔ یہ طریقہ اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔ استدقاق بطی ہوگا اگر شخصوں کے میلان محور لا کے ساتھ (ایک ہی یا مخالف سمتوں میں) تقریباً وہی ہوں۔

۵۔ لاستناہی سلسلوں میں استعمال۔

اگر لاستناہی سلسلہ

$$ع_۱ + ع_۲ + \dots + ع_n \dots (۱)$$

میں جسکی ارقام کا ہم علامت ہونا مشروط نہیں ہے ہم

$$س_۱ = ع_۱، س_۲ = ع_۱ + ع_۲، \dots، س_n = ع_۱ + ع_۲ + \dots + ع_n$$

(۲)

لکھیں اور اگر تو اتر

$$س_۱، س_۲، س_۳، \dots، س_n \dots (۳)$$

کی انتہائی قیمت $س_n$ ہو تو سلسلہ کو 'ستدق' کہا جاتا ہے اور $س_n$ کو اس کا مجموعہ کہتے ہیں۔

دفعہ (۲) سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ (۱) کے استدقاق کے لئے ضروری اور کافی شرط یہ ہے کہ ایک عدد n کا معلوم کرنا ممکن ہو اس طرح کہ جزوی

$$\text{مجموعہ } س_n، س_{n+1}، \dots، س_{n+p} \dots \text{تمام } س_n$$

سے استقدرقز رکھیں جو حصہ سے کم ہو جہاں حصہ کوئی اختیار می متقدرا ہے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہو۔

موجودہ بحث سے متعلق ایک اہم سلسلہ یہ ہے کہ اگر سلسلہ

اگر ایک سلسلہ کی ارقام باری باری سے مثبت اور منفی ہوں اور ملحوظ مطلق قیمت کے مسلسل گھٹتی جائیں اور معینہ آخر کار صرف انتہا کی طرف مائل ہوں تو سلسلہ مستحق ہوتا ہے اور اس کا مجموعہ ارقام کی کسی محدود طاق تعداد کے مجموعے اور کسی محدود جفت تعداد کے مجموعے کے درمیان واقع ہوتا ہے جبکہ ہر صورت میں ارقام کی تعداد ابتدا سے شمار کی جائے۔

طالب علم اس کے ثبوت سے واقف ہو گا لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ کے استدلال کی ایک عمدہ مثال ہے اسکو یہاں دہرایا جاتا ہے۔
فرض کرو کہ سلسلہ


$$(4) \dots + \mu_2 \omega - \mu_1 \omega + \mu_1 \omega - \mu_0 \omega$$

ہے جس میں بموجب فرض

$$\dots \dots \dots < \mu_0 < \mu_1 < \mu_2$$

منشکل میں فرق کرو کہ

$$\dots \mu_0 = \mu_1 \mu_2 \mu_3 = \mu_2 \mu_1 \mu_3 = \mu_3 \mu_1 \mu_2 = \mu_3 \mu_2 \mu_1 = \mu_1 \mu_3 \mu_2 = \mu_2 \mu_3 \mu_1 = \mu_3 \mu_1 \mu_2 = \mu_1 \mu_2 \mu_3$$



شکری (۵)

یہ ظاہر ہے کہ نقاط 'م'، 'م'، 'م' ایک نزولی توازن بناتے ہیں اور نقاط 'م'، 'م'، 'م' ایک صعودی توازن۔ نیز پہلے سلسلہ کا ہر نقطہ دوسرے سلسلہ کے ہر نقطہ کے دائیں جانب ہے پس ہر توازن کا ایک انتہائی نقطہ موجود ہوتا ہے اور چونکہ

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

اور اس لئے آخر کار کسی اختیاری مقدار سے کم ہے۔ یہ دونوں انتہائی نقطے آخر کار ایک نقطہ (مفروض کرد) پر منطبق ہونے چاہئیں۔ تب وہ درجہ ہوئے سلسلہ (۶) کے مجموعہ کو تعبیر کرتا ہے۔

مثال - سلسلہ

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

۱ اور ۱- کے درمیان ایک انتہائی طرف مستغرق ہوتا ہے۔
یہ سلسلہ اتفاقاً مستغرق جماعت سے متعلق ہے۔ آئندہ یہ بتلایا جائیگا (صفحہ ۱۰۵)

کہ سلسلہ

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

ن کو کافی بڑھانے سے اس قدر بڑا بنایا جاسکتا ہے جس قدر ہم چاہیں۔
یہ اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ لامتناہی سلسلوں سے متعلق جو لفظ مجموعہ ہم نے استعمال کیا ہے وہ بالکل وضعی حیثیت رکھتا ہے اور یہ کہ ہم اس معاملہ میں آزاد نہیں ہیں کہ بغیر جانچ کے اس طرح کے سلسلہ کو اس طور پر استعمال کریں جیسے ایک جملہ کو استعمال کیا جاتا ہے جو ارقام کی محدود تعداد پر مشتمل ہو۔
مثلاً ہمیں یہ نہیں مان لینا چاہئے کہ رقموں کی ترتیب کو بدل دینے سے مجموعہ نہیں بدلتا۔ مطلقاً مستغرق سلسلہ کی صورت میں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ مفروض جائز ہے لیکن اتفاقاً مستغرق سلسلہ میں ارقام کی ترتیب کو بدلکر ان کو کسی دوسری مناسب ترتیب میں رکھنے سے سلسلہ کو ہمیں انتہائی طرف مستغرق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔
ان سلسلوں کے ثبوت جبر و مقابلہ کی کتابوں میں مل سکتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔
بہر کیف حسب ذیل سادہ مسائل کا اکثر حوالہ دیا جائیگا۔

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{4n} + \dots + \frac{1}{6n} + \dots + \frac{1}{8n} + \dots + \frac{1}{10n} + \dots + \frac{1}{12n} + \dots + \frac{1}{14n} + \dots + \frac{1}{16n} + \dots + \frac{1}{18n} + \dots + \frac{1}{20n} + \dots + \frac{1}{22n} + \dots + \frac{1}{24n} + \dots + \frac{1}{26n} + \dots + \frac{1}{28n} + \dots + \frac{1}{30n} + \dots + \frac{1}{32n} + \dots + \frac{1}{34n} + \dots + \frac{1}{36n} + \dots + \frac{1}{38n} + \dots + \frac{1}{40n} + \dots + \frac{1}{42n} + \dots + \frac{1}{44n} + \dots + \frac{1}{46n} + \dots + \frac{1}{48n} + \dots + \frac{1}{50n} + \dots + \frac{1}{52n} + \dots + \frac{1}{54n} + \dots + \frac{1}{56n} + \dots + \frac{1}{58n} + \dots + \frac{1}{60n} + \dots + \frac{1}{62n} + \dots + \frac{1}{64n} + \dots + \frac{1}{66n} + \dots + \frac{1}{68n} + \dots + \frac{1}{70n} + \dots + \frac{1}{72n} + \dots + \frac{1}{74n} + \dots + \frac{1}{76n} + \dots + \frac{1}{78n} + \dots + \frac{1}{80n} + \dots + \frac{1}{82n} + \dots + \frac{1}{84n} + \dots + \frac{1}{86n} + \dots + \frac{1}{88n} + \dots + \frac{1}{90n} + \dots + \frac{1}{92n} + \dots + \frac{1}{94n} + \dots + \frac{1}{96n} + \dots + \frac{1}{98n} + \dots + \frac{1}{100n} + \dots$$

ایک مستغرق سلسلہ ہو جس کا مجموعہ ۱ ہے تو سلسلہ

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{4n} + \dots + \frac{1}{6n} + \dots + \frac{1}{8n} + \dots + \frac{1}{10n} + \dots + \frac{1}{12n} + \dots + \frac{1}{14n} + \dots + \frac{1}{16n} + \dots + \frac{1}{18n} + \dots + \frac{1}{20n} + \dots + \frac{1}{22n} + \dots + \frac{1}{24n} + \dots + \frac{1}{26n} + \dots + \frac{1}{28n} + \dots + \frac{1}{30n} + \dots + \frac{1}{32n} + \dots + \frac{1}{34n} + \dots + \frac{1}{36n} + \dots + \frac{1}{38n} + \dots + \frac{1}{40n} + \dots + \frac{1}{42n} + \dots + \frac{1}{44n} + \dots + \frac{1}{46n} + \dots + \frac{1}{48n} + \dots + \frac{1}{50n} + \dots + \frac{1}{52n} + \dots + \frac{1}{54n} + \dots + \frac{1}{56n} + \dots + \frac{1}{58n} + \dots + \frac{1}{60n} + \dots + \frac{1}{62n} + \dots + \frac{1}{64n} + \dots + \frac{1}{66n} + \dots + \frac{1}{68n} + \dots + \frac{1}{70n} + \dots + \frac{1}{72n} + \dots + \frac{1}{74n} + \dots + \frac{1}{76n} + \dots + \frac{1}{78n} + \dots + \frac{1}{80n} + \dots + \frac{1}{82n} + \dots + \frac{1}{84n} + \dots + \frac{1}{86n} + \dots + \frac{1}{88n} + \dots + \frac{1}{90n} + \dots + \frac{1}{92n} + \dots + \frac{1}{94n} + \dots + \frac{1}{96n} + \dots + \frac{1}{98n} + \dots + \frac{1}{100n} + \dots$$

جو (۱) کی ارقام کو جزو ضربی ۱ سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے

مجموعہ (س) کی طرف مستحق ہوگا۔ اس کا ثبوت ظاہر ہے۔

۲۔ اگر $س_۱ + س_۲ + \dots + س_n + \dots$ - (۹)

اور $س'_۱ + س'_۲ + \dots + س'_n + \dots$ - (۱۰)

مستحق سلسلے ہوں جن کے مجموعے علی الترتیب (س) اور (س') ہیں تو سلسلہ

$(س_۱ \pm س'_۱) + (س_۲ \pm س'_۲) + \dots + (س_n \pm س'_n) + \dots$ - (۱۱)

جو (۹) اور (۱۰) کی متناظر ارقام کے مجموعوں یا فرقوں پر مشتمل ہے مجموعہ

(س) $\pm$ (س') کی طرف مستحق ہوگا کیونکہ اگر (س) ، (س') علی الترتیب

(۹) اور (۱۰) کی پہلی n رقموں کے مجموعے ہوں تو (۱۱) کی پہلی n رقموں کا

مجموعہ (س) $\pm$ (س') ہوگا۔ اب

$(س_۱ \pm س'_۱) - (س_۲ \pm س'_۲) = (س_۱ - س_۲) \pm (س'_۱ - س'_۲)$ - (۱۲)

.....

بوجب فرض اگر صہ کوئی اختیاری مقدار کتنی ہی چھوٹی ہو ہم n کی ایک قیمت معلوم کر سکتے ہیں ایسی کہ اس قیمت اور اس سے اعلیٰ قیمتوں کیلئے

$|س_۱ - س_۲| > \frac{1}{n}$ صہ اور $|س'_۱ - س'_۲| > \frac{1}{n}$ صہ

..... (۱۳)

اور اسلئے $|س_۱ \pm س'_۱ - (س_۲ \pm س'_۲)| > \frac{1}{n}$ - (۱۴)

جو اس بات کی شرط ہے کہ (س) $\pm$ (س') کی انتہائی قیمت (س) $\pm$ (س') ہو جائے۔

۳۔ اسی مفروضہ سے سلسلہ

$(س_۱ + س'_۱) + (س_۲ + س'_۲) + \dots + (س_n + س'_n) + \dots$ - (۱۵)

مجموعہ $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ کی طرف مستحق ہوگا۔ پچھلے دو سٹلوں سے یہ فوراً اخذ ہو سکتا ہے۔

۶۔ تفاعل کی عام تعریف۔

ایک متغیر مقدار کو دوسری متغیر مقدار کا 'تفاعل' کہتے ہیں جبکہ دوسری چیزیں وہی برقرار رہیں اور موخر الذکر متغیر کی قیمت مقرر کر دی جائے تو اول الذکر متغیر کی قیمت معین ہو جائے۔

اس قسم کا ربط رکھنے والی دو مقداروں میں اس طرح تیسرہ کچا جاتی ہے کہ ان کو علی الترتیب 'تابع متغیر' اور 'متغیر متبوع' کہتے ہیں۔

ایک متغیر مقدار کے تفاعل کا تصور ریاضیات کی مختلف شاخوں میں رونما ہوتا ہے۔ مثلاً علم الحساب میں ن اشیا کی ترتیبوں کی تعداد ن کا ایک تفاعل ہے۔ گولیوں کے ایک شلشی یا ایک مربع انبار میں گولیوں کی تعداد گولیوں کی اس تعداد کا تفاعل ہے جو قاعدے کے ہر ضلع میں ہوتی ہیں۔ کسی دے ہوئے سلسلہ کی پہلی ن رقموں کا مجموعہ (س) عدد ن کا تفاعل ہے۔ علی ہذا القیاس۔ اس قسم کی بعض صورتوں میں زبردست تفاعلوں کے لئے ریاضی کے خاص خاص ضابطے ہوتے ہیں لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ تفاعل کے منشاء میں ان کا وجود ضروری نہیں ہے۔ مثلاً سلسلہ

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

کی پہلی ن رقموں کا مجموعہ ن کا ایک خاص تفاعل ہے اگرچہ اس مجموعہ کو خاتہرہ نیکے لئے ریاضی میں کوئی ٹھیک جملہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اعداد مغر کی تعداد جو ایک دے ہوئے صحیح عدد ن سے تجاوز نہیں کرتے ن کا ایک خاص تفاعل ہے اگرچہ اس کو ایک ضابطہ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

ان مثالوں میں متغیر متبوع لمخاط ابھی نوعیت کے صرف محدود طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ صغاری احصا میں خصوصاً ایسی صورتوں پر بحث ہوتی ہے جن میں متغیر متبوع و فوراً

معنوں میں سلسل ہو۔ مثلاً ہندسہ میں ایک دائرہ کا رقبہ یا ایک کرہ کا حجم نصف قطر کا ایک تفاعل ہوتا ہے نظری طبیعیات میں ایک گرنے والے ذرہ کا ارتفاع یا رفتار وقت کا ایک تفاعل بھی جاتی ہے۔ ایک دوسرے تفاعل کے اتہنا کا دوسرے کا ایک تفاعل دے ہوئے تپش پر ایک دی ہوئی گیس کا باؤٹکنٹ کا ایک تفاعل سیر شدہ بھاپ کا باؤتیش کا ایک تفاعل وغیرہ تصور ہوتے ہیں یہاں پر بھی تفاعل کے لئے ریاضی کے ایک جملہ کا وجود یا غیر وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دو متغیروں کے درمیان تفاعلی ربط قائم کرنے کے لئے صرف یہ ضروری ہے کہ ایک کی قیمت سے دوسرے کی قیمت کا تعین ہو جائے بشرطیکہ دوسری چیزیں غیر متغیر رہیں۔

عام طور پر ہم متغیر متبوع کو (لا) سے اور تابع متغیر کو (ما) سے تعبیر کریں گے۔ ان دونوں کے درمیان جو ربط ہوتا ہے اسکو اکثر

ما = ف (لا) یا ما = ف (لا) وغیرہ سے ظاہر کیا جائیگا۔ مرف (لا) (x) [ف] سے مراد 'لا' کا کوئی خاص تفاعل ہے۔

جب ایک مقدار ایک قیمت سے دوسری قیمت اختیار کرتی ہے تو یہ نئی قیمت پہلی قیمت سے جس قدر بڑی ہوتی ہے اسکو اس مقدار کا 'اضافہ' کہتے ہیں خواہ یہ مثبت ہو یا منفی۔ اس اضافہ کو ہم اس طرح ظاہر کریں گے کہ متغیر مقدار کے پہلے 'فف' جو متحد و دو فرق کا اختصار خیال کیا جاسکتا ہے لکھ دیا جائیگا، اگر تری میں اس علامت کے لئے 'ک' یا 'Δ' ہے [فف = Δ]۔

مثلاً ہم کہتے ہیں کہ متغیر متبوع 'لا' سے بدل کر 'لا + فف' ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے تابع متغیر 'ما' سے بدل کر 'ما + فف' ہو جاتا ہے۔

پس اگر ما = ف (لا) (۱)

تو ما + فف = ف (لا + فف) (۲)

اس لئے فف = ما = ف (لا + فف) - ف (لا) (۳)

فی الحال اس ترتیب میں یہ مفہوم داخل نہیں ہے کہ فف 'لا' یا فف 'ما' چھوٹا ہے۔ ربط (۲) پورا ہونے پر اضافوں کی کوئی قیمتیں ہو سکتی ہیں۔

مثال (۱)۔ اگر $ما = لا^3$ تو جب $لا = ۱۰۰$ ، صف $لا = ۱$ تو

$$\text{صف } ما = (۱۰۰)^3 = ۱۰۰۰۰۰۰$$


مثال (۲)۔ اگر $ما = جب لا^3$ تو اگر $لا = ۶۰$ ، صف $لا = ۱$ تو

$$\text{صف } ما = ۶۰^3 = ۲۱۶۰۰۰$$

ایک خاص درجہ صحت تک۔

۷۔ تفاعلوں کی ہندسی تعبیر۔

متغیروں $لا$ ، $ما$ کے درمیان جو ربط ہے اب ہم اسکی ہندسی تعبیر علی القوائم محاور $ولا$ و $وما$ لیکر معلوم کرتے ہیں۔ $ولا$ میں طول و $وما$ اس طرح کہ وہ متغیر متغیر $لا$ کی کسی خاص قیمت کو تعبیر کرے اور $وما$ میں $ول$ جو تفاعل $ما$ کی متناظر قیمت کو تعبیر کرے اور مستطیل و $من$ ل کی تکمیل کر دے تو نقطہ $ن$ کا مقام



شکل (۶)

دونوں مربوط متغیروں کی قیمتوں کو ظاہر کریگا۔

اب چونکہ نقطہ $ن$ بموجب فرض $ولا$ پر کوئی مقام اختیار کر سکتا ہے جو (مکمل ہے کہ) دو ثابت سروں کے درمیان ہو ہمیں اس طرح نقاط $ن$ کا ایک لامتناہی گروہ حاصل ہوتا ہے۔

اس گروہ کی نوعیت سے متعلق اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس

گروہ کے نقاط ایک منحنی پر واقع ہوتے ہیں ۹۔ اکثر صورتوں میں اسکا جواب ظاہر ہے۔ مثلاً ایک دائرہ کے رقبہ اور اس کے نصف قطر کے درمیان جو ربط ہوتا ہے اسکی اگر ہندی تعبیر معلوم کرنا ہو تو ہم ω و ω کو نصف قطر کے متناسب اور n ہر کو رقبہ کے متناسب لیتے ہیں۔ اس طرح n ہر ω و ω اور نقاط n ایک نکافی پر واقع ہوتے ہیں یہی منحنی اس ربط کو بھی تعبیر کریگا جو ایک گرنے والے جسم کے طے شدہ فاصلہ (ف) اور وقت (ت) کے درمیان ہے کیونکہ ف ایسے بدلنا ہے جیسے ت۔

لیکن عام صورت میں ہمارا جواب نفی میں ہونا چاہئے۔ دفعہ (۶) کی ابتدا میں تفاعل کی جو تعریف کی گئی ہے اس کا ضروری مفہوم یہ ہے کہ لا کی ہر قیمت کے جواب میں ω کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے لیکن لا کی مختلف قیمتوں کے جواب میں ω کی قیمتیں ہیں ان میں کسی ربط کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے خواہ لا کی یہ مختلف قیمتیں ایک دوسرے سے کتنے ہی قریب واقع ہوں۔

تفاعل کی جس تعریف کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حقیقت ہمارے موجودہ مقایسہ کا لحاظ کرتے ہوئے بہت زیادہ وسیع ہے۔ عام طور پر احصا میں ایسے تفاعلوں سے سابقہ پڑے گا جو چند خاص اہم قیود کی پابندی کرتے ہیں۔

ان میں سے پہلی قید یہ ہے جو شامل کے نام سے موسوم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نقطہ ہر خط ω لا کے کسی محدود حصہ (اب) پر چلتا ہے، ω بھی خط ω کے ایک محدود حصہ ω پر چلتا ہے یعنی ω کے کم سے کم ایک مرتبہ ω اور ω کے درمیان ہر مقام کو اختیار کرتا ہے مزید بریں اگر وسعت ω کو مسلسل گھٹا دیا جائے تو وسعت ω بھی گھٹتی ہے اور ω کو کافی چھوٹا لینے سے اس قدر چھوٹی بنائی جاسکتی ہے جسقدر ہم چاہیں۔

ابھی تک یہ دیکھنے کے دفعہ (۸) کہ اس دوسری خاصیت میں ω کی خاصیت شامل ہے۔ اب ہم مسلسل تفاعل کی باضابطہ تعریف دینگے جو اگرچہ

تفاعل ہو تو ایک مقدار صمدہ کا معلوم کرنا ممکن ہونا چاہئے اس طرح کہ

ا ف (لا = ہ) - ف (لا) | > ش


ہ کی تمام جائز قیمتوں کے لئے اس طرح کہ ا ہ | > صہ ، صہ کی قیمت عام طور پر ش کی قیمت پر منحصر ہوتی ہے لیکن اس تعریف میں یہ مفہوم مضمر ہے کہ صہ کی کسی خاص قیمت سے شرط بالا ہمیشہ پوری ہو سکتی ہے خواہ ش کتنا ہی چھوٹا ہو۔

۹۔ مسلل تفاعل کی خاصیت۔

اگر ف (لا) ایک تفاعل ہو جو لا = ا سے لا = ب تک مسلسل ہے اور اگر ف (ا) ، ف (ب) مختلف العلاست ہوں تو ا اور ب کے درمیان لا کی کم سے کم ایک قیمت ضرور ہوگی جس کے لئے ف (لا) = ۰۔

شکل ذیل میں صراحت کی خاطر یہ مان لیا گیا ہے کہ ف (ا) مثبت اور ف (ب) منفی ہے۔ خط لا لا کے وہ نقطے جہاں لا = ا ، لا = ب علی الترتیب ا ب سے تعبیر کئے گئے ہیں اور تفاعل کی تناظر قیمتیں ا ہ ، ب ک سے تعبیر ہوتی ہیں۔ ثبوت اس بات پر مشتمل ہے کہ طول میں گھسنے والے دونوں کا سلسلہ

ا ب ، $\frac{1}{2}$ ا ب ، $\frac{1}{3}$ ا ب ، ، $\frac{1}{n}$ ا ب ، ، ا ب ، ،



معلوم ہو سکتا ہے اس طور پر کہ ہر وقفہ اپنے سے پہلے وقفہ کا ایک حصہ ہو اور ہر ایک ایسے نقاط پر مشتمل ہو جن پر ف (لا) مثبت اور نیز ایسے نقاط پر جن پر ف (لا) منفی ہوتا ہو۔

فرض کرو کہ (ب) کی تصنیف مہ پر ہوتی ہے۔ اگر مہ پر ف (لا) =
تو اس خاص صورت کے لئے مسئلہ بالادست ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہم اس کو
اور اسکی مماثل صورتوں کو اپنے ثبوت سے خارج کر دیتے ہیں۔ اگر ف (لا)
نقطہ مہ پر صفر نہیں ہوتا تو (ا) مہ پر ب وقفوں میں سے کم سے کم ایک
وقفہ میں تغافل کی قیمتیں مثبت اور منفی دونو ہوں گی۔ اگر صرف ایک وقفہ میں
یہ بات پائی جائے تو ہم اس کو منتخب کر لیتے ہیں اور اگر دونوں تو انتخاب اختیاری
ہے۔ منتخب شدہ وقفہ کو پھر مہ پر تصنیف کیا جاتا ہے۔ اس صورت کو خارج
کر کے جہاں مہ پر ف (لا) صفر ہو جاتا ہے ان دونوں حصوں میں کم سے کم
ایک حصہ ایسا ضرور ہو گا جس میں تغافل کی قیمتیں مثبت اور منفی دونو ہوں گی۔
اس عمل کو لا متناہی طور پر جاری رکھا جاسکتا ہے اور چونکہ

$$\text{ب) } \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

علامت تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صفر قیمت میں سے نہ گزرے۔
 اگر ف (لا) ایک تفاعل ہو جو لا = ۱ سے لا = ۲ تک سلسل ہے
 اور اگر ف (۱) ف (ب) غیر مساوی ہوں تو ۱ اور ۲ کے درمیان لا کی
 ایک قیمت موجود ہونی چاہئے ایسی کہ ف (لا) = ۲ جہاں ۱ ف (۱)
 اور ف (ب) کے درمیان کوئی مقدار ہو سکتی ہے۔ کیونکہ فرض کرو
 ف (لا) = ۲ ف (لا) = ۲

چونکہ ۲ مستقل ہے ف (لا) بھی ایک سلسل تفاعل ہوگا۔ بموجب فرض
 ف (۱) = ۲ اور ف (ب) = ۲

مختلف العلامت ہیں اور اس لئے ف (۱) اور ف (ب) مختلف العلامت
 پس مسئلہ بالاسے ۱ اور ۲ کے درمیان لا کی ایک قیمت موجود ہونی
 چاہئے جس کے لئے ف (لا) = ۲ یعنی ف (لا) = ۲
 الفاظ دیگر ایک سلسل تفاعل ایک قیمت سے دوسری قیمت تک جان نہیں سکتا
 جب تک کہ ہر درمیانی قیمت کو (کم سے کم) ایک مرتبہ اختیار نہ کرے۔

۱۰۔ سلسل تفاعل کی ترکیب

جو کچھ کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نقاط کا گردہ
 جو ایک تفاعل کو دفعہ (۱۲) کے معنوں میں تعبیر کرتا ہے ایک مثلث گردہ پیدا کرتا
 ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس گردہ میں سے کوئی ایسا خط نہیں کھینچا جاسکتا
 جو اس کے کسی نہ کسی ایک نقطہ میں سے نہ گزرے۔ کیونکہ اگر تفاعل کو ف (لا)
 سے اور کسی خط کے معین کو ف (لا) سے تعبیر کریں اور اگر ف (لا) اور ف (لا)
 دونوں سلسل ہوں تو فرق

ف (لا) - ف (لا)
 بھی سلسل ہوگا (دفعہ ۱۲) اور اس لئے یہ علامت بدل نہیں سکتا جب تک کہ صفر
 قیمت میں سے نہ گزرے۔
 اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نقاط کے ایک مثلث گردہ کا ایک منحنی پر

واقع ہونا فرض کر سکتے ہیں۔ اسکا جواب زیادہ تر اس پر منحصر ہے کہ اصطلاح ”مخفی“ کے ساتھ کیا خاصیتیں لازم قرار دی جاتی ہیں۔ بہر کیف یہ تو ظاہر ہے کہ گروہ سے متعلق کافی نقاط معلوم کر کے ان کو عملی طور پر ایک کاغذ پر ترسیم کر کے اور ان میں سے گزرتا ہوا ایک مسلسل خط کھینچنے سے ہم ایک مسلسل تفاعل کے عام طریق یا چال کو اچھی طرح ظاہر کر سکتے ہیں۔ جو شکل اس طرح بنائی جاتی ہے اس کو تفاعل کی ”ترسیم“ کہتے ہیں۔

ذیل کے تفاعلوں کی ترسیمات سے طالب علم بخوبی واقف ہوگا یہ سادہ اور دودرجی مساواتوں کے نظریہ کی توضیح کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔

$$A + B = A + B + C$$

اس کتاب میں ترسیمی طریقہ توضیح کی خاطر اکثر استعمال کیا جائیگا (جیسا دوسری ابتدائی کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے) لیکن یہ بنیادین ضروری ہے کہ تفاعل ریاضی پر اس کو استعمال کرنے میں خاص خاص قیود کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ظاہر ہے کہ جدا جدا قیمتوں کی ایک محدود تعداد تفاعل کو پوری طرح تعبیر نہیں کر سکتی۔ اور درحقیقت جب تک کہ لا کی قیمتوں کے انتخاب میں جن کے لئے تفاعل محسوب کیا جا رہا ہے احتیاط سے کام نہ لیا جائیگا نتیجہ سے بہت زیادہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ مزید بریں سیاہی یا پینسل کی لکیر کا جس سے ہم تفاعل کا طریق تعبیر کرتے ہیں (بہ خلاف خیالی ریاضی خط کے) کچھ نہ کچھ عرض ضرور ہوگا اویسی حال اس لکیر کا ہے جو محور لا کو تعبیر کرتی ہے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان جو نااصلہ ہے اسکو صحیح طور پر معلوم کرنے میں ابہام کا امکان ہے۔ نیز اسی سبب سے ایک حد سے زیادہ تفصیلات کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس لئے یہ طریقہ ایسے تفاعلوں کی صورت میں (جبکہ وجود ثابت کیا جاسکتا ہے) بذاتہ ناقص سمجھا جاتا ہے جن میں پیمانہ کو بڑا کرنے سے نئی نئی تبدیلیات کا انکشاف رونما ہوتا ہے۔ سو الخ

مثلاً تفاعل $A + B = A + B + C$ کی تفصیلات مبداء کے پاس۔

قبیل کے تفاعیل احصا میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔
 ۱۹ ترتیبی تعبیر کا طریقہ اکثر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ تفاعل کے لئے ریاضی
 شکل کا کوئی جملہ معلوم نہ ہو سکے اور شاہدہ سے متغیر متبوع اور تابع متغیر کی چند متناظر
 قیمتیں معلوم کی جائیں۔ اس صورت میں خطوط کی موٹائی کی وجہ سے جس ابہام کا
 امکان ہے وہ بمقابلہ اس میں کے قابل قدر نہیں ہے جو اس کے نقائص اور
 شاہدے کی اغلاط سے پیدا ہوتی ہیں۔

طالب علم نے ایسے سوئی جدولوں کا مشاہدہ کیا ہو گا جن میں باہر جایا
 پیش کیا گئے ارتفعل کو وقت کے ایک تفاعل کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے
 طریقہ بالا کو مد نظر رکھ کر ترتیم حاصل کی جاتی ہے اس سے درحقیقت انہی
 باتوں کا انکشاف ہوتا ہے جو اس عددی جدول سے اخذ ہو سکتی ہیں میں متغیر
 کی متناظر قیمتوں کے جوڑوں کا ایک سلسلہ مندرج ہوتا ہے لیکن ترتیبی شکل زیادہ
 قوی طریقہ سے دل پراثر کرتی ہے اور تفاعل کی دیمائی قیمتوں کا تصور پیدا کرنے
 میں مدد دیتی ہے۔

۱۱۔ عدم تسلسل۔

اگرچہ ریاضیات میں جن تفاعلوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ عام طور پر سخت
 متغیر متبوع کی وسعت میں محض اور تسلسل ہوتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں
 چند متناظر نقطوں پر یہ تسلسل پائی جاتی۔
 مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ متغیر متبوع کی چند خاص قیمتوں کے لئے تفاعل کی
 ابتدائی تعریف بے معنی ثابت ہو۔ مثال کے طور پر تفاعل

جب لا

پر غور کرو۔ صفر کے علاوہ لا کی کسی قیمت کے لئے شمار کنندے اور نسب نامہ کی
 خاص قیمتیں ہوتی ہیں اور خارج قسمت کا وجود ہوتا ہے۔ لیکن جب لا = ۰
 تو کسر غیر معین شکل صفحہ اختیار کرتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عام طور پر اس قیمت

انرض کرلی جاتی ہے لیکن ابتدائی تعریف کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اسی طرح کی بہت سی اور مثالیں پیش آئیں گی۔
 مزید برآں تفاعل (لا) کی کسی خاص قیمت (لا) کے لئے لامتناہی ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ لا کو کافی طور پر لا کے تقریباً مساوی لینے سے تفاعل کی قیمت کسی مقدار سے جو ہم منتخب کریں متجاوز ہو سکتی ہے خواہ یہ مقدار کتنی ہی بڑی ہو۔ اسکو عام طور پر ہم ضابطہ

$$\text{نسباً } f(لا) = \infty$$


سے تعبیر کریں گے۔ ریاضیات میں لفظ 'لامتناہی' کے صرف وہی معنی ہیں جو اوپر بیان ہوئے اور رمز ∞ کا جائز استعمال صرف اس قسم کے محفل ضابطوں کے ذریعہ ہو سکتا ہے جو اوپر بیان ہوئے۔

تفاعل $\frac{1}{لا}$ سے جو لا کے لئے لامتناہی ہو جاتا ہے اور تفاعل مس لا سے جو لا کے لئے لامتناہی ہوتا ہے متذکرہ بالا بیان کی مثالیں حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھو شکل ۱۵ صفحہ ۲۲۔
 نیز علم خیل میں رفاص کے امتزاج کا دور جو سرعت (ع) کا تفاعل ہوتا ہے $\frac{1}{لا}$ کے لئے لامتناہی ہو جاتا ہے۔

مزید برآں ایک تفاعل کو محدود ہو لیکن لا کی کسی خاص قیمت (لا) کے لئے غیر مسلسل ہو سکتا ہے یعنی لا = لا - صہ اور لا = لا + صہ کے لئے اس کی قیمتیں غیر مساوی ہو سکتی ہیں خواہ صہ کتنا ہی چھوٹا ہو۔ ایسی صورت میں تفاعل کی ابتدائی تعریف سے لا = لا کے لئے تفاعل کی ایک معین قیمت حاصل ہو سکتی ہے یا حاصل نہیں ہو سکتی۔

اس کی مثال علم خیل سے مل سکتی ہے۔ ایک ذرہ حرکت کر رہا ہے اور حرکت کی سمت میں اس کو ایک دے ہوئے لمحہ پر اچانک دھک دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ٹھیک اس لمحہ پر ذرہ کی رفتار غیر معین ہوتی ہے اگرچہ دھک کے عین

پیشتر اور عین بعد کی رفتاروں کی تعیین ہو سکتی ہے۔



شکل (۸)

عدم تسلسل کی اور مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن اس مضمون کے عام استعمال میں نہیں پائی جاتیں۔

۱۲۔ سلسل تفاعلوں سے متعلق مسائل۔

اب ہم مختلف تفاعلوں کے تسلسل یا عدم تسلسل کی تحقیق کریں گے اور انہی تریبی تعیین کی نوعیت معلوم کریں گے جبکہ ان تفاعلوں کی صریح طور پر یا ضعیف تعیین ہو سکے۔

اس مقصد کے لئے حسب ذیل ابتدائی مسائل کا جان لینا ضروری ہے۔
۱۔ سلسل تفاعلوں کی ایک محدود تعداد کا مجموعہ خود ایک سلسل تفاعل ہوتا ہے۔
پہلے فرض کرو کہ متغیر متبوع لا کے دو تفاعل ۶ اور ۷ ہیں۔ تب

$$\text{مف} (۶ + ۷) = (۶ + \text{مف} ۶ + ۷ + \text{مف} ۷) - (۶ + ۷)$$

$$\Delta = \text{مف} ۶ + \text{مف} ۷$$

تسلسل کی تعریف سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شما کی خواہ کوئی قیمت ہو ہم ایک مقدار صہ معلوم کر سکتے ہیں اس طرح کہ

$$\text{امف لا} > \text{صہ ایگے امف} ۶ > \frac{1}{2} \text{ شما امف} ۷ > \frac{1}{2} \text{ شما امف لا}$$

امف ع + مف و | > ث

پس تفاعل ع + و سلسل ہے۔
اب اگر تین سلسل تفاعل ع، و، ہوں تو ع + و سلسل ہے جس طرح
کہ ثبوت بالا سے ظاہر ہے اور اس لئے (ع + و) + ہ سلسل ہے۔ اسی طرح
اس مسئلہ کو قدم بہ قدم تفاعلوں کی ایک محدود تعداد کی صورت میں وسعت
دیجا سکتی ہے۔
۲۔ سلسل تفاعلوں کی ایک محدود تعداد کا حاصل ضرب خود ایک سلسل
تفاعل ہوتا ہے۔

پہلے دو تفاعلوں ع، و کی صورت پر غور کرو۔

مف (ع و) = (ع + مف ع) (و + مف و)۔ ع و

= و مف ع + ع مف و + مف ع مف و

بوجہ فرض ہم امف لا کو کافی چھوٹا لیکر امف ع اور امف و کو کسی
مقررہ مقدار سے چھوٹا بنا سکتے ہیں خواہ یہ مقدار کتنی ہی چھوٹی ہو۔ پس چونکہ ع اور و
محدود ہیں اور مف ع اور ع مف و کسی مقررہ مقدار سے چھوٹے
بنائے جاسکتے ہیں خواہ یہ مقدار کتنی ہی چھوٹی ہو یہی حال امف ع مف و
کا ہے۔ اس لئے

اور مف ع + ع مف و + مف ع مف و |

کی قیمت بھی کسی مقررہ مقدار سے چھوٹی بنائی جاسکتی ہے خواہ یہ مقدار کتنی ہی
چھوٹی ہو۔ یعنی ع و ایک سلسل تفاعل ہے۔

اب فرض کرو کہ تین سلسل تفاعل ع، و، ہ ہیں ہم نے دیکھ لیا کہ ع و
سلسل ہے اس لئے (ع و) بھی سلسل ہے۔ اور اسی طرح سلسل

تفاعلوں کی ایک محدود تعداد کے حاصل ضرب کی صورت میں بھی یہ درست ہے۔

۳۔ دو سلسل تفاعلوں کا خارج قسمت سلسل تفاعل ہوتا ہے سوائے متغیر
متبعی کی ان قیمتوں کے لئے (اگر کوئی ہوں) جن کے لئے مقسوم علیہ صفر ہوتا ہو۔
فرض کرو کہ تفاعل ع و اور و ہیں تو

$$\text{مف} \left(\frac{ع}{و} \right) = \frac{ع + \text{مف} ع - ع}{و + \text{مف} و - و}$$

$$= \frac{\text{مف} ع - ع}{و + \text{مف} و}$$

بوجب فرض و۔ اس لئے مقدار و (و + مف و) کی مطلق قیمت کی ایک منجلی انتہا مہونی چاہئے جو صفر نہیں ہو سکتی۔ پس

$$|\text{مف} \left(\frac{ع}{و} \right)| > \left| \frac{\text{مف} ع - ع}{و + \text{مف} و} \right|$$

اب چونکہ $\frac{و}{ع}$ اور $\frac{ع}{و}$ محدود ہیں ہم مف و کو کافی چھوٹا لینے سے $\left| \frac{\text{مف} ع - ع}{و + \text{مف} و} \right|$ اور $\left| \frac{ع}{و} \right|$ مف و کو کسی مقررہ مقدار سے چھوٹا بنا سکتے

ہیں خواہ یہ مقدار کتنی ہی چھوٹی ہو۔ اس لئے $|\text{مف} \left(\frac{ع}{و} \right)|$ پر بھی یہ درست ہوگا۔ یعنی خارج قسمت $\frac{ع}{و}$ سلسل ہے۔

۴۔ اگر ما' کا ایک سلسل تفاعل ہو جہاں ع' لا کا ایک سلسل تفاعل ہو گا۔

کیونکہ فرض کر دے لا کا کوئی اضافہ مف لا ع کا متناظر اضافہ مف ع اور ما' کا متناظر اضافہ مف ما' ہے۔ چونکہ ما' ع کا ایک سلسل تفاعل ہے ہم ایک مقدار صہ معلوم کر سکتے ہیں اس طرح پر کہ اگر

$$|\text{مف} ع| > \text{صہ تو } |\text{مف} ما'| > \text{صہ}$$

جہاں صہ کوئی مقررہ مقدار ہو سکتی ہے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہو۔ اور چونکہ ع' لا کا ایک سلسل تفاعل ہے ہم ایک مقدار صہ معلوم کر سکتے ہیں اس طرح پر کہ اگر

$$|\text{مف} لا| > \text{صہ تو } |\text{مف} ع| > \text{صہ}$$

شکل

$$\text{لا} (\text{لا}^1 + \frac{\text{لا}^2}{\text{لا}^1} + \frac{\text{لا}^3}{\text{لا}^2} + \dots + \frac{\text{لا}^n}{\text{لا}^{n-1}} + \frac{\text{لا}^{n+1}}{\text{لا}^n})$$

میں لکھنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لا کو کافی بڑا (مطلق قیمت میں) لینے سے ہم پہلے جزو ضربی (لا) کو جس قدر بڑا بنا چاہیں بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے جزو ضربی کی قیمت لا کے اس قدر قریب لائی جاسکتی ہے جس قدر ہم چاہیں۔ یعنی انکا حاصل ضرب اس قدر بڑا بنا جاسکتا ہے جس قدر ہم چاہیں۔ مزید یہ کہ اگر لا مثبت ہو تو حاصل ضرب کی علامت وہی ہوگی جو لا کی ہے لیکن جب لا منفی ہو تو حاصل ضرب کی علامت وہی ہوگی جو لا کی ہے یا اس کے برعکس ہو جب اس کے کہ ن جفت یا طاق ہو۔ صحیح تفاعل

امور متذکرہ بالا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ منطبق صحیح تفاعل
 ما = ف (لا) کی ترسیبی تقسیم میں منحنی ہر جگہ محور لا سے محدود فاصلے پر واقع ہوتا ہے لیکن اس سے ہٹنا جانا ہے بغیر کسی حد کے جس طرح لا مسلسل طور پر بغیر حد کے بڑھتا ہے خواہ یہ مثبت سمت میں بڑھے یا منفی سمت میں۔ منحنی کو عملی طور پر بنانے میں مساوات ف (لا) = کو حل کر لینا مفید ہوتا ہے (اگر اس کا حل معلوم کرنا ممکن ہو) کیونکہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ منفی محور لا کو کتنے نقاط پر قطع کرتا ہے۔


مثال - منحنی ما = لا (لا - ۱) کی ترسیم یہ منحنی محور لا کو نقاط

لا = ۰، ۱ پر قطع کرتا ہے۔ چونکہ جب لا = ۰، لا متبادل لا کے لا اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس لئے منفی ابتدا کے قریب خط مستقیم ما = لا کی شکل تقریباً اختیار کرتا ہے جو دراصل مبدأ پر منحنی کا ماں ہے۔ چونکہ ما، لا کے ساتھ علامت بدلتا ہے ہم صرف لا کی مثبت قیمتوں کے لئے معینوں کو محسوب کرتے ہیں۔ ہم بہ آسانی

حسب ذیل جدول مرتب کر سکتے ہیں جہاں صرف دو ملحوظ ہندسوں کو عمل میں قائم رکھا گیا ہے۔

لا	لا	لا	لا
۵۱	۵۸	۵۱۰	۵۲۹
۵۲	۵۹	۵۱۹	۵۱۶
۵۳	۱۵۰	۵۲۶	۰
۵۴	۱۵۱	۵۳۴	۵۲۳+
۵۵	۱۵۲	۵۳۸	۵۵۱+
۵۶	۱۵۳	۵۳۸	۵۸۸+
۵۷	∞	۵۳۶	∞

شکل ذیل اس منحنی کو تعبیر کرتی ہے۔



شکل (۹)

۱۴۔ منطق کسیریں۔

تفاعل $\text{ما} = \frac{\text{فا} (\text{لا})}{\text{ف} (\text{لا})}$ ----- (۱)

جو منطق ہے لیکن صحیح تفاعل نہیں ہے، لا کی تمام محدود قیمتوں کے لئے سوائے ان قیمتوں کے جن کے لئے ف (لا) = *، محدود اور مسلسل ہے۔ کیونکہ یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ منطق صحیح تفاعل فا (لا) اور ف (لا) محدود اور مسلسل ہوتے ہیں جس سے بموجب دفعہ (۲) یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خارج قسمت بھی محدود اور مسلسل ہوگا سوائے اس صورت کے جبکہ نسب نامہ صفر ہو جائے۔

(۱) سے بغیر ہونے والا منفی محور لا کو ان نقاط پر قطع کریگا (اگر کوئی ہوں) جنکے لئے فا (لا) = ۰، ما کے متوازی منحنی کے متقارب ہوں گے جہاں کہیں ف (لا) = ۰ اور لا کی باقی تمام محدود قیمتوں کے لئے ما محدود اور مسلسل ہوگا۔ لا $\leftarrow \pm \infty$ کے جواب میں ما کی قیمتیں فا (لا) اور ف (لا) کے انسانی درجوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ اگر فا (لا) ف (لا) سے بڑے درجہ کا ہو تو معین لامتناہی ہو جاتے ہیں لیکن اگر کم درجہ کا ہو تو معین لا اتہا چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں محور لا متقارب ہوتا ہے۔ اگر دونوں کا درجہ وہی ہو تو محور لا کے متوازی ایک متقارب ہوتا ہے۔

ایسی صورتوں میں جہاں شمار کنندہ کا درجہ نسب نامہ کے درجہ سے کم نہ ہو یہ بہتر ہوگا کہ شمار کنندہ کو نسب نامہ سے اتنا تقسیم کیا جائے کہ باقی 'مقسوم علیہ' کے درجہ سے کم درجہ کا ہو اور پھر ما کو ایک صحیح تفاعل اور ایک صحیح کسر کے مجموعہ سے ظاہر کیا جائے۔

چند ضروری امور کی وضاحت حسب ذیل مثالوں سے ہوگی۔

$$\text{مثال ۱۔} \quad \text{ما} = \frac{\text{لا} - ۱}{\sqrt{۲}} = -\frac{۱}{\sqrt{۲}} + \frac{۱}{\sqrt{۲}}$$

اس میں اگر لا = ۱ تو ما = ۰ اور لا $\leftarrow \pm \infty$ نیز لا $\leftarrow ۰$ کے لئے


* یہ مان لیا گیا ہے کہ کسر منفرد ترین شکل میں ہے۔

ما مثبت ہے اور اس وقفہ کے باہر بھی۔ ما کی دوسری صورت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر $\frac{1}{p} \rightarrow \infty$ تو $\frac{1}{p} = \frac{1}{\infty}$ اور ما کی حسب ذیل متناظر قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0 \quad \text{تو} \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0 \quad \text{اور} \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0$$

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0 \quad \text{تو} \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0 \quad \text{اور} \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0$$

شکل ذیل منحنی کو ظاہر کرتی ہے۔




شکل (۱۰)

$$\frac{2}{p+1} - 2 + \frac{1}{p} = \frac{(1-1)p}{p+1} = 0 \quad \text{مثال ۲-}$$

یہاں $\text{لا} = 0$ ، تو $\text{ما} = 0$ اور $\text{لا} = 1$ تو بھی $\text{ما} = 0$ اور $\text{لا} < 0$ تو $\text{ما} < 0$ اور $\text{لا} > 0$ تو $\text{ما} > 0$ ۔
 نیز ما علامت بدلتا ہے جبکہ لا انہیں سے ہر ایک قیمت میں سے گزرتا ہے۔ لا کی
 بڑی قیمتوں کے لئے خواہ منفی ہوں یا مثبت منفی کی تقریری شکل

$$\text{ما} = -(\text{لا} + 2)$$

ہو جاتی ہے جو ایک خط مستقیم ہے۔ $\text{لا} < 0$ کے لئے یہ منفی اس خط کے نیچے
 واقع ہوتا ہے اور $\text{لا} > 0$ کے لئے اس خط کے اوپر۔ شکل (۱۱) میں اس منفی کو
 دکھایا گیا ہے۔




شکل (۱۱)

$$\text{ما} = \frac{2}{\text{لا} - 1}$$

شکل ۳-

یہاں $\text{لا} = 0$ اور $\text{لا} < 0$ کے لئے ما محدود رہتا ہے اور $\text{لا} > 0$ کے لئے
 لامتناہی۔ نیز $\text{لا} < 0$ کے لئے ما مثبت ہوتا ہے اور $\text{لا} > 0$ کے لئے


منفی۔ مزید بریں لا کے ساتھ ما علامت بدلتا ہے۔



شکل ۳۔ $\frac{y^2}{x^2 + 1} = 1$

۲۷

پچھلی مثال کی طرح یہاں بھی $y = 0$ اور $x = \pm \infty$ کے لئے ما معدوم ہوتا ہے اور x کے ساتھ علامت بدلتا ہے۔ لیکن نسبت y/x کی کسی حقیقی قیمت کے لئے معدوم نہیں ہوتا اس طرح ما ہمیشہ محدود ہوتا ہے۔



۱۵۔ دائری تفاعل۔ جب لا، جم لا، مس لا، وغیرہ

کی عام تعریفات علم ثلث کی کسی کتاب سے معلوم ہونگی۔
تفاعل جب لا، لا کی تمام قیمتوں کے لئے مسلسل ہے۔ کیونکہ
مف (جب لا) = جب (لا + مف لا)۔ جب لا

$$= ۲ جب \frac{1}{۲} مف لا جم (لا + \frac{1}{۲} مف لا)$$

آخری جزو ضربی ہمیشہ محدود ہوتا ہے اور مف لا کو کافی چھوٹا لینے سے
حاصل ضرب اس قدر چھوٹا بنایا جاسکتا ہے جس قدر ہم چاہیں۔
اسی طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جم لا مسلسل ہے۔ یہ نتیجہ بہر کیف
قبل الذکر میں مشتمل ہے۔ کیونکہ

$$جم لا = جب (لا + \frac{1}{۲} \pi)$$

پھر چونکہ

$$مس لا = جب لا$$



اور جب لا اور جم لا کا مسلسل ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لئے مس لا
بھی مسلسل ہے سوائے لا کی ان قیمتوں کے جن کے لئے جم لا = قیمتیں
لا = (ن + \frac{1}{۲} \pi) سے حاصل ہوتی ہیں جہاں ن ایک صحیح عدد ہے۔
اسی طرح قط لا، قم لا، ہم لا کی صورتوں پر بحث ہو سکتی ہے۔

صفحہ آئینہ ویر جب لا اور مس لا کی تریسات بتلائی گئی ہیں۔ طالب علم
کو یہ دیکھنا چاہئے کہ کس آسانی سے روابط

$$جب (لا) = جب لا جب (لا - \pi) = جب لا$$

$$جب (لا + \pi) = جب لا مس (لا + \pi) = مس لا$$

منفیوں کے تشاکل کو پیش نظر رکھ کر حاصل ہو جاتے ہیں۔




۱۶- منقلب تفاعل -

۹۲

اگر ما لا کا ایک مسلسل تفاعل ہو تو بعض شرائط کے تحت لا کا ایسا
 مسلسل تفاعل ہوگا۔ یہ بات اس وقت ہوگی جبکہ لا کی وسعت ایسے حصوں
 میں (جو لامتناہی چھوٹے نہ ہوں) تقسیم ہو سکتی ہو کہ ہر ایک حصہ میں تفاعل ما

استقلال کے ساتھ بڑھتا یا گھٹتا ہو جیسے لا بڑھے۔
فرض کرو کہ جس طرح لا اور ب سے ب تک بڑھتا ہے ماکہا سے بھا
ایک استقلال کے ساتھ بڑھتا ہے تب بھا اور بھا کے درمیان ماکہا کی کسی قیمت کے
متناظر اور ب کے درمیان لا کی ایک اور صرف ایک قیمت ہوگی۔ پس
اگر ہم اس وقفہ کے اندر ہی لا کی قیمتوں سے سروکار رکھیں تو لا



شکل (۱۶)

ما کا وحید قیمت تفاعل ہوگا۔ نیز یہ ظاہر ہے کہ لا، ماکہا ایک سلسل تفاعل ہے۔
کیونکہ اگر ہم وقفہ مندرجہ بالا کے اندر لا میں کسی مثبت مقدار صہ کا اضافہ کریں
تو ما میں بھی ایک محدود مقدار شہ کا اضافہ ہوگا۔ اور شہ سے کم صف ماکہا کی تمام
قیمتوں کے لئے صف لا > صہ۔ یہی استدلال اس وقت بھی درست ہے جبکہ لا کا
اضافہ منفی ہو۔ پس ہم ایک مثبت مقدار شہ معلوم کر سکتے ہیں اس طرح کہ جب صہ
کوئی مقررہ مثبت مقدار ہو خواہ یہ کتنی ہی چھوٹی ہو تو صف لا > صہ، صف ماکہا
کی ان تمام قیمتوں کے لئے جن کے لئے صف ماکہا > صہ۔ لیکن یہ لا کے سلسل
ہونے کی شرط ہے جبکہ لا، ماکہا ایک تفاعل ہو۔ (وقفہ ۸)

صیر کا ہم اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں جب ماکہا لا = ب سے لا = ب تک کے
وقفہ میں استقلال کے ساتھ گھٹتا ہے۔

اگر ہم اس وقفہ کے پابند نہ رہیں جس میں تفاعل استقلال کے ساتھ بڑھتا یا گھٹتا ہے
تو ماکہا کی کسی دی ہوئی قیمت کے متناظر لا کی ایک سے زیادہ قیمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسی
صورت میں مقلوب تفاعل کو ہم کثیر قیمت کہیں گے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے (اور عام طور پر)

ہوگا کہ ما کی خاص دستوں میں ما کی قیموں کے متناظر لا کی کوئی قیمتیں حاصل نہ ہوں
یعنی مقلوب تفاعل کا وجود نہ ہو۔

اگر ما = ف (لا) (۱)
تو مقلوب تفاعلی ربط کو بعض اوقات ہم اس طرح بیان کریں گے:-

لا = ف' (ما) (۲)

پس ف {ف' (ما)، ف (لا)} = ما (۳)

یعنی تفاعلی رموز ف اور ف' ایک دوسرے کو خارج کر دیتے ہیں۔ ترتیم (۲) کی
یہی وجہ ہے۔

مقلوب تفاعل کی ترتیم اصلی تفاعل کی ترتیم سے صرف لا اور ما کے محوروں کا
تبادلاً کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

مثال ۱۔ فرض کرو کہ ما = لا، یہ لا کا ایک مسلسل تفاعل ہے اور اگر لا مثبت ہو تو لا کے
ساتھ مسلسل برہمیت ہے۔ پس لا = ما، ما کا ایک مسلسل تفاعل ہے۔ اگر لا علامت
کی پابندی نہ کرے تو ما کی برہمیت کے متناظر لا کی دو قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان کو عام طور پر
ما سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر ما منفی ہو تو مقلوب تفاعل ما کا وجود نہیں ہوتا۔

مثال ۲۔ مقلوب دائری تفاعل

جب لا، جہم لا، مس لا، وغیرہ

کی برہمیت تفاعل ہیں۔

تفاعل جب لا، جہم لا، کا وجود لا کی صرف ان قیمتوں کے لئے ہے جو

۱۔ سے ۱ کے درمیان واقع ہوں لیکن ان حدود کے باہر جو قیمتیں ہوں ان کے لئے

ان تفاعلوں کا وجود نہیں۔

تفاعل مس لا، لا کی تمام قیمتوں کے لئے وجود رکھتا ہے یہ کثیر برہمیت تفاعل ہے۔

لا کی قیمتیں ایک حسابی سلسلہ بناتی ہیں جنکا فرق مشترک ۱۱ ہے۔

جب لا اور مس لا کی ترتیمات اشکال ۱۱، ۱۲ میں بتلائی گئی ہیں۔

۱۔ گروہ کی علوی یاسفلی انتہا۔

قبل اس کے کہ ہم مسلسل تقاضوں کے نظریہ پر مزید بحث کریں 'علوی' اور 'دسلی' انتہا اور انتہائی کمیّت کی تعریفات کی جگہ تذکرہ و فہات (۲) اور (۴) میں ہو چکا ہے تو سب سے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔

سب سے پہلے مقداروں کے ایسے گروہ پر غور کرو جو تعداد میں لا انتہا ہیں لیکن تمام کسی محدود مقدار بعد سے کم ہیں۔ گروہ کی تعریف کسی طور پر ہو سکتی ہے لیکن ضرورت اس میں زیادہ تر صرف ایسی کمیّت کی ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ کوئی دی ہوئی مقدار اس گروہ سے متعلق ہے یا نہیں۔ مثلاً ایک گروہ ان قیمتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جو ایک دیا ہوا قاع (سلسلہ ہو یا نہ ہو) اختیار کرتا ہے جبکہ غیر متبوع کسی محدود یا منحصر دست میں مختلف قیمتیں اختیار کرتا ہے۔

اس قسم کے گروہ میں ممکن ہے کہ "بڑی سے بڑی" مقدار موجود ہو یا نہ ہو یعنی ایسی مقدار جس سے باقی مقداریں تجاوز نہیں کر سکتیں۔ لیکن ہر صورت میں گروہ کی مقداروں کی ایک 'علوی' انتہا ضرور ہوگی یعنی ایک خاص مقدار ایسی موجود ہوگی کہ گروہ کی کوئی مقدار اس سے تجاوز نہ کرتی ہو اور (کم سے کم) ایک مقدار معلوم ہو سکے گی جو گروہ کی کسی ایک ایسی مقدار سے بڑی ہو جو ہمارے کم ہو۔ اگر ہمارے گروہ سے متعلق مقدار نہ ہو تو ان مقداروں کی ایک لا انتہا تعداد معلوم ہو سکتی ہے جو کسی ایک ایسی مقدار سے بڑی ہوں جو ہمارے کم ہے۔


۳۱۔ ان بیانات کا ثبوت دفعہ (۲) کی طرح ہندسی تعبیر کی مدد سے مستطیل ہو سکتا ہے۔

اسی طرح اگر مقداروں کا ایک لا انتہا ہی گروہ ہو جن میں سے ہر ایک ایک محدود مقدار ہمارے بڑی ہے تو گروہ میں ممکن ہے کہ کم سے کم مقدار ہو یا نہ ہو لیکن ہر صورت میں ایک 'دسلی' انتہا نہ ہوگی اس طور پر کہ گروہ کی کوئی مقدار ہمارے کم نہیں ہوتی حالانکہ اگر کوئی مقدار بھی ہو جائے جو نہ سے بڑی ہو تو (کم از کم) ایک مقدار گروہ کی سلام ہو سکتی جو اس سے بڑی ہو اور اگر نہ ہو تو گروہ سے متعلق مقدار نہ ہو تو ان مقداروں کی لا انتہا تعداد معلوم ہو سکتی ہے جو کسی ایک مقدار سے کم ہوں

جو نما سے بڑی ہے۔

ایک عمدہ مثال دائرہ کے محیط یا گھیرے کی تعریف میں پیش آتی ہے۔
دائرہ کے محیط پر نقطوں کی کوئی تعداد لیکر ان کو ترتیب وار ملا یا جائے تو ایک
اندرونی کثیر الاضلاع حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ان نقاط پر ماس کھینچے جائیں تو بیرونی
محاط کثیر الاضلاع ملتا ہے۔ اب یہ آسانی کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی اندرونی
کثیر الاضلاع کا گھیرا بیرونی کثیر الاضلاع کے گھیرے سے کم ہے۔ اگر تمام ممکن اندرونی
کثیر الاضلاع کے کل گروہ پر غور کیا جائے تو گھیروں کی ایک خاص علوی انتہا
ہوگی۔ اسی طرح تمام ممکن بیرونی کثیر الاضلاعوں کے گھیروں کی ایک سفلی انتہا
ہوگی۔

مہندان دونوں انتہاؤں کو ایک ہی ہونا چاہیئے۔ کیونکہ فرض کرو کہ ت ق
اندرونی کثیر الاضلاع کے گروہ میں سے ایک کا ایک ضلع ہے۔ ت اور ق ت
نقاط اور ق پر ماس ہیں۔



شکل (۱۴)

فرض کرو کہ و مرکز ہے اور ن ق، و ت کو مل پر ملتا ہے۔ تب ن ت
اور ق ت بیرونی کثیر الاضلاع کے ضلعوں کے حصے ہوں گے اور اگرچی حاصل
جمع کی علامت ہو تو دونوں کثیر الاضلاعوں کے گھیروں کی
نسبت ہوگی

$$\frac{\text{ح (ن ق)}}{\text{ح (ن ق)}} = \frac{\text{ح (ن ل)}}{\text{ح (ن ت)}}$$

پس ایک معلومہ مسئلہ کی رو سے اوپر کی نسبت قیمت میں اس نمونہ

$$\frac{\text{ن ل}}{\text{ن ت}} = \frac{\text{ول}}{\text{ون}}$$

کی نسبتوں کی اعظم اور اقل قیمتوں کے درمیان ہوگی جو مکمل شکل میں واقع ہوتی ہوگی۔ لیکن جب زاوے ن و ق کافی چھوٹے لئے جائیں تو کثیر الاضلاع میں ضلعوں کی تعداد میں متناظر اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے نسبت ول / ون ایک کے اتنا قریب لائی جاسکتی ہے جتنا ہم چاہیں۔ اس لئے متذکرہ بالا علوی اور سفلی انتہائیں وہی ہونی چاہئیں۔

اس معین انتہا کو جس کی طرف ایک اندرونی کثیر الاضلاع (یا بیرونی کثیر الاضلاع) کا گھیرا مال ہوتا ہے جبکہ وہ زاوے جو مرکز پر اضلاع کے محاذی بنتے ہیں لا انتہا گھٹائے جائیں دائرہ کے محیط یا ”گھیرے“ کی تعریف کے طور پر اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس امر کا ثبوت کہ اس انتہا کی نسبت دائرہ کے قطر کے ساتھ سکو (π) سے تعبیر کرتے ہیں تمام دائروں کے لئے وہی ہے علم مثلث کی اکثر ثنائیوں میں ملے گا۔ دائرہ کی کسی قسم کے طول کے متعلق بھی جو کچھ تعبیر سے کم ہو اسی طرح کی تعریف دیا جاسکتی ہے۔ اور یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ یہ یکا نہ قیمت رکھتا ہے۔

۱۸۔ مسلسل تفاعل کی ایک بڑی اور ایک چھوٹی سے چھوٹی قیمت ہوتی ہے۔

مسلسل تفاعل کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ متغیر متغیر کی کسی محدود وسعت میں تفاعل کی ایک بڑی سے بڑی اور ایک چھوٹی سے چھوٹی قیمت ہوتی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر ما ایک تفاعل ہو جو لا = اے سے لا = ب تک مسلسل ہے (بشمول طرفین) اور اس وسعت میں میں ما جو قیمتیں اختیار کرتا ہے اُنکی علوی انتہا صا ہو تو اس وسعت میں

لا کی ایک ایسی قیمت ضرور ہوگی جس کے لئے ما = صمد۔ یہی حال غلی انتہا کا ہے۔
ایسے تفاعل کی صورت میں جو زیر بحث وسعت میں استعمال کے ساتھ بڑھتا یا استعمال
کے ساتھ گھٹتا ہے یہ مسئلہ خود واضح ہے۔ اس صورت میں ٹی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی قیمتیں
صریحاً وسعت کے سروں پر واقع ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ مسئلہ تو سیدھا اس وقت بھی
درست ہے جبکہ تفاعل اس طرح کا ہو کہ وسعت وقفوں کی ایک جھل و دتعداد
میں تقسیم ہو سکے جن میں سے ہر ایک وقفہ میں تفاعل یا توسیعی بڑھتا ہے یا کم
گھٹتا ہے۔

اس مضمون کے استعمالات میں درحقیقت جن تفاعلوں سے ہمیں سابقہ
پہلے ان میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، لیکن وہ اصول جن کی مدد سے کسی
دی ہوئی صورت میں ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں ایسے استدلال سے قائم کئے جاتے
ہیں جس میں وقفہ ہذا کے مسئلہ کی صداقت مان لی جاتی ہے۔ دیکھو دفعہ (۳۸)۔
اس لئے منطق کے نقطہ نظر سے ایسے ثبوت کا فراہم کرنا بہتر ہوگا جس میں زیر بحث
تفاعل سے متعلق کسی چیز کو نہ مان لیا گیا ہو سوائے اس کے کہ وہ بموجب تعریف
دفعہ (۸) مسلسل ہے۔

مب ذیل اس طرح کے ثبوت کا خاکہ ہے۔ ہندی تفسیر میں فرض کر دو کہ ۱ = ۱ و ۱ = ۱
و ۱ = ۱۔ اگر ۱ = ۱ مائ کی قیمت غلی انتہا صمد کے مساوی نہیں ہے تو صمد
سے کم ہوگی۔ اس کو ما سے تعبیر کرو۔
لا متناہی طریقوں سے ہم تقادیر

ما، ما، ما

کا ایک سعودی تو از معلوم کر سکتے ہیں جس کی غلی انتہا صمد ہو۔ مثلاً ہم ما کو ما اور
صمد کے اوسط حسابی کے مساوی لے سکتے ہیں، ما کو ما اور صمد کے اوسط
حسابی کے مساوی اور غلی ہذا القیاس۔ چونکہ وسعت ۱ = ۱ میں ما کی قیمت
ما سے بدتر کوئی مقدار ہو سکتی ہے جو صمد سے کم ہو، لا کی کم سے کم ایک
قیمت ضرور ہوگی (دفعہ ۹) جس کے لئے ما درمیانی قیمت ما اختیار کرنا ہے فرض کر دو

اسی طرح فرض کرو کہ لا کی سب سے چھوٹی قیمت لا ہے جس کے لئے $\lambda = 0$ ہو اور علیٰ ہذا۔
یہ ظاہر ہے کہ متغیر

(جو شکل میں نقاط م، م، م..... سے تعبیر ہوتے ہیں) ایک صعودی نوا آتیں
ہونے چاہئیں۔ فرض کر دو کہ اس نوا ترکی علوی اتھا ہے۔ اب چونکہ ہر کے بائیں جانب
کسی دست میں خواہ یہ کتنی ہی پیچولی ہو ایسے نقاط ہوتے ہیں جن پر حاکم سے استفادہ
فرق رکھتا ہے جو کسی مقررہ مقدار سے کم یا زیادہ تعامل کے تسلسل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خود
نقطہ مدبر کا قیمت صما کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔

[۱۷] شکل صرف وضاحت کی خاطر کھینچی گئی ہے اور ثبوت کے لئے ضروری نہیں۔ درحقیقت یہ ظاہر ہے کہ جس تعامل کو ٹھیک طور پر ترمیمی طور پر تعبیر کیا جاسکتا ہے اس میں اس خاصیت کا ہونا ضروری ہے اور اور کا ثبوت اس کی سمجھت میں غیر ضروری ہوگا۔

شکل میں وگ = مہ، وہر = باؤل = ماکول = ماک۔ اور توانتر

کو شہزادہ بلاطریقہ سے حامل کرنے میں ل' ہرک کی تعجب کرتا ہے ل' ل' ہرک کی

تصنیف کرتا ہے، لہٰذا لگ کی تصنیف کرتا ہے اور علیٰ ہذا۔]

اب یہ دیکھنے کے لئے کہ غنیمت مسلسل تفاعلوں کی صورت میں مسئلہ بالا عام طور پر صادق نہیں آتا ایسے تفاعل پر غور کرو جو اس طرح حاصل ہوتا ہے فرض کرو کہ صفر کے سوال لا کی اور قیمتوں کے لئے تفاعل کی قیمت جیسے لا ہے اور لا = ۰ کے لئے تفاعل کی قیمت فرض کرو صفر ہوتی ہے۔ اس تفاعل کی علوی انتہا اسے جسکی طرف لا کو کافی چھوٹا لینے سے اسے اس قدر قریب لایا جاسکتا ہے جسقدر ہم چاہیں لیکن یہ کبھی اس انتہا کو نہیں پہنچتا۔

۱۹۔ تفاعل کی انتہائی قیمت۔ ان قیمتوں کے کل گروہ پر غور کرو جو ایک

تفاعل مارسل یا غیر مسلسل اختیار کرتا ہے جبکہ متغیر متغیر لا ایک ثابت قیمت لا کے ایک جانب کے کسی وقفہ میں مختلف قیمتیں اختیار کرتا ہے۔ فرض کرو کہ ہر طرح لا کے قریب آتا ہے مگر کسی ثابت مقدار لا کے قریب اس طرح آتا ہے کہ لا۔ لا کو کافی طور پر چھوٹا لینے سے اس بات کا یقین ہو سکتا ہے کہ لا۔ لا کی اس قیمت یا اس سے چھوٹی قیمتوں کے لئے لا۔ لا کی قیمت شمار سے کم ہوتی ہے جہاں شمار کوئی مقررہ مقدار ہو سکتی ہے خواہ یہ کتنی ہی چھوٹی ہو۔ ان شرائط کے تحت ہم کہتے ہیں کہ لا، ما کی انتہائی قیمت ہے جبکہ لا زیر بحث جانب سے لا کے قریب آئے۔ اس ربط کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

نہا = لا

لیکن ٹھیک محنت تو اس میں ہے کہ اس کی تخصیص بھی کر دجائے کہ لا، لا کے کس جانب سے قریب آ رہا ہے۔

متذکرہ بالا ربط کے ساتھ دفعہ (۸) کی تعریف پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلسل تفاعل کی صورت میں

نہا ف (لا) = ف (لا) (۱۰)

حاصل ہوتا ہے۔ یعنی تفاعل کی انتہائی قیمت خود تفاعل کی قیمت پر منطبق ہوتی ہے اور یہ کہ اگر لام متغیر متبوع کی وسعت کے اندر واقع ہو تو لام خواہ کسی جانب سے لام کے قریب آئے یہ خاصیت درست ہے۔ لیکن اگر لام وسعت کے کسی سرے پر منطبق ہو تو لام کا وسعت کے اندر سے لام کے قریب آنا ضروری ہے۔

برعکس اس کے جب تک شرط (۱) پوری نہ ہو تفاعل سلسل نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے تفاعل پر غور کرو جس کے متغیر متبوع کی وسعت مثبت لام کی سمت میں غیر محدود ہے۔ اگر لام کو مسلسل بڑھانے سے ما ایک ثابت قیمت لام کی طرف مائل ہو اس طرح کہ لام کو کافی بڑھانے سے ہم یہ یقین کر سکیں کہ لام کی اس قیمت اور اس سے بڑی قیمتوں کے لئے ا ما۔ لام ا شما سے چھوٹا ہو گا جہاں شما کوئی مقررہ مثبت مقدار ہے خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو تب لا ∞ کے لئے لام کو ما کی انتہائی قیمت کہتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں

$$\text{نہا} = \text{ما} = \text{لا} \infty$$

اسی طرح کی تعریف

$$\text{نہا} = \text{ما} \infty$$

۳۵ کی ہے جب یہ موجود ہو اور تفاعل کے متغیر متبوع کی وسعت منفی لام کی سمت میں غیر محدود ہو۔

۲۰۔ انتہائی قیمتوں سے متعلق عام مسائل۔

۱۔ تفاعلوں کے کسی محل وود تعداد کے مجموعہ کی انتہائی قیمت ان تفاعلوں کی انتہائی قیمتوں کے مجموعہ کے مساوی ہوتی ہے بشرطیکہ یہ تمام انتہائی قیمتیں محدود ہوں۔

۲۔ تفاعلوں کے کسی محل وود تعداد کے حاصل ضرب کی انتہائی قیمت ان تفاعلوں کی انتہائی قیمتوں کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتی ہے بشرطیکہ یہ تمام

انتہائی قیمتیں محدود ہوں۔

۳۔ دو تفاعلوں کے خارج قسمت کی انتہائی قیمت ان تفاعلوں کی انتہائی قیمتوں کے خارج قسمت کے مساوی ہوتی ہے بشرطیکہ یہ انتہائی قیمتیں محدود ہوں اور مقسوم علیہ صفر نہ ہو۔

ان مسائل کے ثبوت کا طریقہ دی ہے جو دفعہ (۱۲) میں دیا گیا ہے۔ اس دفعہ کے مسائل مسائل یا لا کی خاص صورتیں ہیں۔

مثلاً فرض کرو کہ 'لا' کے دو تفاعل 'ع' و 'ہ' اور جس طرح 'لا' کے قریب آتا ہے ان تفاعلوں کی انتہائی نشیں علی الترتیب 'ع' و 'ہ' حاصل ہوتی ہیں۔ تب اگر ہم

لکھیں تو $ع + ع = ع$ اور $ع + ع = ع$ کے تفاعل ہوں گے جنکی انتہائی قیمتیں صفر ہیں۔

$$m + n = (e + g) - (d + f)$$

$$e - e = e + e = e + e + e$$

$$\frac{6-9}{9+9} = \frac{6}{9} - \frac{9}{9}$$

اور دفعہ (۱۲) کی طرح لا کو کافی طور پر لا کے قریب لا کر ہم مذکورہ بالا شرائط کے تحت بائیں طرف کو مطلق قیمت میں کسی مقررہ مقدار سے چھوٹی بنا سکتے ہیں خواہ یہ مقدار اتنی ہی چھوٹی ہو۔

۲۱۔ مثالیں۔

ہم نے دفعہ (۱۹) میں یہ دیکھا ہے کہ ایک مسلسل تفاعل کی انتہائی قیمت متغیر متبوع لا کی کسی قیمت لا کے لئے خود تفاعل کی قیمت ہوتی ہے بشرطیکہ لا کی اس قیمت کے لئے تفاعل کی قیمت موجود ہو۔ لیکن متغیر متبوع کی چند تنبیہا سروس پر کی قیمتوں کے لئے یہ ممکن ہے کہ تفاعل کا وجود نہ ہو یا تفاعل غیر معین ہو جائے حالانکہ لا کی ان قیمتوں کے لئے جو ان قیمتوں سے لا انتہائی قلیل

فرت کہتی ہیں 'تفاعل' موجود ہو۔ یہی وہ صورتیں ہیں جنہیں "انتہائی قیمت" کا تحمل زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔
مثال ۱۔ تفاعل

$$\frac{1}{1 - \sqrt{2}} - 1$$

یہاں ۱ کے درمیان لا کی کسی قیمت کے لئے تمام جبری اعمال جاری ہو سکتے ہیں جو اس صورت کے جبکہ لا کی قیمت صفر بن جائے۔ اس صورت میں کسر کی شکل صفر ہو جاتی ہے۔ اب خارج قیمت کی یہ تعریف ہے کہ اگر اس کو ب سے ضرب دیا جائے تو حاصل ہو اور چونکہ کسی محدود مقدار کو صفر سے ضرب دینے سے صفر حاصل ہوتا ہے اس لئے یہ ظاہر ہے کہ صفر کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو 'غیر معین' کہتے ہیں۔
بہر کیف دی ہوئی کسر کے شمار کنندہ اور نسب نامہ کو $1 + \frac{1}{1 - \sqrt{2}}$ سے ضرب دیکر ہم اس کو اس شکل

$$\frac{1}{1 - \sqrt{2}}$$

میں رکھ سکتے ہیں اور یہ کسر ۱ کے درمیان لا کی تمام قیمتوں کے لئے سوا صفر قیمت کے

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1 - \sqrt{2}}}$$

کے مساوی ہے۔ اب چونکہ یہ تفاعل مسلسل ہے اور لا = ۰ کے لئے اس کا وجود ہے اس لئے لا = ۰ کے لئے اس کی انتہائی قیمت $\frac{1}{2}$ ہے۔
مثال ۲۔ تفاعل

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2}} - \frac{1}{1 - \sqrt{2}}$$

پرمغور کرد۔ یہاں جس طرح لا سلسل بڑھتا ہے یہ تفاعل غیر معین شکل $\infty - \infty$ اختیار کرنے پر مائل ہوتا ہے۔ لیکن تفاعل کو

۱

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}$$

کی متماثل شکل میں رکھنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لا ∞ کے لئے اس کی انتہائی قیمت صفر ہو جاتی ہے۔
مثال ۳۔ دئے ہوئے رفاص کے امتیاز کے دور کو سمت صا کا تفاعل قرار دیں تو صفر اور ۳ کے درمیان صا کی تمام قیمتوں کے لئے دور کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے لیکن صا کی انتہائی قیمتیں صفر اور ۳ لینے پر اس کا وجود نہیں ہوتا۔ ہر کیف جس طرح صا صفر کے قریب آتا ہے دور ایک خاص انتہائی قیمت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس انتہائی قیمت کو علم حرکت میں اس طور پر موسوم کیا جاتا ہے کہ یہ لا انتہا چھوٹی فوس میں امتیاز کا وقت ہے

۲۲۔ چند خاص انتہائی قیمتیں۔

حسب ذیل مثالیں تفرقی احصا میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔
۱۔ م کی تمام منطقی قیمتوں کے لئے

$$\text{نسا} = \frac{(1^2 - 1^2)}{(1 - 1)} = \frac{1^2 - 1^2}{1 - 1} = \dots \dots \dots (1)$$

اگر م مثبت صحیح عدد ہو تو

$$\text{نسا} = \frac{(1^2 - 1^2)}{(1 - 1)} = \frac{(1^2 - 1^2 + 1^2 - 1^2 + \dots + 1^2 - 1^2)}{(1 - 1)} = \dots \dots \dots$$

کیونکہ ارتقام کی تعداد (م) محدود ہے اس لئے مجموعہ کی انتہائی قیمت مختلف ارتقام کی انتہائی قیمتوں کے مجموعہ کے مساوی ہے (دفعہ ۲۰)۔

اگر م منطق کسر ہو تو فرض کر دو کہ یہ کسر $\frac{پ}{ق}$ ہے۔ نیز فرض کر دو کہ

$$لا = ما، ر = ب$$

$$\frac{لا - ر}{لا - ر} = \frac{ما - ب}{ما - ب} = \frac{پ - ق}{پ - ق}$$

نو
یکسر

$$\frac{پ - ق}{پ - ق}$$

$$\frac{ما - ب}{ما - ب}$$

$$\frac{پ - ق}{پ - ق}$$

کے مساوی ہے۔ بھلی صورت ہے اس کسر کے شمار کنندہ کی انتہائی قیمت پ ب پ اور ضرب نام کی انتہائی قیمت ق ب ق ہے۔ اسلئے مطلوبہ انتہا

$$\frac{پ - ق}{پ - ق} = \frac{پ - ق}{پ - ق} = \frac{پ - ق}{پ - ق}$$

ہے جو وہی ہے۔

اگر م منفی ہو تو فرض کر دو کہ م = - ن جس سے

$$\frac{لا - ر}{لا - ر} = \frac{لا - ر}{لا - ر} = \frac{لا - ر}{لا - ر}$$

اگر ن منطق ہو تو اس کی انتہائی قیمت بھلی صورتوں کی مدد سے

$$- \frac{پ - ق}{پ - ق} \times \frac{پ - ق}{پ - ق} = - \frac{پ - ق}{پ - ق} = - \frac{پ - ق}{پ - ق}$$

ہے۔

۲۔ یہ ثابت کرنا مطلوب ہے کہ

$$\text{نسبہ} = \frac{\text{جب طہ}}{\text{طہ}} = ۱، \text{نسبہ} = \frac{\text{س طہ}}{\text{طہ}} = ۱ \dots\dots\dots (۲)$$

اگر ہم دائرہ کی قوس کے 'طول' کی تعریف (دفعہ ۱۱) کی طرف رجوع کریں تو ان بیانات کی صداقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ شکل (۱۴) میں اگر زاویہ ن وق چار قائمہوں کا $\frac{1}{4}$ ہو تو ن x ن ق، ن ضلعوں والے اندرونی منظم کثیر الاضلاع کا گھیرا ہو گا اور ن (ن + ن ق) متناظر جانٹ کثیر الاضلاع کا گھیرا ہو گا۔
اب اگر

$$\begin{aligned} \text{طہ} &= > \text{ن و} ۱ = \frac{\pi}{\text{ن}} \\ \text{تو} \quad \text{وتر ن ق} &= \frac{\text{ن ل}}{\text{قوس ن ق}} = \frac{\text{جب طہ}}{\text{طہ}} \\ \text{اور} \quad \text{ن + ن ق} &= \frac{\text{ن ت}}{\text{قوس ن ق}} = \frac{\text{س طہ}}{\text{طہ}} \end{aligned}$$

پس کسور

$$\frac{\text{جب طہ}}{\text{طہ}} \text{ اور } \frac{\text{س طہ}}{\text{طہ}}$$

سے وہ نسبتیں تعبیر ہوتی ہیں جو متذکرہ بالا کثیر الاضلاع کے گھیروں کو بالترتیب دائرہ کے گھیرے سے ہیں۔ پس ن جب مسلسل بڑھتا ہے تو ہر کسر انتہائی قیمت میں اکائی کی طرف مال ہوتی ہے (دفعہ ۱۴)۔

استدلال بالا میں یہ مان لیا گیا ہے کہ طہ، π کا زیر اضعاف ہے۔ لیکن شکل میں زاویہ ن وق کی قیمت کچھ ہی ہو ہر صورت میں وتر ن ق > قوس ن ق اور ت ن + ن ق < قوس ن ق

یعنی $\frac{\text{جب طہ}}{\text{طہ}} > ۱$ اور $\frac{\text{س طہ}}{\text{طہ}} < ۱$ ۔ پس ان کسروں کی علی الترتیب اوپر کی اور نیچے کی انتہا ہونی چاہئے اور متذکرہ بالا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ انتہائیں اکائی کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتیں۔

ذیل کی عددی جدول سے یہ معلوم ہوگا کہ کس طرح متذکرہ بالا تفاعل طہ کو مسلسل گھٹانے سے اپنی مشترک انتہائے قریب آتے ہیں۔

ن	$\frac{\text{طہ}}{\pi}$	$\frac{\text{جب طہ}}{\text{طہ}}$	$\frac{\text{مس طہ}}{\text{طہ}}$
۴	۵۲۵	۵۹۰۰۳۲	۱۵۲۷۳۲۴
۵	۵۲۰	۵۹۳۵۴۹	۱۵۱۵۶۳۲
۱۰	۵۱۰	۵۹۸۳۶۳	۱۵۰۳۴۲۵
۲۰	۵۰۵	۵۹۹۵۸۹	۱۵۰۰۸۳۱
۳۰	۵۰۲۵	۵۹۹۸۹۷	۱۵۰۰۲۰۶
∞	۵۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰

تیسرے اور چوتھے خانوں میں وہ نسبتیں درج ہیں جو ن ضلعوں واسطے اندرونی اور بیرونی یا حامل منتظم کثیر الاضلاع کے گھیسروں کو بالترتیب دائرہ کے گھیرے سے ہیں۔

۲۳۔ صفاریات۔ جب کوئی متغیر مقدار کسی عمل میں انتہائی قیمت صفر کی طرف مائل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدار آخر کار معدوم ہو جاتی ہے یا "لا انتہا چھوٹی" ہے۔

دو لا انتہا چھوٹی مقادیر مساوی کہلاتی ہیں جب ایک کو دوسری سے جو نسبت ہے اسکی انتہائی قیمت ایک ہو۔ مثلاً طہ جب صفر تھا کی طرف مائل ہوتا ہے تو جب طہ اور طہ آخر کار مساوی ہو جاتے ہیں (دفعہ ۲۲ مثال ۲)۔ لا انتہا چھوٹی مقداروں کے رتبوں میں تیز کرنا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے پس اگر $\frac{1}{x}$ و $\frac{1}{y}$ دو متساوی ہوں جو صفر کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اگر نسبت $\frac{1}{x}$ و $\frac{1}{y}$ محدود ہو اور صفر نہ ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ لا انتہا چھوٹی مقدار ہے جسکا

رتبہ دی ہے جو جو کا ہے۔ لیکن اگر نسبت $\frac{و}{و}$ صفر کے مساوی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ $\frac{و}{و}$ لا انتہا چھوٹی مقدار ہے مگر اس کا رتبہ جو کے رتبہ سے بڑا ہے اگر $\frac{و}{و}$ کی انتہا محدود ہو اور صفر نہ ہو تو $\frac{و}{و}$ کو $\frac{و}{و}$ میں رتبہ کا صغاری کہتے ہیں جبکہ جو کو معیار قرار دیا جائے۔

مثال ۱۔ شکل ۱ میں جب زاویہ $\angle$ وق کو لا انتہا گھٹا دیا جائے تو $\angle$ اور $\angle$ آخر کار مساوی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ متشابہ مثلثوں کی مدد سے

$$\frac{و}{و} = \frac{و}{و}$$

$$\frac{و}{و} = \frac{و}{و} \quad \text{اور اس لئے}$$

$$\frac{و}{و} = \frac{و}{و}$$

اور نسبت $\frac{و}{و}$ کی انتہائی قیمت ایک ہے۔

پھر $\angle$ دوسرے رتبہ کا صغاری ہے اگر $\angle$ معیار قرار دیا جائے کیونکہ

$$\frac{و}{و} = \frac{و}{و} = \frac{و}{و} \quad \text{جس سے}$$

$$\frac{و}{و} = \frac{و}{و} = \frac{و}{و} \quad \text{مثال ۲۔ ہم جانتے ہیں کہ}$$

$$۱۔ \text{جم } \frac{و}{و} = ۲ \text{ جب } \frac{و}{و} = \frac{و}{و} \times \frac{و}{و} \quad (۱)$$

جب $\frac{و}{و}$ پہلے جزو ضربی کی انتہا ایک ہے۔ اس لئے ۱۔ جم $\frac{و}{و}$ دوسرے رتبہ کا صغاری ہے جبکہ معیار $\frac{و}{و}$ ہو۔

پھر

$$\text{سس طہ} - \text{جب طہ} = (\text{جب طہ} \div \text{طہ}) \times \frac{\text{جم طہ}}{\text{طہ}} \times \frac{\text{طہ}}{\text{طہ}} \dots (۲)$$

جب طہ ۔ تو پہلے دو اجزائے ضربی میں سے ہر ایک انتہا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پس سس طہ ۔ جب طہ تیسرے رتبہ کا صغاری ہے۔ شکل میں اس کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ن ت ۔ ن ل آخر کار تیسرے رتبہ کا ہے جبکہ ن کی معیار ہو۔ اصول ذیل کو پیش نظر رکھ کر ہم مختلف دلیلوں کو افتقار سے ساتھ بیان کر سکتے ہیں خصوصاً ایسی صورتوں میں جبکہ احصا کو ہندسہ اور علم حیل میں استعمال کیا جائے۔ اگر عہا اور بیہا ایک ہی رتبہ کے دو صغاریات ہوں اور اگر عہما اور بیہما دوسرے صغاریات ہوں جو آخر کار بالترتیب عہا اور بیہا کے مساوی ہو جائیں تو

$$\text{نسہا} \left(\frac{\text{عہما}}{\text{بیہما}} \right) = \text{نسہا} \left(\frac{\text{عہا}}{\text{بیہما}} \right) \dots (۳)$$

$$\text{کیونکہ} \quad \frac{\text{عہا}}{\text{بیہما}} = \frac{\text{عہا}}{\text{عہا}} \times \frac{\text{بیہا}}{\text{بیہا}} \times \frac{\text{عہا}}{\text{عہا}} \dots (۴)$$

اور بائیں طرف کے پہلے دو اجزائے ضربی کی انتہائیں بموجب فرض ایک کے مساوی ہیں۔ دفعہ ۲۰ سے نتیجہ زیر بحث حاصل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نتیجہ مقدار و دوران عمل میں بالآخر کسی قابل قیاس مقدار سے بھی بڑھ جاتی ہو تو اس کو 'لا انتہا بڑی' مقدار کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس قسم کی کسی مقدار کو معیار قرار دیا جائے تو کسی دوسری مقدار کو کم، وہیں رتبہ کی لا انتہا بڑی مقدار کہا جاتا ہے جبکہ $\frac{1}{\text{عہا}}$ کی انتہا محدود ہو اور صفر نہ ہو۔

اشکۃ نمبری ۱

(جبری تفاعل)

۱۔ ایک ہی شکل میں لا^۱ کی تزیینات حسب ذیل صورتوں میں معلوم کرو:-

* اس اصول کے استعمال کی اچھی مثال دفعہ ۶۳ میں ملے گی۔

۴۔ ثابت کرو کہ مساوات

$$۲ لا^۲ + ۳ لا^۱ + ۳ لا^۰ = ۵$$

کی تین حقیقی اصلیں ہیں۔ تقریبی طور پر ان کے مقامات معلوم کرو۔

$$۵۔ مساوات \quad ۲ لا^۲ - ۳ لا^۱ - ۳ لا^۰ + ۱۰ = ۰$$

کی اصلوں کے مقامات کی تعین تقریبی طور پر کرو۔

۶۔ ثابت کرو کہ طاق درجے کی ہر جبری مساوات کی کم سے کم ایک اہل حقیقی ہوتی ہے اور جفت درجے کی ہر مساوات میں جس کی پہلی اور آخری رٹوں کے مختلف علامت ہوں کم سے کم دو حقیقی اصلیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک مثبت اور دوسری منفی ہوتی ہے۔

امثلہ نمبری ۲

(دائری تفاعل)

۱۔ تفاعل ذیل کی ترتیبیں کیجئے۔

$$(۱) \quad ۱م لا، ۱م لا، ۱م لا + ۱س لا،$$

$$(۲) \quad ۱ج لا، ۱ج لا، ۱س لا،$$

$$(۳) \quad ۱ج لا + ۱ج لا، ۱ج لا + ۱ج لا، ۱ج لا + ۱ج لا،$$

$$(۴) \quad ۱ج لا، ۱ج لا، ۱ج لا، ۱ج لا$$

۲۔ ثابت کرو کہ مساوات

$$۱ج لا - ۱ج لا = ۰$$

کی ایک اہل اور $\frac{۲}{۳}$ کے درمیان واقع ہوتی ہے۔

امثلہ نمبری ۳

(تواتر)

۱۔ مقادیر

$$\frac{۲}{۱+۲}$$

کی علوی اور منغلی انتہائیں معلوم کرو جبکہ $۱ = ۲' ۲' ۲'$
۲۔ اگر تواتر

..... $۱' ۱' ۱' ۱' ۱' ۱' ۱' ۱' ۱' ۱'$

میں $۱ + ۱ = ۲$ ج + ج
جہاں ۲ اور ج مثبت ہیں اور $۲ > ۱$ تواتر کی انتہا $\frac{ج}{۲-۱}$ ہوگی خواہ ۱ کی
یکم ہی قیمت ہو۔
۳۔ مقادیر

..... $\{ \sqrt{۲+۲}, \sqrt{۲+۲}, \sqrt{۲+۲} \}$

جہاں $۱ + ۱ = ۲$
ایک صعودی تواتر بناتی ہیں جس کی انتہا ۲ ہے۔

۴۔ اگر $۱ + ۱ = ۲$ گ + گ

جہاں ۱ اور گ مثبت ہیں تو تواتر صعودی یا نزولی ہوگا بموجب اس کے کہ ۱ گ مساوات
 $۱ + ۱ = ۲$ گ کی مثبت اہل سے چھوٹا یا بڑا ہو اور ہر صورت میں اس کی انتہا یہ اہل ہو۔
۵۔ تواتر کی نوعیت کی جانچ کر جس میں

$\frac{۱}{۱+۱} = ۱$ گ

جہاں گ مثبت ہے۔ ثابت کر دو کہ اگر ۱ مثبت ہو تو تواتر کی انتہا مساوات
 $۱ + ۱ = ۲$ گ کی مثبت اہل ہے۔

۶۔ ایسی مقداروں کا تواتر معلوم کر دو مساوات

$۱ + ۱ = ۲$ لا

کی مثبت اہل کے قریب آئیں۔

۷۔ ثابت کر دو کہ قانون

$$\frac{لا}{س} = \frac{سن}{لا}$$

کے بموجب بننے والے تو اتر کی انتہا مساوات سن لا = لا کی اقل مثبت اصل ہے جہاں لا اور ۲ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

۸۔ اگر لا اور ب کے درمیان حسابی اور موسیقی اور اسطبا بالترتیب $\frac{لا}{ب}$ اور $\frac{ب}{لا}$ ہوں اور لا اور ب مثبت ہوں تو ایسے تو اتر کی مشترک انتہا $\frac{لا}{ب}$ اور $\frac{ب}{لا}$ ہوتی ہے جنکی ن دیں ارقام بالترتیب لا اور ب ہیں۔

۴۳

$$۹۔ اگر \frac{لا}{ب} = \frac{۱}{(لا + ب)} = \frac{ب}{لا + ب}$$

اور لا اور ب مثبت ہوں تو تو اتر جن کی ن دیں ارقام لا اور ب ہیں ایک مشترک انتہا کی طرف مستحق ہوتے ہیں۔
(اس انتہا کو لا اور ب کے درمیان حسابی ہندسی اوسط کہتے ہیں)

اشد نمبری ۴ (تفاضلوں کی انتہائی قیمتیں)

۱۔ لا کے لئے

$$\frac{جب لا}{لا} ، \frac{سن لا}{لا}$$

کی انتہائی قیمتیں معلوم کر دو۔

۲۔ لا کے لئے

$$\frac{جب لا}{لا} ، \frac{سن لا}{لا}$$

کی انتہائی قیمتیں معلوم کرو۔

$$۳- \quad ۱- \text{جب } \frac{۱}{۱} = ۱ \quad ۲- \text{جب } \frac{۱}{۱} = ۱$$

کی ترسیں بناؤ۔

۴- ثابت کرو کہ

$$۵- \quad \text{ثابت کرو کہ}$$

$$۶- \quad \text{ثابت کرو کہ}$$

$$۷- \quad \text{ایک دے ہوئے دائرہ کے اندرونی اور بیرونی مستقیم کثیر الاضلاع کھینچے گئے۔}$$

ثابت کرو کہ جب 'ن' بڑا ہو تو 'ن' ضلعوں والے اندرونی اور بیرونی کثیر الاضلاعوں کے رتبوں میں فرق 'ن' ضلعوں والے اندرونی اور بیرونی کثیر الاضلاعوں کے رتبوں کے فرق کا $\frac{1}{n}$ ہوتا ہے۔

۸- ایک خط مستقیم 'ا' ب اس طرح حرکت کرتا ہے کہ دو ثابت خطوط مستقیم 'ا' و 'ب' پر اس کے تقاطعوں 'ا' و 'ب' کا مجموعہ مستقل رہتا ہے۔ اگر 'ا' ب کے دو متصل محلوں کا نقطہ تقاطع 'ن' ہو اور 'ق' وہ نقطہ ہو جس پر زاویہ

'ا' و 'ب' کا نامف 'ا' ب کو قطع کرتا ہے تو 'ا' ب = 'ق' ب


۹- دائرہ کے نقطہ 'ا' میں سے وتر 'ا' ب کھینچا گیا اور 'ا' پ کے ماس پر ایک نقطہ 'ت' اس طرح لیا گیا کہ 'ا' ب = 'ا' ت' اگر 'ت' محدودہ 'ا' میں سے گزرتو 'ا' قطر کو 'ق' پر ملے تو 'ا' ق کی انتہائی قیمت جب 'ن' 'ا' کی طرف حرکت کرے دائرہ کے قطر کا دو چندان ہوتی ہے۔

۱۰۔ ایک خط مستقیم (ج) اس طرح حرکت کرتا ہے کہ دو ثابت خطوط مستقیم ولا، و ما پر اس کے نقطوں اور (ج) سے بنے والے مثلث (ا و ج) کا رقبہ مستقل رہتا ہے۔ ثابت کرو کہ (ج) کے دو متصل غلوں کے تقاطع کا انتہائی نقطہ (ج) کا وسطی نقطہ ہوتا ہے۔

۱۱۔ مستقل طول کا ایک خط مستقیم (ج) اس طرح حرکت کرتا ہے کہ اس کے سر دو ثابت علی القوائم خطوط مستقیم ولا، و ما پر رہتے ہیں۔ ثابت کرو کہ اگر (ج) کے دو متصل غلوں کا انتہائی نقطہ تقاطع ن ہو اور و سے (ج) پر جو عمود کھینچا جائے اس کا پائین ٹی ہو تو $\angle ن = ۹۰^\circ$ (ج)۔

۱۲۔ ایک دائری قوس کے سروں پر اور اس کے وسطی نقطہ پر تاس کھینچے گئے ہیں۔ ثابت کرو کہ ان تاسوں سے بنے والے مثلث کا رقبہ آخر کار اس مثلث کے رقبہ کا نصف ہوتا ہے جس کے اس نقاط تاس ہوں۔

۱۳۔ اگر $\angle ج ن$ ایک ناقص کا کوئی ثابت قطر ہو اور ق ہ اس قطر کا کوئی سین اور اگر ق پر کا تاس $\angle ج ن$ محدودہ کو ت پر ملے تو ثابت کرو کہ نسبت $ت ن : ن ہ$ کی انتہائی قیمت جبکہ $ن ہ$ لانا چھوٹا ہو ایک ہے۔



اگر نقطہ چپ کو ثابت رکھا جائے اور ق نقطہ چپ کے قریب لایا جائے تو یہ وتر عام ہندسی منحنی کی صورت میں ایک خاص انتہائی مقام چپ تک اختیار کرے گا اور ہم اسے نقطہ چپ پر ماسی خط کی تعریف قرار دیں گے۔ ایسا ممکن ہے کہ منحنی کے ایک یا زیادہ اکیلے نقطوں پر وتر کا کوئی انتہائی مقام نہ ہو۔ ماسی خط کی سمت اس زاویے سے حاصل ہوتی ہے جو چپ چپ خط و کلا سے بناتا ہے یعنی شکل میں زاویہ چپ ماسی کلا کی انتہائی قیمت ہے۔ فرض کرو کہ

$$۴۶ \quad \text{وم} = \text{لا} \text{، چپ م} = \text{ما} \text{، ون} = \text{لا} + \text{مف} \text{، قن} = \text{ما} + \text{مف} \text{، ما}$$

$$\text{تو سس چپ س لا} = \text{چپ م} = \frac{\text{ق ر}}{\text{چپ ر}} = \frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}} \dots (۲)$$


اب سوال صرف اتنا ہے کہ کسر $\frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}}$ کی انتہائی قیمت دریافت کی جائے جبکہ مف لا کی انتہا صفر ہو۔ اس کی انتہائی قیمت کو

$$\frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} \dots (۳) \quad \text{ترقیم} \quad \left[\frac{dx}{dy} = \frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} \right]$$

سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے ایک ہی علامت تصور کرنا چاہئے۔ کسی شکل کی انتہا حاصل کرنے کے طریقے کی یاد دہانی کے لئے برقرار رکھی گئی ہے۔ تخلیلاً اسی چیز کو فنا (لا) سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسے فنا (لا) کا شتق افعال کہتے ہیں۔

علامت (۳) سے جو منحنی کی خاصیت تعبیر ہوتی ہے اس کے لئے ہندسی نام تجویز کرنے میں بہت سہولت ہوگی۔ اس سخی میں ہم اصطلاح ”ڈھال“ کام میں لائیں گے۔ اگر ہم منحنی کے کسی نقطہ پر دائیں جانب ماسی خط دیکھیں تو ڈھال اس زاویہ کا شلشی ماس ہے جو ماسی خط محور لا کی مثبت سمت سے بناتا ہے۔ اگر یہ زاویہ منفی ہے تو ڈھال منفی ہو گا اور اگر ماسی خط و کلا کے متوازی ہے تو ڈھال صفر ہو گا۔ دیکھو شکل ۲۰

اکثر صورتوں میں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے ڈھال بھی خود لا کا مسلسل تفاعل ہوتا ہے اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ ایک یا زیادہ اکیلے نقطوں پر جہاں مماسی خط محور لا پر عمود وار ہو ڈھال لا انتہا ہو جائے۔ شکل میں ایسی صورت بھی دکھائی گئی ہے جبکہ ڈھال میں محدود مقدار کا توڑ یا عدم تسلسل ہے۔



شکل ۲۰

۲۵۔ مشتق تفاعل کی عام تعریف۔

چونکہ مشتق تفاعل کا تخیل ریاضی کی تمام شاخوں میں نہایت اہم ہے اس لئے اہم اس کی تعریف زیادہ باقاعده طور پر بغیر ہندسی مثالوں کی مدد کے درج کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ ما، متبوع تغیر لا کا خاص وسعت میں ایک مسلسل تفاعل ہے۔ اب اگر لا میں صف لا کا اضافہ کیا جائے جہاں لا + صف لا مذکورہ بالا وسعت میں واقع ہے اور اس کی وجہ سے ما میں صف ما کا اضافہ ہو تو لا کو ثابت مگر نسبت $\frac{\text{صف ما}}{\text{صف لا}}$ (۱) اضافہ صف لا کا تفاعل ہوگی۔

اب اگر صف لا اور اس کی وجہ سے صف ما سلسلہ وار کچھ قیمتیں اختیار کریں جنکی انتہا صفر ہو تو اس نسبت کی قیمت ایک معین اور واحد انتہائی

مقدار کی طرف مائل ہوگی۔ اس طرح حاصل شدہ قیمت کو ہم ما کا الجاظ لا کے مشتق تفاعل یا مشتق یا تفسیقی سرکسٹے۔ اور اس کو علامت $\frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}}$ (۲) سے ظاہر کریں گے۔

مختصر مشتق تفاعل (جب یہ وجود رکھتا ہو) اس نسبت کی انتہائی قیمت ہے جو تفاعل کے اضافہ کو متبوع متغیر کے اضافہ کے ساتھ ہے جبکہ دونوں اضافے لا انتہا چھوٹے ہو جائیں۔

اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ تعریف بالا میں ہم ایک خاص نسبت کی انتہائی قیمت کا ذکر کرتے ہیں نہ کہ مف ما اور مف لا کی انتہائی قیمتوں کی نسبت کا۔ مؤخر الذکر نسبت کی قیمت دریافت نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کی شکل غیر معین $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ ہے۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نسبت $\frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}}$ کی واحد انتہائی قیمت ہے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ متبوع متغیر کی وسعت کے اندر لا کی کسی درمیانی قیمت کے لئے اس نسبت کی انتہا صرف ایک ہی ہے خواہ مف لا مثبت جانب سے صفر کی طرف مائل ہو خواہ منفی جانب سے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مف لا کے مثبت یا منفی جانب سے صفر کی طرف آنے سے نسبت کی انتہا مختلف ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں مذکورہ بالا تعریف کے مطابق اصل مشتق وجود نہیں رکھتا، لیکن ان انتہائی قیمتوں کو ہم بالترتیب ”دائیں“ اور ”بائیں“ مشتق کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو شکل ۲۰۔

اس سوال کا جواب کہ نسبت $\frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}}$ کی کوئی معین انتہائی قیمت ہے

یا نہیں، تفاعل ما کی نوعیت پر منحصر ہے۔ جن تفاعلوں کے لئے یہ انتہا معین اور یگانہ نہ ہو (سوائے لا کی چند اکیلی قیمتوں کے لئے) انہیں ہم ”قابل تفرق تفاعل“

کہیں گے۔ باقی تمام تفاعل جو قابل تفرق نہیں ہیں ابتدائی سے علم احصا کی حدود سے باہر کر دیئے گئے ہیں۔

قابل تفرق تفاعل لازماً مسلسل ہوگا لیکن اس دعوے کا عکس صحیح نہیں ہے۔ مگر ایسے تفاعل جو مسلسل ہیں لیکن تفرق نہیں ہو سکتے وہ علم یا فنی میں بہت کم ملتے ہیں۔

مثلاً (۱) اشتق تفاعل کے لئے علاوہ فرما کے اور بھی بہت سی علامتیں ہم استعمال کریں گے۔ عموماً اس کو ظاہر کرنے کے لئے تفاعل کی علامت پر زبر لگا دیا جائیگا۔

پس اگر ما = فہ (۱)۔۔۔ (۲) اشتق تفاعل کو ما یا جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے فہ (۱) سے تعبیر کیا جائیگا۔

$$\text{اب چونکہ} \frac{\text{عف} \text{ ما}}{\text{عف} \text{ لا}} = \text{فہ} \text{ (لا + عف) (۱) - فہ} \text{ (لا) (۲)}$$

عف لا

اس لئے عف لا کی بجائے ہ لکھنے سے

$$\text{فہ} \text{ (لا) (۱) = فہ} \text{ (لا + ہ) - فہ} \text{ (لا) (۲) (۳)}$$

ہ

آئندہ یہ ضابطہ اکثر استعمال کیا جائیگا۔ کسی دے ہوئے تفاعل کے تفرقی سرور یافت کرنے کے عمل کو ہم "تفرق کرنا"

کہیں گے۔ اگر لا متبوع منفرج ہو تو "فہ" اس عمل کی علامت تصور کیا جاسکتی

ہے اور اسے واحد علامت "عف" سے ظاہر کرنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ پس لجا تا لا کے ما کے تفرقی سر کے لئے

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} \text{ ما اور عف ما میں سے کوئی سی بھی علامت}$$

کا ہمیں لائی جاسکتی ہے۔ نوٹ [عال تفرق کا اختصار عف = D]

ترجمہ

۲۶۔ طبیعی مثالیں۔ مختلف مضامین میں مشتق تفاعل کے استعمال کی

اہمیت اس بات پر مبنی ہے کہ اس سے اہل تفاعل کے اضافہ کی شرح کا ناپ حاصل ہوتا ہے جبکہ متبوع تغیر میں اکائی کا اضافہ ہو۔

مثلاً ہم پہلے ایک نقطہ کی خطی حرکت پر غور کریں گے۔ خط حرکت پر کسی مقررہ مبدا سے تحریک نقطہ کا فاصلہ میں وقت کا (جو کسی مقررہ آن سے ناپا گیا ہو) تفاعل ہو گا۔ ان تغیروں میں رشتہ اکثر ”رسمی“ مقامات کے معنی سے ظاہر کیا جاتا ہے جس میں فصلہ وقت کے متناسب ہوتا ہے اور عین میں کے اگر وقت

مف ت میں فاصلہ مف س ط ہو تو کسر مف مف ت وقفہ مف ت

میں ’اوسط رفتار‘ کہلاتی ہے یعنی بہ الفاظ دیگر اگر کوئی نقطہ اس مستقل رفتار سے حرکت کرے تو وہ اسی وقفہ مف ت میں وہی فاصلہ مف س ط کریگا۔ انتہا میں جبکہ مف ت اور اس کی وجہ سے مف س لا انتہا چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس اوسط رفتار کی انتہائی قیمت کو ہم اندرون تعریف آن ت پر کی رفتار کہیں گے۔ علم احصائی ترقیم میں رفتار و ذیل کی سادات سے حاصل ہوگی

$$و = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} \dots \dots \dots (۱)$$

مذکور بالا رسمی تعبیر میں و مقامات کے معنی کا احوال ہے۔

اب رفتار و خودت کا تفاعل ہے۔ اس رشتہ کو ظاہر کرنے والا نمونی رفتار کی نمونی کہلاتا ہے۔ اگر وقفہ مف ت میں رفتار میں مف و کا اضافہ

ہو تو کسر مف ت کو اس وقفہ میں رفتار کے اضافہ کی اوسط شرح یا اوسط

اسراع کہتے ہیں۔ اوسط اسراع کی انتہائی قیمت کو جبکہ مف ت لا انتہا چھوٹا ہو جاتا ہے، آن ت پر کا اسراع کہتے ہیں۔

$$\text{اگر عا اس اسراع کو ظاہر کرے تو عا} = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} \dots \dots \dots (۲)$$

تشریحی تعبیر میں صغائر قاری منہنی کا ڈھال ہے۔ ایک استوار جسم کی صورت میں جو ایک ثابت محور کے گرد گھوم رہا ہے اگر جسم کسی معیاری مقام سے شروع ہو کر زاویہ طہ میں سے گھوم جائے تو اوسط زاویہ رفتار 'وقفہ مفا' میں $\frac{\text{مفا}}{\text{مفا}}$ ہوگی اور ان تپہ کی زاویہ رفتار 'فرطہ' $\frac{\text{فرطہ}}{\text{مفا}}$ (۳) ہوگی۔

نیز اگر سہ اس زاویہ رفتار کے لئے استعمال کریں تو وقفہ مفا ت میں "اوسط زاویہ اسراع" $\frac{\text{مفا}}{\text{مفا}}$ سے ظاہر ہوگا اور ان تپہ کا زاویہ اسراع "فرسہ" $\frac{\text{فرسہ}}{\text{مفا}}$ (۴) ہے۔

نیز کسی شے کی سلاح کا طول تیش (طہ) کا تفاعل ہوتا ہے۔ اگر تیش طہ پر ایک ایسی سلاح کا طول لا ہو جس کا طول کسی معیاری تیش (فرض کردہ) تیش پر اکائی ہے تو $\frac{\text{مفا}}{\text{مفا}}$ تیش کے طہ سے طہ + مفا طہ تک جا میں سلاح کے خلی پھیلاؤ کی اوسط قدر ہے اور $\frac{\text{فرطہ}}{\text{فرطہ}}$ تیش طہ پر پھیلاؤ

کی قدر یا مہر ہے۔ بطور دوسری مثال کے فرض کرو کہ ایک مانع ہے جو آزادانہ سلسلہ وار چند ایسی شکلیں اختیار کر سکتا ہے کہ دباؤ (د) 'اکائی کمیت کے حجم (ح) کا ایک معین تفاعل ہے۔

اگر حجم ح سے ح + مفا ح ہو جائے تو کسر $\frac{\text{مفا}}{\text{ح}}$ اس نسبت کا ناپ ہے جو حجم کی کمی کو اصل حجم کے ساتھ ہے اور اس لئے اسے ہم "پچکاؤ" کہتے ہیں

اور فرما $\frac{1}{فرلا} = \frac{1}{نسا} = \frac{1}{(لا + لا + لا)} = \frac{1}{(لا)}$ (۴)
 تنفی علاست کی وجہ یہ ہے کہ جب 'لا' بڑھتا ہے تو ما گھٹتا ہے۔
 مثال ۴:- اگر ما = لا = لا (۵)

$$نمف ما = لا + لا - لا = \frac{لا}{لا + لا + لا}$$

$$\therefore \frac{مف ما}{مف لا} = \frac{1}{لا + لا + لا}$$

اس لئے انتہائیں جب 'لا' تو

$$\frac{1}{فرلا} = \frac{1}{لا} \dots \dots \dots (۶)$$

۲۸- معیاری تفاعلوں کا تفرق -

$$(۱) \dots \dots \dots (آ) \text{ اگر } ما = لا$$

$$\text{تو } \frac{مف ما}{مف لا} = \frac{(لا + مف لا) - (لا - لا)}{(لا + مف لا) - لا}$$

دفعہ ۲۲ (آ) میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ م کی تمام منطوق قیمتوں کے لئے مف لا ← کی صورت میں اس کسر کی انتہا م لا^{۱-۲} ہے۔

$$\text{پس } \frac{فرما}{فرلا} = م لا^{۱-۲} \dots \dots \dots (۲)$$

$$\text{مثال :- اگر } م = ۲ \text{ تو } \frac{فرما}{فرلا} = ۲$$

$$\text{اور اگر } م = \frac{1}{۲} \text{ تو } \frac{فرما}{فرلا} = \frac{1}{۲} \text{ دیکھو دفعہ ۲۷}$$

$$(۲) \dots \dots \dots \text{ اگر } ما = جب لا$$

تو مف لا کی بجائے ہ لکھنے سے حاصل ہوگا

$$\frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}} = \frac{\text{جب (لا+ہ) جب لا}}{\text{ہ}} = \frac{\text{جب } \frac{1}{4} \text{ ہ}}{\frac{1}{4} \text{ ہ}} \times \text{جم (لا+ہ)} \quad (۱)$$

اگر زاوے قوسی پیمانہ میں ناپے گئے ہوں تو دفعہ ۲۲ (۲) سے

$$\text{نسب} = \left[\frac{\text{جب (لا+ہ)}}{\frac{1}{4} \text{ ہ}} \right] = ۱$$

اور دوسرے جزو ضروری کی انتہائی قیمت جم لا ہے۔

$$\text{اس کے } \frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} = \text{جم لا} \quad (۳)$$

طالب علم شکل (۱۴) صفحہ (۲۲) میں جب لا کی ترکیب پر غور کرنا چاہئے اور اس امر کی تصدیق کرنی چاہئے کہ منحنی کا وصال اس ضابطہ کے مطابق بدلتا ہے۔

$$\text{(۴)} \quad \text{اگر ما} = \text{جم لا} \quad (۵)$$

$$\text{تو } \frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}} = \frac{\text{جم (لا+ہ) جم لا}}{\text{ہ}}$$

$$= \frac{\text{جب } \frac{1}{4} \text{ ہ}}{\frac{1}{4} \text{ ہ}} \times \text{جب (لا+ہ)} \quad (۶)$$

مذکور بالا اسی وجہ بنا پر اس کی انتہائی قیمت ہے

$$\text{(۷)} \quad \frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} = \text{جب لا} \quad (۸)$$

$$\text{(۹)} \quad \text{اگر ما} = \text{س لا} \quad (۱۰)$$

$$\text{تو } \frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}} = \frac{\text{س (لا+ہ) س لا}}{\text{ہ}}$$

$$= \frac{\text{جب (لا+ہ) جم لا - جب لا جم (لا+ہ)}}{\text{ہ جم لا جم (لا+ہ)}}$$

$$\frac{1}{\text{جم لا جم (لا ه)}} \times \frac{\text{جب ه}}{\text{ه}} =$$

اور انتہائیں

$$\text{فرما} = \frac{1}{\text{جم لا}} = \text{قط لا} \dots \dots \dots (۸)$$

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ما = مس لا کے منہی کا دھال نقاط عدم تسلسل کے درمیان ہمیشہ مثبت ہے۔ دیکھو شکل (۱۵) صفحہ (۲۲)۔

۲۹۔ سادہ قسم کے جملوں کو تفرق کرنے کے ضابطے۔ حاصل جمع کا تفرق۔ ۵۲

$$(۱) \dots \dots \dots \text{ج} + \text{ع} = \text{ما} \dots \dots \dots (۱)$$

جہاں ع متغیر لا کا مملوہ تفاعل ہے اور ج مستقل ہے۔

$$\text{پس} \quad \text{ما} + \text{مف} = \text{ع} + \text{مف} \quad \text{ع} + \text{مف} = \text{ج} + \text{مف}$$

$$\text{یعنی} \quad \frac{\text{مف} \text{ ما}}{\text{مف} \text{ لا}} = \frac{\text{مف} \text{ ع}}{\text{مف} \text{ لا}}$$

$$(۲) \dots \dots \dots \frac{\text{فرع}}{\text{فر لا}} = \frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} \dots \dots \dots (۲)$$

اگرچہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ تفرق کرنے میں جمع کیا ہوا مستقل غائب ہو جاتا ہے تاہم یہ امر نہایت ضروری ہے۔ اس کے ہندسی معنی یہ ہیں کہ کسی سطحی کو کلیتاً ماحور کے متوازی ہٹا دینے سے دھال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

$$(۲) \dots \dots \dots \text{اگر} \quad \text{ما} = \text{ع} + \text{و} \dots \dots \dots (۳)$$

جہاں ع اور و متغیر لا کے دئے ہوئے تفاعل ہیں تو دفعہ ۱۱ کے مطابق

$$\text{مف} \text{ ما} = \text{مف} \text{ ع} + \text{مف} \text{ و}$$

$$\text{یعنی} \quad \frac{\text{مف} \text{ ما}}{\text{مف} \text{ لا}} = \frac{\text{مف} \text{ ع}}{\text{مف} \text{ لا}} + \frac{\text{مف} \text{ و}}{\text{مف} \text{ لا}}$$

چونکہ ایک مجموعہ کی انتہائی قیمت علیحدہ علیحدہ رقموں کی انتہاؤں کے مجموعہ کے مساوی ہوتی ہے

$$\text{اس لئے} \quad \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} + \frac{\text{فرو}}{\text{فرلا}} \quad (۴)$$

نیز اگر $\text{ما} = \text{ع} + \text{و} + \text{طہ}$ (۵)
تو اوپر کے قاعدہ کو دو مرتبہ استعمال کرنے سے

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} + (\text{ع} + \text{و}) \frac{\text{فرو}}{\text{فرلا}} + \frac{\text{فوطہ}}{\text{فرلا}}$$

$$= \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} + \frac{\text{فرو}}{\text{فرلا}} + \frac{\text{فوطہ}}{\text{فرلا}} \quad (۶)$$

اس طریقہ پر کے بعد دیگرے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ تفاعلوں کی کسی محدود تعداد کے مجموعہ کا شقوق ان تفاعلوں کے جداگانہ مشتقات کا مجموعہ ہے۔

مثال :- $\text{جہد} \text{ لا}^1 \text{ لا}^2 \text{ لا}^3 + \dots + \text{لا}^1 \text{ لا}^2 + \text{لا}^1 \text{ لا}^3 + \dots + \text{لا}^1 \text{ لا}^n$

کا شقوق تفاعل $\text{م} \text{ لا}^1 \text{ لا}^2 + (\text{م} - ۱) \text{ لا}^1 \text{ لا}^3 + \dots + \text{لا}^1 \text{ لا}^n$ ہے۔

۵۲

۳۔ حاصل ضرب کا تفريق -

(۱) جہاں ج مستقل ہے اور ع تغیر کا تفاعل ہے،

$$\text{ما} = \text{مف} \text{ ج} = (\text{ع} + \text{مف} \text{ ع})$$

$$\text{اس لئے} \quad \text{مف} \text{ ما} = \text{ج} \times \text{مف} \text{ ع}$$

$$\text{اور} \quad \frac{\text{مف} \text{ ما}}{\text{مف} \text{ لا}} = \frac{\text{ج}}{\text{مف} \text{ لا}} \times \text{مف} \text{ ع}$$

$$\text{اس لئے انتہائیں} \quad \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{ج} \times \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} \quad (۲)$$

پس مستقل جزو ضربی تفرق کرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔
اس امر کے ہندسی معنی یہ ہیں کہ اگر کسی سختی کے معین ایک خاص نسبت
میں تبدیل کئے جائیں تو ذرا حال بھی اسی نسبت سے بدل جاتا ہے۔ دیکھو
شکل ۲، صفحہ (۱۱۹)

(۲) اگر ما = ع و (۳)
جہاں ع اور و دونوں لا کے تفاعل میں تو دفعہ ۱۲ کے مطابق
مف ما = (ع + مف ع) (و + مف و) - ع و
= و مف ع + ع مف و + مف ع مف و

اور اس لئے $\frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}} = \frac{\text{و مف ع} + \text{ع مف و}}{\text{مف لا}}$

اور اس کی انتہا لینے سے اس اصول کے مد نظر کہ حاصل ضرب کی انتہا علیحدہ علیحدہ
انتہاؤں کے حاصل ضرب کے مساوی ہے ہمیں ذیل کا ضابطہ حاصل ہوتا ہے

فر ما = و فر ع + ع فر و (۴)

اگر مساوات کے دونوں جانب ما = ع و سے تقسیم کئے جائیں

تو $\frac{\text{فر ما}}{\text{ما}} = \frac{\text{و فر ع}}{\text{ع}} + \frac{\text{ع فر و}}{\text{و}}$

اس نتیجہ کی آسانی سے توسیع کیجا سکتی ہے۔ پس اگر ما = ع و ط
تو ہی = ع و لکھنے سے ما = ہی ط

اس لئے اوپر کے قاعدہ کو دو مرتبہ استعمال کرنے سے حاصل ہوگا

$\frac{\text{فر ما}}{\text{ما}} = \frac{\text{و فر ع}}{\text{ع}} + \frac{\text{ع فر و}}{\text{و}} + \frac{\text{فر ط}}{\text{ط}}$

(۵) $\frac{\text{فر ما}}{\text{ما}} = \frac{\text{و فر ع}}{\text{ع}} + \frac{\text{ع فر و}}{\text{و}} + \frac{\text{فر ط}}{\text{ط}}$

اور اسی طرح اجزاء کی کسی محدود تعداد کے لئے اگر ہم آخر الذکر ضابطہ کی عام

شکل کے دونوں جانب ما = ع و ط سے ضرب دیں تو ذیل کا
نتیجہ حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{وط} \times \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} + \text{عط} \times \frac{\text{فرو}}{\text{فرلا}} + \text{عو} \times \frac{\text{فوط}}{\text{فرلا}} \dots (۶)$$

الفاظ میں اسے اس طرح بیان کر سکتے ہیں: مختلف اجزاء میں سے ہر ایک کو باقی
باری تغیر مانکر اور باقی اجزاء کو مستقل مانکر لا کے لحاظ سے مشتق نکالو تو حاصل ضرب
کا مشتق تفاعل ان جداگانہ دریافت کئے ہوئے مشتقوں کا مجموعہ ہوگا۔

مثال ۱۰۔ اگر ما = ع × ع × ع × ... م اجزاء تک = ع × ... (۷)

$$\text{تو } \frac{1}{\text{ما}} \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{1}{\text{ع}} \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} + \frac{1}{\text{ع}} \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} + \dots + \frac{1}{\text{م}} \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}}$$

$$= \frac{\text{م}}{\text{ع}} \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}}$$

$$\text{پس } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{م} \times \frac{1}{\text{ع}} \times \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} \dots (۸)$$

اس نتیجہ کا عام ثبوت جس میں م کے مثبت صحیح عدد ہونے کی قید نہیں ہے دفعہ
۲۲ میں دیا جائیگا۔

مثال ۱۱۔ اگر ما = جب لا جم لا (۹)

$$\text{تو } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{جم لا} \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} (\text{جب لا}) + \text{جب لا} \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} (\text{جم لا})$$

$$= \text{جم لا} \times \text{جم لا} - \text{جب لا} \times \text{جب لا}$$

$$= \text{جم لا} - \text{جب لا} = \text{جم لا} \dots (۱۰)$$

مثال ۱۲۔ اگر ما = لا جب لا (۱۱)

$$\text{تو } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{لا} \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} (\text{جب لا}) + \text{جب لا} \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} (\text{لا})$$

$$= \text{لا} \times \text{جم لا} + \text{لا جب لا} \dots (۱۲)$$

۳۱۔ خارج قسمت کا تفرق۔

فرض کرو کہ $\frac{ما}{و} = \dots\dots\dots (۱)$

جہاں عداد و تفریق کے معلوم تفرقات میں دفعہ ۱۲ کے مطابق

$$\frac{مف+ما}{و+مف+و} = \frac{ع+مف+ع}{و+مف+ع+مف+و}$$

$$\frac{مف+ما}{مف+و} = \frac{مف+ع}{و+مف+و}$$

اور انتہا میں $\frac{فرما}{فرلا} = \frac{ع+فر+ع}{و+فر+و} \dots\dots\dots (۲)$

۵۵

اسے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:- اگر کسی خارج قسمت کا مشتق نکالنا ہو تو نسب نما اور شمار کنندہ کے مشتق کے حاصل ضرب میں سے شمار کنندہ اور نسبت کے مشتق کا حاصل ضرب تفریق کرو اور اس حاصل تفریق کو نسب نما کے مربع سے تقسیم کرو۔

خاص شکل $\frac{ما}{و} = \dots\dots\dots (۳)$

خاص غور کے قابل ہے۔

$$\frac{مف+ما}{و+مف+و} = \frac{ا}{و} = \frac{ا}{و+مف+و}$$

$$\frac{مف+ما}{مف+و} = \frac{مف+ع}{و+مف+و}$$

فرما $\frac{فرما}{فرلا} = \frac{ا}{و} = \frac{فر+ع}{و+فر+و} \dots\dots\dots (۴)$

ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ عام مسئلہ (۲) میں $ع=۱$ اور $\frac{فر+ع}{و+فر+و} =$ رکھنے سے حاصل ہو سکتا تھا۔

مثال ۱:- $\frac{r^2l + l + 1}{r^2l + l - 1} = م$ (۵)

یہاں $\frac{فرع}{فرلا} = r + 1$ اور $\frac{فرو}{فرلا} = -r + 1$

پس $\frac{(r^2l + l + 1)(r - 1) + (r^2l + l - 1)(r + 1)}{r^2(l^2 + l - 1)} = \frac{فرما}{فرلا}$

(۶) $\frac{(r^2l - 1)r}{r^2(l^2 + l - 1)} =$

مثال ۲:- اگر $م = \frac{1}{ع}$ (۷)

جہاں م مثبت صحیح عدد ہے تو

$\frac{فرما}{فرلا} = -\frac{1}{ع^m} \times م = -\frac{فرع}{فرلا} \times م = -\frac{1-م}{ع} \times م$ (۸)

دیکھو دفعہ ۳۲

اس دفعہ کا ضابطہ دفعہ ۳۰ (۲) سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اگر $م = \frac{ع}{و}$ تو $ع = ما$ و

اس لئے $\frac{1}{ع} = \frac{فرع}{فرلا} = \frac{1}{و} + \frac{1}{ما} = \frac{فرو}{فرلا} + \frac{فرما}{فرلا}$ (۹)

پس $\frac{1}{ما} = \frac{فرما}{فرلا} = \frac{1}{ع} - \frac{فرع}{فرلا} = \frac{1}{و} - \frac{فرو}{فرلا}$ (۱۰)

یہ مذکورہ بالا ضابطہ (۲) کے معادل ہے۔

ذیل کی مثالیں ضروری ہیں۔

(آ) اگر $ما = سس لا = جب لا$ (۱۱)

$$\text{تو } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{جم لا فرلا} (\text{جب لا}) - \text{جب لا فرلا} (\text{جم لا})}{\text{جم لا}}$$

$$(۱۲) \dots\dots\dots \frac{\text{جم لا} + \text{جب لا}}{\text{جم لا}} = \text{قط لا}$$

نتیجہ دفعہ ۲۸ (۳) کے مطابق ہے۔

$$(۱۳) \dots\dots\dots \text{اسی طرح اگر ما} = \text{م لا}$$

$$(۱۴) \dots\dots\dots \text{تو ہم حاصل کر سکتے ہیں } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{قم لا}$$

$$(۱۵) \dots\dots\dots \text{اگر ما} = \text{قط لا} = \frac{۱}{\text{جم لا}}$$

$$(۱۶) \dots\dots\dots \text{تو } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{۱}{\text{جم لا فرلا} (\text{جم لا})} = \frac{\text{جب لا}}{\text{جم لا}}$$

$$(۱۷) \dots\dots\dots \text{اور اسی طرح اگر ما} = \text{قم لا}$$

$$(۱۸) \dots\dots\dots \text{تو } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{جم لا}}{\text{جب لا}}$$

جیسا کہ دفعہ ۲۵ میں بتایا گیا ہے اگر ہم لا کے لحاظ سے تفرق کرنے کے عمل کو علامت عف سے ظاہر کریں تو دفعات ۲۹ تا ۳۱ کے نتائج مختصر ذیل کی شکل میں بیان ہو سکتے ہیں۔

$$(۱۹) \dots\dots\dots \text{عف (ع+و)} = \text{عف+ع} \text{ و } \text{عف+و}$$

$$(۲۰) \dots\dots\dots \text{عف (ع+و)} = \text{و عف+ع} \text{ و } \text{و عف}$$

$$(۲۱) \dots\dots\dots \text{عف (ع/و)} = \frac{\text{و عف-ع} \text{ و } \text{و عف}}{\text{و}}$$

۳۲۔ تفاعل کے تفاعل کا تفرق۔

$$(۱) \dots\dots\dots \text{اگر ما} = \text{فا (ع)}$$

$$(۲) \dots\dots\dots \text{جہاں ع} = \text{ف (لا)}$$

اور علامتیں فَا اور ف معلومہ تفاعلوں کو ظاہر کرتی ہیں تو ثابت کرنا ہے کہ

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرع}} \times \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} = \text{فا} (ع) \times \text{ف} (لا) \dots (۳)$$

اگر مفا، مفا، مفا، ایک ساتھ کے اضافے ہوں تو مثلاً

$$\frac{\text{مفا}}{\text{مفلا}} = \frac{\text{مفا}}{\text{مفع}} \times \frac{\text{مفع}}{\text{مفلا}}$$

اور چونکہ حاصل ضرب کی اہتہ اجزاء کی اہتہاؤں کے حامل ضرب کے مساوی ہے

$$\text{اس لئے} \quad \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرع}} \times \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}}$$

ضابطہ (۳) کا مفید استعمال خطی حرکت کے نظریہ میں ہوتا ہے۔

اگر ہم دفعہ ۲۶ کے مطابق کسی متحرک نقطہ کی رفتار اور اسراع کو بالترتیب و اور ع سے تعبیر کریں تو

$$و = \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}} \text{ اور } ع = \frac{\text{فرو}}{\text{فرت}} \dots \dots \dots (۴)$$

اب اگر و کو طے شدہ فاصلہ میں کا تفاعل سمجھا جائے تو

$$ع = \frac{\text{فرو}}{\text{فرس}} \times \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}} = و \frac{\text{فرو}}{\text{فرس}} \dots \dots \dots (۵)$$

اسی طرح ایک محور کے گرد گھومنے والے استوار جسم کی صورت میں زاوی اسراع ذیل کے جملہ سے یلیگا جبکہ زاوی رفتار کو طے کا تفاعل مان لیا جائے

$$\frac{\text{فرسہ}}{\text{فرطہ}} \times \frac{\text{فرطہ}}{\text{فرت}} \text{ یعنی مسہ } \frac{\text{فرسہ}}{\text{فرطہ}} \dots \dots (۶)$$

ضابطہ (۳) سے ذیل کے اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$(۱) \quad \text{اگر } ما = \text{فا} (لا + ۱) \dots \dots \dots (۷)$$

تو مسئلہ (۳) میں $ع = لا + ۱$ اور $\frac{\text{فرو}}{\text{فرلا}} = ۱$ رکھنے سے

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{فأ (لا + ا)} \dots \dots \dots (۸)$$

حاصل ہوتا ہے۔

اس کی ہندی تفسیر یہ ہے کہ نسخی کو کھینا لا مور کے متوازی ہٹا دینے سے دُحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{فأ (گ لا)} \dots \dots \dots (۹)$$

۵۸

تورکو ع = گ لا پس $\frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} = \text{گ اور}$

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{گ فأ (گ لا)} \dots \dots \dots (۱۰)$$

حاصل ہوتا ہے۔

(۱۱) اگر ما = عا جہاں م کوئی منطق مقدار ہے
تو فأ (ع) = عا اور فأ (ع) = م عا^۱

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{م عا}^۱ = \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} \dots \dots \dots (۱۲)$$

خاص صورتوں میں جبکہ م = $\frac{۱}{۲}$ اور م = $\frac{۱}{۳}$ تو بالترتیب حاصل ہوتا ہے

$$(۱۳) \dots \dots \dots \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{فرلا}}{\text{ع}} = \frac{۱}{\text{ع}^۲} \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} \\ \frac{\text{فرلا}}{\text{ع}} = \frac{۱}{\text{ع}^۳} \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} \end{array} \right.$$

اب اوپر کے ضابطوں پر چند مثالیں دی جائیگی۔

$$\text{مثال (۱)} \dots \dots \dots \text{اگر ما} = \text{جب آ لا} \dots \dots \dots (۱۴)$$

یہی ما = عا جہاں ع = جب لا

$$\text{تو عفا ما} = \text{م عا}^۱ = \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} = \text{م جب آ لا} \text{جم لا} \dots \dots \dots (۱۵)$$

مثال (۲)۔ اگر $\sqrt{لا - لا^۲} = ما$ (۱۶)

تو عف $\sqrt{لا - لا^۲} = \frac{۱}{۲} (لا - لا^۲) \times \frac{۱}{۲} (لا - لا^۲)$ عف $(لا - لا^۲)$

$$(۱۷) \quad \frac{لا}{\sqrt{لا - لا^۲}} =$$

مثال (۳)۔ اگر $\sqrt{\frac{لا}{لا - لا^۲}} = ما$ (۱۸)

اس میں $ع = لا$ اور $و = \sqrt{\frac{لا}{لا - لا^۲}}$ رکھیں تو اس سے پہلی مثال کی بنا پر
عف $ع = ا$ اور عف $و = \frac{لا}{\sqrt{لا - لا^۲}}$ حاصل ہوتے ہیں۔

اب کسر کو تفرق کرنے کے قاعدہ سے

$$\frac{\frac{لا}{\sqrt{لا - لا^۲}} + \sqrt{\frac{لا}{لا - لا^۲}}}{\frac{لا}{\sqrt{لا - لا^۲}}} = \frac{عف ع - عف و}{و}$$

$$(۱۹) \quad \frac{\frac{لا}{\sqrt{لا - لا^۲}}}{\frac{لا}{\sqrt{لا - لا^۲}}} =$$

۳۳۔ مقلوب تفاعلوں کا تفرق۔

اگر ما متغیر $لا$ کا مسلسل تفاعل ہو تو چند شرائط نے ماتحت (دیکھو دفعہ ۱۶)
جو عموماً علم ریاضی کے عام تفاعلوں کی صورت میں پوری ہوتی ہیں $لا$ متغیر ما
کا مسلسل تفاعل ہوگا۔

اگر $لا$ اور ما کے متناظر اضافے مف $لا$ ، مف ما ہوں تو مثلاً

$$\frac{مف ما}{مف لا} \times \frac{مف لا}{مف ما} = ۱$$

پس چونکہ حاصل ضرب کی انتہا ان اجزاء کی انتہاؤں کے حاصل ضرب سے
سادہ ہے

اس لئے
$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} \times \frac{\text{فرلا}}{\text{فرما}} = 1 \dots\dots\dots (۱)$$

پس اگر یہ پہلے فرض کر لیا جائے کہ ما بلماظ لا کے قابل تفرق تفاعل ہے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ عموماً لا متغیر ما کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ اور یہ دونوں مشتق تفاعل ایک دوسرے کے تنکافی ہونگے۔ اس کی ہندسی تعبیر یہ ہے کہ سنخی کا ماس لا اور ما محوروں سے نیم زاوے بناتا ہے۔
ذیل کی صورتیں ضروری ہیں۔

(۱) اگر ما = جب لا $\dots\dots\dots (۲)$

تو لا = جب ما اور $\frac{\text{فرلا}}{\text{فرما}} = \text{جم ما}$

پس $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{1}{\text{جم ما}} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - \text{لا}^2}} \dots\dots\dots (۳)$

(۲) اگر ما = جم لا $\dots\dots\dots (۴)$


تو لا = جم ما اور $\frac{\text{فرلا}}{\text{فرما}} = - \text{جب ما}$

اور اسلئے $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = - \text{جب ما} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - \text{لا}^2}} \dots\dots\dots (۵)$

ان نتیجوں میں مبہم علامت کے لئے ذیل کی وجہ دی جاسکتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ما = جب لا تو ما متغیر لا کا کثیر القیمت تفاعل ہے یعنی ± 1 کے درمیان لا کی کسی مقررہ قیمت کے لئے ما کی قیمتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض قیمتوں کے لئے فرما / فرلا مثبت ہے اور بعض کے لئے منفی ہے۔ دیکھو شکل ۲۱ صفحہ (۸۶) اور اسی طرح جم لا کے لئے۔

مردجہ قرار داد کے مطابق اگر ہم جب لا سے وہ زاویہ سمجھیں جو

- $\frac{\pi}{4}$ اور $+\frac{\pi}{4}$ کے درمیان واقع ہے اور جبکہ جیب لہ کے مساوی ہے تو
 فریلا (جیب لہ) $= \frac{1}{\sqrt{1-\pi^2}}$ (۶)



شکل ۲۱

اسی طرح اگر جہم π کو صفر اور π کے درمیان محدود کر دیا جائے

$$\frac{f}{f'} = \frac{f''}{f'} = \frac{f'''}{f'} = \dots = \frac{f^{(n)}}{f'} \quad (4)$$

(۳) اگر $\frac{1}{a} = \frac{1}{b}$ (۸)

تو لا = مس ما اور $\frac{\text{فر ما}}{\text{فر ما}} = \text{قطر ما}$

اسلئے

$$(9) \dots\dots\dots \frac{1}{\frac{1}{x} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{x} + 1} = \frac{x}{1+x}$$

اس صورت میں کوئی مبہم علامت نہیں ہے۔ لا کی ہر قیمت کے لئے
 ما کی لا انتہا قیمتوں کا سلسلہ ہے لیکن ہر ایک کے لئے $\frac{1}{2}$ کی قیمت
 دی ہے۔ کیونکہ غنی ما = مس - لا کے متناظر نقطوں پر ماسی خطوط متوازی
 ہیں۔ دیکھو صفحہ ۲۲ (۸۹)۔

مثال ۱۔ اگر ما = جبہ (۱)

تو ما = جبۂ اع جہاں ع = $\frac{N}{\sqrt{N+1}}$

اب $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرء}} \times \frac{\text{فرء}}{\text{فرلا}} = \frac{1}{11-6} = \frac{\text{فرء}}{\text{فرلا}}$
یہ آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے کہ

$$\frac{1}{f(y+1)} = \frac{f}{f(y)} \Rightarrow \frac{1}{f(y+1)} = \frac{1}{f(y)} - 1$$

پس $\frac{f_2}{f_1} = \frac{1}{r_2 + 1} \dots \dots \dots (11)$

۱۶) دس گنا رکھنے سے آسانی سے ثابت ہو سکتا ہے کہ

$$\frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} \times \frac{1}{2\text{ح} + 1} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$$

$$\text{نیز } 1 + \text{ح} = \frac{2}{(2\text{ح} + 1) + 1} = \frac{2}{2\text{ح} + 2} = \frac{1}{\text{ح} + 1} \text{ اور } \frac{\text{فرع}}{\text{فرلا}} = \frac{(2\text{ح} + 1) + 1}{2} = \frac{2\text{ح} + 2}{2} = \text{ح} + 1$$


$$\text{اس لئے } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{1 - \text{لا}}{2\text{ح} + 1 + 2\text{لا}} \quad (۱۳)$$

۳۴۔ دو یا زیادہ متبوع متغیروں کے تفاعل۔ جزوی مشتق

اگرچہ اس کتاب کا اصل مقصد صرف ایک متبوع متغیر کے تفاعل پر غور کرنا ہے لیکن ابتدائی سے زیادہ عام نظریہ کے خیالات اور تنظیم سے واقف ہونا بعض اوقات مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

کئی مقدار دو یا زیادہ متبوع متغیروں (لا، ما، ...) کا تفاعل اس وقت کہلاتی ہے جبکہ وہ بالذکر کئی قیمتوں کے جابجائیں جو اختیاری اور ایک دوسرے سے بے تعلق ہو سکتی ہیں تین متغیروں کا وجود ہو۔ پھر وری ہے کہ ہر صورت میں متبوع متغیروں کی قیمتیں الکی جدا گانہ حد کے اندر لی جائیں پس اگر ایک دی ہوئی سطح پر کوئی نقطہ چاہا ہو اور پ ن کسی ثابت انجی ستوی پر عمود ہو تو بلندی چپ ن نقطہ ن کے عمود (لا، ما) کا تفاعل ہے۔

(۶۳)



اسی طرح طبیعیات میں گیس کا دباؤ دو متبوع متغیروں حجم (فی اکائی کیت) اور
تپش کا تفاعل ہے۔ تفاعلی رشتہ شکل ذیل کی مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ع = فہ (لا، ما،)^(۱)
نمذورہ بالا سطح کی خاص صورت میں اگر ہم بلندی پ ن کو ی سے ظاہر کریں تو
ی = فہ (لا، ما،)^(۲)

تسلسل کی تعریف کو (جو دفعہ ۸ میں دی گئی ہے) موجودہ صورت میں اس
طرح توسیع دیا جاسکتی ہے۔ تفاعل فہ (لا، ما،) متبوع متغیروں
لا، ما، کی قیمتوں کے خاص جٹ کے لئے مسلسل کہلائیگا اگر کسی
دی ہوئی مقدار (جو کتنی ہی چھوٹی ہو) کے جواب میں (صفر سے مختلف)

ایک مقدار صہ ایسی دریافت ہو سکے کہ اخافوں
فف (لا، مف، ما،) کی صہ سے کم تمام مطلق قیمتوں کے لئے
فہ (لا، مف، لا، ما، مف، ما،) اور فہ (لا، ما،) کے فرق
کی مطلق قیمت صہ سے کم ہو۔

پس دو متبوع متغیروں کی خاص صورت میں (جس کو شکل میں دکھایا گیا
ہے) شرط تسلسل کا مفہوم یہ ہے کہ مستوی (لا، ما،) کے ہر ایک نقطہ پر ایسا
جاسکتا ہے کہ اس متغیروں کے اندر کے تمام نقطوں کے مقیموں کا فرق
پ ن سے صہ کی نسبت کم ہو جہاں صہ کتنی ہی چھوٹی مقدار ہو سکتی ہے

اب فرض کرو کہ تفاعل ع = فہ (لا، ما،)^(۳)
مسلسل ہے اور تمام متبوع متغیر سوائے (لا) کے مستقل رکھے جاتے ہیں،
تب یہ فرض کر کے کہ ع متغیر (لا) کا قابل تفرق تفاعل ہے اسکا مشتق تفاعل

بلحاظ لا کے ع کا جزوی تفرقی سر یا جزوی مشتق کہلاتا ہے اور ہم اسے جف ع
جف لا سے تعبیر کریں گے۔

نوٹ:- علامت "جف" جزوی تفرق کا اختصار ہے جف ما = جف لا (سہج)

پس جف ۶ = نہا $\frac{\text{فہ (لا) مف لا 'ما' ...}}{\text{مف لا}} \dots (۴)$

اسی طرح جف ۶ = نہا $\frac{\text{فہ (لا) ما + مف ما' ...}}{\text{مف ما}} \dots (۵)$

سطح (۲) کی صورت میں ظاہر ہے کہ اگر سطح کو چپ میں سے مستوی سے ولا اور سے ویا کے متوازی مستویوں سے کاٹا جائے تو جف ہی اور جف ہی بالترتیب ان تراشوں کے ڈھال ہیں۔ شکل میں یہ تراشیں ہگ اور ل م ہیں۔ مثال ۱۔ اگر ہی = لا ا م ا ن (۶)

تو جف ہی = م لا ا م ا ن اور جف ہی = ن لا ا م ا ن (۷)

مثال ۲۔ اگر فنز کر لیں کہ گیس کے دباؤ (د) 'جم (ح) 'اوتیش (طہ) میں ذیل کارشتہ ہے

د = ح طہ (۸)

تو جف د = ح طہ اور جف د = ح طہ (۹)

۳۵۔ تفسینی تفاعل۔

فہ (لا) ما' = ... (۱)

کے نمونہ کی مساوات عموماً ما کو لا کے تفاعل کی شکل میں بیان کرتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم لا کو کوئی قیمت دیں تو مایں حاصل شدہ مساوات کی ایک یا زیادہ معین اصلیں ہوں گی۔ یہ اصلیں حقیقی یا خیالی ہو سکتی ہیں لیکن ہم صرف ان صورتوں پر غور کرنے جن میں خاص حدود کے اندر لا کی تمام قیمتوں کے لئے مای (کم از کم) ایک حقیقی اصل وجود رکھتی ہو۔ اصطلاح 'تفسینی تفاعل'

اس طور پر معلوم کئے ہوئے تفاعلوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے متقابل ایسے
تفاعلوں کے جیسے

$$\text{ما} = \text{ف (لا)} \dots \dots \dots (۲)$$

جہاں ما نصیری طور پر لا کی قوم میں دیا گیا ہے۔

$$\text{فما} = \text{ف (لا، ما)} \dots \dots \dots (۳)$$

ایک سطح کی مساوات تصور کی جائے تو مساوات (۱) ستوی (می) = س کے
قطع کی ہوئی سطح کی تراش کی مساوات ہے۔ اگر ستوی لا ما کو افقی مانا جا
تو می = ج کی تراشیں (جہاں ج کی مختلف مستقل قیمتیں ہیں) سطح کے
نقشی خطوط " (Contour-lines) کہلاتے ہیں۔

اگر تفصیلی تفاعل کو تفریق کرنا مقصود ہو تو ممکن ہے کہ پہلے مساوات (۱) کو
ما کے لئے حل کر لیا جائے تاکہ وہ شکل (۲) میں تبدیل ہو جائے۔ تاہم ایسی
صورتوں کے لئے جن میں یہ طریقہ تکلیف دہ یا غیر ممکن ہو کوئی قاعدہ دریافت کرنا
مضبوط ثابت ہوگا۔ فی الحال ہم صرف (لا، ما) کے منطبق صحیح تفاعل (فما، لا، ف) پر
غور کریں گے۔ منطبق صحیح تفاعل اسے وہ تفاعل مراد ہے جہاں نمونہ (۱) لا، ما
کی ارقام کے محدود سلسلہ کا حاصل جمع ہو جہاں م اور ن صحیح اعداد
۱، ۲، ۳، ۴ وغیرہ میں سے کوئی قیمت اختیار کر سکتے ہیں۔ چونکہ مفروضہ کی
رو سے ف (لا، ما) ہمیشہ صفر ہے اس لئے لا کے لحاظ سے اس کا
مشق تفاعل بھی صفر ہوگا۔

اب دفات ۲، ۳، ۴ اور ۵ کی رو سے

$$\frac{\text{فر}}{\text{فر}} (\text{لا، ما}) = \text{م لا} + \text{ن لا، ما} + \frac{\text{فر}}{\text{فر}}$$

$$\text{اس لئے اگر فما (لا، ما) = ج ل م ن لا، ما} \dots \dots \dots (۴)$$

$$\text{تو ج ل م ن لا، ما} + \text{ج ل م ن لا، ما} = \frac{\text{فر}}{\text{فر}} \dots \dots \dots (۵)$$

دفعہ ۳۴ کی ترقیم کے مطابق یہ شکل ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۶) \dots\dots\dots \frac{\text{جف فہا}}{\text{جف لا}} + \frac{\text{جف فہا}}{\text{جف ما}} = \frac{\text{جف فہا}}{\text{جف لا}}$$

$$(۷) \dots\dots\dots \frac{\text{جف فہا}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{جف فہا}}{\text{جف ما}}$$

چوتھے باب میں ثابت کیا جائیگا کہ نتائج (۶) اور (۷) تفاعل فہا (لا، ما) کی اس خاص صورت تک ہی محدود نہیں ہیں۔ تاہم یہ خاص صورت اکثر سندھی اطلاقات کے لئے کافی ہے۔

مثلاً

۱۶۶

(تفریق ابتدائی اصولوں سے)
ابتدائی اصولوں سے سوالات آٹھ کے تفاعلوں کے شوق دریافت کرو۔

$$۱- \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱}$$

$$۲- \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱}$$

$$۳- \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱}$$

$$۴- \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱}$$

$$۵- \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱}$$

$$۶- \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱} ، \frac{۱}{۱}$$

مس = عت + ۱/۲ عت ہو جاں ع اور ع مستقل ہیں تو
ثابت کرو کہ وقت پر رفتار ع + عت ہے اور سراع مستقل ہے۔

$$۷ - م = م + (۱ + \frac{1}{n})^2$$

$$۸ - م = م + \frac{n}{n-1}$$

$$۹ - م = م + \frac{n}{n-1}$$

$$۱۰ - م = م + \frac{n+1}{n-1}$$

$$۱۱ - م = م + \frac{n^2}{(n-1)^2}$$

$$۱۲ - م = م + (۱ + \frac{1}{n})^2$$

$$۱۳ - م = م + (۱ + \frac{1}{n})^2$$

$$۱۴ - م = م + (۱ + \frac{1}{n})^2$$

$$۱۵ - م = م + \frac{1}{n}$$

$$۱۶ - م = م + \frac{1}{n}$$

$$۱۷ - م = م + \frac{1}{n}$$

$$۱۸ - م = م + \frac{1}{n}$$

$$۱۹ - م = م + \frac{1}{n}$$

$$۲۰ - م = م + \frac{1}{n}$$

$$۲۱ - م = م + \frac{1}{n}$$

$$عف م = م + (۱ + \frac{1}{n})^2$$

$$عف م = م + \frac{1}{(n-1)^2}$$

$$عف م = م + \frac{1}{(n-1)^2}$$

$$عف م = م + \frac{n^2}{(n-1)^2}$$

$$عف م = م + \frac{n^2}{(n-1)^2}$$

$$عف م = م + (۱ + \frac{1}{n})^2$$

$$عف م = م + (۱ + \frac{1}{n})^2$$

$$عف م = م + (۱ + \frac{1}{n})^2$$

$$عف م = م + \frac{1}{n}$$

$$عف م = م + \frac{1}{n}$$

$$عف م = م + \frac{1}{n}$$

$$عف م = م + \frac{1}{n}$$

$$عف م = م + \frac{1}{n}$$

$$عف م = م + \frac{1}{n}$$

$$عف م = م + \frac{1}{n}$$

$$۲۲ - م = \frac{۱ - جم لا}{جم لا + ۱}$$

$$عف م = \frac{۲ جب لا}{جم لا + ۱}$$

اشد

(تفاعل کے تفاعل)

$$۱ - م = (لا + ۱) (لا + ۱) \text{ تر عف م} = (لا + ۱) (لا + ۱) (لا + ۱) (لا + ۱) (لا + ۱) (لا + ۱)$$

$$۲ - م = \frac{لا}{(لا + ۱)}$$

$$عف م = \frac{۱ - ن لا}{(لا + ۱)}$$

$$۳ - م = \sqrt{لا + ۱}$$

$$عف م = \frac{۱}{\sqrt{لا + ۱}}$$

$$۴ - م = \sqrt{(۱ + لا)(۲ + لا)}$$

$$عف م = \frac{۳ + لا^۲}{\sqrt{(۱ + لا)(۲ + لا)}}$$

$$۵ - م = \sqrt{لا - ۱} (لا + ۱)$$

$$عف م = \frac{لا^۳ - ۱}{\sqrt{لا - ۱}}$$

$$۶ - م = (لا - ۱) \sqrt{لا + ۱}$$

$$عف م = \frac{(لا^۲ + لا - ۱)}{\sqrt{لا + ۱}}$$

$$۷ - م = \frac{۱}{\sqrt{لا - ۱}}$$

$$عف م = \frac{لا - ۱}{\sqrt{لا - ۱}}$$

$$۸ - م = \frac{لا}{\sqrt{لا + ۱}}$$

$$عف م = \frac{۱}{\sqrt{لا + ۱}}$$

$$۹ - م = \frac{\sqrt{لا + ۱}}{لا}$$

$$عف م = \frac{۱}{\sqrt{لا + ۱}}$$

$$۱۰ - م = \frac{\sqrt{لا + ۱}}{لا - ۱}$$

$$عف م = \frac{۱}{\sqrt{لا + ۱}}$$

امشله
مقلوب تفاعل

۱- با حیات (۱-۱)

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

۲- ۶ = واجتالا

حفظہ جتلا = $\frac{1}{174-1}$

۱-۲-۳

$$\frac{1}{r^2 + 1} = \cos$$

۶-۷ = ۱۰

عقبات =

$$2^3 = 8$$

عفا = $\frac{1}{1.01}$

١- ما = جبة الإرجبة - ١٠

عفا

۷- ما = سن الا + سن ا

عفا =

۸- ما جب $\{ \sqrt{1-y}, \sqrt{1-y} \}$

$$\frac{2}{\sqrt{2}-1} = \text{عفا}$$

۹-۶ = ست

$$\frac{r}{r^2 y + 1} = \text{مفرد}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{x}{x + 1}$$

$$\frac{2}{n+1} = \text{مف}$$

۱۱- ما من اس عجب الا
۱۲- قطع عجب الا

عفاً = $\frac{\text{مس عفا}}{\text{قطعه عفا + حجم لا}}$

۹۔ اگر گیس کے حجم اور دباؤ میں رشتہ $d \propto \frac{1}{V}$ = مستقل ہو تو کمپی ایک گہ d کے مساوی ہے۔

مشلہ ۱۰

(۴۱)

(جزوی تفسیق)
۱۔ سطح xy = $(x^2 + y^2)$ کے نقشی خطوط کھینچو اور سطح کی عام شکل بیان کر دو۔
۲۔ نیز سطح xy = $(x^2 + y^2)$ کے نقشی (Contour) خط کھینچو اور سطح کی عام شکل بیان کر دو۔
۳۔ اگر $xy = f(x, y)$
تو ثابت کرو کہ $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ اور اس نتیجہ کی ہندسی تعبیر بتاؤ۔
۴۔ اگر $xy = f(x, y)$

تو ثابت کرو کہ $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ = xy

۵۔ اگر $xy = f(x, y)$


تو ثابت کرو کہ $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ = xy
۶۔ اگر $xy = f(x, y)$

تو ثابت کرو کہ $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$: $xy = f(x, y)$

۷۔ اگر $xy = f(x, y)$

تو ثابت کرو کہ $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial xy} = 0$

ا- اگر اولاً ۲ هـ لا ما ب ما ۲ گ لا ۲ ف ما ج =
 ثوابت کرد که فرما
 فرلا - = هـ لا ۲ هـ ما ۲ گ
 هـ لا ۲ ب ما ۲ ف



تیسرا باب

قوت نما تفاعل اور لوکار تہی تفاعل

۳۶۔ قوت نما تفاعل :- تفاعل زیر بحث کی تعریف کئی طرح کیجا جاسکتی ہے لیکن علم احصا اور اس کے اکثر اطلاقات کے مد نظر ذیل کی تعریف زیادہ نوزوں ہوگی۔ اہل تفاعل کی اساسی خاصیت ہے کہ یہ

فرما = گ ما (۱)

کے نمونہ کی مساوات کو پورا کرتا ہے جہاں گ کی نسبت یا منفی مستقل ہے۔ اسے الفاظ میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ کسی آن میں تفاعل کے اضافہ کی شرح کو تفاعل کی اسی آن کی نسبت کے ساتھ ایک مستقل نسبت ہوتی ہے مذکورہ بالا تعریف والے عام قوت نما تفاعل کے مقابلہ میں تفاعل

ما = و + ب لا (۲)

کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ اس کو خطی تفاعل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ترکیب ایک سیدھا خط ہے۔ درحقیقت ان دونوں میں وہی رشتہ ہے جو سود مرکب کو سود مفرد کے ساتھ ہے بشرطیکہ سود مرکب مستقل وقفوں کے بعد جمع ہونے کی بجائے مسلسل جمع ہوتا رہے۔

۱۔ بعد میں معلوم ہوگا کہ اگر لا نامعلوم مقدار ہے تو یہ لازماً ج و کی شکل کا ہوگا اور اصطلاح ”قوت نما“ تفاعل کی وجہ سے یہ ہے کہ اس میں متغیر لا بطور قوت نما کے شریک ہوتا ہے۔

تمام خطی تفاعل میں دو مستقل ہیں یعنی $\frac{1}{\text{حال ج}}$ اور ابتدائی قیمت ۱۔
اگر یہ بیان پہلے ہی سے کافی طور پر واضح نہ ہوتا تو ہم غالباً معیاری خطی تفاعل
اسے لیتے جنکا $\frac{1}{\text{حال ج}}$ اور ابتدائی قیمت دونوں ایک کے مساوی ہوں یعنی

$$\frac{1}{\text{حال ج}} = \frac{1}{\text{حال ج}} \quad (۳۱)$$

اب اس میں $\frac{1}{\text{حال ج}}$ اور $\frac{1}{\text{حال ج}}$ کے میانوں کو مناسب طور پر بدلنے سے عام خطی تفاعل
حاصل ہو سکتا ہے۔

اسی طرح عام قوت نامہ تفاعل میں بھی دو مستقل شریک ہیں یعنی مساوات
(۱) کا مستقل $\frac{1}{\text{حال ج}}$ اور ابتدائی قیمت جو فرض کرو کہ ج ہے۔

ابھی ثابت کیا جائیگا کہ دو مستقل تفاعل کو پورے طور پر معین کر دیتے ہیں۔
ہم اس تفاعل کو معیاری تفاعل کہنے جس میں $\frac{1}{\text{حال ج}} = 1$ اور جس کی ابتدا
قیمت بھی ایک ہے۔

دوسرے لفظوں میں ہم قوت نامہ تفاعل کی تعریف مساوات

$$\frac{1}{\text{حال ج}} = \frac{1}{\text{حال ج}} \quad (۳۲)$$

کے اس عمل سے کرینگے جس کی قیمت ایک ہے جبکہ $\frac{1}{\text{حال ج}} = 1$ ۔

۳۳۔ سلسلہ قوت نامہ۔ سب سے پہلے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ایسے

تفاعل کا وجود ہے اور پھر اگر ممکن ہو تو کوئی ایسا ضابطہ دریافت کرنا ہے جس سے
لااکی کسی مقرر قیمت کے لئے تفاعل کی قیمت کسی مطلوبہ تقریبی تمام تک نکالی جاسکے۔
بطور آزمائش کے فرض کرو کہ مساوات

$$\frac{1}{\text{حال ج}} = \frac{1}{\text{حال ج}} \quad (۱)$$

کامل ذیل کے قوتی سلسلہ کا حاصل جمع ہے

$$\frac{1}{\text{حال ج}} = \frac{1}{\text{حال ج}} + \frac{1}{\text{حال ج}} + \dots + \frac{1}{\text{حال ج}} \quad (۲)$$

$$1) \frac{1}{1} + \frac{1+0.2}{1+0.2^2} + \dots + \frac{1}{5} + \frac{1}{3} + 1 = [(1) - (1)] \cdot \frac{1}{1} = 0$$

اگر لام اور لا متغیر کی دو قسمیں ہوں جنہیں ہم ایک ہی علامت کا فرض کر لیتے ہیں تو دفعہ ۵ کے ضابطہ (آ) اور (۲) کی رو سے ذیل کی سادائیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$\begin{aligned} & \dots + \frac{{}^0\mathcal{N} - {}^1\mathcal{N}}{{}^0\mathcal{C}_2} + \dots + \frac{{}^1\mathcal{N} - {}^2\mathcal{N}}{{}^1\mathcal{C}_2} + \frac{{}^2\mathcal{N} - {}^3\mathcal{N}}{{}^2\mathcal{C}_2} = ({}^1\mathcal{N})^m - ({}^0\mathcal{N})^m \\ & \dots + \frac{{}^2\mathcal{N} + {}^1\mathcal{N}, {}^1\mathcal{N} + {}^0\mathcal{N}, {}^2\mathcal{N} + {}^1\mathcal{N}}{{}^2\mathcal{C}_2} + \frac{{}^1\mathcal{N} + {}^0\mathcal{N}}{{}^1\mathcal{C}_2} \} ({}^1\mathcal{N} - {}^0\mathcal{N}) = \\ & (10) \dots \left\{ \dots + \frac{{}^{1-\mathcal{C}_2}\mathcal{N} + \dots + {}^2-\mathcal{C}_2}\mathcal{N}, {}^1-\mathcal{C}_2}\mathcal{N} + \dots + \frac{{}^{1-\mathcal{C}_2}\mathcal{N} + \dots + {}^2-\mathcal{C}_2}\mathcal{N}}{{}^0\mathcal{C}_2} + \dots \right\} \end{aligned}$$

فرض کرو کہ خط ایسی مثبت مقدار ہے کہ وہ لا اور لا میں سے بڑی مقدار کی مطلق قیمت کے مساوی ہے۔

اور نتیجہ (۱۰) میں خطوط وحدانی { کے درمیان کا سلسلہ مطلق قیمت کے لحاظ سے کم ہے یعنی ج (ظہ) سے

$$ظہ + \frac{ظہ^2}{3} + \dots + \frac{ظہ^{n-1}}{n-1} + \dots + ظہ^n$$
 (۱۱)

نیز ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ مساوات (۱) کا حل جو شرط $ما = ا' لا = ۰$ کے
تابع حاصل ہوتا ہے یگانہ حل ہے۔ کیونکہ اگر $ع$ اور $و$ دو ایسے حل ہوں
تو $\frac{ف}{ع} = ۶$ اور $\frac{ف}{و} = ۰$ (۱۸)
یعنی $و = \frac{ف}{۶}$ - $۶ = \frac{ف}{و}$ (۱۹)
یا $\frac{ف}{و} = \left(\frac{۶}{۰}\right) = ۰$ (۲۰)
اس لئے ثابت ہوا کہ $\frac{ف}{ع}$ کی نسبت مستقل ہے۔ اور اگر $ع = ا' و = ۰$
جبکہ $لا = ۰$ تو اس مستقل کا ایک ہونا ضروری ہے پس $۶ = ۰$ و
۳۸۔ مسئلہ جمع اور ق (لا) کی ترسیم۔

۶۶

عام تر مساوات $\frac{ف}{ما} = ک$ (۱)
ذیل کی صورت میں لکھی جاسکتی ہے
 $\frac{ف}{رگ لا} = ما$ (۲)
اور اسلئے اس کا حل شرط $ما = ا' لا = ۰$ کے ماتحت $ما = ق (رگ لا) \dots (۳)$ ہوگا۔
اب فرض کرو کہ
 $۶ = ق (لا) \times ق (ب لا) \dots (۴)$
تو $\frac{ف}{ع} = ا' ق (لا) \times ق (ب لا) + ب ق (ب لا) \times ق (لا)$

* اس میں ہم نے ایک بالکل ظاہر مسئلہ کو مان لیا ہے جس کا باضابطہ ثبوت
صفحہ ۵۶ میں دیا جائیگا۔

$$(۵) \quad = (۱+ب) ق (۱+لا) ق (ب+لا) = (۱+ب) ق (۱+لا) \dots (۵)$$

نیز ع کی ابتدائی قیمت ایک ہے۔ پس

$$(۶) \quad \dots \dots \dots \{ (۱+ب) ق (۱+لا) \} = ع$$

یعنی ۱ اور ب کی تمام قیمتوں کے لئے

$$(۷) \quad \dots \dots \dots ق (۱) \times ق (ب) = ق (۱+ب) \dots \dots (۷)$$

یہ قوت ناتفاعلوں کا مسئلہ جمع کہلاتا ہے۔


$$(۸) \quad \dots \dots \dots ق (لا) \times ق (-لا) = ق (۰) = ۱ \dots \dots (۸)$$

$$(۹) \quad \dots \dots \dots ق (-لا) = \frac{۱}{ق (لا)} \dots \dots (۹)$$

ہم نے پہلے ثابت کیا ہے کہ تفاعل ق (لا) سلسل ہے۔ نیز لا کی مثبت قیمتوں کے لئے ق (لا) کے سلسلہ کی ہر ایک رقم لا کے ساتھ بڑھتی ہے اور لا سے + ∞ کے لئے لا انتہا بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لئے حاصل جمع کے لئے بھی یہ بات ضروری طور پر صحیح ہے۔

علاوہ اس کے (۹) سے ظاہر ہے کہ اگر لا مثبت ہو تو ق (-لا) بھی مثبت ہوتا ہے اور مطلق قیمت میں کم ہوتا ہے جیسے لا بڑھتا ہے اور لا سے + ∞ کے لئے صفر ہو جاتا ہے۔ اس لئے جیسے لا کی قیمت - ∞ سے + ∞ تک بڑھتی ہے، تفاعل ق (لا) سلسل طور پر صفر سے + ∞ تک بڑھتا ہے اور ہر ایک درمیانی قیمت صرف ایک ہی مرتبہ اختیار کرتا ہے۔

صفحہ ۱۰ کی شکل ننھی ماہ ق (لا) کی ترسیم ہے۔ اور تفاعل ق (لا) کی عددی قیمتوں کا تختہ کتاب کے قلم برجدول (ع) میں دیا گیا ہے۔



شکل ۲۲

۳۹- عدد قو -

دفعہ ۳۸ کے نتیجہ (۷) کی توسیع حسب ذیل کیا جاسکتی ہے:-

$$ق (۱) \times ق (ب) \times ق (ج) = ق (۱+ب) \times ق (ج) = ق (۱+ب+ج) \dots (۱)$$

اور اسی طرح اجزاء ضربی کی کسی تعداد کے لئے -

اگر ہم ن اجزاء کو جنہیں سے ہر ایک ق (۱) کے مساوی ہے آپ میں ضرب

دیں تو

$$\{ق(۱)\} = ق(۱+۱+.....ن رقوم تک) = ق(ن)..... (۲)$$

مقدار ق (۱) یعنی سلسلہ

$$(۳) + \frac{1}{3!} + \frac{1}{2!} + 1 + 1$$

کو ہم علامت "قو" سے تعبیر کریں گے 'اعشاریہ کے سات مقام تک اپنی قیمت

اس ترقیم میں اگر ن کوئی مثبت صحیح عدد ہو تو

$$ق(ن) = قو..... (۴)$$

نیز اگر $\frac{۱}{۲}$ مفرد ترین رقوم میں کوئی حسابی منطوق کسر ہو تو

$$\{ق(\frac{۱}{۲})\} = ق(\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} + ...ن رقوم تک) = ق(۱) = قو$$

$$(۵) ق(\frac{۱}{۲}) = قو$$

پس اگر لا کوئی مثبت منطوق مقدار ہو صحیح عدد یا کسر تو

$$ق(لا) = قو..... (۶)$$

اب دفعہ ۳۸ (۹) سے حاصل ہوتا ہے کہ

$$ق(-لا) = ق(\frac{1}{لا}) = \frac{1}{قو} = -قو$$

یعنی نتیجہ (۶) لا کی تمام منطوق قیمتوں کے لئے صحیح ہے خواہ یہ مثبت ہوں یا منفی۔ یہ قابل توجہ ہے کہ لا کے غیر منطوق ہونے کی صورت میں علامت

قولا کی (ہنوز) تعریف نہیں کی گئی۔ اب ہم اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ

یہ ق (۹) کے سلسلے کے حاصل جمع کو تعمیر کر نیکی لے ایک اور علامت ہے۔ اس تعریف کا نامہ
 ہے کہ اس طریق کتابت سے ان جبریت قوانین کی یاد دہانی ہوتی ہے جنکو یہ فعال پورا کرتا ہے۔
 پس $قو \times قو = ق (۹) \times ق (۹) = ق (۸۱) = قو$
 جہاں ۹ اور ۸۱ منطق یا غیر منطق ہو سکتے ہیں۔

قو کی قیمت نکالنے کا عمل بالکل آسان ہے سلسلہ (۳) کی پہلی (۱۳) قمیں یہ ہیں

$$۱ = ۱ + ۱$$

$$۱۳ = ۱ + ۱۲$$

$$۱۳۶ = ۱ + ۱۳۵$$

$$۱۳۶۵ = ۱ + ۱۳۶۴$$

$$۱۳۶۵۲ = ۱ + ۱۳۶۵۱$$

$$۱۳۶۵۲۱ = ۱ + ۱۳۶۵۲۰$$

$$۱۳۶۵۲۱۳ = ۱ + ۱۳۶۵۲۱۲$$

$$۱۳۶۵۲۱۳۶ = ۱ + ۱۳۶۵۲۱۳۵$$

$$۱۳۶۵۲۱۳۶۵ = ۱ + ۱۳۶۵۲۱۳۶۴$$

$$۱۳۶۵۲۱۳۶۵۲ = ۱ + ۱۳۶۵۲۱۳۶۵۱$$

ان ہندسوں کا حاصل جمع ۲۶۷۱۸۲۸۱۳۰ ہے، باقی رقموں کو نظر انداز کر دینے سے جو غلطی
 یا خطا پیدا ہوتی ہے وہ سلسلہ $\frac{1}{13} + \frac{1}{13^2} + \dots$ کے حاصل جمع کے مساوی ہے۔

یہ سلسلہ کم ہے $\frac{1}{13} [1 + \frac{1}{13} + \frac{1}{13^2} + \dots]$ یعنی $\frac{1}{12}$ سے اور اس لئے
 اسکا اعشاریہ کے نویں مقام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پس اوپر کی جدول میں آخری ہندسوں کی
 خطاؤں کے لئے انجائش چھوڑتے ہوئے ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ اوپر کے
 نتیجہ سے اعشاریہ کے سات مقام تک قو کی صحیح قیمت حاصل ہوتی ہے۔
 ۴۰۔ زائد ہی تقاضا ہے۔ قوت ماتفاعل کے چند ایسے مرکب ہیں کہ

جن کے خواص علم مثلث کے عام تفاعلوں کے خواص کے ساتھ باقاعدہ مشابہت رکھتے ہیں، ان تفاعلوں کو ہم زائدی جیب، جیب التمام، ماس وغیرہ کہیں گے۔ انکی تعریفیں ذیل میں دی جاتی ہیں۔

$$\text{جہز لا} = \frac{1}{p} \cdot (q - q') = \frac{1}{p} \cdot \left(\frac{a}{\sin A} + \frac{a'}{\sin A'} + \dots \right) \quad (1)$$

$$\text{جہز لا} = \frac{1}{p} \cdot (q + q') = \frac{1}{p} \cdot \left(\frac{a}{\sin A} + \frac{a'}{\sin A'} + \dots \right) + 1$$

$$\text{مسلا لا} = \frac{\text{جہز لا}}{\text{جہز لا}} \quad \text{قطن لا} = \frac{1}{\text{جہز لا}} \quad (2)$$

$$\text{من لا} = \frac{\text{جہز لا}}{\text{جہز لا}} \quad \text{قمن لا} = \frac{1}{\text{جہز لا}}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ جہز لا تفاعل ہم لا کی طرح 'جفت تفاعل' ہے یعنی لا کی بجائے لا کہتے ہیں اسکی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا اور غلاف اس کے جہز لا تفاعل جب لا کی طرح طاق تفاعل ہے یعنی لا کی بجائے لا کہتے ہیں تفاعل کی مطلق قیمت وہی رہتی ہے لیکن علامت بدل جاتی ہے۔


شکل ۱۰ میں منحنی ما = تو اور ما = تو نقطوں والے خطوط سے دکھائے گئے ہیں۔

ہیں اور منحنی ما = جہز لا اور ما = جہز لا جو اوپر کے منحنیوں کے معینوں کے بالتسب نصف محور اور نصف فرق لینے سے حاصل ہوتے ہیں مسلسل خط میں دکھائے گئے ہیں۔

* چند باتوں میں ان تفاعلوں کو قائم زاد کے ساتھ وہی رشتہ بہتہ جو مستند تفاعلوں کو دائرہ کے ساتھ ہے۔ دیکھو دفعہ ۱۰۰ شال ۲۔

* یہ تفاعل ذرا مختلف طریق کا مستند دفعہ ۳ میں نمودار ہو چکے ہیں۔


* منحنی ما = جہز لا کو کم سکونیات میں زخمیرہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ کہ کجیاں کشافت والی زخمیرہ قوت جاذبہ کے زیر عمل آزادانہ لگ رہی ہو یہ شکل اختیار کرتی ہے۔



شکل ۲۵

چونکہ تفاعل جنس لا اور جنس لا مسلسل ہیں اور جنس لا کبھی صف نہیں ہوتا
اس لئے ثابت ہوا کہ مسٹر لا تغیر لا کی تمام قیمتوں کے لئے مسلسل ہے
شکل ۲۶ میں منحنی $MA =$ مسٹر لا کی ترسیم دکھائی گئی ہے خطوط $MA = \pm 1$ کے

تقارب ہیں۔*



چونکہ جنم لا + جنم لا = قو اور جنم لا - جنم لا = قو (۳)

اس لئے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے کہ

جنم لا - جنم لا = ۱ (۴)
نیز اسکو بالترتیب جنم لا اور جنم لا سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے کہ

$$(۵) \dots \dots \dots \begin{cases} \text{قطن}^2 \text{ لا} = ۱ - \text{مسن}^2 \text{ لا} \\ \text{قمن}^2 \text{ لا} = \text{ممن}^2 \text{ لا} - ۱ \end{cases}$$

نیز جنم لا + ما = ۱ (۶)

$$\frac{1}{4} = \{ (\text{جنم لا} + \text{جنم لا}) (\text{جنم ما} + \text{جنم لا}) (\text{جنم ما} - \text{جنم لا}) (\text{جنم ما} - \text{جنم لا}) \} \dots \dots \dots (۶)$$

۹ تفاعل جنم لا جنم لا اور مسن لا کی قیمتیں اشاریہ کے تین مقام تک لا کی قیمتوں سفر سے ۵ و ۲ تک کے لئے وقتوں ۱۰، ۱۱ پر تخمینہ کے جدول ح میں دی ہوئی ہیں۔

اور اسی طرح

۶۲

جبنہ (لا + ما) = جبنہ لا جبنہ ما + جبنہ لا جبنہ ما (۷)
 اور بالخصوص جبنہ (لا + جبنہ لا) = جبنہ لا جبنہ لا + جبنہ لا جبنہ لا (۸)
 نتیجہ (۴) اور (۵) ذیل کے غلطی نتائج کے مقابلہ میں

جبنہ لا + جبنہ لا = لا (۹)

قطر لا = لا + س لا (۱۰)

قلم لا = لا + م لا (۱۱)

اور اسی طرح نتیجہ (۸) ذیل کے نتیجوں کے مشابہ ہے

جبنہ لا + جبنہ لا جبنہ لا = لا جبنہ لا جبنہ لا (۱۲)

۲۱۔ زائدی تفاعلوں کا تفرق۔

(۱) اگر ما = جبنہ لا (۱)

$$\text{تو فرما} = \text{عف} \left(\frac{\text{قو} - \text{قو}}{۲} \right) = \frac{۱}{۲} (\text{عف قو} - \text{عف قو})$$

(۲) (۲)

اسی طرح اگر ما = جبنہ لا (۳)

تو فرما = جبنہ لا (۴)

(۲) اگر ما = مسنر لا (۵)

$$\text{تو فرما} = \text{عف} \left(\frac{\text{جبنہ لا}}{\text{جبنہ لا}} \right) = \frac{\text{جبنہ لا} \times \text{عف جبنہ لا} - \text{جبنہ لا} \times \text{عف جبنہ لا}}{\text{جبنہ لا}}$$

$$\text{جبنہ لا} = \frac{\text{جبنہ لا} - \text{جبنہ لا}}{\text{جبنہ لا}} = \text{قطر لا} \dots \dots (۶)$$

دفعہ ۳۰ (۴) کی مدد سے۔

اسی طرح اگر ما = ممز لا (۷)

- تو $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = - \text{قمنز لا}$ (۸)
- (۳) اگر $\text{ما} = \text{قطنز لا}$ (۹)
- تو دفعہ ۳۱ (۴) کی مدد سے

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{عف} \left(\frac{1}{\text{جمنز لا}} \right) = - \frac{\text{عف جمنز لا}}{\text{جمنز لا}} \text{ (۱۰)}$$

- اسی طرح اگر $\text{ما} = \text{قمنز لا}$ (۱۱)

$$\text{تو } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = - \frac{\text{جمنز لا}}{\text{جمنز لا}} \text{ (۱۲)}$$

۴۲۔ لوکارنتی تفاعل۔


قوت ما تفاعل کے مقلوب تفاعل کو لوکارنتی تفاعل کہتے ہیں۔

$$\text{اب اگر لا} = \text{فوا} \text{ تو } \text{ما} = \text{لوگ لا} \text{ (۱)}$$

دفعہ ۳۸ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے $\text{ما} = \infty$ سے صفر میں سے ہوتا ہوا $\infty + \infty$ تک بڑھتا ہے تو فوا بھی مسلسل طور پر صفر سے ایک میں سے ہوتا ہوا $\infty + \infty$ تک بڑھتا ہے۔ پس لا کی ہر ایک مثبت قیمت کے لئے لوگ لا کی صرف ایک ہی قیمت ہے، نیز یہ قیمت مثبت یا منفی ہوگی بموجب اسکے کہ $\text{لا} < \text{یا} > 1$ ۔ نیز جبکہ $\text{لا} = 1$ تو $\text{ما} = \infty$ اور $\text{لا} = \infty + \infty$ کے لئے $\text{ما} = \infty + \infty$ لا کی منفی قیمتوں کے لئے لوکارنتی تفاعل وجود نہیں رکھتا۔

لوکارنتی تفاعل کے عام خواص اس تعریف سے حسب معمول طریقوں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ شکل ۲ میں مسلسل خط سے لوگ لا کی پریم دکھائی گئی ہے ظاہر ہے کہ یہ پریم خط میں دہی ہے جو فوا کی ہے (دیکھو شکل ۲ صفحہ ۱۱۰) صرف لا اور ما آپس میں بدل دئے گئے ہیں*۔

* تفاعل لوگ لا کی قیمتیں ضمیر کی جدول ف میں دی گئی ہیں۔



اس کتاب میں علامت لوگ لا ہمیشہ لوگ لا کو تعبیر کرے گی۔

۲۳۔ چند انتہائی قیمتیں۔

قوت نما اور لوکارتمی تفاعلوں سے متعلق چند انتہائی قیمتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔

(۱) نیا لا قوت $\rightarrow \infty$ (۱)

کو محسوس کرو۔
یہ تفاعل غیر یمنین شکل $\times \infty$ اختیار کرتا ہے۔ اب چونکہ

$$\frac{1}{\text{قوت}} = \frac{1}{\text{لا}} + \frac{1}{\frac{\text{لا}}{2}} + \frac{1}{\frac{\text{لا}}{3}} + \dots$$

اس لئے ظاہر ہے کہ دریافت طلب انتہا صفر ہے۔
اسی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ∞ کی تمام ناطق قیمتوں کے لئے

(۲) $\infty \leftarrow \infty = \infty$

اس سے حاصل ہوا کہ جیسے ∞ ، ∞ انتہا بڑھتا ہے ∞ بمقابلہ ∞ کی بڑی سے
بڑی قوت کے ∞ انتہا ہو جاتا ہے۔ نیز اگر ∞ ایک سے کم نسبت مقدار ہو تو

(۳) $\infty \leftarrow \infty = \infty$

اس کے ثبوت کے لئے فرض کر دو کہ
گ = لوگ ($\frac{1}{\infty}$)

اب چونکہ کی مثبت ہے
 $\infty \leftarrow \infty = \infty$

(۲) اب اگر نتیجہ (۱) میں ہم رکھیں ∞ یعنی $\infty =$ لوگ ∞ تو حاصل ہوتا

(۴) $\infty \leftarrow \infty = \infty$

پس جیسے ∞ بے انتہا بڑا ہوتا ہے ویسے لوگ ∞ بھی ∞ انتہا بڑھتا ہے لیکن
 ∞ کے مقابل میں ∞ انتہا چھوٹا رہتا ہے۔

(۴) نیز اگر نتیجہ (۱) میں ∞ یعنی $\infty =$ لوگ ∞ تو حاصل ہوتا ہے۔

(۵) $\infty \leftarrow \infty = \infty$

(۳) اب $\infty \leftarrow \infty = \infty$ $\frac{1}{\infty} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{\infty} + 1 = 1$

$\left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{\infty} + 1 \right) \frac{1}{\infty} + 1 =$

خلوط وحدانی کے اندر کا سلسلہ ستدق ہے اور اسلئے اس کا حامل جمع محدود ہے۔

پس $\text{نیا} = \frac{1 - 1}{1} = 1$ (۶)

اور اگر لا کی بجائے گ لکھیں تو

نیا $\text{فگ} = \frac{1 - 1}{1} = 1$ (۷)

اور اس میں گ = لوگ و درج کرنے سے جہاں مثبت مقدار ہے
حاصل ہوتا ہے

نیا $\text{لا} = \frac{1 - 1}{1} = 1$ (۸)

نیز لا = ۱/۲ درج کرنے سے اس نتیجہ کی دوسری شکل حاصل ہوتی ہے

نیا $\text{ن} = (1 - 1) = 0$ (۹)

(۵) اگر (۶) میں لا = لوگ (۱+۱) یعنی $\text{فگ} = 1 + 1$ لکھیں تو حاصل ہوتا ہے

نیا $\text{فی} = \frac{1 - (1 + 1)}{1} = -1$ (۱۰)

(۶) اگر $6 = (1 + \frac{1}{2})$ (۱۱)

تو لوگ ۶ = ن لوگ $(1 + \frac{1}{2})$

اور اس میں لا = ن فی رکھنے سے حاصل ہوتا ہے

نیا لوگ ۶ = لا $\times$ نیا $\text{فی} = \frac{1 - (1 + 1)}{1}$ [نتیجہ (۱۰) کی مدد سے]

..... (۱۲)

پس نیا $\text{ن} = (1 + \frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$ (۱۳)

بعض اوقات جبر و مقابلہ میں دائیں جانب کی انتہا سے قوت کا تفاعل کی تعریف کرتے ہیں۔

۴۴۔ لوکار تم کا تفرق

(۱) اگر ما = لوک لا (۱)

تو لا = نو اور فرما = نو = لا

اور اس لئے فرما = لا = ۱ (۲)

اور چونکہ یہ گھٹتا ہے جیسے لا بڑھتا ہے اس لئے اس کے منہی کے ماس کا میلان محور لا سے کم ہوتا جاتا ہے۔ شکل ۲، صفحہ (۱۱۹) دیکھو۔

(۳) اگر ما = لوک لا (۳)

تو لا = نو، فرما = لا = ۱، لوک لا = لا لوک لا

اس لئے فرما = لا = ۱، لوک لا = لا (۴)

مثلاً اگر ما = لوک لا (۵)

تو فرما = ما = ۱ (۶)

جہاں وفد ۴۲ کے مطابق ما = ۶۳۳۲۹۔

(۷) اگر ما = لوک لا (۷)

جہاں ح تغیر لا کا معلومہ تفاعل ہے تو وفد ۳۲ کے مطابق

فرما = فرما = ۱، فرما = فرما = ۱، فرما = فرما = ۱ (۸)

مثال ۱۔ اگر ما = لوک (جب لا) (۹)

(۱۰) تو فرما $\frac{1}{\text{فرلا}} = \text{جب لا} \times \text{عف (جب لا)} = \text{مم لا}$

(۱۱) اسی طرح اگر ما = لوک قط لا = لوک جم لا

(۱۲) تو فرما $\frac{1}{\text{فرلا}} = \text{سس لا}$

(۱۳) مثال ۲ - اگر ما = لوک (سس $\frac{1}{4}$ لا)

تو فرما $\frac{1}{\text{فرلا}} = \text{سس لا} \times \text{عف (سس لا)} = \text{سس لا} \times \text{قط لا} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$

(۱۴) $\frac{1}{\text{جب لا}} =$

(۱۵) اسی طرح اگر ما = لوک سس $(\frac{1}{4} + \frac{1}{4})$

(۱۶) تو ہمیں مال ہوگا $\frac{1}{\text{فرلا}} = \frac{1}{\text{جم لا}}$

مثال ۳ - اگر ما = $\frac{1}{4}$ لوک $(\frac{1}{4} + 1)$

(۱۷) $\frac{1}{4}$ لوک $(1 + 1)$ - $\frac{1}{4}$ لوک $(1 - 1)$

(۱۸) تو فرما $\frac{1}{\text{فرلا}} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{1+1} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{1-1} = \frac{1}{1-1}$

(۱۹) مثال ۴ - فرض کر دو کہ ما = لوک $\{ \frac{1}{1 \pm \sqrt{1+1}} + 1 \}$

تو فرما $\frac{1}{\text{فرلا}} = \text{عف} \{ \frac{1}{1 \pm \sqrt{1+1}} + 1 \}$

$\{ \frac{1}{1 \pm \sqrt{1+1}} + 1 \} \times \frac{1}{\frac{1}{1 \pm \sqrt{1+1}} + 1} =$

(۲۰) $\frac{1}{1 \pm \sqrt{1+1}} =$

۴۵۔ لوکاری تفرق
زیادہ اجزاء وضی داتے تفاعل کو تفرق کرنے سے پہلے تفاعل کا لوکاری تم
لے لینے سے اکثر دفعہ سہولت ہو جاتی ہے۔

پس اگر $\text{ما} = \frac{\text{ع} + \text{ع} + \text{ع} + \dots}{\dots}$ (۱)

تو لوک $\text{ما} = \text{لوک ع} + \text{لوک ع} + \text{لوک ع} + \dots$ لوک و۔ لوک و۔ لوک و۔ (۲)
اور اس لئے موجب دفعہ ۳۴ (۳)

$$\frac{\text{ا}}{\text{ما}} = \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \dots + \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \dots$$

(۳) $\frac{\text{ا}}{\text{و}} - \frac{\text{ا}}{\text{و}} - \frac{\text{ا}}{\text{و}} - \frac{\text{ا}}{\text{و}} - \dots - \frac{\text{ا}}{\text{و}} - \frac{\text{ا}}{\text{و}} - \dots$
دفعہ ۳۰ اور ۳۱ سے نتیجوں کی یہ عام شکل ہے

(۴) $\text{ما} = \text{ع} + \dots$
یہی طریقہ کرنے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(۵) اب لوک $\text{ما} = \text{لوک ع} + \dots$

(۶) اس لئے $\frac{\text{ا}}{\text{ما}} = \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \dots + \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \frac{\text{ا}}{\text{ع}} + \dots$

(۷) پس $\frac{\text{ا}}{\text{ع}} = \frac{\text{ا}}{\text{و}} - \frac{\text{ا}}{\text{و}} + \frac{\text{ا}}{\text{و}} - \frac{\text{ا}}{\text{و}} + \dots - \frac{\text{ا}}{\text{و}} + \frac{\text{ا}}{\text{و}} - \dots$
یعنی تفاعل عائدہ و کو باری باری مستقل ماکثر تفرق کریں اور نتیجوں کو جمع کر لیں۔

$$\text{مثال ۱۔ اگر } \text{ما} = \frac{(\text{ا} + \text{ب})(\text{ا} - \text{ب})}{(\text{ا} - \text{ب})(\text{ا} - \text{ب})}$$

تو لوک $\text{ما} = \frac{1}{4} \text{لوک (ا} + \text{ب)} + \frac{1}{4} \text{لوک (ا} - \text{ب)} - \frac{1}{4} \text{لوک (ا} - \text{ب)} - \frac{1}{4} \text{لوک (ب} - \text{ا)}$

پس $\frac{1}{\text{ما}} \frac{1}{\text{فر لا}} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{\text{لا} + \text{ب}} + \frac{1}{\text{لا} - \text{ب}} + \frac{1}{\text{لا} + \text{لا}} + \frac{1}{\text{لا} - \text{لا}} \right\}$

$$\frac{1}{\text{لا} + \text{ب}} + \frac{1}{\text{لا} - \text{ب}} = \frac{\text{ب}}{(\text{لا} + \text{ب})(\text{لا} - \text{ب})}$$

$$\frac{1}{\text{لا} + \text{لا}} + \frac{1}{\text{لا} - \text{لا}} = \frac{\text{لا}}{(\text{لا} + \text{لا})(\text{لا} - \text{لا})}$$

$$\frac{1}{\text{لا} + \text{ب}} + \frac{1}{\text{لا} - \text{ب}} = \frac{(\text{لا} + \text{ب})(\text{لا} - \text{ب})}{(\text{لا} + \text{ب})(\text{لا} - \text{ب})}$$

$$\frac{1}{\text{لا} + \text{لا}} + \frac{1}{\text{لا} - \text{لا}} = \frac{(\text{لا} + \text{لا})(\text{لا} - \text{لا})}{(\text{لا} + \text{لا})(\text{لا} - \text{لا})}$$

اسلئے فرما

$$\frac{1}{\text{فر لا}} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\text{ب}}{(\text{لا} + \text{ب})(\text{لا} - \text{ب})} + \frac{\text{لا}}{(\text{لا} + \text{لا})(\text{لا} - \text{لا})} \right\}$$

مثال ۲۔ اگر $\text{لا} = \text{ما}$ ✓

تو فرما $\frac{1}{\text{فر لا}} = \frac{1}{2} (\text{لا} + \text{لا})$

۴۶۔ منقلب زائدی تفاعل - منقلب زائدی تفاعل
جنز لا، جنز لا، جنز لا، مسنن لا، وغیرہ وغیرہ کی تعریف اسی اصول پر کی جائیگی ۴۹

جو دفعہ ۱۶ میں بتایا گیا ہے۔
یعنی $\text{ما} = \text{جنز لا}$ کے معنی یہ ہیں کہ $\text{لا} = \text{جنز ما}$ (۱)
اور اسی طرح باقی منقلب تفاعلوں کے لئے۔
یہ تمام تفاعل نوکار تفاعلوں کے رقوم میں بیان ہو سکتے ہیں۔

پس اگر $\text{لا} = \text{جنز ما} = \frac{1}{2} (\text{فوا} - \text{فوا})$ (۲)

تو $\text{فوا} - \text{فوا} = 1$ (۳)
فوا میں دوسرے درجے کی مساوات کو حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$\text{فوا} = \text{لا} \pm \sqrt{\text{لا}^2 + 1}$ (۴)

اگر ما حقیقی ہے تو فوا کو مثبت ہونا چاہئے اور اسلئے اوپر کی علامت یعنی لازم

ہیں جنز لا = $\text{لوک} \{ \text{لا} + \sqrt{\text{لا}^2 + 1} \}$ (۵)

اسی طرح اگر لا < اتوم حاصل کر سکتے ہیں کہ

$$\text{جمن}^{\text{لا}} = \text{لوگ} \{ \text{لا} \pm \text{لا}^{\text{لا}} - 1 \} \dots \dots \dots (۶)$$

آئیں دونوں علامتیں ممکن ہیں۔ مقداریں لا ± لا^{لا} - 1 ایک دوسرے کی
شکافی ہیں اور انکا لوکارتم صرف علامت میں مختلف ہے۔ جمن^{لا} کی ترسیم
مکعبین پر ظاہر ہو گا کہ ایک سے بڑی لا کی خصوصیت کے لئے ما کی دو قیمتیں ہیں
جو مقداریں مساوی ہیں اور علامت میں مختلف ہیں۔

$$\text{اب اگر } \text{لا} = \text{مسر}^{\text{ما}} = \frac{\text{ق}^{\text{ما}} - \text{ق}^{\text{لا}}}{\text{ق}^{\text{ما}} + \text{ق}^{\text{لا}}} \dots \dots \dots (۷)$$

$$\text{تو } \text{ق}^{\text{لا}} = \frac{\text{ق}^{\text{لا}} + 1}{\text{ق}^{\text{لا}} - 1} \dots \dots \dots (۸)$$

$$\text{پس } \text{مسر}^{\text{لا}} = \frac{1}{\text{ق}^{\text{لا}}} \text{ لوگ } \frac{\text{ق}^{\text{لا}} + 1}{\text{ق}^{\text{لا}} - 1} \dots \dots \dots (۹)$$

یہ حقیقی ہے صرف جبکہ $\text{ق}^{\text{لا}} > 1$ ہے۔

$$\text{اسی طرح } \text{جمن}^{\text{لا}} = \frac{1}{\text{ق}^{\text{لا}}} \text{ لوگ } \frac{1 + \text{ق}^{\text{لا}}}{1 - \text{ق}^{\text{لا}}} \dots \dots \dots$$

اور حقیقی ہے صرف جبکہ $\text{ق}^{\text{لا}} < 1$ ہے۔

۴۔ مقلوب زائدی تفاعلوں کا تفرق۔

$$(۱) \text{ اگر } \text{ما} = \text{جمن}^{\text{لا}} \dots \dots \dots (۱)$$

$$\text{تو } \text{لا} = \text{جمن}^{\text{ما}} \text{ اور } \frac{\text{فر}^{\text{لا}}}{\text{فر}^{\text{ما}}} = \text{جمن}^{\text{ما}} = \text{لا}^{\text{لا}} + 1$$

$$\text{اس لئے } \frac{\text{فر}^{\text{ما}}}{\text{فر}^{\text{لا}}} = \frac{1}{\text{لا}^{\text{لا}} + 1} \dots \dots \dots (۲)$$

۹۰
آئیں کوئی مثبتہ علامت نہیں ہے کیونکہ جمن^{ما} خاصیت سے مثبت ہے۔

(۲) اگر ما = جمنز' لا (۳)

$$\text{تو لا} = \text{جمنز ما اور فرما} = \frac{\text{فرما}}{\text{لا}} = \text{جمنز ما} \pm \frac{1}{\text{لا} - 1}$$

پس فرما = $\frac{1}{\text{لا} - 1} \pm \frac{1}{\text{لا}}$ (۴)

ایک سے بڑی لا کی کسی مقررہ قیمت کے لئے ما کی دو قیمتیں ہیں اور ان کے لئے

فرما کی علامتیں مختلف ہیں (لا اور ما کو بدل کر صفحہ (۱۱۴) پر شکل ۲۵ دیکھو۔)

(۵) اگر ما = مسنز' لا (۵)

$$\text{تو لا} = \text{منز ما اور فرما} = \frac{\text{فرما}}{\text{لا}} = \text{قطنز ما} = 1 - \text{لا}$$

اور اس لئے فرما = $\frac{1}{1 - \text{لا}}$ (۶)

یہ نتیجہ دسم ۴۴ سال ۳ کے موافق ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ما صرف اسی وقت حقیقی ہے جبکہ لا > ۱ (شکل ۲۶ صفحہ (۱۱۵) پر دیکھو)

اسی طرح اگر ما = مهنز' لا (۷)

$$\text{تو فرما} = \frac{1}{\text{لا} - 1} \pm \frac{1}{\text{لا}}$$

اگر ما حقیقی ہو تو یہ ضروری ہے کہ لا' ایک سے بڑا ہو۔

اشک ۱۱

۱۔ نو کے سلسلے کو جمع کر کے ثابت کرو کہ

$$\frac{1}{\text{نو}} = ۱۳۶۷۸۷۹ = \text{جمنز} = ۱۵۵۴۳۰۸۰۶ = \text{جمنز} = ۱۲۰۵۲۰۵۱$$

$$۱۳ - \text{منہی } ۶\frac{۱}{۲} = \frac{\text{جنہی } ۶}{\text{جنہی } ۱+۶} = \frac{\text{جنہی } ۱-۶}{\text{جنہی } ۱+۶}$$

$$۱۴ - \text{جنہی } ۳ = ۶\frac{۲}{۳} = ۳ + ۶\frac{۲}{۳}$$

$$\text{جنہی } ۳ = ۶\frac{۲}{۳} = ۳ - ۶\frac{۲}{۳}$$

$$۱۵ - ۱ + ۲\text{جنہی } ۶ + ۲\text{جنہی } ۶ + ۲\text{جنہی } ۶ + ۲\text{جنہی } ۶ + \dots + ۲\text{جنہی } ۶ = \frac{\text{جنہی } ۱ + ۲\text{جنہی } ۶}{\text{جنہی } ۶}$$

مثلاً ۱۲

ذیل کے تقرقات کی تصدیق کرو۔

$$(۱) \text{ ما} = \text{و} \quad \text{عفا} = ۲\text{لا} \text{و}$$

$$(۲) \text{ ما} = \frac{\text{و}}{\text{لا}} \quad \text{عفا} = \text{و} (۲ - \frac{۱}{\text{لا}})$$

$$(۳) \text{ ما} = \text{و جب لا} \quad \text{عفا} = \text{ما} = \text{جم لا و جب لا}$$

$$(۴) \text{ ما} = \text{و جب لا} \quad \text{عفا} = \text{ما} = \text{جب لا} \text{و جب لا}$$

$$(۵) \text{ ما} = \text{و عفا لا جب لا} \quad \text{عفا} = \text{ما} = \text{و عفا لا جب لا}$$

$$(۶) \text{ ما} = \text{و عفا لا جم لا} \quad \text{عفا} = \text{ما} = \text{و عفا لا جم لا}$$

$$(۷) \text{ ما} = \text{لا و} \quad \text{عفا} = \text{لا} (۱ + \text{و})$$

$$(۸) \text{ ما} = \text{لا و} \quad \text{عفا} = \text{لا} (۱ - \text{و})$$

$$(۹) \text{ ما} = \text{لا و} \quad \text{عفا} = \text{لا} (۴ + \text{و})$$

$$(۱۰) \text{ ما} = \text{و جب لا} \quad \text{عفا} = \text{ما} = \text{و جب لا جم لا}$$

(۱۱) ما = فو جم لا	عفا = فو (جم لا - جب لا)
(۱۲) ما = فو - ۱	عفا = ۲ فو
(۱۳) ما = جبز لا	(فو + ۱) ۲
(۱۴) ما = جبز لا	عفا = جبز ۲ لا
(۱۵) ما = مسز لا	عفا = جبز ۲ لا
(۱۶) ما = جبز لا + ۱/۳ جبز لا	عفا = جبز لا
(۱۷) ما = مسز لا - ۱/۳ مسز لا	عفا = قطنز لا
(۱۸) ما = جمز لا جم لا + جبز لا جب لا	عفا = ۲ جبز لا جم لا
(۱۹) ما = جمز لا جب لا + جبز لا جم لا	عفا = ۲ جمز لا جم لا
(۲۰) ما = جمز لا - جم لا	عفا = ۲ جب لا جبز لا
(۲۱) ما = مسز لا + جمز لا جم لا	عفا = (جبز لا + جب لا)
	عفا = ۲ جبز لا جم لا

مثله ۱۳

ذیل کے تفرقات کی تصدیق کرو۔

(۱) ما = لا لوک لا	عفا = ۱ + لوک لا
(۲) ما = لا لوک لا	عفا = (۱ + ۳ لوک لا)
(۳) ما = لوک جب لا	عفا = مم لا
(۴) ما = لوک جم لا	عفا = مس لا
(۵) ما = لوک مس لا	عفا = ۲ قم لا
(۶) ما = لوک جبز لا	عفا = همز لا
(۷) ما = لوک جمز لا	عفا = مسز لا

- (۸) $\text{ما} = \text{لوک مستر لا}$ عف $\text{ما} = \frac{2}{\text{قنر لا}}$
- (۹) $\text{ما} = \text{لوک لا}$ عف $\text{ما} = \frac{1}{\text{لا}(\text{لا}+1)}$
- (۱۰) $\text{ما} = \text{لوک لا} - 1$ عف $\text{ما} = \frac{2}{\text{لا} - 1}$
- (۱۱) $\text{ما} = \text{لوک لا}$ عف $\text{ما} = \frac{1}{\text{لا}(\text{لا}^2+1)}$
- (۱۲) $\text{ما} = \text{لوک لا} + 1$ عف $\text{ما} = \frac{1}{\text{لا}(\text{لا}-1)}$
- (۱۳) $\text{ما} = \text{لوک } \left\{ \sqrt{1+\text{لا}} + \sqrt{1-\text{لا}} \right\}$ عف $\text{ما} = \frac{1}{1-\text{لا}^2}$
- (۱۴) $\text{ما} = \text{لوک لا}$ عف $\text{ما} = \frac{1}{\text{لا}} + \frac{1}{\sqrt{1+\text{لا}^2}}$
- (۱۵) $\text{ما} = \text{لوک لا} - (1-\text{لا})$ عف $\text{ما} = \frac{1+\text{لا}^2}{3(1-\text{لا})}$
- (۱۶) $\text{ما} = \text{لوک لا} + 1$ عف $\text{ما} = \frac{2}{\text{لا}^2 + \text{لا} + 1}$
- (۱۷) $\text{ما} = \frac{\sqrt{2\text{لا}+1}}{\text{لا}^2 - 1}$ عف $\text{ما} = \frac{2}{\sqrt{2\text{لا}+1}} \cdot \frac{1}{\text{لا}^2 - 1}$
- (۱۸) $\text{ما} = \frac{\sqrt{\text{لا}^2+1}}{\text{لا} + \sqrt{\text{لا}^2+1}}$ عف $\text{ما} = \frac{2}{\sqrt{\text{لا}^2+1} \cdot \left\{ \sqrt{\text{لا}^2+1} + \text{لا} \right\}}$
- (۱۹) $\text{ما} = \frac{\sqrt{\text{لا}+1} + \sqrt{\text{لا}-1}}{\text{لا}-1}$ عف $\text{ما} = \frac{1}{\text{لا}} - \frac{1}{\text{لا}-1}$

$$(21) \quad 6 = \text{لوک} \frac{1 - \sqrt{1+4}}{1 + 1 + 4} = \text{عفا} \frac{1}{1 + 1 + 4}$$

امشلم

- ۱۔ لوک جب لا اور لوک بس لا کی ترسیم لا۔۔ سے لا = ۱۱ نکھنچے۔
 ۲۔ ثابت کرو کہ اگر ف (لا) متغیر لا کا مطلق صحیح متغیر ہو تو
 نہا $\frac{ف (لا)}{ولا} = -$

- ۳۔ ثابت کرو کہ اگر مثبت ہو تو $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n-1}$ $n=2$ $\frac{1}{2} = 1$
- ۴۔ ثابت کرو کہ $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n-1}$ $n=2$ $\frac{1}{2} = 1$
- ۵۔ ذیل کے ضابطوں کو ثابت کرو۔

$$\begin{aligned} \text{جبر}^{\text{ا}} = \text{جبر}^{\text{ا}} + \frac{1}{\text{ا}} & \quad \text{جبر}^{\text{ا}} = \text{جبر}^{\text{ا}} - \frac{1}{\text{ا}} \\ \text{قطر}^{\text{ا}} = \text{لوک} + \frac{1}{\text{ا}} & \quad \text{قطر}^{\text{ا}} = \text{لوک} - \frac{1}{\text{ا}} \end{aligned}$$

۶- ثابت کرد که مستقر $\frac{1-2}{1+2} = \text{لوک}$

- ۷۔ ثنابت کرد کہ مساوات جنم لا + جنم ما = م نامہ کو ظاہر کرتی ہے اور اسکے متقارب دریافت کرو۔ [ما = لا قوا، ما = لا قوا]

ذیل کے تفقات کی تصدیق کرو۔

$$8 - \text{ما} = \text{قطر لا} \quad \text{عف ما} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{2}{3}$$

$$9 - \text{ما} = \text{قمر لا} \quad \text{عف ما} = \frac{1}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{3}{4}$$


$$10 - \text{ما} = \text{جب لا (منر لا)} \quad \text{عف ما} = \text{قطر لا}$$

$$11 - \text{ما} = \text{سن لا (جبر لا)} \quad \text{عف ما} = \text{قطر لا}$$

$$12 - \text{ما} = \text{سن لا (منر لا)} \quad \text{عف ما} = \frac{1}{4} \text{ قطر لا}$$

$$13 - \text{ما} = \text{سن لا (س لا)} \quad \text{عف ما} = \frac{1}{4} \text{ قطر لا}$$

$$14 - \text{ما} = \text{سن لا (لا + لا)} \quad \text{عف ما} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{2}{3}$$



پوختاباب

مشتق تفاعل کا استعمال

۴۸۔ مشتق تفاعل کی علامت سے نتائج۔

اگر ما = فم (لا) اور اگر فم لا (x) (y) فم ما (y) متغیروں
 لا ما کے ہمزاد یا ایک ساتھ کے اضافے ہوں تو $\frac{\text{فم ما}}{\text{فم لا}}$ کی انتہا
 جبکہ فم لا کو لا انتہا کم کر دیا جائے تعریف کی رو سے فم لا ہے
 اس لئے انتہا سے قبل ہم لکھ سکتے ہیں

$$\frac{\text{فم ما}}{\text{فم لا}} = \text{فم لا} + \text{ثما}$$

جہاں ثما بالآخر معدوم ہونے والی مقدار ہے۔

جس طریق سے نسبت $\frac{\text{فم ما}}{\text{فم لا}}$ اپنی انتہائی قیمت کے قریب
 آتی ہے اسکی توضیح کے لئے ایک عددی مثال دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی
 لا = ۱ کے قریب میں ما = لوک لا کی صورت کو لے لیں جہاں انتہائی قیمت ہے

$$\frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} = \frac{\text{فم ما}}{\text{فم لا}} = ۱۲۳۴۵۹ \dots$$

دوسرے کالم کے عدد مطبوعہ جدولوں سے لئے گئے ہیں

مف لا	مف ما	مف لا
۵۴۱۳۹۳	۵۰۴۱۳۹۳	۵۱۰۰۰
۵۴۲۳۷۹	۵۰۲۱۱۸۹	۵۰۵۰۰
۵۴۳۲۱۲	۵۰۰۴۳۲۱۲	۵۰۱۰۰
۵۴۳۳۲۱	۵۰۰۲۱۶۶۱	۵۰۰۵۰
۵۴۳۳۰۸	۵۰۰۰۴۳۳۰۸	۵۰۰۱۰
۵۴۳۳۱۹	۵۰۰۰۲۱۷۰۹	۵۰۰۰۵
۵۴۳۳۲۷	۵۰۰۰۰۴۳۳۲۷	۵۰۰۰۱

پہلے فرض کرو کہ فم (لا) ہے۔
چونکہ شما کی انتہائی قیمت صفر ہے اس لئے مف لا کو کافی طور پر
چھوٹا لینے سے اس امر کا یقین کر لیا جاسکتا ہے کہ

فم (لا) + شما = ۰

یعنی (لا) کی رو سے مف ما کی وہی علامت ہوگی جو مف لا کی ہے
مف لا کی تمام جائز قیمتوں کے لئے جو مطلق قیمت میں ایک خاص مقدار
صفر سے کم ہیں۔

اسی طور پر اگر فم (لا) > ۰ تو مف ما کی علامت مف لا
سے مختلف ہوگی مف لا کی ان تمام جائز قیمتوں کے لئے جو مطلق مقدار
میں ایک خاص مقدار صفر سے کم ہیں۔

اگر متغیر متبوع کو ہندی طور پر تعبیر کیا جائے جسے شکل ا دفعہ (میں) اور
اگر (لا) = ۰ وہاں ہر ایک نقطہ ہے قیمت زیر بحث میں تو ہم یہ کہہ سکتے
ہیں کہ فم (لا) کے مثبت ہونے کی صورت میں ہر کے دائیں جانب
ایک وقفہ ہے جس کے ہر نقطہ پر تفاعل فم (لا) کی قیمت ہر پر کی قیمت

بڑی ہے اور ہر کے بائیں جانب ایک وقفہ ہے جس کے ہر نقطہ پر تفاعل کی قیمت ہر پہلی قیمت سے چھوٹی ہے۔ اگر فہ (لا) منفی ہو تو اس بیان میں الفاظ ”چھوٹے“ اور ”بڑے“ کو باہم بدل دینا چاہئے۔ جب ہر (لا) کے وقفہ کے شروع یا اخیر میں ہو تو یہ وقفے بالترتیب ہر کے دائیں اور بائیں جانب واقع ہونگے۔

اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر فہ (لا) کسی محدود وسعت میں مثبت ہو فہ (لا) کی قیمت لا کے ساتھ اس وقفہ میں استقلال کے ساتھ بڑھنے لگی یعنی اگر لا، لا، اس وقفہ میں لا کی کوئی ایسی قیمتیں ہوں کہ لا، لا، تو

فہ (لا) < فہ (لا)

کیونکہ فہ (لا) مفروضات کے مطابق قابل تفرق ہے اور اس لئے مسلسل ہے پس وقفہ لا سے لا تک (بیشمول طرفین) اس کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی قیمت ضرور ہونی چاہئے۔ گزشتہ استدلال سے واضح ہے کہ بڑی سے بڑی قیمت نہ تو وقفہ کی ابتدا میں ہو سکتی ہے اور نہ درمیان میں، اس کو لازماً وقفہ کے اخیر پر واقع ہونا چاہئے۔ اسی طرح فہ (لا) کی کم سے کم قیمت کو وقفہ کے شروع میں واقع ہونا چاہئے۔

اسی طرح یہ ظاہر ہے کہ اگر فہ (لا) کسی محدود وسعت میں منفی ہو تو فہ (لا) اس تمام وقفہ میں لا کے بڑھنے سے استقلال کے ساتھ گھٹتا ہے یعنی اگر اس وسعت میں لا کی کوئی دو قیمتیں لا، لا، ایسی ہوں کہ لا، لا، تو

فہ (لا) > فہ (لا)


ان نتائج کا ہندسی مفہوم ظاہر ہے۔ جب ایک منحنی کا ڈھال مثبت ہو تو معین لا کے ساتھ بڑھتے ہیں، جب ڈھال منفی ہو تو معین لا کے بڑھنے سے گھٹتے ہیں۔ مختلف تفاعلوں کی ترسیموں سے جواب اول میں دی گئی ہیں مذکورہ بالا امور کی توضیح ہوگی۔

اس کے برعکس بیانات کہ اگر فہ (لا) کسی وسعت میں لا کے بڑھنے سے استقلال کے ساتھ بڑھتا ہو تو اس وسعت میں لا کی کسی قیمت کے لئے

فما (لا) منفی نہیں ہو سکتا اور اگر فما (لا) کے بڑھنے سے استقلال کے ساتھ گھٹتا ہو تو فما (لا) مثبت نہیں ہو سکتا یہ سب بیانات فما (لا) کی تعریف سے فوراً مسترد ہو گئے ہیں۔

نیز اگر فما (لا) چند ایک نقطوں کی محدود تعداد پر صفر بھی ہو بشرطیکہ باقی ہر جگہ مثبت ہو تو فما (لا) استقلال کے ساتھ بڑھے گا۔ مثلاً فرض کرو کہ فما (لا) = ۰۔ اور سوائے اس صورت کے باقی وقفہ میں لا = لا سے لا = لا تک جہاں لا = لا فما (لا) مثبت ہے۔ فما (لا) کی کم سے کم قیمت اس وقفہ کے اندر واقع نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اوپر کے سرے لا = لا پر نہیں اسے لازماً نیچے سرے (لا = لا) پر واقع ہونا چاہئے۔ اسلئے فما (لا) < فما (لا)

یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے اگر فما (لا) مثبت ہو لا = لا سے لا = لا تک اور موخر الذکر قیمت کی صورت میں صفر ہوتا ہو



اسی طرح اگر فما (لا) ایک نقطوں کی محدود تعداد پر صفر ہوتا ہو لیکن باقی ہر جگہ منفی ہو تو فما (لا) استقلال کے ساتھ گھٹتا ہے۔

مثال ۱۔ ما = جم لا - (۱ - ۱/۲ لا)

اس سے $\frac{فما}{فزا} = لا - جب لا$

اور لا کی مثبت قیمتوں کے لئے مثبت ہے۔ چونکہ ما ایک جفت تفاعل ہے اور لا = ۰ کے لئے معدوم ہوتا ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ

$$1 < \text{جم لا} < 1 - \frac{1}{4} \text{ لا}^2$$

نیز اگر ما = جب لا = (لا - ۱ - ۱/۴ لا²)

تو فرما = جم لا = (۱ - ۱/۴ لا²) فرما
 جس کا مثبت ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اس لئے چونکہ ما = ۰ جبکہ لا = ۰ پس
 لا < جب لا < لا - ۱/۴ لا² لا کی مثبت قیمتوں کے لئے۔
 اگر لا منفی ہو تو ترتیب الٹ جانا چاہئے۔
 مثال ۲۔ اگر ما = مس لا - لا

۹۸

تو فرما = قط لا = ۱ - مس لا

پس فرما مثبت ہے سوائے لا = ۰، ۱، ۲، ۳، ... کے لئے۔ اسلئے
 لا کے بڑھنے سے ما استقلال کے ساتھ ہر ایسی وسعت بھر میں بڑھتا ہے جسکے
 اندر نقاط عدم تسلسل (لا = ۱/۲، ۳/۲، ۵/۲، ...) میں سے کوئی ایک بھی
 شامل نہیں ہوتا۔

پس باسانی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ۰ اور ۱/۲ کے درمیان
 مس لا - لا = ۰

کی کوئی اصل نہیں اور اسکی ایک اور صرف ایک اصل ہے ۱/۲ اور ۳/۲ کے
 درمیان اور علیٰ غرض القیاس سے تصدیق ہو سکتی ہے۔ اگر خطوط
 اس نتیجہ کی ترسیمی عمل سے تصدیق ہو سکتی ہے۔ اگر خطوط
 ما = مس لا، ما = لا

کی ترتیبیں بنائی جائیں تو ان کے نقاط تقاطع سے لا کی دو قیمتیں معلوم ہوں گی جنکے لئے
سس لا = لا

۴۹۔ تفاعل کی دو مساوی قیمتوں کے درمیان کے وقفے میں مشتق صفر ہوتا ہے۔

اگر فہ (لا) صفر ہوتا ہو لا = لا اور لا = ب کے لئے اور لا = ب کے درمیان
لا کی تمام قیمتوں کے لئے فہ (لا) محدود ہو تو لا اور ب کے درمیان لا کی
ایک نایک قیمت کے لئے فہ (لا) صفر ہوگا۔

کیونکہ یا تو فہ (لا) سراسر وقفہ لا تا ب میں مستقل طور پر صفر ہوگا یا (وقفہ
کی رو سے) اس وقفہ کے اندر لا کی کسی قیمت لا کے لئے اس کی بڑی سے بڑی یا
چھوٹی سے چھوٹی قیمت ہوگی پہلی صورت میں فہ (لا) = تمام وقفے میں اور
دوسری صورت میں فہ (لا) نہ مثبت ہو سکتا ہے اور نہ منفی (وقفہ ۴۸)۔

اس لئے اسے لازماً صفر ہونا چاہئے کیونکہ صفر وضع کے مطابق یہ محدود ہے۔
اس سلسلے کی ہندی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی منحنی محور لا سے دو نقطوں پر
لے اور منحنی کا ڈھال ہر جگہ محدود ہو تو ان کے درمیان کم از کم ایک نقطہ ضرور
ہوگا جس پر کا ماس محور لا کے متوازی ہو۔ مثال کے طور پر دیکھو جب لا
کی ترتیب صفحہ ۴۲ پر نیز شکل ۹ صفحہ ۴۶۔

یہ احتیاط سے یاد رہے کہ اوپر کے استدلال میں یہ شرائط ضروری ہیں کہ
فہ (لا) اور فہ (لا) میں سے ہر ایک کی تمام وقفہ لا = لا سے لا = ب میں
ایک معین (اور اس لئے محدود) قیمت ہوئی پائے۔ ذیل کی اشکال میں مختلف
صورتمیں ہیں جنکے لئے ایک یا زیادہ شرائط کے لوٹ جائیکے باعث نتیجہ
قائم نہیں رہتا۔



اس دفعہ کے مسئلہ کی ذرا زیادہ وسیع شکل یہ ہے کہ اگر $f(a)$ کی وہی قیمت (جس) $f(b) = f(a)$ اور $f(a) = f(b)$ دونوں کے لئے اور اگر $f(a) = f(b)$ مسلسل اور محدود ہونے کے متعلق وہی اوپر کے شرائط پور اکریں تو مشتق تفاعل $f(a)$ اور $f(b)$ کے درمیان $f(a)$ کی ایک نہایت قیمت کے لئے معدوم ہوگا۔ اوپر کے استدلال کو $f(a)$ - $f(b)$ پر لگانے سے یہ واضح ہے۔

مثال ۱۔ اگر $f(a) = f(b)$ اور $f(a) = f(b)$ ۔

تو $f(a) = f(b) = f(a) - f(b)$ ۔

اس لئے $f(a) = f(b)$ صفر ہوتا ہے $f(a) = f(b) = \frac{1}{2} (f(a) + f(b))$ کے لئے جو $f(a)$ اور $f(b)$ کے درمیان ہے۔

مثال ۲۔ اگر $f(a) = f(b)$ تو $f(a) = f(b) = \frac{f(a) + f(b)}{2}$ ۔ جب $f(a) = f(b)$ ۔

یہاں $f(a) = f(b) = 0$ جبکہ $f(a) = f(b) = \frac{1}{2} (f(a) + f(b))$ اس لئے $f(a) = f(b)$ کو $f(a)$ کی کسی درمیانی قیمت کے لئے صفر ہونا چاہئے یہ دفعہ ۴۴ مثال ۲ کے نتیجے کے مطابق ہے جہاں ثابت کیا گیا تھا کہ مساوات $f(a) = f(b)$ کی ایک اصل $f(a)$ اور $f(b)$ کے درمیان ہے۔

۵۰۔ مساواتوں کے نظریہ میں استعمال۔

اگر $f(a) = f(b)$ کا منطق صحیح تفاعل ہو تو $f(a) = f(b)$ اور اس کا مشتق $f(a) = f(b)$ دونوں $f(a)$ کی تمام محدود قیمتوں کے لئے مسلسل (اور محدود) ہوں گے اس لئے مساوات

$f(a) = f(b) = \dots = f(a) = f(b)$ (۱)

کی کم از کم ایک حقیقی اصل مساوات

$f(a) = f(b) = \dots = f(a) = f(b)$ (۲)


کی برہنہ حقیقی اصولوں کے درمیان واقع ہوگی، اس نتیجہ کو $f(a)$ کے مسئلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور مساواتوں کے نظریہ میں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

اس سے یہ سیدھا نتیجہ نکلتا ہے کہ (۲) کی زیادہ سے زیادہ ایک حقیقی اصل (۱) کی دو متضمت اصلوں کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ یعنی (۱) کی اصلیں (۲) کی اصلوں کو جدا کرتی ہیں۔

مثال ۱۔ اگر $f(x) = (x-2)(x^2-2x+1)(x^2+18x+20)$

تو $f(x) = (x-2)(x^2-2x+1)(x^2+18x+20) = (x-2)(x-1)(x+2)(x+10)$ پس $f(x) = (x-2)(x-1)(x+2)(x+10)$ کی حقیقی اصلیں اگر ہیں تو وقفوں $-\infty$ اور $-\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{2}$ اور 2 کے درمیان بالترتیب واقع ہوں گی۔ اب اگر $f(x) = -\infty - \frac{1}{2} + 2 + \infty$ تو

$f(x)$ کی علامات ہیں $+$ ، $-$ ، $+$ ، $-$ پس $f(x)$ کو اوپر کے وقفوں میں سے ہر ایک میں (دفعہ ۹) ایک دفعہ لازماً صفر ہونا چاہئے۔ اس لئے تین حقیقی اصلیں ہیں، ذیل کی شکل میں $f(x)$ کی ترسیم درج ہے۔



شکل (۳۰)

اگر $f(x)$ دلائی کی شکل کی سلسل ترسیم سے مثلاً ایک مستقل کے جمع یا تفرق کرنے سے

اس کی دو اصلیں باہم منطبق کر دی جائیں تو $F(a) = 0$ کی اصل بھی جو ان کے درمیان واقع ہے ان کے ساتھ منطبق ہو جائیگی۔ پس $F(a) = 0$ کی دوسری اصل $F(a) = 0$ کی بھی اصل ہوتی ہے زیادہ عام طور پر $F(a) = 0$ کی ر' دس رتبہ کی ضعیفی اصل کو اگر ایسا خیال کیا جائے یہ الگ الگ ر' اصولوں کے منطبق ہونے سے پیدا ہوتی ہے تو $F(a) = 0$ کی (۱) درمیانی اصلیں ہونی جو منطبق ہوں گی۔

اس سے کسی دی ہوئی جبر مساوات کی ضعیفی اصلیں اگر کوئی ہوں تو ان کے معلوم کرنے کا طریقہ اصل ہوتا ہے۔ اگر $F(a) = 0$ کی ر' ضعیفی اصل $F(a) = 0$ ہو تو

$F(a) = 0 = (a - \alpha)(a - \beta) \dots (a - \gamma)$ جہاں α, β, γ منطوق صحیح تفاعل ہے۔ اس لئے

$$F(a) = (a - \alpha)(a - \beta) \dots (a - \gamma)$$

یعنی $(a - \alpha)(a - \beta) \dots (a - \gamma)$ اور $F(a) = 0$ کا مشترک جزو ضروری ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ $(a - \alpha)(a - \beta) \dots (a - \gamma)$ مشترک جزو ضروری نہیں ہوگا جب تک کہ $F(a) = 0$ کی ر' ضعیفی اصلیں ہوں تو انہیں جبر یہ طریقوں کی پس اگر $F(a) = 0$ کی کوئی ضعیفی اصلیں ہوں تو انہیں جبر یہ طریقوں کی مدد سے $F(a) = 0$ اور $F(a) = 0$ کے مشترک اجزائے ضروری دریافت کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے۔

$$\text{مثال ۲۔ } F(a) = (a - 1)(a - 2)(a - 3) = 0$$

$$F(a) = (a - 1)(a - 2)(a - 3) = 0$$

معمولی جانچ سے حاصل ہوتا ہے کہ $(a - 1)(a - 2)(a - 3) = 0$ اور $F(a) = 0$ کا مشترک جزو ضروری ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ $(a - 1)(a - 2)(a - 3) = 0$ کا جزو ضروری ہے۔ باقی کے اجزاء آسانی سے معلوم ہو جاتے ہیں پس

$$F(a) = (a - 1)(a - 2)(a - 3) = 0$$

مثال ۳۔ شرط مطلوب ہے کہ کئی مساوات $(لا + ق) لا + ر = ۰ \dots (۵)$ کی دوسری اصل ہو۔
دوسری اصل اگر ہو تو اسے اس مساوات کو پورا کرنا چاہئے

$$۳ (لا + ق) = ۰ \text{ یا } لا = ۱ - \frac{۱}{۳} ق \dots (۶)$$

(۵) میں درج کرنے سے حال ہوتا ہے

$$ر = ۲ - \frac{۲}{۳} ق \text{ یا } ر = -\frac{۲}{۳} ق \dots (۷)$$

جو مطلوبہ شرط ہے۔

۵۔ اعظم اور اقل قیمتیں۔

سلسل تفاعل کی ”اعظم“ قیمت وہ ہے جو پٹری ہو اور ”اقل“ قیمت وہ ہے جو چھوٹی ہو دونوں طرف کی بالکل پاس کی قیمتوں سے۔ زیادہ قیمت کے ساتھ اسے کوئی بیان کر سکتے ہیں۔ فدا (لا) اعظم ہو گا $لا = ۱$ لے لے اگر دو قیمتیں مقداریں صہ صہ ایسی معلوم ہو سکیں کہ فدا (لا) برابر ہو یہی قیمت سے جو وقفہ $لا = ۱ - صہ$ سے $لا = ۱ + صہ$ کے درمیان لای کی کسی اور قیمت کے جواب میں فدا (لا) اختیار کرتا ہے۔ ایسے ہی اقل قیمت کے لئے۔

چونکہ تفاعل کی ایسی قیمتوں کا باہم مقابلہ کیا جاتا ہے جو لا کے بالکل پاس ہوں اس لئے اعظم قیمت ضروری نہیں کہ تفاعل کی پٹی سے بڑی قیمت ہو اور اسل چھوٹی سے چھوٹی۔ (دیکھو شکل ۳)

فی الحال ہم بحث کو اس صورت تک محدود رکھینگے (اور اس کے اندر تمام ضروری اطلاعات شامل ہیں) جہاں وسعت زیر بحث کے تمام نقطوں پر مشتق قابل نقیص اور محدود ہو۔ دفعہ ۴ کے استدلال سے ظاہر ہے کہ اگر فدا (لا) اعظم یا اقل ہو تو فدا (لا) صفر سے مختلف نہیں ہو سکتا۔

کیونکہ اگر یہ مثبت یا منفی ہو تو لا کی عین پڑوس میں ایسے نقطے ہونگے جنکے لئے
فہ (لا) بڑا ہوگا اور دوسروں کے لئے چھوٹا ہوگا تفاعل کی قیمت
فہ (لا) سے۔ پس صورت مجوزہ میں فہ (لا) کی اعظم یا اقل قیمت
کے لئے پہلی شرط یہ ہوگی کہ فہ (لا) معروم ہو۔

یہ شرط ضروری ہے کافی نہیں۔ مزید تقویٰ کی خاطر فرض کرو کہ نقطہ
لا کے دونوں طرف ایک خاص وقفہ ہے جس کے اندر سراسر فہ (لا)
یا تو بالکل مثبت ہے یا بالکل منفی۔ اب اگر فہ (لا) لا کی ان تمام قیمتوں
کے لئے جولا۔ صہہ اور لا کے درمیان واقع ہوں مثبت ہو تو فہ (لا)
[دفعہ ۴۸] اس وقفہ کے اندر استقامت کے ساتھ بڑھے گا اور اگر
فہ (لا) وقفہ لا اور لا + صہہ کے درمیان لا کی تمام قیمتوں کے لئے
منفی ہو تو فہ (لا) استقامت کے ساتھ اس وقفہ میں گھٹے گا۔ پس اگر
یہ دونوں شرائط پورے ہوں تو فہ (لا) اعظم ہوگا۔

یہ ظاہر ہے کہ اگر علامات اس طور پر نہ ہوں تو فہ (لا) تفاعل کی
بڑی سے بڑی قیمت وقفہ لا - صہہ اور لا + صہہ کے درمیان
نہیں ہو سکتی۔

اسے مختصر آیوں بیان کر سکتے ہیں کہ اس امر کے لئے ضروری اور کافی
شرط کہ فہ (لا) فہ (لا) کی اعظم قیمت ہو یہ ہے کہ فہ (لا) علامت
بدلے + سے۔ جسے لا بڑھتے بڑھتے قیمت لا میں سے گزرے۔
اسی طرح حاصل ہوتا ہے کہ ضروری اور کافی شرط اس امر کے لئے
کہ فہ (لا) فہ (لا) کی اقل قیمت ہو یہ ہے کہ فہ (لا) علامت
بدلے - سے + جیسے لا بڑھتے بڑھتے قیمت لا میں سے گزرے۔

یعنی ایسی صورتوں کو ہم خارج کر دیتے ہیں جہاں فہ (لا) کسی وقفہ کے
اند میں لا مثال ہوتا ہے لا انتہا بار علامت بدلتا ہے۔ نقطہ لا تفاعل
لا اوجب لا میں ایک ایسی مثال ہے۔

ہندی زبان میں اسے بولوں بیان کرتے ہیں۔ جب ایک منحنی کا معین اعظم ہو تو ڈھال کو مثبت سے بدل کر منفی ہونا چاہئے اور جب معین اقل ہو تو ڈھال کو منفی سے بدل کر مثبت ہونا چاہئے۔ اوپر کی اشکال سے اسکی کافی توجہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر دیکھو نکلیں ۹، ۱۳، ۱۴، ۲۰۔

جب کبھی مشتق تفاعل فیما (۹) معدوم ہو تو اصلی تفاعل فیما (۱۱) کے بڑھنے کی شرح (دفعہ ۲۶) تھوڑی دیر کے لئے صفر ہو جاتی ہے اور اسے بولوں بیان کرتے ہیں کہ فیما (۱۱) کی قیمت مساکن ہے۔ جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے یہ ضروری نہیں کہ مساکن قیمت اعظم یا اقل قیمت ہو کیونکہ ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں جہاں فیما (۱۱) صفر ہوتا ہے مگر علامت نہیں بدلتا۔

اکثر دلچسپ صورتوں میں مشتق تفاعل فیما (۱۱) مسلسل ہوتا ہے نیز قابل دریافت (اور محدود) تب یہ صرف قیمت صفر میں سے گذرتے ہی علامت بدل سکتا ہے نیز دفعہ ۹ سے ظاہر ہے کہ اگر تبدیلیاں + سے - اور - سے + ایک سے زیادہ ہوں تو یہ باری باری واقع ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اعظم اور اقل قیمتیں بھی باری باری یا متبادل واقع ہوں گی۔ دیکھو شکل ۱۳ صفحہ ۲۲۔

مثال ۱۔ خط شقیم پر ایک ذرہ حرکت کر رہا ہے، اس کا فاصلہ میں جو ایک اختیاری مبداء سے ناپنا شروع کیا گیا ہے اعظم ہوگا جبکہ رفتار (فرس) مت بدلتی ہے مثبت سے منفی اور اقل ہوگا جبکہ رفتار منفی سے مثبت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک ذرہ جو جاذبہ ارض کے ماتحت اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے اس کے لئے

$$س = عت - \frac{1}{4} ع ت، \frac{فرس}{عت} = ۶ - ع ت$$

پس فرس مثبت سے منفی ہوتا ہے جیسے ت بڑھتے بڑھتے قیمت $\frac{۶}{ع}$

میں سے گزرتا ہے۔ اونچائی میں اس وقت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔
 مثال ۲۔ بڑے سے بڑے رقبہ والا مستطیل معلوم کرو جس کا گھیرا دیا گیا ہو۔
 گھیرے کو ۱ فرض کرو۔ دو مستقل اضلاع کے طول ۱ اور ۱۔ لائے جاسکتے ہیں۔
 میں میں تفاعل (۱-۱)۔ (۱-۱) کی اعظم قیمت دریافت کرتا ہے۔
 اس کا مشتق ۱-۲ لایا ہے جو علامت بدلتا ہے + سے - جیسے ۱ قیمت
 میں سے گزرتا ہے۔ اس لئے بڑے سے بڑے رقبہ والا مستطیل مربع ہے۔
 مثال ۳۔ ذیل کے تفاعل کی اعظم اقل قیمتیں دریافت کرو۔

$$\text{فما (۱)} = ۴ - ۱۱ + ۲۱ + ۱۸ - ۲۰ + \dots (۲)$$

$$\text{فما (۱)} = ۱۲ - (۱۱ - \frac{1}{4}) - (۱۱ - ۳) \dots (۳)$$

یہ تفاعل صرف اس وقت علامت بدل سکتا ہے جبکہ ۱ قیمتوں $\frac{1}{4}$ اور ۳
 میں سے گذرے۔ جب ۱، $\frac{1}{4}$ سے ذرا کم ہو تو دوسرے اور تیسرے اجزاء
 ضربی کی علامات -، - ہوتی ہیں، لیکن جب ۱، $\frac{1}{4}$ سے ذرا بڑا ہو تو یہ
 علامتیں +، - ہوتی ہیں۔ اس لئے جب ۱ قیمت $\frac{1}{4}$ میں سے گزرتا ہے
 تو فما (۱) علامت بدلتا ہے + سے -، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے
 ۱ بڑھتے رہتے قیمت ۳ میں سے گزرتا ہے تو فما (۱) علامت بدلتا ہے - سے
 +، اسلئے فما (۱) اعظم ہے جبکہ ۱ = $\frac{1}{4}$ اور اقل ہے جبکہ ۱ = ۳ (۲)
 میں ۱ کی قیمتیں ۱۱ کے لئے مکمل ہوتی ہیں اعظم قیمت $\frac{1}{4}$ اور اقل - ۳ کے
 دیکھو شکل ۳۰۔

$$\text{مثال ۴۔ فما (۱)} = \frac{۲}{۱ + ۲} \dots (۴)$$

$$\text{فما (۱)} = \frac{۲(۱-۱)}{(۱+۱)^2} \dots (۵)$$

یہ علامت بدل سکتا ہے صرف ۱ = +۱ کے لئے۔ جیسے ۱ بڑھتے بڑھتے
 (جبر طور پر) قیمت - میں سے گزرتا ہے - ۱ علامت بدلتا ہے - سے +،
 اور جیسے ۱ + میں سے بڑھتا ہے - ۱ علامت بدلتا ہے + سے -، اسلئے

۱۱۔ ا کے لئے فضا (لا) کی اقل قیمت ہے اور یہ -۱ ہے اور لا = ا کے لئے اعظم قیمت = ۱ دیکھو شکل ۱۳ صفحہ ۱۴۰

مثال ۵۔ فضا (لا) = $\frac{لا^2}{لا - ۱}$ (۶)

فضا (لا) = $\frac{(لا + ۱)^2}{(لا - ۱)}$ (۷)

یہاں فضا (لا) ہمیشہ مثبت ہوتا ہے اور تفاعل فضا (لا) کی کوئی محدود اعظم اقل قیمتیں نہیں ہوتیں۔ دیکھو شکل ۱۴ صفحہ ۱۴۱

مثال ۶۔ قائم مستطی اسطوانہ معلوم کر جس کا حجم دیا ہوا ہو اور جسکی سطح کا رقبہ کم سے کم ہو۔

فرض کرو کہ اسطوانہ کا نیم قطر لا اور ارتفاع ما ہے۔ سطح ہوگی

$$۲\pi لا^2 + ۲\pi لا ما$$

اگر دیا ہوا حجم $۲\pi لا^2$ ہو تو لا ما = ۲

ما کو اس مفکر نے سے جس جملہ کو اقل بنانا ہے وہ ہے لا + $\frac{۲}{لا}$ اس کا مشتق

تفاعل ہے $۲(لا - \frac{۲}{لا^2})$ اور یہ علامت بدلتا ہے جسے لا قیمت ۱ میں سے بڑھتا ہے اور یہ تبدیلی ہے - سے + اس لئے لا = ۱ سے سطح کم سے کم ہوتی ہے اور تبا ما = ۲ پس اسطوانہ کا ارتفاع قطر کے مساوی ہے۔

طالب علم اس کی تصدیق کرے کہ ایسے اسطوانہ کی سطح مساوی حجم کے کرہ کی سطح کا ۱۴۷ دیکھو۔

مثال ۷۔ تفاعل = $\frac{لا(لا + ۲)ھ(لا + ھ)}{لا(لا + ۲)ھ(لا + ھ)}$ (۸)

کی ”کھڑی“ یا اقل قیمتیں دریافت کرو۔

(۱) لا(لا + ۲)ھ(لا + ھ) = ۶ (لا + ۲)ھ(لا + ھ) (۹)

تفرق کرنے اور $\frac{۶}{لا}$ کو صفر کے مساوی رکھنے سے حاصل ہوتا ہے


(۱۰) $(لا + ه) = ع$ لا سے ضرب دیگر (۹) سے سختی کر تو

(۱۱) $(ه + لا) = ع$ (ه + لا + ح) (۱۰) اور (۱۱) کے درمیان ع ساقط کرنے سے لا کی مطلوبہ قیمتیں ذیل کی مساوات درجہ دوم کی اصولوں کے طور پر حاصل ہونگی

(۱۲) $(ا - ه) (ا - لا) + (ا - ح) (ا - لا) + (ا - ح) (ا - ه) = ۰$ بخلاف اس کے اگر لا کو ساقط کیا جائے تو ع کی اہل قیمتیں ذیل کی مساوات درجہ دوم سے حاصل ہوتی ہیں

(۱۳) $(ا - ح) (ا - لا) + (ا - ح) (ا - ه) + (ا - ح) (ا - ه) = ۰$ مثال ۸ - اہل قیمت کی سادہ سے سادہ مثال جو اعظم یا اقل نہیں ہے ذیل کے تفاعل سے حاصل ہوتی ہے

(۱۴) $فما (لا) \equiv لا^۳$




شکل (۳۱)

فما (لا) = ۲ (لا) ۲ جو لا = کے لئے صفر ہوتا ہے مگر قیمت صفیر میں سے بڑھنے سے علامت نہیں بدلتا۔ اس لئے فما (لا) اگرچہ "چل" ہے مگر لا = کے لئے اعظم یا اقل نہیں ہے۔ شکل ۳۱ میں (لا) کی ترکیب دی گئی ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فما (لا) جو عام طور پر مسلسل ہوا کی کسی ایکلی قیمت کے لئے غیر مسلسل ہو جاتا ہے، اگر عدم تناسل کے ساتھ علامت کی تبدیلی بھی وقوع پذیر ہو جبکہ لا بڑھتے بڑھتے قیمت زیر بحث میں سے ہو کر گذرے تو پہلے کے استدلال کی بنا پر اعظم یا اقل قیمت پیدا ہوگی۔

مشال ۹۔ اگر فما (لا) = (لا) ۳ (لا) ۴ (۱۵)

تو فما (لا) = (لا) ۲ (لا) ۳ (لا) ۴ (۱۶)
جیسے لا قیمت صفیر میں سے بڑھتا ہے فما (لا) - ∞ سے ∞ تک بدلتا ہے
اس لئے فما (لا) اقل ہے لا = کے لئے۔ دیکھو شکل ۳۲۔



نیز شکل ۲۹ میں ایک نقطہ واقع ہوتا ہے جہاں فما (لا) غیر مسلسل ہے اور ایک ایک محدود مثبت قیمت سے محدود منفی قیمت کی طرف گذرتا ہے۔ معین کہاں اعظم ہے

۱۰۶

۵۲۔ جبریتہ طریقے۔ بعض مشہور سوالات محض جبریتہ قابل توجہ ہیں کہ اعظم یا اقل قیمتوں کے بعض مشہور سوالات محض جبریتہ طریقوں سے بغیر احصا کی مدد کے آسانی حل ہو سکتے ہیں، یہ خاص طور پر دو درجی جملوں کی صورت میں ہے مکمل مربع کا طریقہ ان سب پر آسانی

لگ سکتا ہے۔

سوالات کا حل اکثر اوقات ذیل کی مثالوں پر لاکے منحصر کیا جاسکتا ہے

$$(۱) \dots\dots\dots \frac{1}{۲} = \frac{۱}{۲} \{ (۱+۱) - (۱-۱) \} \dots\dots\dots$$

$$(۲) \dots\dots\dots (۱+۱) = (۱-۱) + ۲ \dots\dots\dots$$

$$(۳) \dots\dots\dots \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۲} \{ (۱+۱) + (۱-۱) \} \dots\dots\dots$$

پس اگر دو مثبت مقداروں کا حاصل جمع $(۱+۱)$ دیا گیا ہو تو ان کا حاصل ضرب $(۱-۱)$ بڑے سے بڑا ہوگا جبکہ وہ باہم مساوی ہوں۔

اگر دو مثبت مقداروں کا حاصل ضرب $(۱-۱)$ دیا گیا ہو تو ان کا حاصل جمع $(۱+۱)$ چھوٹے سے چھوٹا ہوگا جبکہ یہ باہم مساوی ہوں۔

اگر دو مقداروں کا مجموعہ دیا گیا ہو تو ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہوگا جبکہ یہ باہم مساوی ہوں۔

مثال ۱۔ دفعہ ۵۱ مثال ۲ میں

$$(۱-۱) = \frac{۱}{۲} - (۱-۱) \dots\dots\dots$$

چونکہ آخری رقم صفر سے نیچے نہیں جاسکتی اس لئے اس جگہ کی جڑی سے بڑی قیمت

مثال ۲۔ جملہ $۱-۱-۱-۱-۱$ اس شکل میں رکھا جاسکتا ہے

$$۲(۱-۱) - \frac{۳}{۲} = (۱-۱) + \frac{۳}{۲} \dots\dots\dots$$

اس جگہ کی کم سے کم قیمت $\frac{۳}{۲}$ ہے جبکہ $۱-۱ = \frac{۳}{۲}$

مثال ۳۔ دئے ہوئے دائرہ میں جو بڑے سے بڑا مستطیل بن سکتا ہے اسے معلوم کرو۔

اگر اضلاع $۱-۱-۱-۱$ ہوں تو $۱-۱$ کو اعظم بنانا مقصود ہے اس شرط کے ماتحت کہ $۱-۱ = ۱$ جہاں ۱ دائرہ کا نصف قطر ہے۔

$$۲(۱-۱) = ۱-۱-۱-۱ \dots\dots\dots$$

جو بڑے سے بڑا ہوگا جبکہ $۱-۱ = ۱$ اس لئے بڑے سے بڑے رقبہ والا اندر فی مستطیل

مربح ہے۔

مثال ۴۔ اہم طلبہ + بائس طلبہ کی کم سے کم قیمت معلوم کر رکھنا
کی ان قیمتوں کے لئے جو سفار اور پے کے درمیان ہوں۔

۱۰۶

سر طہ = $(\frac{1}{10})^{\frac{1}{2}}$ ، اگلے مجھو عکی کم سے کم قیمت ہے ۲۰ لاکھ۔

مثال ۵۔ گردشِ مکانی نما کو اس کے محور پر عمودِ راستی سے کاٹنے سے قطعہ بنایا گیا ہے اس کے اندر جو ٹریے سے بڑا اسطوانہ بن سکتا ہے اسے معلوم کرو۔

قرض کرو کہ مکانی نما، عا^۲ = ۴۷ لا (۴۷)
کو محور لا کے گرد گھمائے سے پیدا ہوتا ہے، محور کا طول l ہے اور مدار سے اسطوانہ کے قریب
سرے کا فاصلہ la ہے۔ اسطوانہ کا حجم ہے

$$(5) \dots\dots\dots \left(\frac{r_6}{r_7} - 1 \right) \pi = (2) - 1 \pi$$

پہلی شرط یہ ہے کہ لازماً ایک ساتھ

$$\frac{\text{جف فہ}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{جف فہ}}{\text{جف لا}} \quad (۲)$$

جہاں تفرق سرحدی ہیں دیکھو دفعہ ۳۴۔ کیونکہ اگر عتفا ل کی کسی اور ایسی قیمت سے جو لا، لا کو خاص حدود کے اندر بدلنے سے حاصل ہو، بڑا یا چھوٹا ہو تو عروج و جوہ مستحکم اعظم (یا اقل ہوگا) جبکہ لا کو مستقل رکھا جائے اور صرف

لا بدلے۔ اس سے بالعموم لازم آتا ہے کہ (دفعہ ۵۱) $\frac{\text{جف فہ}}{\text{جف لا}} =$ ، اسی طرح عروج اعظم (یا اقل) ہونا چاہئے جبکہ لا کو مستقل رکھا جائے اور صرف لا بدلے۔

$$\frac{\text{جف فہ}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{جف فہ}}{\text{جف لا}}$$

پہلی کی طرح یہ شرائط ضروری ہیں کافی نہیں۔ عام صورت میں اس سوال کی مزید تحقیق آئندہ سوچو لیں باب میں ہوگی تکن اکثر ایسا ممکن ہوتا ہے کہ اعظم اور اقل قیمتیں غیر متعلق ذرائع سے مل جاتی ہیں اور ان میں مختلف شخصیں ہو سکتی ہیں۔ بشرط (۲) سے ایسی صورتوں میں سب کچھ مل جاتا ہے جو تکلیلی نقطہ نظر سے

ضروری ہے۔

مثال۔ دے ہوئے حجم والا استیظلی توازی السطح معلوم کرو جس کی سطح کم سے کم فرض کرو کہ لا، لا می کنارے ہیں اور لا دیا ہوا حجم ہے۔

چونکہ لا ما می = لا (۳) تفاعل جو کم سے کم ہوگا وہ ہے

$$ع = لا ما + ما می + می لا = لا ما + \frac{لا}{لا} + \frac{لا}{لا} \quad (۴)$$

$$\frac{\text{جف ع}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{جف ع}}{\text{جف لا}} \quad \text{شرائط جف ع سے ملتا ہے}$$

لا ما = لا، لا ما = لا اور ان مساواتوں کا حقیقی حل صرف یہی ہے کہ لا ما = لا، نیز می = لا۔

۱) 'ما' چونکہ اس سوال میں لازماً مثبت ہیں اس لئے (۴) سے ظاہر ہے کہ متوازی السطوح کی سطح کی بجلی انتہا ہے۔ اوپر کی تحقیق سے ظاہر ہے کہ یہ انتہا نہیں پہنچتی جب تک کہ شکل مکعب نہ ہو۔
دفعہ ۵۲ کے مطابق کئی سوالوں کا حل معلومہ جبری متانہات سے حاصل ہو سکتا ہے مثلاً

$$(۵) \quad (لا + ما + ی) = \frac{۱}{۳} \{ (لا + ما + ی) + (ما - ی) + (ی - لا) + (لا - ما) \} \dots (۵)$$

$$ما + ی (لا + لا) = لا + ما + ی - \frac{۱}{۳} \{ (ما - ی) + (ی - لا) + (لا - ما) \} \dots (۶)$$

یعنی اگر ایک خط مستقیم کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان حصوں کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہوتا ہے جبکہ یہ حصے مساوی ہوں۔
متوازی السطوح جو ایک دائرہ کے اندر (لا + ما + ی = لا) بن سکے اس کی سطح زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے جبکہ یہ مکعب ہو۔

۵۴۔ تفرقوں کی ترقیم - دفعہ ۴ کی مساوات

$$\frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}} = \text{فما} (لا) + \text{شما} \dots (۱)$$

کی طرف پہر ہم رجوع کرتے ہیں۔ اسے یوں لکھا جاسکتا ہے

$$\text{مف ما} = \text{فما} (لا) + \text{مف لا} + \text{شما} \text{ مف لا} \dots (۲)$$

جیسے مف لا، صفر کے قریب آنا جاتا ہے بائیں جانب کی دوسری رقم پہلی رقم کے مقابل میں خفیف اور کم ہو جاتی ہے کہ نہ تو شما کی انتہائی قیمت صفر ہے۔ اس لئے یہ تقریباً زیادہ صحیح ہوتا جاتا ہے کہ

$$\text{مف ما} = \text{فما} (لا) + \text{مف لا} \dots (۳)$$

یہ مساوات ان معنوں میں پیدا نہیں ہوتی کہ طسہ فین تقریباً صفر ہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ طسہ فین کی قیمت ایک کے قریب آتی جاتی ہے۔ ان معنوں میں اس مساوات کو اکثر اوقات اس طرح

لکھتے ہیں

فرما = فَمَا (لا) فرلا (۴)

صفر ہونے والی مقداروں مف (لا) مف ما کو تفرقے کہا جاتا ہے۔
نوٹ ضابطہ (۴) میں فَمَا (لا) کا جو مقام ہے اس کے لحاظ سے اس کو
”تفرقی سر“ کہا جاتا ہے۔

طالب علم اوپر کے طرز بیان کو ناروا خیال نہ کرے، یہ محض دستور پر مبنی
ہے۔ اس کے استعمال کی غرض صرف یہ ہے کہ جہاں کہیں حسابات میں مقداریں
مف (لا) مف ما شامل ہوتی ہوں جنہیں بعد میں انتہائی طور پر صفر ہو جانا
ہے ان میں کسی منزل پر مف ما کی بجائے فَمَا (لا) مف (لا) رکھ دیا
جاسکتا ہے جبکہ یہ واضح ہو کہ دوسرے رتبہ کی مقداروں کے نظر انداز کر دینے سے
آخری جواب کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

۵۵۔ چھوٹی تصحیحات کا محسوب کرنا۔ علاوہ اسکے مساوات

مف ما = فَمَا (لا) مف (لا) کو ایک تقریبی ضابطہ خیال کر کے ایسی صورت
میں استعمال کیا جاسکتا ہے جہاں متبوع متفرق کی چھوٹی تبدیلی کے جواب
میں تقابل کی قیمت پر اثر محسوب کرنا مطلوب ہو تو یہ جیسا ہم نے اوپر
دیکھا ہے باقی ماندہ غلطی یا خطا فَمَا (لا) و لا کی محض ایک چھوٹی کسر
ہوگی جبکہ مف (لا) نہایت چھوٹا ہو۔ اس کا مشہور عملی استعمال یہ ہے
کہ کسی عددی نتیجہ میں جو کسی خاص معطیات کی بنا پر حاصل کیا گیا ہو غلطی
یا خطا کی مقدار مف و م کی جائے جبکہ معطیات کے اندر کی خطاؤں اور
نادقتیوں کی مقدار مف و م ہو۔

اوپر کا طریقہ ایک لحاظ سے مکمل نہیں۔ اس کے تقریب میں خطا کی
مقدار کی کوئی نشان دی نہیں۔ یہ کمی دفعہ ۵۶ کے مسئلہ سے پوری کیا جاسکتی۔
وہاں ثابت کیا جائیگا کہ

مف ما = فَمَا (لا) مف (لا) مف (لا) مف (لا) ... (۴)

جہاں طہ کوئی مقدار ہے صفر اور ا کے درمیان - اس لئے اگر وقفہ لا تا لا + مفا میں مشتق تفاضل کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی قیمتیں اور جب ہوں تو تقریب (۱) میں خطائی مفا دار (۱-۲) مفا لا سے بڑی نہیں ہو سکتی -

مثال ۱- لوک جیوں کی جدول میں ایک منٹ کے لئے فرق محسوب کرو۔

$$\text{اگر } \text{ما} = \text{لوک جب لا تو } \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \text{مما مم لا}$$

۱۱۰ اور مفا ما = مم مم لا مفا لا تقریباً بشرطیکہ مفا لا کو قوسی پیمانہ میں بیان کیا جائے۔ رکھو

$$\text{مفا لا} = \text{آکافوسی ناپ} = \frac{\pi}{1.0800} = 2.909 \dots 6$$

تو حاصل ہوگا مفا ما = ۱۲۶۳ ۰۰۰ ۱۲ مم لا
یہ عددی جزو ضربی اس فرق کے مطابق ہے جو آ کے لئے ۵۵ کے قریب میں جدولوں میں مندرج ہے -

مثال ۲- ایک مثلث کے اضلاع ا، ب اور درمیانی زاویہ ج ناپا گیا ہے، اگر زاویہ کی پیمائش میں خطائی خطارہ جائے تو تیسرے ضلع کے محسوبہ طول ج میں خطا معلوم کرو۔

$$\text{ج} = \text{ا} + \text{ب} - ۲ \text{ا ب جم ج} \dots \dots \dots (۳)$$

اس مفروض پر کہ صرف ج اور ج بدلیں
ج مفا ج = ا ب جب ج مفا ج

$$\text{جس سے مفا ج} = \frac{\text{ا ب}}{\text{ج}} \text{جب ج مفا ج} = \text{ا جب ب مفا ج}$$

(۴)
یہ نتیجہ ہندی طور پر بھی حاصل ہو سکتا ہے، مثلاً اگر شکل میں جب ج ب = مفا ج اور بن (ب) پر عمود دار کھینچا جائے تو بالا خسر

لا = ا + طہ (ب - ا) (۷)
 جہاں طہ ایسی مقدار ہے جو صفر اور ایک کے درمیان واقع ہے۔ طہ کی
 ٹھیک قیمت بالعموم ا اور ب کی قیمتوں پر منحصر ہوگی۔ ب کی بجائے
 ا + ہ لکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کی بڑی مفید صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$\text{فہ (ا + ہ) - فہ (ا) = فہ (ا + طہ ہ) (۸)}$$

یا فہ (ا + ہ) = فہ (ا) + ہ فہ (ا + طہ ہ) (۹)
 اب اگر ا کی بجائے لا اور ہ کی بجائے مہ لا لکھا جائے تو حاصل
 ہوتا ہے

مہ فہ (لا) = فہ (لا + طہ مہ لا) مہ لا (۱۰)
 مسئلہ ماقبل سے ایک ضروری استنباط یہ ہے کہ اگر

$$\text{فہ (لا) = ... (۱۱)}$$

لا کی تمام قیمتوں کے لئے جو ایک خاص وقفہ کے اندر ہیں تو فہ (لا) اس
 تمام وقفہ میں مستقل ہوگا۔ کیونکہ اگر فہ (لا) بدلتا ہو تو فرض کرو کہ لا کی
 دو قیمتوں ا، ب کے لئے اس کی نامساوی قیمتیں ہیں۔ کسر

$$\text{فہ (ب) - فہ (ا) (۱۲)}$$

ب - ا
 کی قیمت اس صورت میں صفر سے مختلف ہوگی اور اس لئے ان کے درمیان
 لا کی کوئی ایک قیمت ہوگی جس کے لئے فہ (لا) صفر سے مختلف
 ہوگا، مگر یہ مفروض کے خلاف ہے۔

علاوہ اس کے اگر دو فیاعلوں فہ (لا) اور پہ (لا) کے مشتق ایک
 سعیت کے اندر لا کی تمام قیمتوں کے لئے مساوی ہوں تو وہ صرف لمحاظ ایک
 مستقل کے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ مفروضہ کی رو سے

$$\text{فہ (لا) - پہ (لا) = ... (۱۳)}$$

$$\text{یا } \frac{\text{فہ (لا)}}{\text{پہ (لا)}} = \text{..... (۱۴)}$$

جواب میں مف ع ہے یعنی
 مف ع = ف (لا + مف لا) + ما + مف ما - ف (لا + ما) ... (۳)
 دفعہ ۳۲ کی ہندی تغیر کے موافق افنی مستوی لا ما کے نقاط (لا + ما)
 اور (لا + مف لا) + ما + مف ما کے جواب میں سطح پر جو دو نقطے ہیں مف ع
 ان کے ارتفاعوں کا فرق ہے -
 اگر صرف لا کو بدلا جائے تو ع کا متناظر اضافہ دفعہ ۵۶ (۱۰) کی رو سے
 اس شکل کا ہوگا

پ مف لا (۴)
 جہاں پ، لا، ما اور مف لا کا ایک خاص تعامل ہے۔ اسی
 دفعہ سے اور تیز دی مشتق کے معنی سے ظاہر ہے کہ پ کی انتہائی قیمت
 جبکہ مف لا کو لا انتہا کم کر دیا جائے پ ہے جہاں

پ = جف ع (۵)
 جف لا
 اگر صرف ما کو بدلا جائے تو ع کا اضافہ ہوگا

ق مف ما (۶)
 جہاں ق کی انتہائی قیمت جبکہ مف ما کو لا انتہا کم کر دیا جائے یہ ہے

ق = جف ع
 جف ما

اب ہم فرض کرتے ہیں کہ حقیقی تغیر لا، ما سے لا + مف لا، ما + مف ما
 تک دو منزلوں میں عمل میں آتا ہے، پہلی منزل میں صرف لا اور دوسری
 میں صرف ما بدلتا ہے۔ تو ع کا عمل اضافہ اس طرح ہوتا ہے

مف ع = پ مف لا + ق مف ما (۸)
 جہاں ق، ق سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ دوسرے تغیر کا ابتدائی
 نقطہ (لا، ما) کی بجائے اب (لا + مف لا، ما) ہے -
 اس صورت میں (۸) کی شکل دریافت کرو جبکہ مف لا، مف ما یکجا

$$\text{چپ} = \frac{\text{فہ} (\text{لا} + \text{مف} \text{لا} \text{ما}) - \text{فہ} (\text{لا} \text{ما})}{\text{مف} \text{لا}} = \frac{\text{فہ} (\text{لا} + \text{طہ} \text{مف} \text{لا} \text{ما})}{\text{مف} \text{لا}} \dots (۱۳)$$

$$\text{ق} = \frac{\text{فہ} (\text{لا} + \text{مف} \text{لا} \text{ما} + \text{مف} \text{ما}) - \text{فہ} (\text{لا} + \text{مف} \text{لا} \text{ما})}{\text{مف} \text{ما}} = \frac{\text{فہ} (\text{لا} + \text{مف} \text{لا} \text{ما} + \text{طہ} \text{مف} \text{ما})}{\text{مف} \text{ما}} \dots (۱۵)$$

جہاں طہ، طہ ایسی مقداریں ہیں جو صفر اور ایک کے درمیان واقع ہیں۔ اسلئے
مف ع = فہ (لا + طہ مف لا ما) مف لا + فہ (لا + مف لا ما + طہ مف ما) مف ما

چونکہ دفعہ ۳۴ کی تعریف کے مطابق فہ، فہ مسلسل فرض کئے گئے ہیں اس
مساوات کی انتہائی شکل یہ ہے

$$\text{مف ع} = \text{فہ} \text{مف لا} + \text{فہ} \text{مف ما} \dots (۱۶)$$

مساوات (۱۱) سے ظاہر ہے کہ اعظم یا اقل قیمت کے قرب میں ع کا تغیر دوسرے
(یا اس سے اعلیٰ) ترتیب کی چھوٹی مقدار ہے کیونکہ ایسی صورت میں دفعہ ۵۳ سے

$$\text{جف ع} = \frac{\text{جف ع}}{\text{جف لا}} = \dots (۱۸)$$

پس کسی سطح کے اعظم یا اقل ارتفاع کے نقطہ پر ماسی مستوی بالعموم افقی ہوگا۔
جیسا بتایا گیا ہے اس کا عکس لازماً درست نہیں۔ دیکھو دفعہ ۵۱۔

اوپر کے مسئلہ کی متبوع متغیروں لا، ما، ہی..... کی کسی تعداد کے لئے
بآسانی توسیع کیجا سکتی ہے چنانچہ

$$\text{مف ع} = \frac{\text{جف ع}}{\text{جف لا}} \text{مف لا} + \frac{\text{جف ع}}{\text{جف ما}} \text{مف ما} + \frac{\text{جف ع}}{\text{جف ہی}} \text{مف ہی} \dots (۱۹)$$

بالآخر۔

۵۸۔ چھوٹی تصحیحات میں استعمال۔

دفعہ ۵۵ کی طرح دفعہ ماقبل کا مسئلہ چھوٹی خطاؤں کے محسوب کرنے میں
استعمال ہو سکتا ہے۔

مثال ۱۔ دفعہ ۵۵ مثال ۲ کی صورت میں اگر دو اضلاع اور درمیانی زاویہ میں خطائیں بالترتیب Δ مفا، Δ مفب، Δ مف ج ہوں تو ج میں کل خطا اس مساوات سے حاصل ہوگی

$$\Delta \text{ مف (ج)} = \frac{\Delta \text{ جفا (ج)}}{\Delta \text{ جفا}} + \frac{\Delta \text{ جفا (ج)}}{\Delta \text{ جفا}} + \frac{\Delta \text{ جفا (ج)}}{\Delta \text{ جفا}} + \frac{\Delta \text{ جفا (ج)}}{\Delta \text{ جفا}}$$

(۱)

اس سے حاصل ہوتا ہے

ج مف ج = (ا۔ ب جم ج) مفا + (ب۔ ا جم ج) مفب + (ب۔ ا جم ج) مف ج
یا مف ج = جم ج مفا + جم ج مفب + ا جم ج مف ج (۲)
مثال ۲۔ مثلث کا رقبہ Δ دو اضلاع Δ ب اور درمیانی زاویہ ج کی بناء پر دریافت کیا گیا۔

$$\Delta = \frac{1}{2} \Delta \text{ ب ج ج} \dots \dots \dots (۳)$$

$$\Delta \text{ لوک} = \frac{1}{2} \Delta \text{ لوک} + \frac{1}{2} \Delta \text{ لوک} + \frac{1}{2} \Delta \text{ لوک ج ج} \dots \dots \dots (۴)$$

$$\Delta \text{ مف ج} = \frac{\Delta \text{ مف ج}}{\Delta} = \frac{\Delta \text{ مف ج}}{\Delta} + \frac{\Delta \text{ مف ج}}{\Delta} + \frac{\Delta \text{ مف ج}}{\Delta} \dots \dots \dots (۵)$$

اس سے "تناسبی خطا معلوم ہوگی یعنی خطا مف Δ کو جو نسبت کل مقدار Δ سے ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ تمام پیمائشوں میں غلطی کی کل مقدار کا معلوم ہونا ایسا ضروری نہیں ہوتا جیسا کہ تناسبی غلطی کا۔

دفعہ ۵۶ کی تھیں سے ایک شہور نکتہ پیدا ہوتا ہے اگر غیر تابع علتوں کے رو سے کسی مقدار میں چھوٹے تغیر پیدا ہوں تو انہیں ایک ساتھ لگا دیا یا جمع کر دیا جاسکتا ہے۔ یہ اس امر سے ظاہر ہے کہ مف ج کے لئے مف لا، مف ما، مف می، کی رقوم میں جو جملہ ہے وہ غلطی یا درجہ اول کا ہے۔

مثلاً جب ترازو سے کسی جسم کا وزن معلوم کرتے ہیں تو ہوا کے اچھال کی وجہ سے کم تر ازاد کے بازوؤں کے نامساوی ہونے کی وجہ سے جو خطائیں پیدا ہوتی ہیں انہیں الگ الگ محسوب کر کے جبریہ طور پر جمع کر لیا جاسکتا ہے۔ ایسے عمل میں دوسرے تہ کی خطا رہ جائے گی۔

۵۹۔ تفاعلوں کے تفاعل کا تفرق۔ تضمینی تفاعل کا تفرق۔

دفعہ ۵ ضابطہ (۱۱) کا ایک اور مشہور استعمال یہ ہے کہ اسکی رو سے تفاعلوں کے تفاعل اور تضمینی تفاعل کا تفرق عمل میں آسکتا ہے۔

(۱) اگر $۶ = فہ (لا، ما)$ (۱)

جہاں لا، ما ایک متغیرات کے معلومہ تفاعل ہیں تو آخر الامر

مف ۶ = جف فہ مف لا جف فہ مف ما جف فہ مف ت (۲)

یا فر ۶ = جف فہ فر لا جف فہ فر ما جف فہ فر ت (۳)

اس نتیجہ کو استعمال کرنے سے باب دوم کے کئی نتیجے حاصل ہو سکتے ہیں پہلی ۱۱۔
ترقیم کے موافق ہم لکھ سکتے ہیں

ما = فہ (۶، و)

جہاں ۶ اور و لا کے معلومہ تفاعل ہیں۔ ضابطہ (۳) اس طرح ہو جاتا ہے

فر لا = جف فہ فر ۶ جف فہ فر و جف فہ فر ت (۴)

مثلاً اگر فہ (۶، و) = ۶ و (۵)

تو جف فہ و = جف فہ ۶ اور فر (۶ و) = فر ۶ + فر و (۶)

جو دفعہ ۳۰ کے مطابق ہے۔

اب اگر فہ (۶، و) = ۶ (۷)

تو جف فہ و = ۱۰ جف فہ ۶ = ۶ لوک ۶ و فہات ۲۸، ۲۴ کی رُو سے۔

اس کے فر (۶ و) = ۱۰ فر ۶ + ۶ لوک ۶ فر لا (۸)

جو دفعہ ۴۵ (۱) کے مطابق ہے۔
(۲) اگر ما، لا کا ضمیمی تفاعل ہو جس کی تفسیر اس مساوات سے ہوتی ہے
فما (لا، ما) = ... (۹)

تو اس مساوات کو لمبا ظ لا کے تفرق کرنے سے

$$\frac{\text{جف فما}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{فر لا}} + \frac{\text{جف فما}}{\text{جف ما}} = \frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}}$$

یا $\frac{\text{جف فما}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{فر لا}}{\text{فر لا}} + \frac{\text{جف فما}}{\text{جف ما}} = \frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}}$ (۱۰)
یہ دفعہ (۳۵) کے نتیجہ کی توسیع ہے۔


۶۔ مشتق تفاعلوں کے ہندی استعمال۔ کارٹیزمی محدود۔

دفعہ ۲۴ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس زاویہ کو یہاں سے تعبیر کریں جو منحنی
ما = فما (لا) (۱) کے کسی نقطہ پر کاماٹس (اسکی دائیں جانب کی
سمت) محور لا کی مثبت سمت کے ساتھ بناتا ہے تو

$$\frac{\text{فر ما}}{\text{فر لا}} = \text{مس یہاں} \dots \dots \dots (۲)$$

اس ضابطہ کی مدد سے منحنی کے متعلق کئی مقداریں لا، ما اور فر ما کی قوم میں بیان ہو سکتی ہیں

۱۱۸



اگر نقطہ پ پر کے ماس اور عماد محور لاے بالترتیب ت اور گ پر ماس اور معین کا پایہ ہو تو ت مر کو زیر ماس اور مرگ کو زیر عماد کہینگے۔

(۳) زیر ماس ت مر = مر پ مم پیہ = ما ÷ $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$ (۳)

(۴) زیر عماد مرگ = مر پ مس پیہ = ما $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$ (۴)

(۵) ماس = ت پ = مر پ قم پیہ = ما {۱ + $\left(\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}\right)^2$ } ÷ $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$ (۵)

(۶) عماد = پ گ = مر پ قط پیہ = ما {۱ + $\left(\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}\right)^2$ } (۶)

زیر ماس کے نقطوے محدودوں کے محوروں پر ہیں

(۷) وقت = و م = ت مر = لا - $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$ (۷)

و ع = ت و مس پیہ = ما - لا $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$ (۷)

(۸) مثال ۱۔ مکانی ما = ۴ اور لا (۸)
 میں طرفین کو ملحوظ لا کے تفرق کرنے اور ۲ پر تقسیم کرنے سے

(۹) ما $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$ = ۲ اور (۹)

جس سے حاصل ہوتا ہے کہ زیر عماد مستقل ہے اور طول میں ۲ کے مساوی ہے۔


زیر ماس ہے ما ÷ $\frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}}$ = $\frac{\text{ما}}{۲}$ (۱۰)

اور اس لئے یہ فصل کا دگنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مبدأ وقت مر کی تنصیف کرنا ہے۔

مثال ۲۔ زائد لا ما = گ (۱۱)

میں $\frac{فرما}{فرلا} + 6 = \dots\dots\dots (۱۲)$

پس ضابطہ (۷) سے ماس کے نقطوں کے محدودوں کے محوروں پر بالترتیب ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ حاصل ہوتے ہیں، اس لئے مرءوضت کی تنصیف کرتا ہے اور اس لئے کتب بحث عمر کی تنصیف کرتا ہے۔ یعنی ماس کا جو حصہ محدودوں کے محوروں کے درمیان گزرتا ہے اسکی نقطہ ماس تنصیف ہوتی ہے۔



شکل (۳۶)

ان مقطوعوں کا حاصل ضرب m لا یا m گ ہے اس لئے مثلث WTE کا رقبہ مستقل ہے اور $2k$ کے مساوی ہے۔

شال ۳- زیادہ عام طور پر $\frac{1}{2}$ ماٹ = مستقل (۱۳)

میں دونوں طرف کے لوکار تم لینے اور تفریق کرنے سے

$$(14) \dots\dots\dots = \frac{f_6}{f_5} \cdot \frac{c}{b} + \frac{p}{q}$$

اس سے متا ہے وقت = $\frac{r_1 - r_2}{\frac{f_2}{f_1} - 1} = \frac{r_1 - r_2}{\frac{f_2}{f_1} - 1} = \frac{r_1 - r_2}{\frac{f_2}{f_1} - 1}$

اسکے ع پ: پ ت = و م: م ت = لا: لا: م = ن: ن: ... (۱۵)
یعنی ماس عت کی نقطہ تاس پر مستقل نسبت سے تقسیم ہوتی ہے۔

اد پر کی دو صورتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ مکانی میں (مثال ۱) م = ۱ - ۱' = ۲'
زائد میں (مثال ۲) م = ۱' = ۱

اس کی ایک ضروری طبیعی مثال یہ ہے۔ گیس کے حجم اور دباؤ میں ”حررنا گذار“
رشتہ ہے اس مساوات سے بیان ہوتا ہے د ح جیسا کہ مستقل (۱۶)
اگر ح کو فصلہ اور د کو معین مان کر مثنیٰ بنایا جائے تو ماس کی نقطہ تاس پر نسبت جیسا:
سے تقسیم ہوتی ہے۔

مثال ۲۔ ناقص $\frac{لا}{ب} + \frac{لا}{ب} = ۱$ (۱۷)

تفرق سے $\frac{لا}{ب} + \frac{لا}{ب} = \frac{لا}{ب}$ جس سے $\frac{لا}{ب} = -$ (۱۸)

ماس کا مقطوعہ محور لا پر وت = لا - لا / $\frac{لا}{ب} = لا + \frac{لا}{ب}$

$$= لا + \frac{لا}{ب} (۱ - \frac{لا}{ب}) = \frac{لا}{ب}$$

جس سے و م: و ت = لا: لا: (۱۹)

عبارت کا مقطوعہ و گ = لا + لا / $\frac{لا}{ب} = (۱ - \frac{لا}{ب}) لا = ز' \times و م: و ت$ (۲۰)

جہاں ز' خروج المکرز ہے۔

۶۱۔ ایک متبذل کی رقوم میں محدود۔

بعض اوقات ایک مثنیٰ اس نمونہ کی دو مساواتوں

لا = فذ (ت) ، ما = خذ (ت) (۱)

کے ذریعہ متعین ہو سکتا ہے جہاں محدود ایک ذیلی متغیر کی قوم میں بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً حرکیات میں متحرک نقطہ کے محدود وقت کے تفاعلوں کے طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ت کی قیمتوں کو کوئی سوزوں سلسلہ یا جائے تو اس سے لا، ما کی متناظر قیمتیں حاصل ہو سکتی ہیں، اس طرح مخفی پڑتے نقطے مرسم ہو سکتے ہیں جتنے ہم چاہیں آتے کے ایک ساتھ کے اضافے مف لا، مف ما، مف ت ہوں تو

$$\frac{\text{مف ما}}{\text{مف لا}} = \frac{\text{مف ما}}{\text{مف ت}} \div \frac{\text{مف لا}}{\text{مف ت}} \quad \text{اس لئے اتھسایں}$$

$$\text{مس پہا} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرت}} \div \frac{\text{فرلا}}{\text{فرت}} \quad (۲) \dots\dots\dots$$

مثال ۱۔ ناقص میں لا = رجم فہا، ما = جب فہا، (۳)

$$\text{مس پہا} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرفہا}} / \frac{\text{فرلا}}{\text{فرفہا}} = \frac{\text{ب مم فہا}}{\text{ب مم فہا}} \quad (۴) \dots\dots\dots$$

مثال ۲۔ اگر جاذبہ ارض کے ماتحت کوئی شے حرکت کر رہی ہو تو

$$\text{لا} = \text{ر + عت}، \text{ما} = \text{ب + و ت} - \text{پ ج ت} \quad (۵) \dots\dots\dots$$

$$\text{جس سے مس پہا} = \frac{\text{فرما}}{\text{فرت}} / \frac{\text{فرلا}}{\text{فرت}} = \frac{\text{و ج ت}}{\text{ب ج ت}}$$

۶۲۔ مخفی کے کسی نقطہ پر ماس اور عماد کی مساواتیں۔

(۱) مخفی ما = فہا (لا) (۱)
پر دو نقطے پ (لا، ما) اور ق (لا، مف لا، ما، مف ما) ہیں، خطب ق پر کسی اور نقطے کے محدود (ظہا، یہا) ہیں جو ذیل کے رشتہ کو پورا کرتے ہیں

$$(۲) \dots\dots\dots \frac{\text{ظہ} - \text{لا}}{\text{مف} - \text{لا}} = \frac{\text{یہ} - \text{ما}}{\text{مف} - \text{ما}}$$

$$\text{یہ} - \text{ما} = \frac{\text{مف} - \text{ما}}{\text{مف} - \text{لا}} (\text{ظہ} - \text{لا}) \dots\dots\dots (\text{شکل ۱۹ صفحہ ۶۶})$$

انتہا میں جب 'ق' پ کے پاس آجائے تو اس مساوات کی شکل ہو جاتی ہے

$$(۴) \dots\dots\dots \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} (\text{ظہ} - \text{لا}) = \text{یہ} - \text{ما}$$

جو نقطہ پ پر کے ماسی خط کی مساوات ہے۔
چونکہ عماد کا ڈھال ماس کے ڈھال کا اول اور علامت میں مختلف ہوتا ہے اس لئے عماد کی مساوات ہے

$$(۵) \dots\dots\dots \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = (\text{ظہ} - \text{لا}) + (\text{یہ} - \text{ما})$$

(۲) اگر عماد اس شکل میں ہوں

$$(۶) \dots\dots\dots \text{لا} = \text{فہ} (\text{ت}) \text{ 'ما' } = \text{خما} (\text{ت}) \dots\dots\dots \text{تو (۲) کی رو سے قاطع پ ق پر}$$

$$(۷) \dots\dots\dots \frac{\text{ظہ} - \text{لا}}{\text{مف} - \text{لا} / \text{مفت}} = \frac{\text{یہ} - \text{ما}}{\text{مف} - \text{ما} / \text{مفت}}$$

اس لئے پ پر کے ماس کی مساوات ہے

$$(۸) \dots\dots\dots \frac{\text{ظہ} - \text{لا}}{\text{فرلا}} = \frac{\text{یہ} - \text{ما}}{\text{فرما}}$$

عماد کی مساوات باسانی حاصل ہوتی ہے

$$(۹) \dots\dots\dots \frac{\text{ظہ} - \text{لا}}{\text{فرلا}} + (\text{یہ} - \text{ما}) \frac{\text{فرما}}{\text{فرلا}} = \dots\dots\dots$$

(۳) اگر منحنی کی مساوات اس شکل

$$(۱۰) \dots\dots\dots \text{فہ} (\text{لا} \text{ 'ما' }) = \dots\dots\dots$$

میں معلوم ہوتا تو دفعتاً ۳۵، ۵۹ کی رو سے

$$(۱۱) \dots\dots\dots \frac{\text{جف فدا}}{\text{جف لا}} = \frac{\text{جف فدا}}{\text{جف لا}} \dots\dots\dots$$

اس لئے ماس کی مساوات ہے

$$(۱۲) \dots\dots\dots \frac{\text{جف فدا}}{\text{جف لا}} + (\text{یہا} - \text{ما}) \frac{\text{جف فدا}}{\text{جف لا}} = \dots\dots\dots$$

یہ اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ منحنی پر پ کے چھوٹے ہٹاؤ کے لئے

$$(۱۳) \dots\dots\dots \text{مف فدا} = \text{یا} \frac{\text{جف فدا}}{\text{جف لا}} \text{مف لا} + \frac{\text{جف فدا}}{\text{جف ما}} \text{مف ما} = \dots\dots\dots$$

$$(۱۴) \dots\dots\dots \text{مف لا} = \text{مف ما} = \text{ظہا} = \text{لا} : \text{یہا} - \text{ما} \dots\dots\dots$$

۱۔ نتیجہ (۱۲) حاصل ہو جاتا ہے۔

$$(۱۵) \dots\dots\dots \frac{\text{ظہا} - \text{لا}}{\text{جف فدا}} = \frac{\text{یہا} - \text{ما}}{\text{جف فدا}} \dots\dots\dots$$

$$(۱۶) \dots\dots\dots \text{ما} = ۳ \text{ لا} \dots\dots\dots \text{مف لا} = \frac{۱۲}{۶} \dots\dots\dots$$

$$(۱۸) \dots\dots\dots \text{ماس کی مساوات ہے یہا} - \text{ما} = \frac{۱۲}{۶} (\text{ظہا} - \text{لا}) \dots\dots\dots$$

$$(۱۹) \dots\dots\dots \text{جو (۱۶) کی رو سے معمولی شکل میں آتی ہے ما یہا} = ۲ \text{ لا} (\text{ظہا} + \text{لا}) \dots\dots\dots$$

$$(۲۰) \dots\dots\dots \text{مثال ۲} - \text{اگر مجدد اس شکل میں دے گئے ہوں لا} = ۱ \text{ ات} \text{ ما} = ۲ \text{ ات} \dots\dots\dots$$

۱۲۳

$$(۲۱) \dots\dots\dots \text{تو ضابطہ (۸) سے ماس ملتا ہے} \frac{\text{ظہا} - \text{لا}}{\text{ت}} = \text{یہا} - \text{ما} \dots\dots\dots$$

اور اس کی مزید تبویل اس شکل میں ہوتی ہے

$$(۲۲) \dots\dots\dots \text{یہا} = \frac{\text{ظہا}}{\text{ت}} + \text{ات} \dots\dots\dots$$


عماد کی مساوات ہے (ظہا۔ لا) ت + (یہا۔ ما) = ... (۲۳)
 یا ت ظہا + یہا = ا ت + ۲ ا ت (۲۳)
 چونکہ ت میں یہ تیسری درجہ کی مساوات ہے اسلئے کسی اختیاری نقطہ (ظہا یہا) سے تین حقیقی یا خیالی عماد مخرج گئے ہیں۔

مثال ۳۔ مرکز دار مخروطی (لا + ۲ ا) + ۲ ا + ۲ ا + ۲ ا + ۲ ا = ... (۲۵)
 کے کسی نقطہ پر ماس کی مساوات (۱۲) کی رو سے یہ ہے

(ظہا۔ لا) (لا + ۲ ا + ۲ ا) + (یہا۔ ما) (ہا + لا + ۲ ا) = ... (۲۶)
 یا (لا + ۲ ا + ۲ ا) ظہا + (ہا + لا + ۲ ا) یہا = ... (۲۶)

۴۳۔ قطبی محدود۔ فرض کرو کہ منحنی پر دو پاس کے نقطے پ' پ

ہیں اور پ کے قطبی محدود (ر' ا طہ) اور پ کے (ر + م ف ر' طہ + م ف طہ) ہیں پ' پ کو ملا دو اور و پ پر عمود پ ن نکالو تو
 پ ن = و پ جب پ و ن = ر جب م ف ط
 پ ن = و پ۔ و ن = ر + م ف ر۔ ر + م ف ط = م ف ر + (ر + ا) جم م ف ط



۱۲۲ جب م ف طہ لا انتہا کم ہو تو جب م ف طہ کی نسبت م ف طہ کے ساتھ
 انتہا میں ایک ہو جاتی ہے اور ۱ = جم م ف طہ = ۲ جب م ف طہ

دوسرے رتبہ کی چھوٹی مقدار ہے۔ اس لئے ہم لکھ سکتے ہیں

$$\text{مس پ پ و} = \frac{\text{پ پ ن}}{\text{مف ن}} = \frac{\text{رمف ط م}}{\text{مف ن}} + \text{ف م} \dots (۱)$$

جہاں ف م ایک مقدار ہے جس کی انتہائی قیمت صفر ہے۔ پس جب پ پ پ پر منطبق ہو اور ف م وہ زاویہ ہو جو منحنی کے نقطہ پ پ کا منحنی (جسے ط م کے بڑھنے کی سمت میں پھینچا جائے) سمتی نیم قطر کی مثبت سمت کے ساتھ بناتا ہے تو

$$\text{مس ف م} = \frac{\text{رف ط م}}{\text{ف م}} \dots (۲)$$

یہاں ط م کو ر کا تفاعل خیال کیا گیا ہے۔ اگر ر کو ط م کا تفاعل خیال کیا جائے تو ضابطہ ہوگا

$$\text{م م ف م} = \frac{۱}{\text{ر}} \frac{\text{فر}}{\text{ف م}} \dots (۳)$$

مثال ۱۔ دائرہ میں $r = ۲$ جب ط م $\dots (۴)$

$$\text{لوک ر} = \text{لوک ۲} + \text{لوک جب ط م}$$


* ذیل کا استدلال جو دفعہ ۲۳ کے اصول کا اطلاق ہے اس طور پر بڑھایا جاسکتا ہے

$$\text{ٹھیک طور پر مس پ پ و} = \frac{\text{رجب مف ط م}}{\text{مف ر} + ۲ \text{ رجب مف ط م}}$$

$$\text{مف ر} = \frac{\text{مف ط م} \times \text{جب مف ط م}}{\text{مف ر} + \frac{\text{مف ط م} \times \text{رجب مف ط م}}{\text{مف ر} + ۲ \text{ رجب مف ط م}}}$$

اور اس جملہ کی انتہائی قیمت $\frac{\text{فر}}{\text{ف م}}$ ہے۔

اور اس لئے $\frac{1}{r} = \frac{r}{r^2} = \frac{r}{\text{مقام جس سے ہم فاصلہ}} = \frac{r}{\text{مقام یا فاصلہ}} \dots\dots\dots (5)$



۲- ثابت کرو کہ منحنی $ما = لا^۲ - لا^۳ + لا^۴ + لا^۵ + لا^۶ - ۱۲$ اور

$$ما = لا^۴ - لا^۳ - لا^۲ + لا - ۲$$

محور لا کو مس کرتے ہیں اور معلوم کرو کہ اس کو کہاں کاٹتے ہیں منحنیات کو مرسم کرو۔

۳- جب لا بڑھتے بڑھتے فضا (لا) = کی کسی ایک اصل میں سے گزرے تو ثابت کرو کہ گزرنے سے عین پہلے فضا (لا) اور فضا (لا) کی مختلف علامتیں ہونگی اور گزرنے کے عین بعد ایک ہی علامت۔ کیا دوسری اصل کی صورت میں بھی یہ درست

۴- اگر $لا < لا$ کیلئے فضا (لا) = $\frac{لا^۲}{لا} - ۱$

اور $لا < لا$ کیلئے فضا (لا) = $۱ - \frac{لا^۲}{لا}$

لیکن $لا = لا$ کیلئے فضا (لا) = ۰

تو ثابت کرو کہ فضا (لا) فضا (لا) دونوں مسلسل ہیں لا = ۰ سے لا = ∞ تک۔

منحنی $ما = فضا (لا)$ کو مرسم کرو۔

۵- مسافات لا^۲ - لا^۳ + لا^۴ + لا^۵ - ۱۶ = ۰ کا دوسری اصول کے لئے معائنہ کرو۔

بائیں طرف کی مرسم کا حصہ کھینچو۔

۶- ثابت کرو کہ منحنی $ما = لا^۴ - لا^۳ - لا^۲ + لا - ۲$ محور لا کو مس کرتا ہے

اور دیکھو کہ یہ اسکو کہاں کاٹتا ہے۔ نیز معلوم کرو کہ کہاں پر منحنی کا ماس خط $لا + ما = ۰$

کے متوازی ہے۔ منحنی کا خاکہ کھینچو۔

۷- سروں ۱، ۲، ۳، ۴ کو معلوم کرو کہ منحنی

$$ما = لا^۴ + لا^۳ + لا^۲ + ج لا + د$$

نقطہ (۲، ۸) میں سے گزرے، محور لا کو نقطہ (۲، ۰) پر مس کرے اور اس نقطہ پر

جہاں لا = ۱ - اس کا ماس محور لا کے متوازی ہو۔

۸- ثابت کرو کہ جملہ (لا - ۱) + لا کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے مثبت ہے۔

۹۔ ثابت کر دکھ جب لا، لا - $\frac{y^3}{4}$ اور لا - $\frac{y^2}{6} + \frac{y^5}{120}$
کے درمیان واقع ہوتا ہے اور حجم لا، لا - $\frac{y^2}{2}$ اور لا - $\frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{24}$ کے
درمیان -

۱۰۔ ثابت کرو کہ اگر $\lambda^2 > 1$ تو لوک $(1 + \lambda)$ $\lambda - \frac{\lambda^2}{2}$ اور $\lambda - \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^2}{3}$ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

۱۱۔ ثابت کرو کہ اگر $\lambda^2 > 4$ تو $\cos \frac{\lambda}{2}$ اور $\frac{\lambda^2}{4}$ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

امثلہ ۱۶
(اعظم اور اقل قیمتیں)

۱۔ ثابت کرو کہ نقطہ کی تقسیم حرکت میں رفتار زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم ہوگی جبکہ اس راع علامت بدلے۔

سادہ موسیقی حرکت سے = رجمنٹ سے اسکی توضیح کرد۔

۲- تفاعل ۱-۸ + ۲-۲۲ - ۲-۲۴ + ۱-۱۲ اکبر عظمیٰ قتل فیتیس دریافت کرد۔

۳۔ ثابت کرو کہ تغافل $2 - 3 - 3 - 3 + 10$ اور اقل ہے جبکہ $2 - 3 =$

۴۔ تفاعل ۴ لا^۲ - ۱۸ لا^۲ + ۲۷ لا - کی کوئی اعظم قیامتیں نہیں۔

۵۔ تفاعل لاۛ ۵ لاۛ ۵ لاۛ ۱ کے اصل نقطے دریافت کرو اور اس کا معائنہ کرو کہ تفاعل کن کے لئے اعظم یا اتسل ہے۔

- ۷- ثابت کرو کہ تفاعل $۱۰\text{ لا}^۱ - ۱۲\text{ لا}^۲ + ۱۵\text{ لا}^۳ - ۲۰\text{ لا}^۴ + ۲۰\text{ لا}^۵$ اقل ہے جبکہ $۱۰ = ۱$ اور اس کے کوئی اور اعظم اور اقل نہیں ہیں۔
- ۸- اس کا معاملہ کرو کہ مساوات $۱\text{ لا}^۱ - ۲\text{ لا}^۲ + ۳\text{ لا}^۳ - ۲\text{ لا}^۴ + ۱\text{ لا}^۵$ کی کوئی مضفی اقل ہے۔ بائیں جانب کے حصہ پر تفاعل کے اہل نقطے معلوم کرو اور اس کی ترتیب بناؤ۔
- ۹- ثابت کرو کہ منحنی $۱\text{ لا}^۱ - ۲\text{ لا}^۲ + ۳\text{ لا}^۳ - ۲\text{ لا}^۴ + ۱\text{ لا}^۵$ کے محور کو دو نقطوں پر پس کرتا ہے اور اس کا اعظم معین دریافت کرو۔ منحنی کا خاکہ کھینچو۔
- ۱۰- ثابت کرو کہ تفاعل $۱\text{ لا}^۱ + ۲\text{ لا}^۲ - ۳\text{ لا}^۳ + ۲\text{ لا}^۴ - ۱\text{ لا}^۵$ اعظم ہے جبکہ $۱ = \frac{۳}{۲}$ اور اقل قیمت ہے صفر۔
- ۱۱- ثابت کرو کہ جملہ $\frac{۱ + ۲\text{ لا} + ۳\text{ لا}^۲}{۱ - ۲\text{ لا} + ۳\text{ لا}^۲}$ کی اعظم قیمت ہے ۳ اور اقل قیمت ہے $\frac{۱}{۳}$ ۔
- ۱۲- تفاعل $\frac{۱\text{ لا}^۱(۱ + ۲\text{ لا}^۲)}{۱ - ۲\text{ لا} + ۳\text{ لا}^۲}$ کی اعظم قیمت ہے ۲ اور اقل قیمت ہے -۲۔
- ۱۳- تفاعل $\frac{۱\text{ لا}^۱(۱ - ۲\text{ لا}^۲)}{۱ - ۲\text{ لا} + ۳\text{ لا}^۲}$ کی دو اعظم قیمتیں ہیں ہر ایک $= \frac{۱}{۲}$ اور دو اقل قیمتیں ہیں ہر ایک $= -\frac{۱}{۲}$ ۔
- ۱۴- تفاعل $\frac{۱\text{ لا}^۱ + ۲\text{ لا}^۲ + ۳\text{ لا}^۳}{۱ - ۲\text{ لا} + ۳\text{ لا}^۲}$ کے اہل نقطے دریافت کرو اور اس کی ترتیب کھینچو۔
- [اہل نقطے حاصل ہوتے ہیں مساواتوں $۱\text{ لا}^۱ = ۱$ ، $۳\text{ لا}^۲ = ۱$ سے]
- ۱۵- $\frac{۱۵\text{ لا}^۱ - ۱۸\text{ لا}^۲ + ۲۵\text{ لا}^۳}{۱ - ۲\text{ لا} + ۳\text{ لا}^۲}$ کے اہل نقطے دریافت کرو اور ترتیب کھینچو۔
- ۱۶- تفاعل $\frac{۱\text{ لا}^۱}{(۱ + ۲\text{ لا} + ۳\text{ لا}^۲)}$ اعظم ہے جبکہ $۱ = ۱$ اور اقل ہے

جیکہ لا = س ارب

۱۷۔ ثابت کرو کہ تفاسل $م (لا - لا) + م (لا - لا) + \dots + م (لا - لا) + م (لا - لا)$

اقل ہے جیکہ لا = $\frac{م (لا) + م (لا) + \dots + م (لا) + م (لا)}{م + م + \dots + م + م}$

۱۸۔ طول لہ کی لہروں کی رفتار گہرے پانی پر $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda}$ کے متقابل

ہے جہاں λ ایک خاص خطی مقدار ہے۔ ثابت کرو کہ رفتار کم سے کم ہوگی جیکہ $\lambda = 0$ ۔

۱۹۔ دخانی جہاز کو پانی کے اندر دھکیلنے کے لئے جو قوت درکار ہوتی ہے وہ رفتار کے کعب کے موافق بدلتی ہے۔ ثابت کرو کہ رد کے خلاف نہایت کفایت کے ساتھ جہاز چلانے کی شرح وہ رفتار ہوگی جو رد کی رفتار کا $\frac{1}{2}$ اگتا ہو۔

۲۰۔ دی ہوئی برقی رو کو ایک برقی اسٹیشن سے دوسرے تک تانبے کے تار کے ذریعہ لیجا ہے۔ ثابت کرو کہ کم سے کم لاگت والا تار کا قطر وہ ہوگا جس سے کہ کل لاگت کا سودا اس توانائی کی مقدار کے مساوی ہو جو تار کے گرم کرنے میں ضائع ہوتی ہے۔

[توانائی کے ضائع ہونے کی شرح عمودی تراش کے بالعکس متناسب ہے]

۲۱۔ دخانی جہاز کے روزانہ اخراجات مزدوری کی اجرت، اہل کے سود اور کوئلہ پر مشتمل ہیں۔ کوئلہ کے خرچ کی شرح ایسے بدلتی ہے جیسے رفتار کا کعب، ثابت کرو کہ اگر سفر کو کم سے کم لاگت دہی رفتار کے ساتھ طے کیا جائے تو کوئلہ کی لاگت مزدوری کی مقدار اور سود کے نصف کے مساوی ہوگی۔

۲۲۔ عدد خطی جہازوں میں سے ایک یہ الیکٹریک بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے دوسرا ٹھیک اس بندرگاہ سے باہر کو جا رہا ہے، ان کے راستے ایک دوسرے سے ۹۰° بناتے ہیں اور ان کی رفتاروں کی نسبت ۱:۲ ہے۔ ثابت کرو کہ ٹھیک اس آن میں جبکہ وہ ایک دوسرے کے قریب سے قریب ہوں بندرگاہ سے ان کے فاصلے نسبت ۵:۴

میں ہیں۔

۲۳۔ نصف قطر λ کے دائرہ میں برقی رو ہے اسکی وجہ سے جو قوت ایک

چھوٹے متفاطیس پر جس کا محور دائرہ کے محور پر منطبق ہوتا ہے اثر انداز ہوتی ہے وہ ایسے بدلتی ہے جیسے $\frac{لا}{(لا + ب)}$ جہاں لا متفاطیس کا فاصلہ ہے دائرہ کی مستوی سطح سے۔ ثابت کرو کہ قوت زیادہ سے زیادہ ہوگی جبکہ $لا = \frac{ب}{۲}$ ۔

۲۲۔ ثابت کرو کہ جملہ $ا + جم + ط + ب$ جب طما کی انتہائی قیمتیں $\pm ا + ب$ ہیں۔

۲۵۔ ثابت کرو کہ جب $(ط - ع + جم)$ $(ط - ب + ا)$ اعظم ہے یا قل جبکہ $ط = \frac{۱}{۲} (ع + ب + ا)$ $ا + ب + ج + ن$ اورن بالترتیب جفت ہو یا طاق۔

۲۶۔ رفاص کا میلان انتصابی خط کے ساتھ جبکہ ہوا کی مزاحمت کو ملحوظ رکھا جائے

اس ضابطہ سے حاصل ہوتا ہے $ط = ا + قو$ $جم (ن + ص)$ ثابت کرو بڑے سے بڑے اہمتر از وقت کے مساوی وقفوں $\frac{ن}{۲}$ کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے والا ہندسی سلسلہ بناتے ہیں۔

۲۷۔ منحنی $ما = لا + قو$ کا اعظم معین دریافت کرو۔ منحنی کو ترسم کرو۔

۲۸۔ منحنی $ما = لا + لوک لا$ کا اقل معین۔ $۲۶، ۲۷، ۲۸$ ہے۔ منحنی کو ترسم کرو۔

۲۹۔ ثابت کرو کہ ایک عدد لا کے لوکارتم کی نسبت اس عدد کے ساتھ بڑی سے بڑی ہوتی ہے جبکہ $لا = ۱$ ہو۔

۳۰۔ ثابت کرو کہ اگر $ا < ب$ تو جملہ $ا + جم + ب$ جنس لا کی اقل قیمت

$ا + ب$ ہے لیکن اگر $ا > ب$ تو اس کی قیمت نہ اعظم ہوگی نہ اقل۔

۳۱۔ ثابت کرو کہ تفاعل جنس $لا + جم$ لا کی اقل قیمت ہوگی جبکہ $لا = ۰$ ۔

لیکن اور کوئی اقل یا اعظم قیمت نہیں ہوگی۔

۳۲۔ ثابت کرو کہ تفاعل جنس $لا + جم$ لا کی اعظم قیمت ہوگی جبکہ $لا = ۰$ ، اقل

قیمت ہوگی جبکہ $\frac{5}{4} = \pi$ تقریباً، اور باری باری سے اعظم اور اقل قیمتوں کا ایک سلسلہ ہوگا جبکہ $(n = \pi + \frac{1}{n})$ تقریباً جہاں $n = 1, 2, 3, \dots$

۳۳۔ تفاعل $\frac{\text{جمن لا} + \text{جمن لا}}{1 + \text{جمن لا جمن لا}}$ کی اعظم اقل قیمتیں دریافت کرو۔

امثلہ ۱۱

ہندسی سوالات

- ۱۔ دئے ہوئے رقبہ کے لئے کم سے کم محیط والا مستطیل مربع ہے۔
- ۲۔ دئے ہوئے محیط والا مستطیل جس کا قطر چھوٹے سے چھوٹا ہو مربع ہے۔
- ۳۔ بڑے سے بڑا مستطیل جو ایک دئے ہوئے مثلث میں بن سکتا ہے رقبہ میں مثلث کا آدھا ہوتا ہے۔
- ۴۔ مثلث قائم الزاویہ کے اندر ایک مستطیل بنایا گیا ہے، اس کا ایک زاویہ زاویہ قائمہ پر منطبق ہوتا ہے، ثابت کرو کہ اس کا رقبہ اعظم ہوگا جبکہ مقابل کا کونہ وتر کی تنصیف کرے۔ ثابت کرو کہ مذکورہ حالات کے ماتحت مستطیل کا محیط نہ تو اعظم ہوگا نہ اقل۔
- ۵۔ بڑے سے بڑا یا کم سے کم محیط والا مستطیل معلوم کرو جو ایک دئے ہوئے دائرے کے اندر بنایا جاسکتا ہے۔
- ۶۔ دائرہ کے اندر ایک دئے ہوئے نقطہ (میں سے ایک وتر پ (ق) کھینچی گیا ہے، ثابت کرو کہ حصوں پ (ا) اور (ق) کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہوتا ہے جبکہ وتر (میں سے گزرنے والے قطر پر عمود وار ہو اور زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ وتر منطبق ہو۔
- ۷۔ ایک ثابت خط مستقیم اور دو ثابت نقطے (ب) خط کے باہر معلوم ہیں، خط کے اندر ایک ایسا نقطہ پ (ا) دریافت کرنا مطلوب ہے کہ (پ) + (پ) اقل ہو۔

۸۔ کم سے کم رقبہ والا مربع دریافت کرو جو ایک دئے ہوئے مربع کے اندر بنایا جاسکتا ہے اور بڑے سے بڑے رقبہ والا مربع دریافت کرو جو ایک دئے ہوئے مربع کے گرد بن سکتا ہے۔

۹۔ ایک چار ضلعی (چاق) جب قطعہ دائرہ کے اندر بنائی گئی ہے (چاق) قطعہ کا قاعدہ ہے۔ جب رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو تو ثابت کر دو کہ

$$(\text{چاق}) = (\text{چاق}) = (\text{قرب})$$

۱۰۔ ایک خط مستقیم نقطہ (ا، ب) میں سے بھینچا گیا ہے اور محدودوں کے (علی القوائم) محوروں کو بالترتیب چاق اور قق پر ملتا ہے ثابت کر دو کہ $\text{وچ} + \text{وق}$ کی اقل قیمت $1 + 2$ ا، ب + ب ہے۔

۱۱۔ ایک خط مستقیم ثابت نقطہ (ا، ب) میں سے گذرتا ہے ثابت کر دو کہ کم سے کم طول جو محدودوں کے محوروں کے درمیان قطع ہوتا ہے وہ $(\text{ا} + \text{ب})$ ہے۔

[محور علی القوائم]

۱۲۔ دھات کی مستطیلی چادر کے کونوں سے چار سادی مربے نکال دئے گئے ہیں اور اضلاع کو اوپر موڑنے سے ایک کھلا مستطیلی صندوق بنایا گیا ہے ثابت کر دو کہ جب صندوق کے اندر کا حجم زیادہ سے زیادہ ہو تو اس کی گہرائی ہوگی

$$\frac{1}{4} \{ (ا + ب) - (ا - ب) + ب \}$$

۱۳۔ ایک مکان کی دیوار پر ایک ۵ فٹ اونچی کھڑکی ہے اور اس کی دہلیز زمین سے ۲۰ فٹ کی اونچائی پر ہے بتاؤ کہ ایک شخص جس کی آنکھ زمین سے ۵ فٹ اونچی ہے دیوار سے کتنے فاصلے پر نظر ہو کہ کھڑکی کے سامنے اس کی آنکھ پر بڑے سے بڑا متصالی زاویہ بنے۔

۱۴۔ درخت کے اسطوانی تنے سے مستطیلی تراش کا ایک شہتیر کاٹنا مقصود ہے جس کے جھکاؤ کی استواری زیادہ سے زیادہ ہو۔ ثابت کر دو کہ تراش کا عرض قطر کا نصف ہونا چاہئے اور اس کی گہرائی قطر کی $\frac{1}{2}$ گنا ہونی چاہئے۔

(یہ مان لیا جائے کہ جھکاؤ کی استواری ایسے بدلتی ہے جیسے عرض اور گہرائی کا کلب) ۱۵۔ ایک چراگاہ کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایک سیدھی سڑک ہے اور چراگاہ کے ایسے مقام پر ایک شخص ہے جو سڑک کے قریب ترین نقطہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے۔ وہ کم سے کم وقت میں سڑک کے ایک دور کے مقام تک جانا چاہتا ہے اگر چراگاہ اور سڑک پر اس کے چلنے کی رفتاریں بالترتیب ۴ اور ۵ میل فی گھنٹہ ہوں تو ثابت کرو کہ اُسے سڑک سے ایک ایسے مقام پر جا ملنا چاہئے جس کا فاصلہ ۱ سے ۱/۲ میل ہے۔

۱۶۔ ایک کمرہ کی دیوار پر روشنی کا مبدأ زمین سے کتنی اونچائی پر لگا جائے کہ فرش کے ایسے نقطہ جس کا فاصلہ دیوار سے رہے روشنی کی چمک زیادہ سے زیادہ ہو۔ (یہ مان لیا جائے کہ کسی سطح پر روشنی کی چمک ایسے بدلتی ہے جیسے مبدأ سے فاصلہ کے مربع کا عکس، نیز ایسے بدلتی ہے جیسے اس زاویہ کی جیب التمام جو شعاعیں سطح کے عماد کے ساتھ بناتی ہیں)۔

۱۷۔ دو ذرے پ اور ق مستقل رفتاروں ع و ع' کے ساتھ دو ثابت میدان سے غطوں پر حرکت کرتے ہیں، یہ خط باہم و برقطع کرتے ہیں اگر ایک ہی وقت میں ذروں کے مقامات (ا اور ب) ہوں اور اگر (ا' = ا و ب' = ب) اور (ا و ب' = سہ تو فاصلہ پ ق کم سے کم ہوگا وقت

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ اور } \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}} \text{ جم سے کے بعد اور کم سے کم فاصلہ ہوگا}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ جب سہ}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}} \text{ جم سے}$$

۱۸۔ ایک قطعہ مکانی ایک ایسے وتر سے گھرا ہوا ہے جو محور پر عمود وار ہے۔ اس کے اندر بڑے سے بڑا مستطیل بنانا مقصود ہے ثابت کرو کہ اس کا طول قطعہ کے طول کا ۲/۳ ہے۔

۱۹۔ بڑے سے بڑا مستطیل جو ایک قطع ناقص کے اندر بن سکتا ہے اسکے قطر مساوی مزدوج قطروں پر منطبق ہوتے ہیں۔

- ۲۰۔ اگر ناقص کے ماس کا طول جو محوروں کے درمیان کٹتا ہے کم سے کم ہو تو ماس کی نقطہ ماس پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے جو بالترتیب ناقص کے نیم محوروں کے مساوی ہوتے ہیں۔
- ۲۱۔ قطع ناقص کا ماس، مخروطہ صدری محوروں کے ساتھ تقاطع سے کم سے کم رقبہ والا مثلث پیدا کرتا ہے، ثابت کرو کہ یہ ماس ناقص کے مساوی فردوج قطروں میں سے کسی ایک کے مساوی ہے۔
- ۲۲۔ دائری قطع کا محیط دیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ اس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا جبکہ قطع کا زاویہ ۲ نیم قطری ہو اور اس صورت میں رقبہ نیم قطر کے مربع کے مساوی ہوگا۔
- ۲۳۔ ایک مثلث کا قاعدہ دیا ہوا ہے، اگر باقی دو اضلاع کا مجموعہ معلوم ہو تو رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا جبکہ اضلاع مساوی ہوں۔
- ۲۴۔ ایک بیاضلعی کے چاروں اضلاع، ایک خاص ترتیب میں دے گئے ہیں ثابت کرو کہ اس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا اگر یہ دائرہ کے اندر بن سکے۔

امثلہ ۱۸

[ذیل کے نتائج مان لئے جائیں۔

- (۱) قائم دائری اسطوانہ کا نصف قطر اور ارتفاع c ہے، اس کی سطحی سطح πr^2 اور c ہوگی (۲) اس کا حجم $\pi r^2 c$ ہوگا۔
- (۳) قائم مستدیر مخروط کا ارتفاع c اور قاعدہ کا نصف قطر اور مائل ضلع l ہے۔ اس کی سطحی سطح πr^2 اور l ہوگی (۴) اس کا حجم $\frac{1}{3} \pi r^2 l$ ہوگا۔
- (۵) کرہ نیم قطر r اس کی سطح πr^2 اور $2r$ ہوگی (۶) اس کرہ کا حجم $\frac{4}{3} \pi r^3$ ہوگا۔
- ۱۔ بڑے سے بڑے حجم کا اسطوانہ جو ایک دے ہوئے کرہ کے اندر بنایا جاسکتا ہے کرہ کے حجم کا $\frac{2}{3}$ ہوگا، گنا حجم رکھتا ہے۔
- ۲۔ بڑے سے بڑے سطحی رقبہ والا اسطوانہ جو ایک دے ہوئے کرہ کے اندر بنایا جاسکتا ہے اس کی سطح کرہ کی سطح کی $\frac{1}{2}$ گنا ہوتی ہے۔
- ۳۔ بڑے سے بڑے حجم والا اسطوانہ جس کا سطحی رقبہ دیا ہوا ہے وہ ہے جس کا

ارتفاع قاعدہ کے قطر کے مساوی ہو اور اس کا حجم اُس کرہ کے حجم کا $\frac{۷۵}{۸۱}$ گنا ہوتا ہے جس کا سطحی رقبہ دی ہو۔

۴۔ دئے ہوئے حجم کے لئے کم سے کم سطح والا اسطوانہ دریافت کرو اور ثابت کرو کہ اسکی سطح کی نسبت مساوی حجم کے کرہ کی سطح کے ساتھ $\frac{۷۵}{۸۱}$ ہے۔

۵۔ کھلے اسطوانی ظرف کے ابعاد کی نسبت معلوم کرو کہ دئے ہوئے حجم کے لئے اسکی بناوٹ میں مسالہ کی مقدار کم سے کم صرف ہو۔ [اس کا ارتفاع قاعدہ کے نصف قطر کے مساوی ہونا چاہئے۔]

۶۔ قائم مستدیر مخروط کے اندر ایک اسطوانہ بنایا گیا ہے اس کا حجم اعظم ہوگا جبکہ اس کا ارتفاع مخروط کے ارتفاع کا $\frac{۱}{۳}$ ہو اور اس کا حجم اسوقت مخروط کے حجم کا $\frac{۷}{۲۷}$ ہوگا۔

۷۔ ایک اسطوانہ ایک قائم مستدیر مخروط کے اندر بنایا گیا ہے ثابت کرو کہ اس کی منحصر سطح اعظم ہوگی جبکہ اسطوانہ کا ارتفاع مخروط کے ارتفاع کا $\frac{۱}{۳}$ ہو۔ نیز ثابت کرو کہ اسطوانہ کی کل سطح کی اعظم قیمت نہیں ہو سکتی اگر مخروط کا نیم زاویہ $۶۶^{\circ} ۲۷' ۳۰''$ [= $\sin^{-1} \frac{1}{3}$] سے بڑا ہو۔

۸۔ دئے ہوئے کرہ کے اندر جو بڑے سے بڑے حجم والا مخروط بنایا جاسکتا ہے اس کا ارتفاع کرہ کے قطر کا $\frac{۲}{۳}$ ہوگا۔ نیز ثابت کرو کہ مخروط کی منحصر سطح ارتفاع کی اسی قیمت کے لئے اعظم ہوگی۔

۹۔ اگر ایک دئے ہوئے کرہ کے گرد قائم مستدیر مخروط بنایا جائے تو اس کا حجم کم سے کم ہوگا جبکہ اس کا ارتفاع کرہ کے قطر کا دگنا ہو۔ نیز ثابت کرو کہ نیم راسی زاویہ

$۶۸^{\circ} ۱۹'$ [= $\cos^{-1} \frac{1}{3}$] ہوگا۔

۱۰۔ اگر قائم مستدیر مخروط کا حجم مستقل رکھا جائے تو سطح زیادہ سے زیادہ ہوگی جبکہ ارتفاع قاعدہ کے قطر کا $\frac{1}{2}$ گنا ہو۔

۱۱۔ دھات کی گول چادر سے ایک قطاع دائرہ کا ٹٹا مقصود ہے کہ باقی حصہ ایک مخروطی ظرف بن سکے جس کی گنجائش زیادہ سے زیادہ ہو۔ ثابت کرو کہ قطاع کا زاویہ ۶۶° ہونا چاہئے۔

۱۲۔ کھلے مستطیلی تالاب میں پانی کا دیا ہوا حجم آسکتا چاہئے، بتاؤ کہ اسکے ابعاد کے

- تناسب کیا ہوں کہ سیمیہ سے اس کو منڈھوانے کے اخراجات کم سے کم ہوں۔
 [طول اور عرض دونوں گہرائی کے دو چند ہونے چاہئیں]
 ۱۳۔ مستطیل متوازی السطوح کے تین متقاطع کناروں کا مجموعہ معلوم ہے۔ اس کی شکل دریافت کرو کہ سطح زیادہ سے زیادہ ہو۔
 ۱۴۔ بڑے سے بڑے حجم والا مستطیل متوازی السطوح جو ایک کرہ کے اندر بن سکتا ہے مکعب ہے۔
 ۱۵۔ بڑے سے بڑے حجم والا مستطیل متوازی السطوح جس کی بیرونی سطح معلوم ہو مکعب ہے۔
 ۱۶۔ بند بیضوی منحنی میں بڑے سے بڑے رقبہ والا مثلث بنایا گیا ہے، ثابت کرو کہ رأسوں پر کے تماس مقابل کے اضلاع کے متوازی ہیں۔
 ۱۷۔ بند بیضوی منحنی کے گرد کم سے کم رقبہ والا مثلث بنایا گیا ہے، ثابت کرو کہ اضلاع کی نقاط تماس پر نصف ہوتی ہے۔
 ۱۸۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ والا مثلث جو ایک دائرہ کے اندر بن سکتا ہے وہ مساوی الاضلاع مثلث ہے، اور کم سے کم رقبہ والا مثلث جو دائرہ کے گرد بن سکتا ہے وہ بھی مساوی ضلعوں والا مثلث ہے۔
 ۱۹۔ بڑے سے بڑے رقبہ والا کثیر الاضلاع جس کی تعداد اضلاع n دی ہوئی ہو اور جو ایک دائرہ کے اندر بن سکے منظم کثیر الاضلاع ہو گا نیز n اضلاع کا کم سے کم رقبہ والا کثیر الاضلاع جو ایک دائرہ کے گرد بن سکتا ہے وہ بھی منظم کثیر الاضلاع ہے۔
 ۲۰۔ یہ مانکر معلوم کیجئے کہ لے بڑے سے بڑے رقبہ والا مستطیل مربع ہے، بتاؤ کہ اس سے فوراً یہ کس طور پر مستبد ہوتا ہے کہ دے ہوئے رقبہ کے لئے کم سے کم گھیرے والا مستطیل مربع ہے۔

۱۳۲

- اسی طور پر اوپر کے سوالات ۱۳ اور ۱۵ سے کیا نتائج اخذ ہو سکتے ہیں۔
 ۲۱۔ n اضلاع کا کثیر الاضلاع معلوم گھیرے کے لئے جس کا رقبہ اعظم ہو یا معلوم رقبہ کے لئے جس کا گھیرہ اقل ہو منظم کثیر الاضلاع ہو گا۔
 [امثلہ ۱۰ سوال ۲۴ کا نتیجہ مان لو]۔

اس سے ثابت کرو کہ معلوم گھیرے کے لئے اعظم رقبہ کی شکل یا معلومہ رقبہ کے لئے اقل گھیرے کی شکل، دائرہ ہوگی۔

۲۲۔ ٹیپہ خانہ (پوسٹ آفس) کے قواعد کی رو سے پارسل کے طول اور گھیرے کا مجموعہ ۶ فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ ثابت کرو کہ بڑے سے بڑے حجم والا پارسل جو بھیجا جاسکتا ہے وہ ایک اسطوانہ ہے جو طول میں ۶ فٹ اور گھیرے میں ۴ فٹ ہو۔ اس کے حجم ۲۶۵۴۶ مکعب فٹ ہوگا۔

امثلہ ۱۹

چھوٹے تغیرات

۱۔ ثابت کرو کہ لوکارتمی تماسوں کی جدول میں ۱۰۰ محسوب کئے گئے ہوں ۶۰ کی پڑوس میں ایک منٹ کے لئے فرق تقریباً ۲۹۔۔۔۶ ہے۔

۲۔ ایک برج کی بلندی ب اس کے پایہ سے فاصلہ L پر زاویہ ارتفاع (عم) مشاہدہ کرنے سے معلوم کی گئی ہے، ثابت کرو کہ مشاہدہ شدہ ارتفاع میں خطا صف عم کے جواب میں خطا ہے

مقاب = $\frac{1}{\sin \theta}$ خطا

اگر $\theta = ۱۰^\circ$ ، $\sin \theta = ۰.۱۷۳۶$ اور زاویہ میں خطا $\Delta \theta$ ہو تو ثابت کرو کہ

مقاب = $\frac{1}{\sin \theta} \Delta \theta$ کا جذر الکعب دریافت کرو، یہ معلوم ہے کہ ۱۰۰ کا جذر الکعب

۳۶۴۶۴۶۴۶ ہے۔ (۲۶۵۴۰)

۳۔ لوگ ۱۰ = ۲.۳۰۲۶، معلوم ہے، لوگ ۱۰ کی تقریبی قیمت معلوم کرو۔ جواب :- (۲.۳۰۲۶۱۵۱)

۵۔ ضد لوکارتموں (۱۰ = ۱) کی جدول میں ۱۰ کے محاذی اندراج

۲۶۵۱۱۸۸۶ ہے، ۱۰ کے ضد لوکارتم دریافت کرو۔ (۲۶۵۱۱۸۸۶) جواب :- (۲۶۵۱۲۱۷۹)

۶۔ لوگ ۱۰ سے ایک زاویہ دریافت کیا جائیگا۔ اگر لوگ ۱۰ سے

محسوب کرنے میں غلطی ۱۰۰۰ رہ گئی ہو تو قوسی سکندوں میں زاویہ کی خطا دریافت کر دے، زاویہ ۳۰ کی پُر دوس میں ہے۔ [۲۰.۵۶]

۷۔ لوک قاطعوں کی جدول میں جو اساس ۱۰ پر محسوب کئے گئے ہیں، ایک منٹ کے لئے فرق ۳۰ کی پُر دوس میں تقریباً ۰.۰۰۰۰۰ ہو گا۔

۱۳۵

۸۔ معلوم ہے جمنہ ۵ = ۲۰.۹۹، جمنہ ۱۰ = ۵۱.۰۱ کی قیمت محسوب کر دے۔

۹۔ مسنر ۵ = ۲۶.۱۲، مسنر ۱۰ = ۵۱.۰۱ کی قیمت معلوم کر دے۔ [۲۰.۵۶]

۱۰۔ اگر فم (لا) مسلسل اور قابل تفرق ہو سو اسے قیمت (لا) = (لا) پر جہاں یہ لائننا ہی ہو جاتا ہے تو ثابت کر دے فم (لا) بھی لائننا ہی ہو گا۔

۱۱۔ حماسی برق یہاں سوئی کے انحراف کا حماس برقی رو کے متناسب ہوتا ہے، ثابت کر دے قرأت کی معلوم خطا کے جواب میں جو رو کی محصلہ قیمت میں متناسب خطا ہوگی وہ کم سے کم ہوگی جبکہ انصراف ۴۵ ہو۔

۱۲۔ ایک عدد کے محور پر ایک نقطہ اور اس کی تصویر یا خیال کے فاصلے

عدد سے (لا) (لا) ذیل کے رشتہ سے مربوط ہیں $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$

ثابت کر دے کسی چھوٹی شے کی طولی تضعیف (لا) ہے۔

۱۳۔ ایک کرنیک و پ، و کے گرد زاوی رفتار سہ کے ساتھ گھومتا ہے، ایک و اہل صلاح پ ق پ پر عمل کر دی گئی ہے اور ق ایک ثابت نالی و لا میں حرکت کرنے کے لئے مجبور ہے، ثابت کر دے ق کی رفتار سہ x و میں ہے جہاں سہ ایسا نقطہ ہے جس پر خط ق پ (معدودہ بشرط ضرورت) و میں سگد زبوا و لا پر معدودہ خط سے ملتا ہے۔

۱۴۔ ایک جسم کی کثافت (س) ہو اور پانی میں اس کے اوزان بالترتیب (و) و سے حاصل کی گئی ہے، ثابت کر دے تو سنے کی خطا و مف و مف و کے جواب میں کثافت کی متناسب خطا ہوگی۔

$$\frac{\text{مف س}}{\text{س}} = \frac{\text{و}}{\text{و}} - \frac{\text{و}}{\text{و}} \times \frac{\text{مف و}}{\text{و}} + \frac{\text{مف و}}{\text{و}} - \frac{\text{و}}{\text{و}}$$

۱۵۔ ایک کروکہ کا نیم قطر ر ہوا اور پانی میں تولنے سے نکالا گیا ہے، ثابت کرو کہ تولنے کی چھوٹی خطاؤں کی وجہ سے متناسب خطا ہوگی

$$\text{مف ر} = \frac{\text{مف و} - \text{مف و}}{\text{ر}} = \frac{\text{مف و} - \text{مف و}}{\text{ر}} \quad \text{جہاں و، و، و بالترتیب ہوا اور پانی}$$

کے اندر وزن ہیں۔

۱۶۔ ناقص کے رقبہ (م) کی خطا جبکہ نیم محوروں و، ب کے ناپے میں چھوٹی خطائیں ہوں یہ ہوگی

$$\text{مف م} = \frac{\text{مف و}}{\text{و}} + \frac{\text{مف ب}}{\text{ب}}$$

۱۷۔ اگر مثلث کے تینوں اضلاع و، ب، ج ناپے جائیں تو اضلاع کی پیمائش میں چھوٹی خطاؤں کی وجہ سے زاویہ و کی خطا ہوگی

$$\text{مف و} = \frac{\text{ج ب و}}{\text{ج ب ج}} - \frac{\text{مف و}}{\text{و}} - \frac{\text{مف ب}}{\text{ب}} - \frac{\text{مف ج}}{\text{ج}}$$

۱۸۔ ایک مثلث کا رقبہ ق اس کے ایک ضلع و اور متصل زاویوں

(ج، ب، ج) کے ناپے سے حاصل کیا گیا ہے، ثابت کرو کہ پیمائش کی چھوٹی خطاؤں کی وجہ سے رقبہ میں متناسب غلطی ہے

$$\text{مف ق} = \frac{۲}{\text{و}} + \frac{\text{ج}}{\text{و}} \frac{\text{مف ب}}{\text{ب}} + \frac{\text{ب}}{\text{و}} \frac{\text{مف ج}}{\text{ج}}$$

اس نتیجہ کی ہندسی طور پر تصدیق کرو۔

۱۹۔ ایک مثلث کا رقبہ ق اس کے اضلاع کے طولوں و، ب، ج سے محسوب کیا گیا ہے، اگر ایک ہی مقدار عما سے و کو گھٹایا اور ب کو بڑھایا جائے تو ثابت کرو کہ اسکی وجہ سے رقبہ میں تبدیلی ہوگی

$$\text{مف ق} = \frac{۲(ب - و) عما}{\text{ج} - (و - ب)}$$

ما = لا کے متوازی ہے۔ ثابت کر دو کہ ان میں سے دو نقطوں پر ایک ہی ماس ہے۔
 ۶۔ مبدأ سے منحنی ما = ۴ لا - ۱۲ لا + ۹ لا - لا کے جو ماس کھینچ سکتے ہیں ان کی مساواتیں دریافت کرو۔ نیز معلوم کر دو کہ کہاں پر ماس محور کا لا کے متوازی ہے۔ شکل بناؤ۔
 ۷۔ ایک منحنی کے کسی نقطہ کا ماس اور معین دونوں کھینچے گئے ہیں، معین کے پایہ سے ماس پر عمود نکالا گیا ہے۔ ثابت کر دو کہ یہ عمود ہے ما ÷ { ۱ + (فرما) } اُس لئے ثابت کر دو کہ زنجیر ما = ج جنم - لا میں یہ عمود مستقل ہے۔

۸۔ ثابت کر دو کہ مبدأ سے ماس پر عمود (ما - لا فرما) ÷ { ۱ + (فرما) } اُس لئے ہے دائرہ ما = ± لا - لا کی صورت میں اس کی تصدیق کر دو کہ یہ عمود مستقل ہے اور قائم قطع زائد لا ما = ک کی صورت میں یہ $\frac{k^2}{la + la^2}$ کے مساوی ہے۔
 ۹۔ توت نامی منحنی (شکل ۲۴ صفحہ ۱۱۰) ما = ب فو میں ثابت کر دو کہ زیر ماس مستقل ہے اور زیر عماد $\frac{a}{b}$ ہے۔
 ۱۰۔ زنجیر ما = ج جنم - لا میں زیر ماس ج جنم - لا ہے، زیر عماد

$\frac{1}{4}$ ج جنم $\frac{la}{ج}$ اور عماد $\frac{a}{ج}$ ہے۔

۱۱۔ منحنی ما = لا - لا کا زیر ماس ن لا ہے۔

۱۲۔ ثابت کر دو کہ منحنی (لا) + (ب) = ن کی تمام قیمتوں کے لئے خط مستقیم $\frac{la}{b} + \frac{a}{b} = ۲$ کو نقطہ (ا، ب) پر پس کرتا ہے۔

۱۳۔ جیبوں کے منحنی ما = ب جب $\frac{لا}{ر}$ میں زیر ماس $\frac{لا}{ر}$ مس $\frac{لا}{ر}$ ہے

زیر عماد $\frac{۱}{۲}$ جب $\frac{لا}{ر}$ اور عماد ب جب $\frac{لا}{ر}$ $\left[۱ + \frac{ب \cdot \frac{لا}{ر}}{\frac{لا}{ر}} \right]$

۱۴۔ ثابت کرو کہ منحنی ما = قو $\frac{لا}{ر}$ جب بہ لا ' ما = قو - عدا

اُن نقطوں پر مس کرتے ہیں جہاں پر جب لا = $۲\pi + \frac{\pi}{۲}$ جبکہ صحیح عدد ہے
منحنیوں کو کھینچو۔

۱۵۔ ثابت کرو کہ مبدائیں سے خطوں کا ایک جوڑا ایسا کھینچ سکتا ہے کہ ہر ایک خط اُن تمام منحنیوں کو مس کرے جو مسادات ما = ج جنم $\frac{لا}{ر}$ میں ج کو مختلف قیمتیں دینے سے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۶۔ ایک متحرک نقطہ کی رفتار (ع) کو معین اور رقبہ مرتسمہ کو فصلہ مانکر ایک منحنی بنایا گیا ہے، ثابت کرو کہ اس عماد زیر عماد سے تعبیر ہوگا۔

۱۷۔ ایک ذرہ کی توانائی بالفعل $\left(\frac{۱}{۲} م ع^۲ \right)$ کو معین اور فضا میں کو فصلہ مانکر ایک منحنی بنایا گیا ہے، ثابت کرو کہ قوت منحنی کے دُحال سے تعبیر ہوتی ہے۔

۱۸۔ ثابت کرو کہ منحنیات ما = $\frac{لا}{ر}$ $\left(۱ - \frac{لا}{ر} \right)$ $\frac{لا}{ر}$ + $\frac{ما}{ب} = ۱$

کے ماسوں کی مساواتیں بالترتیب ذیل کی شکلوں میں رکھی جاسکتی ہیں

$$ما = \frac{لا}{ر} \left\{ \frac{لا}{ر} + (۱ - \frac{لا}{ر}) \right\} \frac{لا}{ر} + \frac{ما}{ب} = ۱$$

۱۹۔ خط ما = م لا + ج کے متوازی، مخروطی تراش فہ (لا، ما) = کے ماس کھینچے گئے ہیں، ثابت کرو کہ ان کے نقاط ماس کے ملانے والے خط کی مسادات ہے

$$\frac{جف فہ}{جف لا} + \frac{جف فہ}{جف ما} = ۰$$

139

۲۰۔ محدود انخدا والے بند بیضوی منحنی کے وتر ایک ثابت سمت کے متوازی کھینچے گئے ہیں، ثابت کرو کہ اس نظام میں کم از کم ایک وتر ایسا ضرور ہے جسکے سروں پر کے تماس متوازی ہیں۔

۲۱۔ ثابت کرو کہ ناقص (۱ = ۱ جم (طہ + عبا) = ۱ جم (طہ + جہا) میں نقطہ طہ پر کا ماس نقطہ طہ میں سے گزرنے والے نیم قطر کے متوازی ہوگا اگر $\text{طہ} - \text{طہ} = \pm \frac{\pi}{2}$ ۔

۲۲ - ناقص لا = اوجم طہ + رجب طہ ما = بجم طہ + بجم طہ
 کے مدد پر محوروں کے جواب میں طہ کی قیمتیں دریافت کرو

$$[مس ۲ طه = \frac{(ا ۱ + ب ۱)^۲}{ا ۱ + ب ۱ - ۲ ا ۱ ب ۱}]$$

۲۳۔ اس کے لئے شرط کہ متغی فہ (لا' ما) = کا عا دبدائیں سے گزرے
یہ ہے $\frac{\text{لا جف فہ}}{\text{حف ما}} - \frac{\text{ما جف فہ}}{\text{حف لا}} = 0$

مخروطی تراش 1 لا + 2 ہ لا ما + جب ما = اکے صدری محوروں کی مساوات دریافت کرو۔

۲۴۔ اگر $b < 12$ تو مبدأ سے مکانی لا^۱ = ۴ اور (ما + ب) کے تین حقیقی

۲۵۔ قائم زائد لا۱۔ ما۲ = ا کے کسی نقطہ پر کا عماد محدودوں کے محوروں پر جو نقطہ بناتا ہے انہیں معلوم کرو اور ثابت کرو کہ ان کے مربعوں کا فرق مستقل ہے۔

۲۶۔ ثابت کرو کہ زائد لا = گ ت، ما = گ ت کے ماس کی مساوات

لا + ت^۱ = ت^۲ گیت ہے۔

۲۷- اگر $\lambda^2 = \lambda^1 + \lambda^2$ تو ثابت کرو کہ $\lambda^1 + \lambda^2 + \lambda^3$ اعظم ہوگا جبکہ $\lambda^1 \pm \lambda^2$ منفی کو مرسم کرو اور ثابت کرو کہ دائرہ $\lambda^1 + \lambda^2 = \lambda^3$ سے اس کا نیادہ سے زیادہ نیم قطری ہوتا ہے۔

۱۸۹ اس ہے۔

۲۸۔ ثابت کرو کہ مکانی $\frac{1}{r} = \text{جب } \frac{1}{\rho} \text{ میں جہاں ماس کو قطب ہے } f = \frac{1}{r} - \frac{1}{\rho}$

اس لئے ثابت کرو کہ ماس ماسکی فاصلہ اور محور کے ساتھ مساوی زاوے بناتا ہے۔

۲۹۔ ایک منحنی پر دو متصل نقطے پ ' پ' لئے گئے ہیں، خطوط مستقیم پ ' پ' پر نیم قطروں پر علی القواوم کھینچے گئے ہیں، ثابت کرو کہ پ ' پ' کی انتہائی قیمت جبکہ

پ ' پ' پر منطبق ہو $\frac{1}{r} = \frac{1}{\rho}$ ہے۔۳۰۔ $f = \frac{1}{r} - \frac{1}{\rho}$ وہ زاویہ ہے جو منحنی کا ماس مبدا میں سے گزرنیوالے سمتی نیم قطر کے ساتھ بناتا ہے ثابت کرو کہ


$$\text{مس } f = \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{\rho}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{\rho}}$$

۳۱۔ قائم قطع زائد $\frac{1}{r} = \text{جم } \frac{1}{\rho} = \frac{1}{r} - \frac{1}{\rho}$ میں ثابت کرو کہ وہ خطوط جو نیم قطر اور ماس کے درمیانی زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں سمت میں مستقل ہیں۔۳۲۔ ثابت کرو کہ منحنی $\frac{1}{r} = f - \frac{1}{\rho}$ کے ماس کی مسادات نقطہ $\rho = \frac{1}{f}$ پر ہے

$$\frac{1}{r} = f - \frac{1}{\rho} \text{ جم } \left(\frac{1}{\rho} - f \right) + f \text{ جب } \left(\frac{1}{\rho} - f \right) = 0$$

اسلئے ثابت کرو کہ مخروطی تراش $\frac{1}{r} = \frac{1}{\rho} + 1$ زجم ρ کے ماس کی مسادات

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\rho} + \text{جم } \left(\frac{1}{\rho} - f \right)$$



پانچواں باب

اعلیٰ رتبہ کے مشتقات

۶۴۔ تعریف اور ترقیم۔ اگر ما متغیر لا کا تفاعل ہو تو مشتق تفاعل فرما بھی عموماً لا کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ فرما کو تفرق کرنے کا نتیجہ فرلا۔ دوسرے تفرقی سر یا دوسرے مشتق کہلاتا ہے اور اگر یہ تفرق کے قابل ہے تو نتیجہ کو تیسرے تفرقی سر یا تیسرے مشتق کہتے ہیں اور اسی طرح اعلیٰ رتبہ والے مشتقوں کے لئے۔ اگر فرجے کو اس عمل کی علامت تصور کیا جائے تو پہلے دوسرے تیسرے ن ویں مشتقوں کو بالترتیب حسب ذیل علامات سے ظاہر کیا جائیگا

فرلا (فرجے) ما (فرجے) ما (فرجے) ما

انکی زیادہ عام شکل ہے فرلا فرما فرلا فرما فرن ما انیس اوپر کی علامات کا اختصار گھنا چاہئے۔

نیز دفعہ ۲۵ کے مطابق فرجے کے بجائے عف لکھنے سے ہمیں

عف ما عفا ما عفا ما عفا ما مل ہوتے ہیں۔

اور علیٰ ہذا قیاس -

$$\text{عفا} = \text{بہا جب} (\text{بہا} + \frac{\pi}{2}) \quad \text{یا بطر زدیگر}$$

$$\text{اور اس لئے} \quad \text{عفا} = \text{بہا جب} (\text{بہا} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{اور شکل عامہ} \quad \text{عفا} = \text{بہا جب} (\text{بہا} + \frac{\pi}{2} \text{ ن}) \quad (۹) \dots\dots\dots$$

$$\text{مثال ۴ -} \quad \text{اگر} \quad \text{ما} = \text{جم بہا} \quad (۱۰) \dots\dots\dots$$

$$\text{تو عفا} = \text{بہا جب بہا} \quad \text{عفا} = \text{بہا جم بہا} \quad \text{عفا} = \text{بہا جب بہا} \quad \text{عفا} = \text{بہا جم بہا} \quad (۱۱) \dots\dots\dots$$

اور علیٰ ہذا قیاس -

$$\text{یا عفا} = \text{بہا جم} (\text{بہا} + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{اس لئے عفا} = \text{بہا جم} (\text{بہا} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{اور شکل عامہ} \quad \text{عفا} = \text{بہا جم} (\text{بہا} + \frac{\pi}{2} \text{ ن}) \quad (۱۲) \dots\dots\dots$$

$$\text{مثال ۵ -} \quad \text{اگر} \quad \text{ما} = \text{فو} \quad \text{جم بہا} \quad (۱۳) \dots\dots\dots$$

$$\text{تو عفا} = \text{فو} \quad \text{جم بہا} \quad \text{عفا} = \text{بہا جب بہا} \quad \text{عفا} = \text{بہا جم بہا} \quad (۱۴) \dots\dots\dots$$

$$\text{اسی طرح اگر} \quad \text{ما} = \text{فو} \quad \text{جب بہا} \quad (۱۵) \dots\dots\dots$$

$$\text{تو عفا} = \text{فو} \quad \text{جب بہا} \quad \text{عفا} = \text{بہا جب بہا} \quad \text{عفا} = \text{بہا جم بہا} \quad (۱۶) \dots\dots\dots$$

$$\text{ان صورتوں میں} \quad \text{ع} = \text{م جم طہ} \quad \text{بہا} = \text{رجب طہ} \quad (۱۷) \dots\dots\dots$$

رکھنے سے عام ضابطہ دریافت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اسکی مدد سے

$$\text{عف}(\text{فو}) = \text{علاجم بہلا} = \text{علاجم بہلا} - \text{بہجب بہلا} \quad (۱۸)$$

$$= \text{ر} \text{فو} \text{علاجم بہلا} + \text{طہا}$$

اور اس نتیجہ کو بار بار استعمال کر کے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ

$$\text{عف}^n(\text{فو}) = \text{علاجم بہلا} = \text{ر}^n \text{فو} \text{علاجم بہلا} + \text{ن طہا} \dots (۱۸)$$

$$\text{اسی طرح} \quad \text{عف}^n(\text{فو}) = \text{علاجم بہلا} = \text{ر}^n \text{فو} \text{علاجم بہلا} + \text{ن طہا} \dots (۱۹)$$

$$\text{مثال ۶۔ اگر} \quad \text{ما} = \text{لوگ لا} \dots \dots \dots (۲۰)$$

$$\text{تو} \quad \text{عف}^1 \text{ما} = \text{لا}^1 \text{عف}^1 \text{ما} = \text{لا}^2 \text{عف}^2 \text{ما} = \text{لا}^3 \text{عف}^3 \text{ما} \dots \dots \dots$$

$$\text{اور کل ماہر ہے} \quad \text{عف}^n \text{ما} = \text{لا}^n \text{عف}^n \text{ما} = \text{لا}^{n+1} \text{عف}^{n+1} \text{ما} \dots \dots \dots (۲۱)$$

$$(۲۱) \dots \dots \dots \frac{\text{لا}^{n+1} \text{عف}^{n+1} \text{ما}}{\text{لا}^n \text{عف}^n \text{ما}} = \text{لا} \text{عف}$$

۶۵۔ مائل ضرب کے متواتر مشتقات۔ لیبنیز کا مسئلہ

اگر e اور w متغیر la کے تفاعل ہوں تو دفعہ ۳۱ (۲۰) کی رو سے

$$\text{عف}(\text{عو}) = \text{عو} + \text{عف} \text{ع} + \text{ع} \text{عف} \text{و} \dots \dots \dots (۱)$$

اگر اسے ہم دوبارہ تفریق کریں تو

$$\text{عف}^2(\text{عو}) = \text{عف}(\text{عو} + \text{عف} \text{ع} + \text{ع} \text{عف} \text{و})$$

اب مذکور بالا ضابطہ کے مطابق

$$\text{عف}^2(\text{عو} + \text{عف} \text{ع} + \text{ع} \text{عف} \text{و}) = \text{عف}^2 \text{عو} + \text{عف}^2 \text{ع} + \text{عف}^2 \text{و}$$

$$\text{اور} \quad \text{عف}(\text{ع} \text{عف} \text{و}) = \text{عف} \text{ع} + \text{ع} \text{عف} \text{و} + \text{ع} \text{عف}^2 \text{و}$$

$$\text{پس} \quad \text{عف}^2(\text{عو}) = \text{عف}^2 \text{عو} + \text{عف}^2 \text{ع} + \text{عف}^2 \text{و} + \text{عف} \text{ع} + \text{ع} \text{عف}^2 \text{و} \dots (۲)$$

حاصل ضرب کے ن میں مشتق کے لئے مامضابطہ ہے

$$\text{حف}^{\text{ن}} (\text{ع و}) = \text{و حف}^{\text{ن}} + \text{ع} \times \text{حف}^{\text{ن-۱}} + \frac{\text{ن} (\text{ن}-۱)}{۲} \text{حف}^{\text{ن-۲}} \times \text{ع} + \text{و}^{\text{ن-۲}} \times \text{حف}^{\text{ن-۲}}$$

$$\dots + \text{ن} \text{حف}^{\text{ن-۱}} \times \text{ع} + \text{و}^{\text{ن-۱}} \text{حف}^{\text{ن-۱}} + \dots (۳)$$

اس میں رقموں کے سرورہی ہیں جو مسئلہ ثنائی میں ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ کو کلیتہً ن نے دریافت کیا نتیجہ (۳) کی صداقت ثابت کر نیکی کے لئے ع و کے چند ابتدائی مشتقوں کے حاصل کرنے کے طریقے پر غور کرو۔

ہم مشتقوں کے لئے زیر کی ترتیم استعمال کریں گے

$$\text{حف}^{\text{ن}} (\text{ع و}) = \text{و}^{\text{ن-۱}} \text{حف}^{\text{ن-۱}} + \text{و}^{\text{ن-۲}} \text{حف}^{\text{ن-۲}} + \dots (۴)$$

اس کو دوبارہ تفریق کرنے سے

$$\text{حف}^{\text{ن}} (\text{ع و}) = \text{و}^{\text{ن-۱}} \text{حف}^{\text{ن-۱}} + \text{و}^{\text{ن-۲}} \text{حف}^{\text{ن-۲}} + \dots (۵)$$

اگلے تفریق سے حاصل ہوتا ہے کہ

$$\text{حف}^{\text{ن}} (\text{ع و}) = \text{و}^{\text{ن-۱}} \text{حف}^{\text{ن-۱}} + \text{و}^{\text{ن-۲}} \text{حف}^{\text{ن-۲}} + \dots$$

$$+ \text{و}^{\text{ن-۳}} \text{حف}^{\text{ن-۳}} + \dots (۶)$$

اس آخری ضابطہ کی پہلی سطر ضابطہ (۵) کی ہر رقم کے پہلے تفریق کو تفریق کرنے سے حاصل ہوئی ہے اور دوسری سطر دوسرے تفریق کو تفریق کرنے سے۔

پس حاصل ہوا کہ

$$\text{حف}^{\text{ن}} (\text{ع و}) = \text{و}^{\text{ن-۱}} \text{حف}^{\text{ن-۱}} + \text{و}^{\text{ن-۲}} \text{حف}^{\text{ن-۲}} + \dots (۷)$$

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضابطہ (۷) کی ر میں رقم کا عددی سر ضابطہ (۵)

کی ر میں اور (۱-۲) میں رقموں کے عددی سرور کا مجموعہ ہے۔ اور

متواتر قدموں کے طرز سے ظاہر ہے کہ یہ قاعدہ اگلے مشتقوں کے لئے بھی صحیح

ہوگا۔ اب عین ہی قاعدہ (۱+ج) کی متواتر قوتوں کے پھیلاؤ میں سرور کے

مرتب کرنے کا ہے اور چونکہ حف (ع و) کے سرورہی ہیں جو (۱+ج) کی پہلی

قوت کے سرورہی تو ثابت ہوا کہ حف (ع و) کے پھیلاؤ میں سرورہی ہونے

جو (۱+ج) کے پھیلاؤ میں ہوتے ہیں۔

مثال ۱- اگر ما = لا ع (۸)

تو عفاً ما = لا عفاً ن + ن عفاً ع + عفاً ع^{۱-ن}، چونکہ عفاً لا =

= لا عفاً ن + ن عفاً ع^{۱-ن} (۹)

پس اگر ما = لا جب بہ لا (۱۰)

تو عفاً ما = لا عفاً (جب بہ لا) + ۲ عفاً (جب بہ لا)

= بہ لا جب بہ لا + ۲ بہ جم بہ لا (۱۱)

نیز اگر ما = لا لوگ لا (۱۲)

تو عفاً ما = لا عفاً (لوگ لا) + ن عفاً^{۱-ن} (لوگ لا)

$$= \frac{1-ن}{1-ن} (1-) + \frac{2-ن}{1-ن} (1-) = \frac{2-ن}{1-ن} (1-)$$

ن^{۱-ن}، دفعہ ۶۴ (۲۱) کے مطابق

پس عفاً ما = لا عفاً (لوگ لا) + ن عفاً^{۱-ن} (لوگ لا) (۱۳)

مثال ۲- اگر ما = فو لا ع (۱۴)

تو عفاً ما = فو لا عفاً ن + ن عفاً فو لا ع + عفاً فو لا ع^{۱-ن}، دفعہ ۶۴ (۲۱) کے مطابق

$$= \text{فو لا} [\text{عفاً ن} + \text{ن عفاً فو لا ع} + \text{عفاً فو لا ع}^{\frac{1-ن}{2 \times 1}}] \dots (15)$$

پس اگر ما = فو لا جب بہ لا (۱۶)

تو عفاً ما = فو لا عفاً (جب بہ لا) + ۲ عفاً (جب بہ لا) + ۲ عفاً (جب بہ لا)

$$= \text{فو لا} \{ \text{ب}^{\frac{1-ن}{2 \times 1}} \text{ب}^{\frac{1-ن}{2 \times 1}} + \text{ب}^{\frac{1-ن}{2 \times 1}} \text{ب}^{\frac{1-ن}{2 \times 1}} \} \dots (17)$$

اور یہ ضابطہ دفعہ ۶۴ (۱۶) کے مطابق ہے۔

۶۶- حرکیات کی مثالیں:- تفنی احصا کے حرکیاتی اطلاعات میں

دوسرا شتق خاص حصہ لیتا ہے۔ چنانچہ خطی حرکت کی صورت میں اگر ثابت مبدا سے فاصلہ میں ہو تو دفعہ ۲۶ میں ہم نے دیکھا ہے کہ رفتار اس اور اسراع ع ذیل کے مضابطوں سے حاصل ہوئے ہیں

$$۱ = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} \quad ۲ = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} \quad (۱)$$

پس موجودہ ترقیم کے مطابق $۲ = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}}$ (۲)
یعنی بلحاظ وقت کے میں کا دوسرا شتق اسراع کی پیمائش کرتا ہے۔
نیز دفعہ ۲۶ کی ترقیم میں ثابت محور کے گرد ایک جسم کا زاوی اسراع ہے

$$\frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} \quad (۳)$$

مثال ۱۔ اگر میں وقت کا دوجہ تفاعل ہو یعنی فرض کرو کہ

$$\text{میں} = ۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۱۶ + ۱۷ + ۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۱ + ۲۲ + ۲۳ + ۲۴ + ۲۵ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ + ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶ + ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ + ۴۷ + ۴۸ + ۴۹ + ۵۰ + ۵۱ + ۵۲ + ۵۳ + ۵۴ + ۵۵ + ۵۶ + ۵۷ + ۵۸ + ۵۹ + ۶۰ + ۶۱ + ۶۲ + ۶۳ + ۶۴ + ۶۵ + ۶۶ + ۶۷ + ۶۸ + ۶۹ + ۷۰ + ۷۱ + ۷۲ + ۷۳ + ۷۴ + ۷۵ + ۷۶ + ۷۷ + ۷۸ + ۷۹ + ۸۰ + ۸۱ + ۸۲ + ۸۳ + ۸۴ + ۸۵ + ۸۶ + ۸۷ + ۸۸ + ۸۹ + ۹۰ + ۹۱ + ۹۲ + ۹۳ + ۹۴ + ۹۵ + ۹۶ + ۹۷ + ۹۸ + ۹۹ + ۱۰۰$$

$$\text{تو} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۱۶ + ۱۷ + ۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۱ + ۲۲ + ۲۳ + ۲۴ + ۲۵ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ + ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶ + ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ + ۴۷ + ۴۸ + ۴۹ + ۵۰ + ۵۱ + ۵۲ + ۵۳ + ۵۴ + ۵۵ + ۵۶ + ۵۷ + ۵۸ + ۵۹ + ۶۰ + ۶۱ + ۶۲ + ۶۳ + ۶۴ + ۶۵ + ۶۶ + ۶۷ + ۶۸ + ۶۹ + ۷۰ + ۷۱ + ۷۲ + ۷۳ + ۷۴ + ۷۵ + ۷۶ + ۷۷ + ۷۸ + ۷۹ + ۸۰ + ۸۱ + ۸۲ + ۸۳ + ۸۴ + ۸۵ + ۸۶ + ۸۷ + ۸۸ + ۸۹ + ۹۰ + ۹۱ + ۹۲ + ۹۳ + ۹۴ + ۹۵ + ۹۶ + ۹۷ + ۹۸ + ۹۹ + ۱۰۰$$

$$\text{اور} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۱۶ + ۱۷ + ۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۱ + ۲۲ + ۲۳ + ۲۴ + ۲۵ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ + ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶ + ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ + ۴۷ + ۴۸ + ۴۹ + ۵۰ + ۵۱ + ۵۲ + ۵۳ + ۵۴ + ۵۵ + ۵۶ + ۵۷ + ۵۸ + ۵۹ + ۶۰ + ۶۱ + ۶۲ + ۶۳ + ۶۴ + ۶۵ + ۶۶ + ۶۷ + ۶۸ + ۶۹ + ۷۰ + ۷۱ + ۷۲ + ۷۳ + ۷۴ + ۷۵ + ۷۶ + ۷۷ + ۷۸ + ۷۹ + ۸۰ + ۸۱ + ۸۲ + ۸۳ + ۸۴ + ۸۵ + ۸۶ + ۸۷ + ۸۸ + ۸۹ + ۹۰ + ۹۱ + ۹۲ + ۹۳ + ۹۴ + ۹۵ + ۹۶ + ۹۷ + ۹۸ + ۹۹ + ۱۰۰$$

یعنی اسراع مستقل ہے۔

مثال ۲۔ سادہ موسیقی حرکت میں

$$\text{میں} = ۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۱۶ + ۱۷ + ۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۱ + ۲۲ + ۲۳ + ۲۴ + ۲۵ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ + ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶ + ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ + ۴۷ + ۴۸ + ۴۹ + ۵۰ + ۵۱ + ۵۲ + ۵۳ + ۵۴ + ۵۵ + ۵۶ + ۵۷ + ۵۸ + ۵۹ + ۶۰ + ۶۱ + ۶۲ + ۶۳ + ۶۴ + ۶۵ + ۶۶ + ۶۷ + ۶۸ + ۶۹ + ۷۰ + ۷۱ + ۷۲ + ۷۳ + ۷۴ + ۷۵ + ۷۶ + ۷۷ + ۷۸ + ۷۹ + ۸۰ + ۸۱ + ۸۲ + ۸۳ + ۸۴ + ۸۵ + ۸۶ + ۸۷ + ۸۸ + ۸۹ + ۹۰ + ۹۱ + ۹۲ + ۹۳ + ۹۴ + ۹۵ + ۹۶ + ۹۷ + ۹۸ + ۹۹ + ۱۰۰$$

$$\text{پس} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = ۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۱۶ + ۱۷ + ۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۱ + ۲۲ + ۲۳ + ۲۴ + ۲۵ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ + ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶ + ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ + ۴۷ + ۴۸ + ۴۹ + ۵۰ + ۵۱ + ۵۲ + ۵۳ + ۵۴ + ۵۵ + ۵۶ + ۵۷ + ۵۸ + ۵۹ + ۶۰ + ۶۱ + ۶۲ + ۶۳ + ۶۴ + ۶۵ + ۶۶ + ۶۷ + ۶۸ + ۶۹ + ۷۰ + ۷۱ + ۷۲ + ۷۳ + ۷۴ + ۷۵ + ۷۶ + ۷۷ + ۷۸ + ۷۹ + ۸۰ + ۸۱ + ۸۲ + ۸۳ + ۸۴ + ۸۵ + ۸۶ + ۸۷ + ۸۸ + ۸۹ + ۹۰ + ۹۱ + ۹۲ + ۹۳ + ۹۴ + ۹۵ + ۹۶ + ۹۷ + ۹۸ + ۹۹ + ۱۰۰$$

$$\text{اور} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{وقت}} = ۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۱۶ + ۱۷ + ۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۱ + ۲۲ + ۲۳ + ۲۴ + ۲۵ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ + ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶ + ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ + ۴۷ + ۴۸ + ۴۹ + ۵۰ + ۵۱ + ۵۲ + ۵۳ + ۵۴ + ۵۵ + ۵۶ + ۵۷ + ۵۸ + ۵۹ + ۶۰ + ۶۱ + ۶۲ + ۶۳ + ۶۴ + ۶۵ + ۶۶ + ۶۷ + ۶۸ + ۶۹ + ۷۰ + ۷۱ + ۷۲ + ۷۳ + ۷۴ + ۷۵ + ۷۶ + ۷۷ + ۷۸ + ۷۹ + ۸۰ + ۸۱ + ۸۲ + ۸۳ + ۸۴ + ۸۵ + ۸۶ + ۸۷ + ۸۸ + ۸۹ + ۹۰ + ۹۱ + ۹۲ + ۹۳ + ۹۴ + ۹۵ + ۹۶ + ۹۷ + ۹۸ + ۹۹ + ۱۰۰$$

یعنی اسراع ہمیشہ ایک ثابت نقطے (میں) کے مبدا کی سمت میں کی طرف اور اس نقطہ سے

فاصلہ کے متناسب ہے۔

مثال ۳۔ اگر $س = (اجز ن ت + ب جز ن ت) \dots (۸)$
تو $\frac{فرس}{فرت} = ن (اجز ن ت + ب جز ن ت)$

اور $\frac{فرس}{فرت} = ن (اجز ن ت + ب جز ن ت) \dots (۹)$
یعنی اسراع ثابت، نقطہ سے مخالف سمت میں ہے اور فاصلہ کے متناسب ہے۔

۶۷۔ تقعر اور متحد۔ نقاط انعطاف۔

جیسے فہ (لا) دفعہ ۲۶ کے مطابق فہ (لا) کے اضافہ کی شرح کو ناپتا ہے
ویسے ہی فہ (لا) بھی فہ (لا) کے اضافہ کی شرح کو ناپتا ہے۔ پس اگر
فہ (لا) مثبت ہے تو منفی

ما = فہ (لا) (۱)
کا ڈھال لا کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور اگر فہ (لا) منفی ہے تو ڈھال لا کے
ساتھ گھٹ رہا ہے۔

اگر فہ (لا) = ۰ تو ڈھال کے بدلنے کی شرح ایک لمحہ کے لئے صفر ہے
اور یہاں ماس ساکن ہے اس کی سادہ مثال نقطہ انعطاف ہے یعنی وہ نقطہ
جس پر منحنی اپنے ماس کو عبور کرے (دیکھو شکل ۶۰)۔

منحنی کو کسی نقطہ پ پر اوپر کی طرف مقعر اس وقت کہتے ہیں جبکہ منحنی کا وہ حصہ
جو نقطہ پ کی عین قربت میں ہے کلیتاً پ کے ماس کے اوپر واقع ہو۔ لیکن اسے
اوپر کی طرف محدب کہتے ہیں جبکہ وہ کلیتاً ماس کے نیچے واقع ہو۔


اگر منحنی کا وہ حصہ جو پ کی دائیں جانب ہے نقطہ پ کے ماس کے اوپر
واقع ہو (جیسے کہ شکل ۳۹ میں) تو دفعہ ۵۶ سے صاف ظاہر ہے کہ پ کے
دائیں جانب کی سمت میں (خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو) ہمیشہ ایسے نقطے
مل سکیں گے جن پر فہ (لا) کی قیمت نقطہ پ پر کی قیمت سے زیادہ ہو۔ پس

دفعہ ۴۸ کے مطابق نقطہ پ پر فہا (لا) کی قیمت منفی نہیں ہو سکتی۔ اگر منحنی کا وہ حصہ جو پ کے بائیں جانب ہے پ پر کے ماس کے اوپر واقع ہو تو بھی یہی نتیجہ قائم رہے گا۔

اسی طرح اگر منحنی کے نقطہ پ کے دائیں یا بائیں جانب کا حصہ پ کے ماس کے نیچے واقع ہو تو فہا (لا) کی قیمت نقطہ پ پر مثبت نہیں ہو سکتی۔

پس اس بحث سے حاصل ہوا کہ منحنی اوپر کی طرف مقعر ہو گا اگر فہا (لا) مثبت ہو اور اوپر کی طرف محدب ہو گا اگر فہا (لا) منفی ہو۔


۱۴۷ نیز یہ ظاہر ہے کہ نقطہ انعطاف پر (جہاں منحنی اپنے ماس کو عبور کرتا ہے) فہا (لا) مثبت ہو سکتا ہے اور نہ منفی۔ اور چونکہ اس کو محدود فرض کر لیا گیا ہے اس لئے اس کا صفر ہونا لازمی ہے۔ یہ شرط اگرچہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔



شکل (۳۹)

اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ جب 'لا' کی قیمت بڑھتے بڑھتے زیر بحث قیمت میں سے گزرے تو فہا (لا) کی علامت بدلے۔ مثلاً فرض کرو کہ پ کے بائیں جانب منحنی ماس کے نیچے ہے اور دائیں جانب اوپر ہے۔ دفعہ ۵۶ سے ظاہر ہے کہ منحنی کے دائیں اور بائیں جانب پ کے قریب میں ایسے نقطے ہونگے جن پر ڈھال پ پر کے ڈھال سے بڑا ہے۔ یعنی ڈھال کی پ پر اقل قیمت ہے اور اس لئے دفعہ ۵ کے مطابق فہا (لا) کی علامت

منفی سے مثبت ہونی چاہئے۔



شکل (۴۰)

اگر منحنی ماس کو مذکورہ بالا سمت سے مخالف سمت میں عبور کرتا ہے تو پ پر
دھال کی اعظم قیمت ہوگی اور فہ (لا) کی علامت مثبت سے منفی ہوگی۔
مثال ۱۔ اگر $ما = لا^2$ (۲)

۱۴۸

تو $ما = لا$ جیسے لا کی قیمت صفر میں سے گزرتے ہوئے بڑھتی ہے ویسے ما کی قیمت
منفی سے مثبت ہوتی ہے اور اس لئے یہ نقطہ انعطاف ہے۔ شکل ۳ (صفحہ ۱۴۸)
دیکھو۔

مثال ۲۔ اگر $ما = \frac{لا^2}{لا + ۱}$ (۳)

$$تو \quad ما = \frac{لا(لا - ۳)}{لا^2 + ۱}$$

پس اس میں تین نقاط انعطاف ہیں یعنی جبکہ $لا = ۰$ اور $لا = ۳$ شکل ۱۳
(صفحہ ۲۰) دیکھو۔

مثال ۳۔ جب کے منحنی $ما = ب$ جب $\frac{لا}{ب}$ (۴)

کی صورت میں $\frac{ب}{ا} = \frac{ب}{ا}$ جب $\frac{لا}{ا} = \frac{لا}{ا}$ -- $\frac{ما}{ا}$

پس $\frac{ما}{ا}$ علامت بدلتا ہے اس لئے وہ تمام نقاط جن پر منحنی لا محور کو کاٹتا ہے نقاط العطف ہیں دیکھو شکل ۱۴ (صفحہ ۴۲)۔

مثال ۴۔ منحنی $\frac{ما}{ا} = \frac{لا}{ا}$ (۵) میں $\frac{ما}{ا} = \frac{لا}{ا}$ ۱۲ ۱۱ ۱۰ نقطہ $\frac{لا}{ا} = \frac{ما}{ا}$ پر $\frac{ما}{ا}$ صفر ہو جاتا ہے لیکن اسکی علامت نہیں بدلتی۔ پس ساکن ماس تو ہے لیکن صحیح معنوں میں نقطہ العطف نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ بات سے بھی ظاہر ہے کہ $\frac{لا}{ا}$ لازماً مثبت ہے اور یوں منحنی مبداء کے ماس کے ایک ہی جانب واقع ہوتا ہے۔

۶۸۔ اقل اور اعظم قیمتوں میں مشتق کا استعمال۔

تفاعل فہ (لا) کی اقل اور اعظم قیمتوں میں امتیاز کرنے کی جابجہ جو دفعہ ۵۱ میں بیان کی گئی ہے وہ دوسرے مشتق فہ (لا) کے رقوم میں بھی بالعموم بیان ہو سکتی ہے۔

چونکہ فہ (لا) خود فہ (لا) کا مشتق ہے اس لئے ظاہر ہے کہ اگر فہ (لا) مثبت ہے جبکہ لا کی قیمت بڑھتے بڑھتے فہ (لا) = کی ایک اصل میں سے گزرتی ہے تو فہ (لا) لازماً بڑھ رہا ہے اور اس لئے اسکی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے۔ پس فہ (لا) اس مقام پر اقل کی اسی طرح اگر فہ (لا) منفی ہے جبکہ فہ (لا) = تو لازماً فہ (لا) گھٹ رہا ہے اور اس لئے اس کی علامت مثبت سے منفی ہوتی ہے۔ پس اس مقام پر فہ (لا) کی اعظم قیمت ہے۔

ان نتیجوں کا تقعر اور تحدب کے ساتھ ربط بالکل ظاہر ہے۔

مثال ۱۔ ثابت کرو کہ منحنی حرکت میں مبداء سے فاصلہ میں کی قیمت اقل یا اعظم ہوگی جبکہ رفتار $\frac{فرس}{فرس}$ صفر ہو اور اسلئے $\frac{فرس}{فرس}$ بالترتیب مثبت یا منفی ہو۔

مثال ۲ - فرض کرو کہ $f_m(a) = \frac{a^2}{a+1}$

تو دفعہ ۵ کی مثال میں دکھایا گیا ہے کہ $f_m(a)$ ، $a=1$ اور $a=2$ کے لئے صفر ہوتا ہے۔ نیز دفعہ ۶ کی مثال (۲) میں $f_m(a)$ کی معلوم قیمت سے حاصل ہوتا ہے کہ

$f_m(a) = 1-2$ اور $f_m(a) = 1-1$

پس $a=1$ سے تفاعل $f_m(a)$ کی اعظم قیمت حاصل ہوتی ہے اور $a=2$ سے اقل قیمت۔ دیکھو شکل ۱۳ (صفحہ ۴۰)۔

ایسا ممکن ہے کہ a کی کوئی خاص قیمت جو $f_m(a)$ کو صفر بناتی ہے $f_m(a)$ کو بھی صفر بنا دے۔ ایسی صورت میں آسانی سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ یہاں پر بالعموم $f_m(a)$ کی اقل اور اعظم قیمت نہیں ہوتی۔ دیکھو شکل ۳۱ (صفحہ ۱۲۸) لیکن یہاں اس پر بحث جاری رکھنا مفید نہ ہوگا۔ عام قاعدہ پندرھویں باب میں ٹیلر کے مسئلے سے حاصل کیا جائیگا۔

۶۹ - مساواتوں کے نظریہ میں متواتر مشتقات -

متواتر مشتق تفاعل مساواتوں کے نظریہ میں بڑا اہم حصہ رکھتے ہیں۔ دفعہ ۵۰ میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اگر $f_m(a)$ منطق صحیح تفاعل ہو تو $f_m(a) = 0$ کی کم از کم ایک اصل $f_m(a) = 0$ کی کوئی دو اصلوں کے درمیان ضرور ہوگی۔ اسی طرح $f_m(a) = 0$ کی کم از کم ایک اصل $f_m(a) = 0$ کی کوئی دو اصلوں کے درمیان ہوگی۔ اور اسی طرح باقی مشتقوں کے لئے۔ نیز چونکہ $f_m(a) = 0$ کی رتبہ کی اصل $f_m(a) = 0$ کی (۱-۱) رتبہ کی اصل ہوگی اسلئے یہ $f_m(a) = 0$ کی (۲-۲) رتبہ کی اصل ہوگی۔ اور اسی طرح وہ بالآخر $f_m(a) = 0$ کی ایک رتبہ کی سادہ اصل ہوگی۔ پس $f_m(a) = 0$ کی (۱-۱) رتبہ کی اصل ہونیکے لئے ضروری اور کافی شرط یہ ہے کہ تفاعل

فما (لا) فمّا (لا) فمّا (لا) فمّا (لا) (۱)
سب ایک ساتھ صفر ہوں -

مثال - اگر فمّا (لا) = ۲ لا + ۵ لا + ۷ لا + ۲ لا + ۲ لا + ۱

تو فمّا (لا) = ۱۰ لا + ۲۰ لا + ۱۲ لا + ۷ لا + ۲ لا + ۲

اور فمّا (لا) = ۴ لا + ۶۰ لا + ۲۴ لا + ۲

یہ تینوں تفاعل لا = ۱ کے لئے صفر ہوتے ہیں، اس لئے یہ فمّا (لا) = کی
تیسرے رتبہ کی یا تہری اصل ہے حقیقت میں

فمّا (لا) = (۱ + لا) (۲ لا - ۱) (۱ + لا)

۷۰ - دوسرے مشتق کی ہندی تعبیر -

دفعہ ۵۶ میں پہلے مشتق تفاعل کی ایک مشہور خاصیت منحنی ما = فمّا (لا) (۱۰۰)
کو دراصل ایک سیدھے خط ما = ۱ + ج لا (۲) کے ساتھ مقابلہ
کرنے سے حاصل کی گئی تھی۔ اور مستقل ۱ اور ج اس شرط سے دریافت
کئے گئے تھے کہ (۱) اور (۲) ایک دوسرے کو لا کی دو معلومہ قیمتوں کیلئے
قطع کریں -

اسی طور پر ہم منحنی (۱) کا مکافی ما = ۱ لا + ج لا + ج (۳)
کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور مستقالات ۱، ج، ج کو اس شرط کے تابع
معلوم کرتے ہیں کہ (۱) اور (۳) لا کی تین معلومہ قیمتوں کے لئے ایک دوسرے کو
قطع کریں -

(آ) پہلے ہم فرض کرتے ہیں کہ لا کی تین قیمتیں مساوی الفصل ہیں یعنی
۱ - ۵، ۱، ۱ + ۵

اب مستقل دریافت کرنے کی مساوی ہیں

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ا} + \text{ج} (\text{ا} - \text{ه}) + (\text{ج} - \text{ا}) \text{ه} = \text{فما} (\text{ا} - \text{ه}) \\ \text{ا} + \text{ج} \text{ا} + \text{ج} \text{ا} = \text{فما} (\text{ا}) \\ \text{ا} + \text{ج} (\text{ا} + \text{ه}) + (\text{ج} + \text{ا}) \text{ه} = \text{فما} (\text{ا} + \text{ه}) \end{array} \right. \quad (۴) \dots$$

ایک نیا تفاعل فآ (لا) ایسا فرض کرو کہ

$$\text{فآ} (\text{لا}) = \text{فما} (\text{لا}) - (\text{ا} + \text{ج} \text{ا} + \text{ج} \text{ا}) \dots (۵)$$

یعنی فآ (لا) منہی (۱) اور (۳) کے متعینوں کا فرق ہے۔ مفروض سے فآ (لا) صفر ہے جبکہ لا = ۱ - ھ اور لا = ۱ کس دفعہ ۴۹ سے شتق تفاعل فآ (لا) تغیر لا کی کسی خاص درمیانی قیمت کے لئے صفر ہوگا۔

$$\text{یعنی فآ} (\text{ا} - \text{طہم} \text{ه}) = ۰ \dots (۶)$$

جہاں $۰ < \text{طہم} < ۱$ ۔ نیز چونکہ فآ (لا) صفر ہے لا = ۱ اور لا = ھ + ۱ کے لئے اس لئے

$$\text{فآ} (\text{ا} + \text{طہم} \text{ه}) = ۰ \dots (۷)$$

جہاں $۰ < \text{طہم} < ۱$ ۔ اس دلیل کو دوبارہ استعمال کرنے سے چونکہ فآ (لا) صفر ہے جبکہ لا = ۱ - طہم اور لا = ۱ + طہم ھ اس لئے اس کا مشتق تفاعل فآ (لا) بھی لا کی کسی خاص درمیانی قیمت کے لئے صفر ہوگا۔ یعنی

$$\text{فما} (\text{ا} + \text{طہم} \text{ه}) = ۰ \dots (۸)$$

جہاں طہم ایسی مقدار ہے جو کسور - طہم اور طہم کے درمیان واقع ہے اور اس لئے ضروری طور پر ± ۱ کے درمیان ہے۔

$$\text{چونکہ ضابطہ (۵) سے فآ} (\text{لا}) = \text{فما} (\text{لا}) - ۲ \text{ج} \dots (۹)$$

اس سے ثابت ہوا کہ طہم کی ± ۱ کے درمیان کسی خاص قیمت کے لئے

$$\text{فما} (\text{ا} + \text{طہم} \text{ه}) = ۲ \text{ج} \dots (۱۰)$$

اب (۴) کے ضابطوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$151 \quad \text{فہا} (۱+۵) - ۲ \text{ فہا} (۱) + \text{فہا} (۱-۵) = ۲ \text{ جہا} \dots\dots (۱۱)$$

$$\text{اور اسلئے} \quad \frac{\text{فہا} (۱+۵) - ۲ \text{ فہا} (۱) + \text{فہا} (۱-۵)}{۲} = \text{فہا} (۱+۵) \dots\dots (۱۲)$$

$$\text{پس نہی} \quad \frac{\text{فہا} (۱+۵) - ۲ \text{ فہا} (۱) + \text{فہا} (۱-۵)}{۲} = \text{فہا} (۱) \dots\dots (۱۳)$$

اسی طریقہ پر ثابت کر سکتے ہیں

$$\text{نہا} \quad \frac{\text{فہا} (۱+۵) - ۲ \text{ فہا} (۱) + \text{فہا} (۱-۵)}{۲} = \text{فہا} (۱) \dots\dots (۱۴)$$

اگر فرق $\text{فہا} (۱+۵) - \text{فہا} (۱) = \text{مفہا}$ کو مفہا سے ظاہر کیا جائے تو

$$\{ \text{فہا} (۱+۵) - \text{فہا} (۱) \} - \{ \text{فہا} (۱+۵) - \text{فہا} (۱) \} = \{ \text{فہا} (۱+۵) - \text{فہا} (۱) \}$$

متبوع متغیر کے مساوی اضافوں ہتھ کے لئے فرقوں کا فرق یعنی دوسرے فرق مفہا (مفہا) یا مفہا سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

پس ضابطہ (۱۴) ضابطہ ذیل کے معادل ہے


$$\text{نہا} \quad \frac{\text{مفہا} (۱)}{\text{فرقا}} = \frac{\text{فرقا}}{۲} \dots\dots (۱۵)$$

ترتیب $\frac{\text{فرقا}}{۲}$ کی یہی وجہ تھی کیونکہ یہ دوسرے فرق کی انتہائی شکل ہے۔

مسئلہ (۱۳) کی ہندی تعبیر دریافت کرنے کے لئے فرض کرو کہ شکل (۴) میں
 $۱ = ۱$ ، $۱ = ۱$ ، $۱ = ۱$ ، $۱ = ۱$ ، $۱ = ۱$

اور ا، ح، پ اور ح، پ کے منحنی (۱) کے ان نقاط پر بالترتیب معین ہیں
 پ، پ کو ملاؤ اور فرض کرو کہ ا، ح، پ کے نقطہ پر ملتا ہے۔

$$\frac{۱}{۲} = \frac{(پ + ح)}{۲} = \frac{\text{فہا} (۱+۵) + \text{فہا} (۱-۵)}{۲}$$



اور اس لئے $ع ق = ۱ - ق ا$

۱۵۲

$\frac{1}{4} \{ ف ا (ا + ہ) - ۲ ف ا (ا) + ف ا (ا - ہ) \} =$
اب ضابطہ (۱۳) اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انہا میں

$$ع ق = \frac{1}{4} (ح ا) \times ف ا (ا) \dots \dots (۱۶)$$

اس سے ظاہر ہے کہ وتر کا قوس کے اوپر یا نیچے ہونا ف ا (ا) کے مثبت یا منفی ہونے پر منحصر ہے۔

(۲) اب ہم فرض کرتے ہیں کہ منحنی (۱) اور (۳) کے تین نقاط تقاطع میں سے دو ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں، یعنی ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ $ا = ۱$ کے لئے دو منحنی ایک دوسرے کو نہ صرف کاٹتے ہیں بلکہ لمس کرتے ہیں اور نقطہ $ا = ۱$ پر وہ ایک دوسرے کو پھر کاٹتے ہیں۔

نقطہ $ا = ۱$ پر دونوں منحنیوں کے لئے ما اور $\frac{ح ا}{۱}$ کی ایک ہی قیمت ہونے کے لئے یہ شرطیں ہیں کہ

$$\left\{ \begin{array}{l} ا + ح ا + ج ا = ف ا (ا) \\ ح ا + ۲ ج ا = ف ا (ا) \end{array} \right. \dots \dots (۱۷)$$

اور تیسری شرط سے حاصل ہوتا ہے کہ

ا + ج (ا + ہ) + ج (ا + ہ) = فہ (ا + ہ) (۱۸)
اگر فا (لا) سے وہی تفاعل تعبیر ہو جس کا اوپر بیان ہوا تو

فا (ا) = اور فا (ا + ہ) = ... (۱۹)

اور اس لئے فا (ا + طہ) = ... (۲۰)

جہاں $\text{طہ} > \text{ا}$
نیز چونکہ فا (لا) صفر ہے لا = ا اور لا = (ا + طہ) کے لئے اسلئے

فا (ا + طہ) = ... (۲۱)

جہاں $\text{طہ} < \text{ا}$

اب ضابطے (۱۷) اور (۱۸) سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ

فہ (ا + ہ) - فہ (ا) - ہ فہ (ا) = ج ہ (۲۲)

پس (۹) اور (۲۱) سے


فہ (ا + ہ) = فہ (ا) + ہ فہ (ا) + $\frac{1}{2}$ ہ فہ (ا + طہ) (۲۳)
یہ نتیجہ نہایت اہم ہے اور بعد ازاں معلوم ہوگا کہ یہ سارے مسئلہ کی لگائی شکل کی خاص صورت ہے (دیکھو پندرہواں باب) اس شکل میں مسئلہ کا صرف اتنا حصہ شریک ہے جسکی بالعموم حرکیاتی اور طبیعیاتی سوالات میں اکثر ضرورت پڑتی ہے۔

نتیجہ (۲۳) سے اخذ ہوتا ہے

نہا $\frac{\text{فہ (ا + ہ) - فہ (ا) - ہ فہ (ا)}}{ہ} = \frac{1}{2} \text{فہ (ا)} \dots (۲۴)$

شکل ۴۲ میں فرض کرو کہ $\text{ا} = \text{ا}$ اور $\text{ا} = \text{ح}$ اور $\text{ا} = \text{پ}$ اور $\text{ا} = \text{ق}$ ۱۵۳
بالترتیب ان نقاط کے معین ہیں۔ اگر ق ح نقطہ پ پر کے ماس کو
ع پر لئے تو

ق ح = فہ (ا + ہ) ع ح = فہ (ا) + ہ فہ (ا)



شکل (۳۲)

پس ضابطہ (۲۴) اس بات کی صداقت کا اظہار کرتا ہے کہ انتہائیں
 ق = ۶ = $\frac{1}{4}$ (ا ح) × فہا (۱) (۲۵)
 پس نقطہ تماس کے قریب میں ماس سے منحنی کا ہٹاؤ عموماً دوسرے رتبہ کی چھوٹی
 مقدار ہوتا ہے۔ اگر فہا (۱) = ۱۰ تو ق = ۶ کی علامت ہ کے ساتھ
 نہیں ملتی اور چ کے عین قریب میں منحنی کا کلیتاً ماس کے اوپر یا نیچے واقع ہونا
 فہا (۱) کے مثبت یا منفی ہونے پر منحصر ہوگا۔ دیکھو دفعہ ۶۷
 انحنا کے نظریہ میں ضابطوں (۱۶) اور (۲۵) کا دلچسپ استعمال ہے۔ دیکھو
 دسواں باب۔

۱۔ اجزائے متناسب کا نظریہ۔

فرض کرو کہ منحنی $ما = فہا (لا)$ (۱)
 اور مکانی $ما = (ا + ب لا + ج لا^۲)$ (۲)
 نقاط $لا = ۱$ ، $لا = ۱ + ا$ ، $لا = ۱ + ا + ب$ پر قطع کرتے ہیں جہاں $ا < ۰$ ۔
 ہم معلوم کرتے ہیں
 (۱-ی) فہا (۱) + ی فہا (۱ + ا) - فہا (۱ + ا + ب) = ی (اسی) ج (۳)
 اور اس لئے دفعہ سابق کے طریقہ کے مطابق

$$(۱-۱) \text{ فہ} (۱+۱) + (۱+۱) \text{ فہ} (۱+۱) = (۱-۱) \text{ فہ} (۱+۱) + (۱+۱) \text{ فہ} (۱+۱) \text{ (۴)}$$

جہاں $۱ < \text{ظہ}$ ۔
 دفعہ ۲ کے مسائل اس ضابطہ کی خاص صورتیں ہیں اور اسے یہاں اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا متناسب اجزاء کے نظریہ سے خاص تعلق ہے۔ فرض کر دو کہ تفاعل فہ (لا) کی قیمتیں لا کی متعدد قیمتوں کے لئے (جو ایک دوسرے سے مساوی فرق ھ پر ہیں) جدول کی شکل میں درج کی گئی ہیں۔ فرض کر دو کہ لا کی ان قیمتوں میں سے ایک قیمت ۱ ہے اور فہ (لا) کی قیمت مطلوب ہے جبکہ لا ۱ اور متصل جدولی قیمت ۱ + ھ کے درمیان کسی واقع ہو مثلاً لا = ۱ + ھ پر ھ جہاں $۱ < ھ$ ۔ اب متناسب اجزاء کے طریقے میں اور ان یہ فرض کر کے کیا جاتا ہے کہ تفاعل لا = ۱ سے لا = ۱ + ھ تک یکساں طور پر بڑھتا ہے یعنی

$$\text{فہ} (۱+۱) - \text{فہ} (۱) = \frac{\text{ی}}{۱} \text{ (۵)}$$

یا $\text{فہ} (۱+۱) = (۱-۱) \text{ فہ} (۱) + (۱+۱) \text{ فہ} (۱+۱) \text{ (۶)}$
 اس عمل میں یہ فرض کر لیا جائے کہ لا = ۱ اور لا = ۱ + ھ کے درمیان متغی (۱) کی قوس کی بجائے دترے لینے سے قابل قدر خطا واقع نہیں ہوتی۔ ضابطہ (۴) سے اس مفروض کی خطا حاصل ہوتی ہے۔

دفعہ ۵ مثال ۲ سے ظاہر ہے کہ (۱-۱) (ی) کی اعظم قیمت $\frac{۱}{۲}$ ہے۔ پس اگر حدود لا = ۱ اور لا = ۱ + ھ کے درمیان فہ (لا) کی بڑی سے بڑی قیمت ھ سے ظاہر کریں تو ضابطہ (۴) سے ثابت ہوتا ہے کہ خطا $\frac{۱}{۲} \times ھ$ سے (۷)
 مثال ۱۔ سات اعشاریہ لو کا رقمی جدول میں ۱۰۰۰۰ سے تک ایک ایک کے وقفہ پر تمام صحیح عددوں کے لو کا رقم درج ہیں۔ اب اگر
 $\text{فہ} (لا) = \text{لوگم لا} \text{ (۸)}$

$$\text{تو فہ} (لا) = - \frac{\text{صہ}}{\text{لا}} \text{ (۹)}$$

پس (۷) میں ۵ = ۱ رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پ ن اور لوگ پ (ن+۱) کے درمیان متناسب اجزاء کے طریقہ سے اور ارج کرنے میں جو خطا نرزد ہوتی ہے وہ $\frac{5.0419}{25} \dots \dots \dots (10)$

سے بڑی نہیں ہے اس لئے اگر ن = ۱۰۰۰ تو بڑی سے بڑی خطا ۵.۴۳..... سے زیادہ نہیں ہے اور سات اعشاریہ تک کے جدول کے لئے یہ بالکل نظر انداز کی جاسکتی ہے نیز (۴) سے ظاہر ہے کہ جب کبھی فم (لا) کی قیمت بڑی ہو تو اس طریقہ صحیح نتیجہ حاصل ہوگی انہیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ فرق بے قاعدہ ہیں۔

مثال ۲۔ اگر فم (لا) = لوگ جب لا (۱۱)
تو فم (لا) = - مہ قم لا (۱۲)

پس ۵ = $\frac{\pi}{1.08 \dots} = 2.91 \dots$ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے،

۱۔ ۵ فم (لا) = -۴۶..... م قم لا (۱۳)
چونکہ قم ۱۸ = ۱.۰۶۷ اس لئے ظاہر ہے کہ آ کے وقفہ والے لوگ ارتقی جیب کے جدول میں اور ارج کی خطا جبکہ زاویہ ۱۸ سے کم ہے اعشاریہ کے ساتویں مقام میں زیادہ سے زیادہ نصف اکائی کی ہو سکتی ہے۔

مثالہ ۲۱

ذیل کے تفرقات کی تصدیق کرو۔

$$(1) \text{ مہ} = \text{لا} (1) - \text{لا} (2) \quad \text{عفا مہ} = 2 - 12 \text{ لا} + 12 \text{ لا}^2$$

$$(2) \text{ مہ} = \frac{1}{2} \text{ مہ لا} (1) - \frac{1}{2} \text{ مہ لا} (2) \quad \text{عفا مہ} = \text{مہ لا} - \text{لا}$$

$$(3) \text{ مہ} = \frac{1}{3} \text{ مہ لا} (1) - \frac{1}{3} \text{ مہ لا} (2) + \frac{1}{3} \text{ مہ لا} (3) \quad \text{عفا مہ} = \frac{1}{3} \text{ مہ لا} (1) - \frac{1}{3} \text{ مہ لا} (2) + \frac{1}{3} \text{ مہ لا} (3)$$

$$(4) \text{ مہ} = \frac{1}{4} \text{ مہ لا} (1) - \frac{1}{4} \text{ مہ لا} (2) + \frac{1}{4} \text{ مہ لا} (3) - \frac{1}{4} \text{ مہ لا} (4) \quad \text{عفا مہ} = \frac{1}{4} \text{ مہ لا} (1) - \frac{1}{4} \text{ مہ لا} (2) + \frac{1}{4} \text{ مہ لا} (3) - \frac{1}{4} \text{ مہ لا} (4)$$

$$(5) \text{ مہ} = \frac{1}{2} \text{ مہ لا} (1) - \frac{1}{2} \text{ مہ لا} (2) + \frac{1}{3} \left\{ \frac{1}{2(1+2)} - \frac{1}{2(2+3)} \right\} \text{ مہ لا}$$

۱۵۷

(۳۱) اگر ما = $\{ (۱ + \sqrt{۲}) + (۱ + \sqrt{۲}) \}$ تو ثابت کرو کہ

$$(۱ + \sqrt{۲}) \left(\frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}} + \frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}} \right) = \frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}} - \frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}} = ۰$$

(۳۲) اگر لا = ف (ت) ، ما = خ (ت) تو ثابت کرو کہ

$$\frac{\frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}}}{\frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}}} - \frac{\frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}}}{\frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}}} = \frac{\frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}}}{\left(\frac{۲}{۱ + \sqrt{۲}} \right)}$$

امثلہ ۲۲

(۱) ثابت کرو کہ طبعی جیوب کی جدول میں جو آ کے وقفوں پر مرتب کی گئی ہو متناسب اجزاء کی خطا ۰.۶..... سے کبھی زیادہ نہیں ہو سکتی۔

(۲) ثابت کرو کہ طبعی ماس کی جدول میں ۹۰ کے قریب کے زاویوں کے لئے متناسب اجزاء کا طریقہ ناکام رہتا ہے۔ نیز دکھاؤ کہ ۵۰ کے قریب کے زاویوں کے لئے اگر ماس آ کے وقفوں پر دئے ہوئے ہوں تو خطا کی حد ۲۲۳..... ہے۔

(۳) دکھاؤ کہ لوکارٹی ماسوں کی جدول میں متناسب اجزاء کا قاعدہ ۹۰ اور ۹۰ کے قریب کے زاویوں کے لئے ناکام رہتا ہے۔ نیز ثابت کرو کہ اس تفاعل کے لئے متناسب اجزاء کے قاعدہ میں بڑی سے بڑی خطا ۵۰ کے قریب کے زاویوں کے لئے کم سے کم ہے۔

(۴) ثابت کرو کہ مخفی ما = لوگ لا ہر جگہ اوپر کی طرف محدب ہے۔

(۵) ثابت کرو کہ مخفی ما = لا لوگ لا ہر جگہ اوپر کی طرف مقعر ہے نیز اسکی ترکیب کھینچو۔

(۶) مخفی ما = لا ہو لا کا اعظم معین اور نقطہ انعطاف دریافت کرو۔

نیز اسکی ترکیب کھینچو۔ [اعظم معین فصلہ لا = آ کے جواب میں اور نقطہ انعطاف

لا = ۲ کے جواب میں ہے۔]

(۷) دکھاؤ کہ مخفی ما = فو میں ایسے نقطوں پر انعطاف ہے جسکے لئے لا = $\frac{۱}{۱ + \sqrt{۲}}$

اس کی ترسیم کیجیو۔
(۸) منحنی $\text{ما} = \text{لا} \text{قو}$ کے اعظم اور اقل معین اور نقاط انعطاف دریافت کرو اور اس کی ترسیم کیجیو۔

[$\text{لا} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ سے اعظم اور اقل معین حاصل ہوتے ہیں اور $\text{لا} = 0$ سے $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ سے نقاط انعطاف]

(۹) فاصل $\text{فما} (\text{لا})$ مستقل ہے اور $\frac{1}{\sqrt{2}} = (\text{ب}^2 - \text{ا}^2)$ جبکہ $\text{ا} > \text{لا} > 0$
نیز $\frac{1}{\sqrt{2}} = \text{ب}^2 - \frac{1}{4} - \text{لا}^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{9}$ جبکہ $\text{ا} > \text{لا} > \text{ب}$

اور $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\text{ا}^2 - \text{ب}^2}{\text{لا}}$ جبکہ $\text{لا} < \text{ب}$
ثابت کرو کہ $\text{فما} (\text{لا})$ 'فما' (لا) مسلسل ہیں لیکن $\text{فما} (\text{لا})$ غیر مسلسل ہے۔
منحنی $\text{ما} = \text{فما} (\text{لا})$ کی ترسیم کیجیو۔

(۱۰) ثابت کرو کہ $\text{ما} = \text{لا}^2 (\text{ا}^2 - \text{ب}^2)$ میں نقطہ $(\text{ا}^2, \text{ب}^2)$ پر نقطہ انعطاف ہے۔
منحنی کو ترسیم کرو۔

(۱۱) ثابت کرو کہ منحنی $\text{ما} = \text{لا}^2 (\text{ا}^2 - \text{ب}^2)$ کے نقاط $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ پر انعطاف ہے۔
منحنی کو ترسیم کرو۔

(۱۲) منحنی $\text{ما} = \frac{\text{ب}^2}{\text{ا}^2 + \text{لا}^2}$ کے نقاط انعطاف دریافت کرو [$\text{لا} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$]

(۱۳) ثابت کرو کہ منحنی $\text{ما} = \frac{\text{ا}^2}{\text{ا}^2 + (\text{ا}^2 - \text{ب}^2)}$ پر $(\text{ا}^2, \text{ب}^2)$ نقطہ انعطاف ہے۔
منحنی کی ترسیم کیجیو۔

(۱۴) منحنی $\text{ما} = \frac{\text{ا}^2}{\text{ا}^2 + \text{لا}^2}$ کی ترسیم کیجیو اور اس کے نقاط انعطاف

دریافت کرو۔ [لا = ۱، لا = ۳]

(۱۵) ثابت کرو کہ منحنی $\frac{1}{1+لا}$ پتریں نقاط انعطاف میں اور وہ ایک خط میں واقع ہیں، منحنی کی ترکیب ملاحظہ کیجئے۔

(۱۶) ثابت کرو کہ مساوات $لا = ۱۰ - لا + لا = ۶$ کی ایک تہری اصل ہے۔

(۱۷) ثابت کرو کہ مساوات $لا = ۵ + لا + لا = ۹ - لا + لا = ۴ - لا + لا = ۸$ کی ایک تہری اصل ہے نیز تمام اصلیں دریافت کرو۔

(۱۸) منحنی $ما = ۱ - لا + لا$ کو مرسم کرو اور اس کے اقل اور اعظم معین اور نقاط انعطاف دریافت کرو۔

(۱۹) منحنی $ما = ۲ - لا + لا = ۳ - لا + لا = ۷$ کو مرسم کرو اور اس کے نقاط انعطاف دریافت کرو۔

(۲۰) منحنی $ما = ۴ - لا + لا + لا = ۹ - لا + لا + لا = ۶$ کے اقل اور اعظم معین اور نقاط انعطاف دریافت کرو اور منحنی کو مرسم کرو۔

(۲۱) ثابت کرو کہ منحنی $ما = لا + لا = ۱ - لا + لا$

اور $ما = ۲ - لا + لا = ۱ - لا + لا$ ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں اور نقطہ تماس پر عبور کرتے ہیں۔ منحنیوں کو مرسم کرو۔

(۲۲) دریافت کرو کہ مستقامات $(ج + ج)$ کی کیا قیمت ہونی چاہئے کہ منحنی $ما = (لا + ج + لا + ج) لا$ پر $لا = \frac{1}{4}$ نقطہ انعطاف ہو، $لا = ۱$ پر منحنی کا ماس $لا$ محور کے متوازی ہو اور منحنی نقطہ $(۱، ۱)$ میں سے گزرے۔

(۲۳) ثابت کرو کہ منحنی $ما = \frac{لا - لا + لا}{لا + لا + لا}$ پتریں حقیقی نقاط انعطاف ہیں۔

(۲۴) منحنی $ما = ۴ - جب لا - جب لا$ پر محور کے نقطے اور نقاط انعطاف دریافت کرو اور منحنی کو مرسم کرو۔

(۲۵) اگر منحنی $ما = ف(لا)$ کے دو متصل معین پ ن، پ ن ہوں اور اگر

ق ح کوئی درمیانی معین ہو جو درجہ پ سے و پر لے تواتر کر کو کہ انتہائیں

$$ق و = \frac{1}{4} ن ح \times ح ت \times ف ص (ج)$$

جہاں ن اور ت کے کسی درمیانی نقطہ کا فاصلہ ج ہے۔

(۲۶) ثابت کر دو دفعہ ۵۶ کے ضابطہ ف ص (۱ + ۵) = ف ص (۱) + ۵ ف ص (۱ + ۵ ط ص ۵) میں ط ص کی انتہائی قیمت (جیکہ ۵ لا انتہا چھوٹا ہو) عموماً $\frac{1}{4}$ ہوتی ہے۔ اس نتیجہ کی ہند کسی تعبیر تباؤ۔

(۲۷) ثابت کر دو اقل اور اعظم نقطا کی تربت میں تفاعل کی قیمت میں تغیر اکثر دوسرے رتبہ کی چھوٹی مقدار ہوتی ہے۔

(۲۸) تباؤ کو کیوں کسی خاص تیش پر متلائی کرو نو میٹر کی چال ٹھیک تلافی پیدا کرنے والی معیاری تیش پر کی چال سے بقدر ایک ایسی مقدار کے مختلف ہوتی ہے جو تیش کے فرق کے مربع کے متناسب ہے۔

(۲۹) ثابت کر دو تغیر کے مساوی قوتوں کے لئے محسوس کردہ ریاضی کی جدول کے کسی حصے میں متناسب اجزاء کے اصول پر اور راج کرنے میں بڑی سے بڑی خطا دوسرے فرق کے اٹھویں حصہ کے مساوی ہے۔ (دوسرے فرق سے مراد مسلسل داخلوں کے فرقوں کا فرق ہے)۔

(۳۰) ایک نئی پستتین نقول کپ 'ق' اس کے محدود بالترتیب (۵۸۵۲۶، ۵۳۲۵۰، ۵۸۹۱۰، ۵۳۵۰۰) اور (۵۹۲۳۹، ۵۳۷۵۰) میں نقطہ ق پر $\frac{ق}{ق}$ اور $\frac{ق}{ق}$ کی قیمتیں تقریباً دریافت کرو۔

(۳۱) دفعہ ۷ کے ضابطہ ۲۳ کی مدد سے لوگب جسم کی قیمت اعشاریہ کے چھ مقام تک دریافت کرو۔ [T ۹۹۹۹۳۴]

فہرست اصطلاحات

صغاری احصاء

(حصہ اول)

Abscissa

Absolute value

Acceleration

Adiabatic relation

Amplitude

Anti-logarithm

Approximation

Arc

Asymptotes

Calculus

Catenary

Cartesian co-ordinates

Chord

Circular Functions

Circumscribed circle

Compression

Cone

فصلہ
مطلق قیمت

اسراع

حرکت گذار شدہ

سعت

ضد لوگاریتم

تقرب

قوس

متقارب

احصاء

زنجیرہ

کارٹیزی مختصات

وتر

دائری تفاعل

بیرونی یا داخلہ دائرہ

پچکاو

مخروط

Consecutive point

متصل نقطے

Continuity

تسلسل

Convergency

استدقاق

Convergent (Series)

مستند سلسلہ

Crank

کرنیک

Cross-section

عمودی تراش

Curvature

انحناء

Curve

منحنی

Cylinder

اسطوانہ

Deflexion

انحراف

Density

کثافت

Dependent variable

تابع متغیر

Derived function

مشتق تفاعل

Differentiable

قابل تفرق

Differentials

تفرقے

Differentiation

تفرق

Discontinuity

عدم تسلسل

Double root

دوہری اصل

Dynamics

حرکیات

Elasticity

لیجک

Elimination

استقاط

Ellipse

قطع ناقص

Ellipsoid

بالقص نما

Exponential function

قوت تفاعل

Frustum

ناکمل یا ناقص حصہ، مقطوع

Function	تفاعل
Galvanometer	مقناطیسی برقی پیمانہ
Geometrical progression	سلسلہ ہندسیہ
Graph	نقشہ
Hyperbola	قطع زائد
Hyperbolic function	زائدی تفاعل
Hyperboloid	زائد نما
Image	خیال
Implicit function	تضمینی تفاعل
Inclination	میلان
Independent variable	متغیر متبوع
Infinite series	لامتناہی سلسلہ
Infinitesimal	صغاری، صغاریہ
Intercept	تقاطع یا مابینی حصہ
Interval	وقفہ
Intrinsic equation	ذاتی مساوات
Inverse	مقلوب
Inversion	تقلیب
Isolated points	تنہا یا انکیلے نقطے
Kinetic energy	توانائی بالحرکت
Lens	عدسہ
Limit	انتہا
Limiting values	انتہائی قیمتیں
Logarithm	لوکارتم
Logarithmic function	لوکارتمی تفاعل

Longitudinal magnification

Lower limit

Magnification

Maximum

Mean-value Theorem

Mechanics

Multiple roots

Node

Normal

Order

Ordinate

Oscillation

Parabola

Paraboloid

Parallelopiped

Parameter

Partial

Perimeter

Pendulum

Period

Permutation

Polar Co-ordinates

Pole

Pressure

Principal axes

طولی تضعیف
نیلی انتہا، نیچے کی حد

تضعیف

اعظم

اوسط قیمت کا مسئلہ

علم حیل

ضعفی اصلیں

عقدہ

عماد

رتبہ

معتین

اہتزاز

قطع مکانی

مکانی نما

متوازی السطوح

مبدل

جزوی

گھیرا، محیط

رقاص

دور

ترتیب

قطبی نمود

قطب

دباؤ

صدری محور

Radius Victor	سستی نیم قطر
Range	وسعت، پیم
Rational	منطوق
Rectilinear motion	مستقیم حرکت
Representation	تعبیر
Rigid body	استوار جسم
Rigidity	استواریت
Roots	اصلیں
Sequence	تواتر
Sphere	کرہ
Spheroid	کرہ نما
Theory	نظریہ
Transcendental	ماورائی
Trigonometry	علم مثلث
Unique	یگانہ
Upper limit	علوی انتہا، اوپر کی حد
Variable	تغیر
Variation	تغیر
Vector	سستی
Vertical	انتصابی
Zone.	منطقہ

(NOTATION)

ترتیم

Sin ∞	جب لا
Cos ∞	جم لا
tan ∞	مس لا
cot ∞	مم لا
Sec ∞	قط لا
Cosec ∞	قم لا
Sin ⁻¹ ∞, Cos ⁻¹ ∞, tan ⁻¹ ∞,	جب ⁻¹ لا، جم ⁻¹ لا، مس ⁻¹ لا
Cot ⁻¹ ∞, Sec ⁻¹ ∞, Cosec ⁻¹ ∞,	مم ⁻¹ لا، قط ⁻¹ لا، قم ⁻¹ لا
Sine hyperbolic (Sinh ∞)	زاندی جیب (جینا لا)
Sinh ∞, Cosh ∞, Tanh ∞,	جینا لا، جینا لا، مسنا لا
Coth ∞, Sech ∞, Cosech ∞,	مینا لا، قطن لا، قمن لا
Sinh ⁻¹ ∞, Cosh ⁻¹ ∞, Tanh ⁻¹ ∞,	جینا ⁻¹ لا، جینا ⁻¹ لا، مسنا ⁻¹ لا
Coth ⁻¹ ∞, Sech ⁻¹ ∞, Cosech ⁻¹ ∞,	مینا ⁻¹ لا، قطن ⁻¹ لا، قمن ⁻¹ لا
π	π
Exponent (e)	توت نام (قو) یا صرف (مو)
e ∞	قو لا
a ∞	قو لا
log _e ∞	لوگ لا [یا صرف لوگ لا]
log ₁₀ ∞	لوگ لا
←	سہ یا صہ

اشاریہ (INDEX.)

احداث صفحات سے متعلق

اتفاق یا مشروط استفاق ' ۱۶

اجزائے متناسب ' ۲۱۲

اجزائے متناسب کے ذریعہ اوراج ' ۲۱۳

استفاق ' لامتناہی سلسلوں کا ' ۹، ۸

اصلیں ' جبریہ مساواتوں کی ' ۱۴

اعظم اور اقل قیمتیں ' ۱۴۳

انتہائی قیمتیں ' ۱۰، ۵، ۴، ۵

انعطاف کے نقاط ' ۸

اوسط قیمت کا مسئلہ ' ۱۵۶

تصیحات کا محسوب کرنا ' ۱۵۴

تضمینی تفاعل ' ۹۲ تا ۹۴، ۱۶۵

تغیر ' ۲، ۱

تفاعل ' تعریف ' ۲۰

ہندی تعریف ' ۲۲

جبری اور مادرانی ' ۳۴

تضمینی ' ۹۲

مقلوب ' ۴۲، ۸۵

- تفاعل کا پورا تغیر ۱۵۹
تفرق ۸۲، ۸۰، ۷۷، ۷۶، ۷۳، ۷۰، ۶۷، ۶۴، ۶۱، ۵۸، ۵۵، ۵۲، ۴۹، ۴۶، ۴۳، ۴۰، ۳۷، ۳۴، ۳۱، ۲۸، ۲۵، ۲۲، ۱۹، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۷، ۴، ۱
- تفرق ۹۳، ۸۵
تفرق ۱۶۲، ۱۵۳
تقعور اور تحدب ۲۰۲
ٹیل کا مسئلہ ۲۱۱
جبری تفاعل کا تسلسل ۳۷، ۳۴، ۳۱، ۲۸، ۲۵، ۲۲، ۱۹، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۷، ۴، ۱
جزوی مشتقات ۹۱
جفت اور طاق تفاعل ۱۱۳
دائرہ کا محیط ۴۶
دائری تفاعل ۸۱، ۷۷، ۷۳، ۶۹، ۶۵، ۶۱، ۵۷، ۵۳، ۴۹، ۴۵، ۴۱، ۳۷، ۳۳، ۲۹، ۲۵، ۲۱، ۱۷، ۱۳، ۹، ۵، ۱
دوسرا مشتق ۱۹۵
اسکی ہندی تغیر ۲۰۷
رول کا مسئلہ ۱۴۰
زائدی تفاعل ۱۱۲ تا ۱۱۷
زیر عماد ۱۶۷
زیر عباس ۱۶۷
ساکن قمتیں، تفاعلوں کی ۱۴۵
ساکن عباس ۲۰۲
صغاریات ۵۷
ضعفی اصلیں، مساواتوں کی ۲۰۶
عدم تسلسل ۲۹
علوی یا سفلی انتہا، گردہ کی ۳
عماد کی مساوات ۱۷۱
قوت نما تفاعل ۱۱۰، ۱۰۳

- ۱۱۲ ' قیمت ' ہوگی
 ۱۵ ' لا متناہی سلسلے ' ۷
 ۱۲۲ ' لوکاریم کا تفرق ' ۷
 ۱۱۷ ' لوکاریمی تفاعل ' ۷
 ۱۹۸ ' لیب نیز کا مسئلہ ' ۷
 ۳۴ ' ماورائی تفاعل ' ۷
 ۲۰ ' متغیر مقبوع اور تابع ' ۷
 ۲۰۶ ' مساواتوں کا نظریہ ' ۱۳۰
 ۲۴ ' مسلسل تفاعل ' تعریف
 ۴۷ ' خاصیت ' ۲۵
 ۱ ' مسلسل تغیر ' ۱
 ۶۸ ' مشتق تفاعل ' تعریف
 ۶۶ ' ہندسی توضیحات
 ۸۵ ' مقلوب تفاعل ' ۴۲
 ۸۹ تا ۸۶ ' مقلوب دائری تفاعل ' ۴۴
 ۱۷۰ ' ماس ' منحنی کا ' ۶۷
 ۶۷ ' منحنی کا ڈھال ' ۶۷
 ۳۴ ' منطق صحیح تفاعل ' ۳۴
 ۳۶ ' منطق کسر تریسین ' ۳۶
 ۱۴۰ ' نظریہ ' مساواتوں کا ' ۱۴۰
 ۹۳ ' نقشی باہم ارتفاع خطوط
 ۲ ' ہندسی تعبیر ' مقداروں کی
 ۲۲ ' تفاعل کی ' ۲۲

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار ^{لیا}
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

کتابخانه

جامعہ کائنات

- ۱۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھے تو اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۲۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۳۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۴۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۵۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۶۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۷۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۸۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۹۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔
- ۱۰۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی اور اس کی ہر ایک بات اس کے دل میں گہرائی سے اترے گی۔

