

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224536

UNIVERSAL
LIBRARY

دیسپاچہ

تین سو برس قبل مسیح سے سترھویں صدی عیسوی تک حکیم اقلیدس کا ترتیب دیا ہوا علم ہندسہ ریاضی اور سائنس کی دوسری شاخوں کی بہ نسبت سب سے زیادہ مکمل ہو چکا تھا یہاں تک کہ لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ اب اس علم میں کسی اہم اضافہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ فرانس کے مشہور فلسفی اور ریاضی دان ڈے کارٹ (Descartes) نے سترھویں صدی کی ابتدا میں یہ محسوس کیا کہ ہندسہ کا علم اضافہ اور ترقی کے ٹرک جانے کی وجہ سے ایک مردہ علم بن گیا ہے اور اس میں نئے سرے سے جان دہانے کے لیے ضروری ہے کہ جبر و مقابلہ کے علم سے اس کا رشتہ جوڑا جائے۔ اس نئے ہندسہ کو "تحلیلی ہندسہ" یا "محدودوں کا ہندسہ" کہتے ہیں جسے ڈے کارٹ نے ۱۶۳۷ء میں پیش کیا۔ یہیں سے جدید ریاضی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سترھویں صدی کے آخری حصہ میں نیوٹن اور لائبنٹز (Leibnitz) نے علم احصاء کی بنیاد رکھی۔ اس وقت سے یہ دونوں علم آزاد طور پر اور ایک دوسرے کی مدد سے آگے بڑھتے رہے اور آج بھی ان میں ترقی کی وسیع گنجائش ہے۔

نہ صرف ریاضی کی دوسری شاخوں بلکہ طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، طب اور عمرانیات یہاں تک کہ روزمرہ کے ہر کاروبار میں بھی ترسیبی طریقہ کا اکثر استعمال ہوتا ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ ریاضی کے طلباء اس موضوع کے بنیادی اصول جاننے کی

انسانی جماعتوں میں کچھ لیں۔ یہ کتاب مبتدیوں کے لیے لکھی گئی ہے اور جامعہ عثمانیہ کے انٹر میڈیٹ کے نصاب پر حاوی ہے۔ اس کے باوجود کوشش کی گئی ہے کہ کتاب اپنے حدود کے اندر مکمل ہو۔ جن عنوانوں پر بحث کی گئی ہے ان کے متعلق تمام ضروری امور بتا دیے گئے ہیں تاکہ پھر اعلیٰ جماعتوں میں ان پر دوبارہ بحث کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اس کتاب میں صرف قائم محور استعمال کیے گئے ہیں اگرچہ باقی نوروں اقطبی محدود کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ نقطہ کے محدود اور خط مستقیم کی مساوات سارے تجلی ہندسہ میں اساسی اہمیت رکھتے ہیں اس لیے پہلے دو باب میں ان پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ پڑھنے والوں کی یہ کوشش ہونی چاہئے کہ اس حصہ پر پوری طرح عبور حاصل کیے بغیر آگے نہ بڑھیں۔ دائرہ، مکافاتی، ناقص اور زاہد کی معیاری مساواتیں پوری وضاحت کے ساتھ حل کی گئی ہیں اور مساواتوں کی مدد سے ان تخمینوں کی چند آسان اور مشہور خاصیتوں کو اخذ کیا گیا ہے۔ کئی توضیحی مثالیں دی گئی ہیں جن میں سوالوں کو تفصیل کے ساتھ حل کیا گیا ہے تاکہ طالب علم کو سوال حل کرنے کا طریقہ سمجھ میں آجائے متعدد مشقیں بھی فراہم کی گئی ہیں تاکہ طلباء خود اپنے طور پر سوال حل کریں اور ضمنیوں پر مہارت حاصل کر لیں۔

ہم ان تمام حضرات کے مشکور ہیں جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب اور طباعت میں ہماری مدد کی۔ ہم ہر رشتہ تالیف و ترجمہ کے عہدہ داروں اور اہلکاروں کے بھی شکر گزار ہیں جن کی محنت اور کوشش کی وجہ سے کتاب کی طباعت میں بہت سہولت ہوئی۔

قاضی محمد حسین

۳۲۸

رضی الدین صدیقی

فہرستِ امین

محدودوں کا ہندسہ

صفحہ	مضامین
۱	پہلا باب: محدود اور خطِ مستقیم
۱	۱۵۱ محدود
۶	۱۵۱۲ محدود تین ابعاد میں
۷	مشق ۱
۹	۱۵۲ کارٹیزنی محدود
۱۰	۱۵۳ دو نقطوں کا درمیانی فاصلہ
۱۲	مشق ۲
۱۳	۱۵۴ خطِ مستقیم کی تقسیم

صفحہ	مضامین
۱۵	۱۵ خط مستقیم کی تقسیم نسبت ک : ک میں
۲۰	مشق ۳
۲۱	۱۶ مثلث کا رقبہ
۲۳	مشق ۴
۲۴	۱۷ قطبی محدود
۲۴	۱۸ منحنی کی مساوات
۳۲	مشق ۵
۳۳	۱۹ محدودوں کی تبدیلی
۳۸	مشق ۶
۴۱	دوسرا باب : خط مستقیم
"	۲۰ سطح مستوی میں خط مستقیم کا تعین
۴۲	۲۱ خط مستقیم کی مساوات مختلف شکلوں میں
۴۹	۲۲ خط مستقیم کی مساوات کی عام شکل کارٹیزی محدودوں میں
۵۱	۲۳ عام مساوات کی تحول
۵۶	۲۴ کسی نقطہ کا عمودی فاصلہ خط مستقیم سے
۶۱	مشق ۷
۶۵	۲۵ دو خطوں کے درمیان زاویہ

صفحہ	مضامین
۷۰	دو خطوں کا نقطہ تقاطع ۲۷۳
۷۳	دو خطوں کے نقطہ تقاطع میں سے گزرنے والے خط کی مساوات ۲۷۳
۷۷	دو خطوں کے درمیانی زاویوں کے منصفیوں کی مساواتیں ۲۷۴
۸۰	مشق ۸
۸۳	لائیا میں متجانس مساوات ۲۷۵
۸۵	مبدأ میں سے گزرنے والے دو خطوں کا درمیانی زاویہ ۲۷۵
۸۶	خطوں کے جوڑے کے درمیانی زاویوں کے منصفیوں کی مساوات ۲۷۵
۸۸	جن نقطوں پر ایک خط ایک منحنی کو کاٹتا ہے ان کو مبدأ سے ملانے والے خطوں کی مساوات - ۲۷۶
۹۰	شرط کہ درجہ دوم کی عام مساوات دو خطوط مستقیم کو تعبیر کرے ۲۷۷
۹۸	متفرق مثالیں اور سوالات ۹
۱۱۱	باب دوم پر متفرق مشقی سوالات
۱۱۵	تیسرا باب : دائرہ
۱۱۶	تعریف ۳۷۱
۱۱۶	دائرہ کی مساوات ۳۷۲
۱۱۶	نقطہ اور دائرہ کا تعلق معیاری مساوات کے لیے ۳۷۲
۱۱۶	کسی قائم محوروں کے لحاظ سے دائرہ کی مساوات ۳۷۲
۱۱۶	نقطہ اور دائرہ کا تعلق عام مساوات کے لیے ۳۷۳
۱۲۲	مشق ۱۰

صفحہ	مضامین
۱۲۲	دائرہ کے وتر کی مساوات ۳۶۳
۱۲۶	ماس ۳۶۴
۱۲۷	دائرہ کے ماس کی مساوات ۳۶۵
۱۳۰	ماس کی مساوات عام شکل میں ۳۶۶
۱۳۳	عماد ۳۶۷
۱۳۴	عماد کی مساوات
۱۳۶	مشق ۱۱
۱۳۷	دائرہ اور خط مستقیم کا تقاطع ۳۶۵
۱۴۰	ایک نقطہ سے دائرہ کے ماس ۳۶۵
۱۴۵	مشق ۱۲
۱۴۶	وتر ماس ۳۶۶
۱۴۹	قطب اور قطبی ۳۶۷
۱۵۰	قطبی کی مساوات ۳۶۸
۱۵۱	عام صورت میں قطبی کی مساوات ۳۶۹
۱۵۲	قطب کے محدود ۳۷۰
۱۵۵	قطبی خطوں کی ایک اہم خاصیت ۳۷۱
۱۵۷	بیرونی نقطہ سے دائرہ کے ماس کا طول ۳۷۲
۱۵۹	مشق ۱۳
۱۶۰	توضیحی مثالیں دائرہ پر متفرق سوالات مشق ۱۴ ۳۷۹

صفحہ	مضامین
۱۷۵	چوتھا باب : قطع مکانی
۱۷۷	مخروطی تراشیں
۱۷۷	قطع مکانی
۱۸۱	مکانی کی شکل
۱۸۸	مکانی کی مساوات
۱۹۲	نقطہ اور مکانی کا تعلق
۱۹۵	مکانی کا ماسک اور مرتب معلوم ہوں تو مکانی کی مساوات دریافت کرنا۔
۱۹۸	مکانی کو مرسم کرنے کا جیلی طریقہ
۱۹۹	مکانی کے وتر، آکسس اور عماد کی مساواتیں
۲۰۳	مشقی سوالات ۱۵
۲۰۵	مشقی سوالات ۱۶
۲۰۶	مکانی اور خط مستقیم کے نقاط تقاطع کے محدود
۲۰۸	مشقی سوالات ۱۷
۲۰۹	تماس کی شرط
۲۱۱	مکانی کی تبدیلی تعبیر
۲۱۲	عماد کی مساوات
۲۱۲	سنخی اور خط مستقیم کے نقاط تقاطع اور تماس کی شرط
۲۱۴	مشقی سوالات ۱۸

صفحہ	مضامین	
۲۱۵	وتر تھاس کی مساوات	۴۶۹
۲۱۷	قطبی اور قطب	۴۶۹
۲۱۸	مکانی کے لحاظ سے نقطہ مستقیم کے قطب کے محدود معلوم کرنا	۴۶۲
۲۱۹	مشقی سوالات ۱۹	
۲۲۱	مکانی پر متفرق سوالات ۲۰	
۲۲۵	پانچواں باب : قطع ناقص	
"	قطع ناقص کی تعریف	۵۱۱
"	ناقص کی مساوات	۵۱۱
۲۲۹	ناقص کی شکل	۵۱۲
۲۳۱	مرکز سے ماسکہ اور مرتب کے فاصلے	۵۱۲
"	ناقص کا دوسرا ماسکہ اور دوسرا مرتب	۵۱۳
۲۳۳	ناقص کے کسی نقطہ سے ماسکی فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہوتا ہے۔	۵۱۳
۲۳۷	عکس مسئلہ	۵۱۳
۲۴۰	ناقص کو ترسیم کرنے کا جیلی طریقہ	۵۱۳
"	ناقص کا وتر فاصل	۵۱۴
۲۴۱	خروج مرکز کی قیمت محوروں کی رقوم میں	۵۱۵
۲۴۲	نقطہ اور ناقص کا تقاطع	۵۱۵
۲۴۴	امدادی دائرہ	۵۱۵
۲۴۶	خارج مرکز زاویہ	۵۱۵

صفحہ	مضامین
۲۴۷	۵۷۵۲ اُس ناقص کی مساوات معلوم کرنا جس کا ماسکہ نقطہ مرتب اور خروج المرکز معلوم ہوں۔
۲۵۲	مشق ۲۱
۲۵۳	۵۷۶ ناقص کے وتر کی مساوات
۲۵۵	۵۷۶۱ ناقص پر کے کسی نقطہ سے ناقص کے ماس کی مساوات
۲۵۷	۵۷۶۲ عماد کی مساوات
۲۵۹	مشق ۲۲
۲۶۰	۵۷۷ ناقص اور خط مستقیم کا تقاطع
۲۶۳	۵۷۷۱ ناقص کی مساوات کے لیے متبادل طریقہ
۲۶۶	مشق ۲۳
۲۶۷	۵۷۸ وتر ماس کی مساوات
۲۶۸	۵۷۸۱ قطب اور قطبی
۲۶۹	۵۷۸۲ قطبی کی مساوات
۲۷۰	۵۷۸۳ قطب کے محدود
۲۷۲	ناقص پر متفرق سوالات
۲۷۹	پچھٹا باب: قطع زائد
۲۷۲	۶۷۱ زائد کی تعریف
۲۷۲	۶۷۱۱ زائد کی مساوات

صفحہ	مضامین
۲۸۰	زائد کی شکل
۲۸۲	مرکز سے ماسک اور مرتب کے فاصلے
۲۸۳	دوسرا ماسک اور دوسرا مرتب
۲۸۵	زائد پر کسی نقطہ سے ماسکی فاصلوں کا فرق مستقل ہوتا ہے۔
۲۸۶	زائد کا وتر خاص
۲۸۸	مشق ۲۲
۲۹۱	ناقص اور زائد کی مساواتوں کا فرق
۲۹۳	مقارب
"	مقاربتوں کی مساواتیں
۲۹۵	قائم زائد
۲۹۶	قائم زائد کی مساوات مقاربتوں کو محور مان کر
۲۹۸	زائد کی مساوات مقاربتوں کو محور مان کر
۳۰۳	زائد پر متفرق مشقیں


بسم اللہ الرحمن الرحیم

محدود واکل ہندسہ

پہلا باب

محدود اور خط مستقیم

۱۱- محدود — ذیل کی شکل میں ایک خط مستقیم ہے جو دونوں طرف لا محدود ہے۔ اس خط پر بے شمار نقطے ہیں ان کا مقام معین کرنا مقصود ہے۔ اس غرض سے اس خط پر ایک نقطہ و لیا گیا ہے جس کے



لحاظ سے باقی تمام نقطوں کے مقام معین کیے جائیں گے۔ و کے دائیں طرف کوئی نقطہ 'ا'، 'ب'، 'ج'..... ہیں اور بائیں جانب 'ا'، 'ب'، 'ج'..... دائیں جانب کے نقطوں پر پہنچنے کے لیے و سے دائیں جانب جانا پڑتا ہے اور بائیں جانب کے نقطوں پر پہنچنے کے لیے بائیں جانب جانا پڑتا ہے اس "جانے کی جانب" یا فاصلہ کی سمت کو مثبت اور منفی علامات کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے، یہاں یہ قرار دیا و اختصار کی جاتی ہے کہ دائیں طرف کے طے کردہ فاصلوں کو مثبت ثابت مانا جائیگا اور بائیں جانب کے طے کردہ فاصلوں کو منفی۔ یہ فیصلہ اختیاری ہے


بائیں جانب کے طے کردہ فاصلوں کو مثبت اور دائیں طرف کے فاصلوں کو منفی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اب اگر ۲ و ۵ میل کے فاصلہ پر واقع ہو اور تمام خط پر کے فاصلوں کا پیمانہ یہ لیا جائے $۱ = ۱۰۰$ میل تو ۵ و ۲ بائیں جانب ۱ کا فاصلہ خط پر ۵ و ۲ رکھنا چاہیے۔ پس $۱ = ۵$ یا اگر اکائی یعنی انچ ہمارے ذہن میں رہے تو $۱ = ۵$ مثبت علامت کیونکہ فاصلہ ۵ کے دائیں جانب ناپا گیا ہے دیکھو شکل۔ عدد $(۱ + ۵)$ سے نقطہ ۱ کی جد بندی یا تعین ہوتی ہے اس عدد $(۱ + ۵)$ کو نقطہ ۱ کا محدّد کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ ۵ دائیں جانب فاصلہ ۵ جانے سے ہم خط کے صرف نقطہ ۱ پر پہنچتے ہیں گویا عدد $(۱ + ۵)$ کے جواب میں نقطہ ۱ ہے اور نقطہ ۱ کے جواب میں صرف عدد $(۱ + ۵)$ حاصل ہوتا ہے۔ پس اس ترکیب تعین یا حوالہ کے فریم کے مطابق ہندسی نقطہ ۱ اور حقیقی عدد $(۱ + ۵)$ میں یگانہ تعلق ہے۔ اسی طور پر نقطہ ۱ کا محدّد (-۱۵) منفی علامت اس لیے لگئی ہے کہ نقطہ ۱ شکل میں ۵ کے بائیں جانب واقع ہے۔ پیمائش سے واضح ہو گا کہ اور نقطوں کے محدّد کیا ہیں مثلاً نقطہ ۵ $(۱ + ۵)$ ہے، ۲ $(۱ + ۲)$ ج $(۲ + ۲)$ ، ۱ $(۱ - ۱)$ ، ۲ $(۱ - ۲)$ ، ۳ $(۱ - ۳)$ ، ۱ $(۱ - ۱)$ ، ۲ $(۱ - ۲)$ ، ۳ $(۱ - ۳)$ وغیرہ۔
 ظاہر ہے کہ ۵ کے دائیں جانب کے تمام نقطے ۱ تا ∞ تک کے تمام حقیقی اعداد سے اور ۵ کے بائیں جانب کے تمام نقطے ۱ تا $-\infty$ تک کے تمام حقیقی اعداد سے تعبیر ہوتے ہیں جن میں صحیح عدد، کسریں اور متبائن اعداد سب شامل ہیں۔
 اب اگر کوئی ہندسی نقطہ ۱ خط پر کہیں واقع ہو تو ۱ کا محدّد جبرہ عدد (۱) سے تعبیر ہو سکتا ہے، پس ۱ $(۱ + ۱)$ ، ۲ $(۱ + ۲)$ ، ۳ $(۱ + ۳)$ یا بالعموم نقطہ ۱ $(۱ + ۱)$ ہو سکتی ہیں یہ نقطہ ۱ خط پر کہیں واقع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نقطہ خط مستقیم پر حرکت کرے تو اس کے محدّد کو بھی اکثر ۱ سے تعبیر کرتے ہیں۔
 پس خط مستقیم پر کا کوئی نقطہ، ایک فاصلہ، ایک پیمائش، ایک عدد سے تعبیر ہو سکتا ہے مثلاً (۳) ، (-۲۵) ، (۱) ، (۱) ، (۱) وغیرہ۔
 واضح ہو کہ اس ترکیب سے ہندسی نقطہ کا نام، ایک عدد سے رکھا گیا۔



اور عدد کے پہلے مثبت، منفی علامت لگانے سے
مبداء و کے دائیں بائیں جانب کے سب
نقطے اس طور پر نامزد ہو جاتے ہیں -

خط مستقیم افقی ہونے کی بجائے انصباہی
ہو سکتا ہے اس پر مناسب مبداء و مقرر کیا گیا
و سے اوپر جانے کی سمت کو $\uparrow$ مثبت مانا جاتا
ہے اور نیچے جانے کی سمت $\downarrow$ کو منفی پہلے

کی طرح خط پر کے تمام نقطے $-\infty$ سے $+\infty$ تک کے تمام حقیقی اعداد سے تعبیر
ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ۱ $(۱+)$ ط $(۱+)$ ق $(-)$ ب (نقطہ ن) (۰) ہے۔
خط مستقیم ہونے کی بجائے منفی ہو سکتا ہے۔




اس پر مناسب مبداء و لے کر، ایک طرف کی سمت کو مثبت اور دوسرے
طرف کی سمت کو منفی لیا جاسکتا ہے۔ اگر اس کی قوس کا طول س سے تعبیر ہو تو
نقطہ ن (س) سے تعبیر ہوگا جہاں س، مثبت، منفی ہونے سے ن تمام اعداد
پر مشتمل ہو سکتا ہے۔

پس خط پر کے کسی نقطہ کا محدود "لا" ہے۔ یا اگر متحرک نقطہ خط پر
حرکت کرنے کے لیے مجبور ہو تو بھی اس کا محدود "لا" ہوگا جہاں لا بدلیگا یا
مختلف عددی قیمتیں اختیار کریگا جیسے نقطہ خط پر حرکت کریگا۔

۱۱۔ اب تک نقطہ ایک خط پر رہنے یا حرکت کرنے کے لیے
مقید تھا، اب فرض کرو کہ نقطہ ایک مستوی سطح پر واقع ہے یا مستوی سطح میں
رہنے یا حرکت کرنے کے لیے مجبور ہے اور اس کا مقام متعین کرنا مقصود ہے۔
اس مستوی میں دو خط علی القوائم لا ولا اور ما و ما ایک افقی اور دوسرا
انصباہی۔ یہ نقطہ و پر قطع کرتے ہیں و کو پیمائشوں کا مبداء مانو۔ نیز

یہ قرارداد ہم اختیار کرتے ہیں، تمام افقی فاصلے جو وکلا کی سمت میں



ناپے جائینگے وہ مثبت ہونگے اور وکلا کی سمت میں منفی۔ نیز انتصابی سمت میں جو فاصلے و ما کی سمت میں ناپے جائینگے وہ مثبت ہونگے اور و ما کی سمت میں منفی۔ ثابت خط وکلا کو محدود لاکتے ہیں اور و ما کو محور ما۔ پس ایک مستوی میں نقطوں کی تعیین کے لیے ذیل کی ترکیب یا آلہ ہم نے اختیار کیا ہے ”دو خط اور ان کا نقطہ تقاطع مبدأ“ مع فاصلوں کے متعلق قراردادوں کے۔

اب مستوی سطح میں کسی نقطہ ا کا مقام معین کرنا مقصود ہے۔ ا سے ان ثابت خطوں پر عمود ا ل، ا م کھینچو ان دو عمودوں یا ان کی پیمائشوں کے ذریعے نقطہ ا کا مقام معین ہو سکتا ہے۔ یعنی م ا، اور ل ا نقطہ کے لیے ا کا مقام متعین کرتے ہیں اور ا کے محدود قرار دیے جاسکتے ہیں یا اسے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، مستوی سطح میں کے نقطہ ا تک پہنچنے کے لیے مبدأ سے فاصلہ ول خط وکلا پر اور ل ا محور ما کے متوازی جانا پڑتا ہے۔

چونکہ م ا = ول اس لیے دونوں صورتوں میں نقطہ ا کی تعیین ول اور ل ا سے ہوتی ہے یعنی نقطہ ا کے محدود (ول، ل ا) ہیں، اور ا کی شکل کو دیکھتے

ظاہر ہے کہ دل اور ل ا دونوں مثبت ہیں۔ اگر دونوں محروں کے متوازی فاصلوں کی اکائی ایک ہی لی جائے مثلاً $10 = 10$ تو دل = ۹ اور ل = ۱، یعنی نقطہ ا کے محدود ہیں (۶، ۹)۔ مختلف محروں پر مختلف اکائیاں استعمال ہو سکتی ہیں۔

یاد رہے کہ اس تقییم میں محور لا پر یا محور کا کے متوازی فاصلہ کو پہلے لکھا گیا ہے اسے فصل کہتے ہیں اور محروما کے متوازی فاصلہ کو بعد میں لکھا گیا ہے اسے نقطہ کا "معین" کہتے ہیں۔ مثلاً دل فصل ہے اور ل ا معین۔ پس ہر نقطہ اس طرح تعبیر ہوگا (فصلہ 'معین') (دل 'ل ا') (۶، ۹)۔ گویا سطح مستوی میں کا کوئی نقطہ دو پیمائشوں یا دو عددوں سے تعبیر ہوگا۔

محاور لا اور ما مستوی مذکور یا دو ابعاد کی فضا کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لا و ما، ما و لا، لا و ما، ما و لا۔ حصے بالترتیب رُبع اول، دوم، سوم، چہارم کے نام سے موسوم ہوتے ہیں۔ پہلے ربع لا و ما میں کسی ایک نقطہ تک پہنچنے کے لیے ولا پر کچھ فاصلہ مثبت سمت میں اور و ما کے متوازی کچھ فاصلہ مثبت سمت میں طے کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ اس ربع کے تمام نقطوں کے لیے فصلہ اور معین دونوں مثبت ہونگے گویا کسی نقطہ کے محدود ہونگے (+، +) دوسرے ربع میں کسی نقطہ کے لیے ولا کی سمت میں کچھ فاصلہ اور و ما کی سمت میں کچھ فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ اس ربع کے نقطوں کے لیے محدود ہونگے (-، +) تیسرے ربع کے نقطوں کے لیے محدود ہونگے (-، -) اور چوتھے ربع کے نقطوں کے لیے (+، -)۔ اوپر کا نقطہ ا (۶، ۹) ہے، ان دو اعداد ۶، ۹ کے پہلے مثبت منفی علامات لگانے سے باقی تین ربعات میں تین نقاط (-، ۶، ۹)، (۶، -، ۹)، (۶، ۹، -) حاصل ہوتے ہیں۔ اور پہلے ربع کے تمام نقطوں کے مثل جن کے محدود دو مثبت عددوں سے تعبیر ہوتے ہیں اس طور پر مثبت منفی علامات استعمال کرنے سے باقی تین ربعات کے تمام نقطے حاصل ہو سکتے ہیں، گویا دو ابعاد کی فضا کے تمام نقطے اس طور پر دو محدودوں کے ذریعہ جبریہ علامات استعمال کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ پس مستوی سطح میں کا نقطہ اس طرح کا ہوگا (-، ۲، ۳) یا زیادہ عام طور پر (ل، ب) یا (لا، لم)۔


جب نقطہ کے محدودوں کی جبریہ شکل ہو تو مثلاً 'لا' کو مختلف عددی قیمتیں دینے سے مستوی کے تمام نقطے اس سے تعبیر ہو سکتے ہیں۔

نیز جب نقطہ متحرک ہو یعنی مثلاً ایک دائرہ کے محیط پر حرکت کرے تو اس کے محدود 'لا' اسے تعبیر ہو سکتے ہیں جہاں 'لا' متغیر ہونگے۔ پس دو ابعاد کی فضا میں کوئی نقطہ (لا) ہے۔

ہم آگے دیکھیں گے کہ ہر منحنی جو بالتمام دو ابعاد کی فضا میں واقع ہو سکتا ہے جیسے خط مستقیم دائرہ قطع مکانی وغیرہ اس پر کے نقطے ایک رشتہ پورا کرتے ہیں جو (لا) کی رقوم میں بیان ہو سکیگا۔

۱۱۲۔ محدودین ابعاد میں نقطہ اب فرض کر دو ایک

سطح مستوی میں رہنے کے لیے مقید نہیں ہے بلکہ تین ابعاد کی فضا میں کہیں واقع ہو سکتا ہے۔ اس کے مقام کی تعیین مقصود ہے۔ اس صورت میں حوالہ کا قریع یہ اختیار کیا جاتا ہے۔



کوئی مناسب علی القوائم تین مستوی ماوے 'ے' ولا، لا و ما فضا میں لہذا یہ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر حصہ کو ثمن کہا جائیگا۔ یہ حوالہ کے مستوی قرار دیے جائیں گے۔

یہ مستوی نقطہ و پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ دیمپیشن کا مبداء ہے۔ ان میں سے دو دوستوی تین خطوط مستقیم ولا، و ما، وے پر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یہ خط محور قرار دیے جا سکتے ہیں۔ محور لا کی سمت لا ولا مثبت اور لا ولا منفی ہوگی، اسی طرح ما و ما مثبت اور ما و ما منفی اور وے وے مثبت اور وے وے منفی ہوگی۔

اب نقطہ ۱ پر پہنچنے کے لیے مبداء و سے فاصلہ و (۳) محور لا پر اور مل (۵) محور ما سے متوازی اور ل ۱ (۳) محور وے کے متوازی جانا پڑتا ہے، پس ۱ کے محدود (۲، ۱، ۵، ۳) ہیں۔ اسی طرح ۲ کے مثل باقی سات شمنوں میں نقطہ ہونچے (۲، ۱، ۵، ۳) (۲، ۱، ۵، ۳) (۲، ۱، ۵، ۳) (۲، ۱، ۵، ۳) (۲، ۱، ۵، ۳) (۲، ۱، ۵، ۳) (۲، ۱، ۵، ۳) گویا تین مثبت عددوں کے سامنے مثبت منفی علامتیں لگانے سے ایسے (۲، ۱، ۵، ۳) عدد حاصل ہوتے ہیں جو فضاء کے مختلف شمنوں میں واقع ہیں۔ زیادہ عام صورت میں نقطہ ن کے محدود (۱، ۲، ۳، ۴) ہونگے یا (۱، ۲، ۳، ۴)۔ نقطہ ن (۱، ۲، ۳، ۴) محدودوں لا، ۱، ۲، ۳ کی مختلف عددی قیمتوں کے لیے فضاء میں کے تمام نقطوں پر منطبق ہو سکتا ہے۔ پس فضاء میں کے کسی نقطہ کی تعیین کے لیے تین پیمائشوں تین محدودوں مثلاً (۲، ۱، ۵، ۳) (۱، ۲، ۳، ۴) (۱، ۲، ۳، ۴) کی ضرورت ہوگی۔

مشق ۱۔

(۱) حقیقی اعداد - $\infty + \infty + \infty$ کو ایک خط مستقیم پر ترتیب دو کسور اور متباہن اعداد کی تعیین بھی کرو۔
(۲) خط ۱ ب کا وسطی نقطہ و ہے اور خط ۲ کوئی اور نقطہ ج ہے و کو محدودوں کا مبداء مان کر ثابت کرو کہ

$$۱ج + ۲ج = ۲وب$$

$$۱ج - ۲ج = ۲وج$$

(۳) ایک خط مستقیم پر دو نقطے 'ا'، 'ب' ہیں، ان کی اندرونی اور بیرونی تقسیم ایک ہی نسبت میں نقاط 'ج'، 'د' سے ہوتی ہے، محدود درج کرنے سے ثابت کرو کہ

$$\frac{1}{د ا} + \frac{1}{ج ا} = \frac{2}{ا ب}$$

$$(۴) \frac{1}{د ا} + \frac{1}{ب ا} = \frac{2}{ج ا}$$

ایک خط مستقیم پر چار نقطے 'ا'، 'ب'، 'ج'، 'د' کسی ترتیب میں ہیں، ہر نقطہ کے لیے محدود فرض کرنے سے ثابت کرو کہ

$$ب ج \times د ا + ج ا \times ب د + د ا \times ج ب = ۰$$

(۵) دو الباد کی فضا میں مناسب پیمانہ پر

(ا) نقاط (۱، ۰)، (۰، ۲)، (۰، ۳) کی شکل میں نشاندہی کرو واضح ہوگا کہ یہ سب نقطے محاورہ واقع ہیں ان سب کا $\lambda = ۰$ ۔

(ب) نقاط (۰، ۰)، (۰، ۱)، (۰، ۲)، (۰، ۳) کی شکل میں نشاندہی کرو واضح ہوگا کہ یہ سب نقطے محاورہ واقع ہیں ان سب کا $\lambda = ۰$ ۔

(ج) نقاط (۱، ۱)، (۱، ۲)، (۲، ۲)، (۲، ۳) کی شکل میں نشاندہی کرو۔

واضح ہوگا کہ یہ سب نقطے محاورہ ولا، و $\lambda = ۰$ کے درمیانی زاویہ کے

منصف پر واقع ہیں ان سب کے لیے $\lambda = ۰$ ۔

(د) نقاط (۱، ۱)، (۱، ۲)، (۲، ۲)، (۲، ۳) کی

شکل میں نشاندہی کرو۔

واضح ہوگا کہ یہ نقطہ ولا اور ولا کے درمیانی زاویہ کے منصف پر

واقع ہیں ان سب کے لیے $\lambda = ۰$ ۔

(۶) سکیل $\frac{1}{4} = ۱$ کے موافق، مربع دار کاغذ پر

(ا) ان نقطوں (۰، ۰)، (۱، ۱)، (۱، ۲)، (۲، ۲)، (۲، ۳)، (۳، ۳)

کو ترسیم کرو، اور ان میں سے خط مستقیم کھینچو۔

(ب) ان نقطوں $(3, 5)$ ، $(-11, 3)$ ، $(-5, 9)$ ، $(1, 3)$ کو مرتب کر دو اور دکھاؤ کہ یہ ایک ایسے دائرہ کے محیط پر واقع ہیں جس کا مرکز $(-5, 3)$ ہے اور نصف قطر 4۔

(ج) ان نقطوں $(-2, 2)$ ، $(3, 4)$ ، $(3, -1)$ ، $(18, 12)$ ، $(18, -1)$ کو مرتب کرو اور ایک ایسا مکانی ان میں سے کھینچو جس کا راس $(2, -2)$ ہے اور جس کا دائرہ خاص 10 ہے۔


(د) نقاط $(-10, 3)$ ، $(-20, 3)$ ، $(-10, 1)$ کو مرتب کرو اور ان نقاط میں سے ایک قطع ناقص کھینچو اور دکھاؤ کہ اس کا مرکز تقریباً $(-10, 3)$ ہے۔ اور اس کے نیم محور 10 اور 5 ہیں۔

۱۲۔ اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ابعاد میں کسی نقطہ کا محور ”لا“ ہوگا، دو ابعاد کی تضاد میں نقطہ کے محدود (لا، ما) ہونگے اور تین ابعاد کی تضاد میں (لا، ما، سی)۔ انہیں کارٹیزی محدود کہتے ہیں۔
نقطہ کو اس طور پر عددوں کے ذریعہ تعبیر کرنے کا طریقہ، فرانسیسی فلسفہ ڈی کارٹ (Des Cartes) نے ایجاد کیا، اسی کے نام کے ساتھ یہ محدود منسوب ہیں۔ جدید ریاضی کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ڈی کارٹ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔

ہندسہ کے عناصر، خطوط، اشکال، مجسمات وغیرہ تمام بے شمار نقطوں سے بنے ہوئے خیال کیے جاسکتے ہیں، ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ اب ہر نقطہ عددوں کے ذریعہ بیان ہو سکتا ہے اور ہم آگے دیکھینگے کہ ہندسی نقطوں کے درمیان کا کوئی رشتہ ان عددوں کے باہمی رشتہ کے ذریعہ بیان ہو سکیگا۔ اب نقطوں کے اکثر ایسے گروہ ہوتے ہیں جن کے تمام افراد میں ایک مشترک خاصیت پائی جاتی ہے مثلاً ایک دائرہ کے محیط پر کے بیشتر نقطے یہ مشترک خاصیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نقطہ مرکز سے مساوی فاصلہ پر ہو۔ اب اگر محیط پر کے بے شمار نقطوں میں سے کسی ایک نقطہ کو (لا، ما) فرض کیا جائے جو عام نقطہ یا نمایندہ نقطہ

خیال کیا جاسکتا ہے اور مختلف عددی قیمتیں اختیار کرنے سے یہ محیط پر کے بے شمار نقطوں میں سے کسی ایک پر منطبق ہو سکتا ہے اور دیے ہوئے مرکز کے محدود (اُب) ہوں اور دائرہ کا دیا ہوا نصف قطر r ہو تو اس ہندسی امر کو ہمیں ریاضی کی علامتی زبان میں بیان کر دینا ہے کہ نقاط (لا) (ما) اور (اُب) کا فاصلہ r کے مساوی ہے۔ جس سے ایک جبریہ رشتہ لا، ما، اُب r میں ملے گا۔ اسی طور پر تین ابعاد میں ایک گڑھ کی سطح پر کے نقطے مرکز سے مساوی فاصلوں پر ہوتے ہیں، نمایندہ نقطہ اگر (لا، ما، ی) ہو اور دیا ہوا مرکز (اُب، ج) اور نصف قطر r تو اس ہندسی امر کو بیان کرنے سے ہمیں (لا، ما، ی، اُب، ج، ر) میں ایک جبریہ رشتہ ملے گا جو لا، ما، ی کی تمام ممکنہ قیمتوں کے لیے جو گڑھ کی سطح پر واقع ہو سکتی ہیں درست ہوگا۔ اب دو اور تین ابعاد کی فضاء میں کسی دو نقطوں کا باہمی فاصلہ ان کے محدودوں کی رقوم میں معلوم کیا جائیگا جس کی مدد سے اوپر کے جبریہ تعلقات معین شکل میں حاصل ہو سکیں گے۔

۳۱۰ - دو ابعاد کی فضاء میں کسی دو نقطوں 'ن' کے محدود (لا، ہ) اور (لا، ہ) معلوم ہیں، ان کے درمیان کے فاصلہ کو ان محدودوں کی رقوم میں معلوم کرو۔ محور علی القواثم ہیں۔



فرض کرو کہ نقطہ ن کے محدود (لا، ما) ہیں اور ن کے (لا، ما) - شکل دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ لا، ما دونوں منفی مقداریں ہیں اور منفی علامت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔

ن کا مطلق طول مطلوب ہے سروس کے محدودوں (لا، ما) اور (لا، ما) کی رقوم میں۔

ن ل د محور ما کے متوازی یعنی لا ولا پر عمود وار کھینچو۔
نیز ن ر د محور لا کے متوازی یعنی محور ما پر عمود وار کھینچو۔

تب دل = لا، ل ن = ما اور ر ن = لا، و ر = ما

اب ن ن = ن د + دن جہاں خطوط کے مطلق فاصلے زیر بحث ہیں۔

ن د = ن ر + ر د = لا + لا واضح ہو کہ لا منفی مقدار ہے اسے

مثبت بنانے کے لیے اس کے اقبل منفی علامت رکھنا چاہیے تاکہ مطلق طول حاصل ہو۔

اور دن = دل + ل ن = - لا + لا

پس ن ن = (لا - لا) + (لا - لا) (۱)

یعنی مطلق فاصلہ ن ن = [(لا - لا) + (لا - لا)]

مثال - (۲، -۳) اور (-۳، ۲) کا درمیانی فاصلہ

$$= \sqrt{\{(2-)-3\} + \{(3-)-2-\}} =$$

$$= \sqrt{5+1} = \sqrt{6} = 2.45 \dots$$

واضح ہو کہ صرف ان خطوں کے لیے جو محوروں کے متوازی ہیں مثبت منفی فاصلوں کا دستور قائم کیا گیا ہے لیکن کسی اور سمت کے فاصلوں

کے لیے فی الحال کوئی قرار دیا جا سکتا ہے۔
 نسبت خیال کیا جا سکتا ہے۔

تین ابعاد میں (λ, μ, ν) اور (λ', μ', ν') کے درمیان
 کا فاصلہ $= \sqrt{(\lambda - \lambda')^2 + (\mu - \mu')^2 + (\nu - \nu')^2}$ محور علی القوائم ہیں۔

نیز واضح ہو کہ اگر نقطہ ν محور لا پر ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ $=$ فصل ν ۔ فصل ν
 $= \sqrt{(\lambda - \lambda')^2 + (\mu - \mu')^2}$ اسی طرح اگر یہ محور μ پر ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ $= \mu - \mu'$
 ایک دائرہ کا مرکز (μ, ν) ہے اور نصف قطر μ اس کے محیط پر کے
 نقطوں کے لیے مشترک جبر یہ رشتہ معلوم کرو۔

فرض کرو کہ محیط پر کا کوئی نقطہ (λ, μ) سے تعبیر ہوتا ہے اس نقطہ
 کا مرکز سے فاصلہ نصف قطر کے مساوی ہے
 $\mu = \sqrt{(\lambda - \mu)^2 + (\nu - \nu)^2}$

$$\text{یعنی } (\lambda + \mu)^2 = (\lambda - \mu)^2 + (\nu - \nu)^2$$

یعنی $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 3\mu^2 + \nu^2$ ۔ دائرہ کی مساوات
 یہ رشتہ محیط پر کے کسی نقطہ کے لیے درست ہے۔ اسے دائرہ کی
 مساوات کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ مساوات صرف اس دائرہ کے محیط پر کے
 کسی نقطہ کے محدودوں سے پوری ہوگی کسی اور نقطہ کے محدود اسے پورا نہیں
 کر سکتے۔

اسی طرح دائرہ کی مساوات جس کا مرکز (λ, μ) اور نصف قطر ہے
 یہ ہوگی

$$(\lambda - \lambda')^2 + (\mu - \mu')^2 + (\nu - \nu')^2 = r^2$$

مشق ۲

۱۔ نقاط ذیل کا باہمی فاصلہ دریافت کرو:-


- (۱) (۳'۵) (۲'۶) کے درمیان - جواب - (۱) (۱۳)
- (ب) (۱'۲) اور (۳'۲) کے درمیان - (ب) (۵'۸)
- (ج) (۰'۲) (۳'۲) کے درمیان - (ج) (۳'۶)
- (د) (۱'۱) اور (۵'۱) کے درمیان - (د) (۸'۵)
- (ع) (۰'۱) اور (۰'۲) کے درمیان - (ع) $\sqrt{۱+۲}$
- ۳ - (۱) ثابت کرو کہ (۵'۵) نقاط (۰'۲) اور (۰'۲) سے مساوی فاصلوں پر ہے - نیز ثابت کرو کہ محور ہما پر کے تمام نقطے نقاط (۰'۲) اور (۰'۲) سے مساوی فاصلوں پر واقع ہیں - اس لیے ایسے نقاط کا طریق معلوم کرو جو نقاط (۰'۲) اور (۰'۲) سے مساوی فاصلوں پر ہوں - جواب [۰=۱]
- (ب) اسی طرح ثابت کرو کہ نقطہ (۳'۳) نقاط (۰'۱) اور (۱'۰) سے مساوی فاصلہ پر ہے اور زاویہ $\angle$ و $\angle$ کے منصف پر کے سب نقطے نقاط (۰'۱) (۱'۰) سے مساوی فاصلوں پر ہیں پس ایسے نقاط کا طریق دریافت کرو جو (۰'۱) اور (۱'۰) سے مساوی فاصلوں پر ہوں - جواب - $۰ = ۱ + ۱$
- (ج) ثابت کرو کہ (۸'۴) نقاط (۱'۲) اور (۲'۳) سے مساوی فاصلہ پر واقع ہے - نیز ایسے نقاط کا طریق دریافت کرو جو نقاط (۱'۲) اور (۲'۳) سے مساوی فاصلہ پر ہوں - جواب - $۰ = ۲ + ۱$
- ۴ - (۱) ایک مثلث کے رأس (۱'۴) (۳'۲) (۲'۱) ہیں اس کے اضلاع کے طول دریافت کرو - جواب - $۵'۸$ $۴'۳$ $۶'۳$
- (ب) ثابت کرو کہ چار نقاط (۲'۱) (۵'۳) (۰'۲) (۳'۲) ایک متوازی الاضلاع کے رأس ہیں -
- (ج) ثابت کرو کہ یہ چار نقطے (۰'۱) (۱'۰) (۱'۲) (۲'۱) ایک مستطیل کے رأس ہیں -
- (د) ثابت کرو کہ نقطے (۰'۱) (۳'۱) اور (۱'۰) ایک مساوی الاضلاع مثلث کے سرے ہیں -
- ۴ - (۱) ثابت کرو کہ (۲'۱) ذیل کے نقاط سے مساوی فاصلہ پر واقع

تمام منفی قیمتوں میں سے گزریگی۔ اب خط پر بائیں جانب لا انتہا فاصلہ پر جو نقطہ ہوگا اس کے لیے بھی نسبت $\frac{ان}{ن} = \frac{ل}{ل}$ کی قیمت ۱ ہوگی اور جب نقطہ ن بائیں طرف کے لا انتہا فاصلہ سے ا کے عین بائیں طرف تک سفر کریگا تو یہ نسبت ۱ سے صفر تک کی منفی قیمتیں اختیار کرے گی پس واضح ہے کہ نسبت کی قیمتوں ۰ سے ∞ تک کے لیے اب پر نقطے ہیں ∞ سے ۱ تک کے لیے ب ج پر نقطے ہیں جہاں ج خط پر دائیں جانب لا انتہا پر کا نقطہ ہے اور ۱ سے ۰ تک کے لیے ج ۲ پر نقطے ہیں جہاں ج خط پر بائیں جانب لا انتہا پر کا نقطہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ∞ سے ∞ تک نسبت کی ہر قیمت کے لیے خط پر ایک نقطہ ہے سوائے قیمت ۱ کے لیے جس کے لیے لا انتہا پر کے دو نقطے دائیں اور بائیں جانب ج اور ج ہیں، تسلسل اور یکساں نسبت کو قائم رکھنے کے لیے ریاضی داں یہ فرض کرتے ہیں کہ ج اور ج دونوں ایک ہی نقطہ کو تعبیر کرتے ہیں جہاں پر خط کی لا انتہا بیاں آ کے ملتی ہیں۔ اس کو لا انتہا پر کا نقطہ کہتے ہیں۔ پس $\frac{ل}{ل}$ کی ہر قیمت کے لیے خط پر ایک اور صرف ایک نقطہ ملتا ہے۔

اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک خط کے سروں کے نقطوں کے محدود دیے گئے ہوں تو اس خط کو کسی معلومہ نسبت میں تقسیم کرنے والے نقطہ کے محدود سروں کے محدودوں اور معلومہ نسبت کی رقوم میں کیونکر معلوم ہو سکتے ہیں۔

۵ و ۱۔ ایک خط مستقیم پر کے دو نقاط ن (لا، ن) اور ن (لا، ن) دیے گئے ہیں خط پر کوئی اور نقطہ ن ن کو نسبت کم : کم سے تقسیم کرتا ہے اس نقطہ کے محدود دریافت کرو۔
فرض کرو کہ نقطہ ن خط ن ن کو نسبت کم : کم سے تقسیم کرتا ہے اور ن کے محدود (لا، ن) مطلوب ہیں۔
ان نقاط میں سے خطوط محوروں کے متوازی کھینچو جیسے

شکل میں -



$$\frac{\frac{لا - لا}{لا - لا}}{\frac{ن - ن}{س - ط}} = \frac{\frac{ن - ن}{ن - ن}}{\frac{ک - ک}{ک - ک}}$$

$$\frac{لا - لا}{لا - لا} = \frac{ن - ن}{س - ط} = \frac{ک - ک}{ک - ک}$$

$$\frac{لا - لا}{لا - لا} = \frac{ن - ن}{س - ط} = \frac{ک - ک}{ک - ک}$$

$$\frac{لا - لا}{لا - لا} = \frac{ن - ن}{س - ط} = \frac{ک - ک}{ک - ک}$$

اسی طرح متشابه مثلثوں سے

$$\frac{\frac{س - س}{ن - ط}}{\frac{ن - ن}{ن - ن}} = \frac{\frac{ک - ک}{ک - ک}}{\frac{ک - ک}{ک - ک}}$$


$$\frac{\frac{س - س}{ن - ط}}{\frac{ن - ن}{ن - ن}} = \frac{\frac{ک - ک}{ک - ک}}{\frac{ک - ک}{ک - ک}}$$

$$\frac{\frac{س - س}{ن - ط}}{\frac{ن - ن}{ن - ن}} = \frac{\frac{ک - ک}{ک - ک}}{\frac{ک - ک}{ک - ک}}$$

$$\frac{\frac{س - س}{ن - ط}}{\frac{ن - ن}{ن - ن}} = \frac{\frac{ک - ک}{ک - ک}}{\frac{ک - ک}{ک - ک}}$$

پس $\frac{ک م + م + م}{ک م + ک م} = ۱$
 پس نقطہ ن کے محدود $\left(\frac{ک م + م + م}{ک م + ک م}, \frac{ک م + م + م}{ک م + ک م} \right)$ ہیں۔
 ن کے وسطی نقطہ کے محدود $\left(\frac{ک م + م + م}{۲}, \frac{ک م + م + م}{۲} \right)$ ہیں۔

نسبت $\frac{ک م}{ن م} = \frac{ن م}{ن م}$ کو مختلف قیمتیں سے $+$ ∞ تک دینے سے خط ن پر کے تمام نقطے مل سکتے ہیں۔ بالخصوص جب $ک م = ۰$ تو 'ن' پر منطبق ہوتا ہے اور اس کے محدود ہمیں $(لا، م)$ ملتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے، اور جب 'ن' پر منطبق ہوتا ہے تو $ک م = ۰$ محدود $(لا، م)$ ملتے ہیں۔
 خارجی تقسیم۔ اگر ن کی خارجی تقسیم ن پر نسبت $\frac{ک م}{ن م}$ سے ہوئی ہو جہاں $ک م$ مثبت صحیح عدد ہیں تو ن کے محدود باسانی معلوم ہو سکتے ہیں۔



$\frac{ن م}{ن م} = - \frac{ک م}{ن م}$ واضح ہوگا کہ نقطہ ن خط پر دائیں جانب (د) کی طرف واقع ہوگا

اگر ک، اور بائیں جانب ہر کی طرف اگر ک، > ک، -
خط محوروں کے متوازی ٹھیک جو جیسے شکل میں، متشابه مثلثوں سے

$$\frac{ک - لا}{لا - لا} = \frac{ن س}{ن ط} = \frac{ن ت}{ن ن} = \frac{ک}{ک}$$

پس ک (لا - لا) = ک (لا - لا) یعنی لا (ک - ک) = ک (لا - ک) لا

$$لا = \frac{ک - لا}{ک - ک} = \frac{ک لا - ک لا}{ک - ک} = \frac{ک لا - ک لا}{ک - ک} = لا$$

اسی طرح ک = ک، یعنی ک (ما - ما) = ک (ما - ما)

$$ما (ک - ک) = ک ما - ک ما$$

$$ما = \frac{ک ما - ک ما}{ک - ک}$$

واضح ہو کہ تین ابعاد میں، دو نقطوں ن (لا، ما، ی) اور ن (لا، ما، ی)

کے ملانے والے خط کی جو نقطہ نسبت ک : ک سے تقسیم کرتا ہے اس کے محدود

$$ہونگے \left(\frac{ک لا + ک لا}{ک + ک}, \frac{ک ما + ک ما}{ک + ک}, \frac{ک ی + ک ی}{ک + ک} \right)$$

مثال (۱) ایک نقطہ نقاط (۵، ۳) اور (۴، ۲) کے ملانے والے

خط کو نسبت ۷ : ۵ میں داخل تقسیم کرتا ہے، اس کے محدود دریافت کرو
نسبت کے اعداد نقطوں کے ساتھ بالترتیب متعلق ہیں -

$$\frac{۵۳}{۱۲} = \frac{(۵) ۵ + (۳) \times ۷}{۵ + ۷} = لا$$


$$\frac{۱}{۱۲} = \frac{-(۳) ۵ + (۲) \times ۷}{۵ + ۷} = ما$$

مثال (۲) ایک نقطہ، نقاط (۳، ۶) اور (۲، ۷) کے ملانے والے خط کو خارجاً نسبت ۱ : ۵ سے تقسیم کرتا ہے، اس کے محدود دریافت کرو۔

$$\frac{۳۷}{۳} = \frac{(۷-۶) \times ۱ - ۶ \times ۵}{۱-۵} = ۱۱$$

$$\frac{۱۳}{۳} = \frac{۲ \times ۱ - ۳ \times ۵}{۱-۵} = ۶$$

مثال (۳) ایک مثلث، اور چار سطحی کے رؤسوں کے محدود دیے ہوئے ہیں، ہندسی مرکز کے محدود معلوم کرو۔




مثلث کا مرکز ثقل خط ۱ د پر ہے اور ۱ کی جانب سے ۱ د کو نسبت ۱ : ۲ میں تقسیم کرتا ہے

$$\left(\frac{۱ + ۱}{۲}, \frac{۱ + ۱}{۲} \right)$$

$$\text{ث کے محدود ہیں } \frac{۱ + ۱ + ۱}{۳} \text{ اور } \frac{۱ + ۱ + ۱}{۳} = \frac{۱ \times ۱ + \frac{۱ + ۱}{۲} \times ۲}{۱ + ۲}$$

چار سطحی کے رؤسوں کے محدود

$$(۱، ۱)، (۱، ۱)، (۱، ۱)، (۱، ۱)$$



یاد رکھیے کہ مرکز ثقل ث پر ہے جہاں $\frac{ث ق}{ث ج} = \frac{۳}{۱}$
 ج مثلث ب ج د کا مرکز ثقل ہے اور ق کے محدود ہیں

$$\frac{\text{لا} + \text{لا} + \text{لا}}{۳} ، \frac{\text{لا} + \text{لا} + \text{لا}}{۳} ، \frac{\text{ی} + \text{ی} + \text{ی}}{۳}$$

$$\frac{\text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا}}{۴} = \frac{\text{لا} \times ۱ + \frac{\text{لا} + \text{لا} + \text{لا}}{۳} \times ۳}{۱ + ۳}$$

ث کے محدود ہیں اور $\frac{\text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا}}{۴} ، \frac{\text{ی} + \text{ی} + \text{ی} + \text{ی}}{۴}$ وغیرہ۔

مشق ۳

(۱) نقاط (۵، ۳) اور (۶، ۷) کے ملانے والے خط کو جو نقطہ
 داخل نسبت ۷ : ۵ میں تقسیم کرتا ہے اس کے محدود معلوم کرو۔

جواب $(\frac{۱۶}{۱۳}، \frac{۲۶}{۱۳})$

(۲) اس نقطہ کے محدود معلوم کرو جو (۴، ۳) اور (۵، ۵) کی
 نسبت ۲ : ۷ سے تقسیم کرتا ہے۔

جواب $(\frac{۲۲}{۹}، \frac{۱۱}{۹})$

(۳) نقاط (۴، ۵) اور (۲، ۷) کے ملانے والے خط کو جو نقطہ خارجاً

نسبت ۱ : ۴ سے تقسیم کرتا ہے اس کے محدود دریافت کرو۔

جواب (۶، ۹)

(۴) اُس نقطہ کے محدود دریافت کرو جو نقاط (۳، ۲) اور (۴، ۵) کے ملانے والے خط کو خارجاً نسبت ۲ : ۳ سے تقسیم کرتا ہے۔

جواب (۱۲، ۴)

(۵) معلوم کرو کہ محور لا نقاط (۴، ۳) اور (۵، ۲) کے ملانے والے خط کو کس نسبت سے تقسیم کرتا ہے۔

جواب $\frac{۴}{۵}$


(۶) اُس مثلث کا مرکز ہندسی دریافت کرو جس کے رؤسوں کے محدود (۳، ۵)، (۲، ۴)، (۳، ۵) ہوں۔

جواب $\frac{۲}{۳}$ ، $\frac{۱۶}{۱۳}$

۱۵۶۔ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ جب دو نقطوں کے محدود دیئے گئے ہوں

تو اُن کے ملانے والے خط کا فاصلہ ان محدودوں کی رقوم میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھینگے کہ جب ایک مثلث کے رؤسوں کے محدود دیئے گئے ہوں تو اس کا رقبہ ان محدودوں کی رقوم میں کیونکر معلوم ہو سکتا ہے۔

ایک مثلث ا ب ج کے رؤسوں ا، ب، ج کے محدود بالترتیب (لا، با)، (لا، با)، (لا، با) ہیں اس کا رقبہ دریافت کرو۔



$$\Delta \text{ ا ب ج} = \text{ا ل ن ج} - \text{ا ل م ب} - \text{ب م ن ج}$$

$$\text{منحرف ا ل ن ج} = \Delta \text{ ا ل ن} + \Delta \text{ ا ن ج}$$

$$= \frac{1}{4} (\text{ا} - \text{ل}) (\text{ا} + \text{ن}) + \frac{1}{4} (\text{ا} - \text{ن}) (\text{ا} + \text{ج})$$

$$\frac{1}{4} (\text{ا} + \text{ن}) (\text{ا} - \text{ل}) = \text{اوسط متوازی اضلاع} \times \text{درمیانی عمودی ضلع}$$

$$\text{منحرف ا ل م ب} = \frac{1}{4} (\text{ا} + \text{م}) (\text{ا} - \text{ل})$$

$$\text{منحرف ب م ن ج} = \frac{1}{4} (\text{ب} + \text{ن}) (\text{ا} - \text{ل})$$

$$\text{اس لیے رقبہ } \Delta \text{ ا ب ج} = \frac{1}{4} \{ (\text{ا} + \text{ن}) (\text{ا} - \text{ل}) - (\text{ا} + \text{م}) (\text{ا} - \text{ل}) - (\text{ب} + \text{ن}) (\text{ا} - \text{ل}) \}$$

$$= \frac{1}{4} \{ \text{ا} - \text{ل} - \text{ا} + \text{ن} + \text{ا} - \text{م} - \text{ا} + \text{ن} + \text{ا} - \text{ب} - \text{ا} + \text{ن} \}$$

اس جملہ کو ایک مقطع کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے یہ محض اوپر کے جملہ کو لکھنے کا ایک طریقہ ثبات ہے جو آسانی سے یاد رہ سکتا ہے۔


$$\frac{1}{4} = \begin{vmatrix} \text{ا} & \text{ن} & \text{ل} \\ \text{ا} & \text{م} & \text{ب} \\ \text{ا} & \text{ن} & \text{ج} \end{vmatrix}$$

یاد رہے کہ مثلث ا ب ج کا رقبہ حاصل کرنے میں، مثلث کے راسوں کو مخالف سمت ساعت لیا گیا ہے، یا رقبہ کے گرو جانے میں رقبہ ہمیشہ بائیں ہاتھ کو رہتا ہے۔ جب کبھی راسوں کو اس ترتیب میں لیا جائیگا تو رقبہ مثبت حاصل ہوگا اور راسوں کو مخالف سمت ساعت لینے سے رقبہ منفی حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ } \Delta \text{ د ا ب} = \frac{1}{4} (\text{ا} - \text{ل}) (\text{ا} + \text{ب}) = \frac{1}{4} \begin{vmatrix} \text{ا} & \text{ب} & \text{ل} \\ \text{ا} & \text{د} & \text{ب} \\ \text{ا} & \text{ن} & \text{ج} \end{vmatrix}$$

مثال (۱۱)۔ ایک چار ضلعی (ذو اربعۃ الاضلاع) 'ا' 'ب' 'ج' 'د' کے

محدود مخالف سمت ساعت (لا، ما) (لا، با) (لا، پا) (لا، ما) ہیں اس کا رقبہ دریافت کرو محور قائم ہیں۔



چار ضلعی ا ب ج د = ا ب مل + ا ل ص د - ب م ن ج - ج ن ص د

$$\left\{ \frac{1}{2} (لا + با) (لا - با) + (لا + با) (لا - با) - (لا + با) (لا - با) - (لا + با) (لا - با) \right\} \frac{1}{2} =$$

$$\left\{ \frac{1}{2} (لا + با) (لا - با) + (لا + با) (لا - با) - (لا + با) (لا - با) - (لا + با) (لا - با) \right\} \frac{1}{2} =$$

مشق ۴

(۱) نقاط ذیل کو ملانے سے جو مثلث بنتے ہیں ان کے رقبے دریافت کرو۔

(ا) (۱، ۲) (۳، ۳) (۴، ۱) (۲، ۱)

(ب) (۲، ۱) (۲، ۳) (۳، ۲) (۳، ۱)

(ج) (۲، ۱) (۲، ۲) (۳، ۲) (۲، ۳)

واضح ہو کہ (ج) میں رأسوں کی ترتیب موافق سمت ساعت لی گئی

ہے۔ نقطوں کو (ب) اور (ج) کی صورت میں مرتب کر کے دیکھا جائے۔

(د) (۳، ۲) (۴، ۳) (۲، ۶)

موافق سمت ساعت

(ع) (۴، ۵) (۳، ۴) (۲، ۲)

موافق سمت ساعت

جواب - (۱) ۱۱ (ب) ۱۲ (ج) ۱۳ (د) ۱۴ (ع) ۱۵

(۲) ایک مثلث ا ب ج کے راسوں کے محدود (۴، ۲) (۲، ۳) (۶، ۶) ہیں اور د'ع' ف اضلاع ب ج' ج' ا' ا ب کے وسطی نقطے ہیں۔

ثابت کرو کہ $\triangle ا ب ج = \triangle د ع ف$

(۳) ذیل کی چار ضلعی اشکال کے رقبے دریافت کرو، ان کے راسوں کے محدود حسب ذیل ہیں:—

(۱) (۲، ۱) (۳، ۵) (۴، ۴) (۳، ۳)

(ب) (۳، ۲) (۴، ۲) (۳، ۳) (۲، ۱)

(ج) (۳، ۲) (۲، ۱) (۲، ۳) (۴، ۲)

موافق سمت ساعت

(د) (۳، ۲) (۲، ۳) (۲، ۱) (۴، ۲)


ان نقاط کو مرتب کر کے دیکھا جائے، آڑے نقطوں کو ملانے سے دو مثلث بنتے ہیں، محصلہ رقبہ ان مثلثوں کے رقبوں کا فرق ہے۔

جواب - (۱) $\frac{9}{4}$ (ب) $\frac{25}{4}$ (ج) $\frac{25}{4}$ (د) $\frac{1}{4}$

۱۰۔ قطبی محدود۔ دو ابعاد میں کوئی نقطہ

ہے، جس کا مقام معین کرنا مقصود ہے، کاریگری محدودوں میں ضروری ہے کہ

جس کا مہلداں ابتدائی خط کے ساتھ دیا ہوا زاویہ عم ہے۔
کارٹیزی اور قطبی محدودوں میں تعلق باسانی حاصل ہو سکتا ہے۔



نقطہ ن کے دو نام ہیں کارٹیزی (لا، ما) اور قطبی (ر، ط) نقطہ وہی ہے
اس لیے محدودوں میں تعلق ہونا چاہیے۔ صریحاً

$$(1) \quad \begin{cases} لا = ر جم ط \\ ما = ر جب ط \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} ر = \pm \sqrt{لا^2 + ما^2} \\ ط = س^{-1} \frac{1}{r} \end{cases} \quad \text{جس سے}$$

پس اگر کسی نقطہ کے قطبی محدود معلوم ہوں تو (۱) سے کارٹیزی حاصل ہو سکتے ہیں
اور اگر کارٹیزی معلوم ہوں تو قطبی حاصل ہو سکتے ہیں۔ علامات کا باسانی
فیصلہ ہو سکتا ہے۔

مثال ۱۔ (۱) ایک نقطہ کے قطبی محدود (۲۱ + ۳۱) میں اس کے

کارٹیزی محدود معلوم کرو۔

$$\begin{aligned} لا &= ۲۱ + ۳۱ جم = \frac{1}{r} \times ۲۱ + = \frac{\pi}{۳} \\ ما &= ۲۱ + ۳۱ جب = \frac{1}{r} \times ۳۱ + = \frac{\pi}{۳} \end{aligned}$$

(ب) ایک نقطہ کے کارٹیزی محدود ($\frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4}$) ہیں اس کے قطبی محدود معلوم کرو۔
 $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$ یہ نقطہ چوتھے ربع میں ہے۔

$\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$ رجم طہ
 $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$ رجب طہ
 ثابت لی جائیگی $r = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}$

مس طہ = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$

پس طہ = 120° یا 300°


اب نقطہ چونکہ چوتھے ربع میں ہے اس لیے طہ = $\frac{3\pi}{4}$
 اس چھٹی ٹی کتاب میں قطبی محدودوں کا استعمال مقصود نہیں ہے، ہمیشہ
 کارٹیزی محدود استعمال کیے جائینگے۔ تاہم طالب علم کو محض تعریفات سے
 مانوس کر دینا مناسب خیال کیا گیا۔

۸۔ اکثر مخنیات کی تعیین ان کے ہندسی خواص سے ہوتی ہے

یعنی ان پر کے تمام نقطوں میں ایک مشترک ہندسی تعلق پایا جاتا ہے جس کی بناء پر
 ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ مثلاً خط مستقیم پر کے تمام نقطے ایک ہی سیدھ
 میں ہوتے ہیں۔

اس امر کو جبریہ رقوم میں بیان کرنے سے ہمیں جبریہ رشتہ لگنا جس کو
 خط پر کے تمام نقطے پورا کریں گے۔ مثلاً فرض کرو کہ خط محور و لا سے زاویہ طہ بنانا ہے
 اور نقطہ (ا، ب) میں سے گزرتا ہے اور اس پر نقطے (ا، ا)، (ب، ب)، (گ، گ)، (د، د) واقع ہیں۔ سب
 نقطے ایک سیدھ میں ہیں، اس امر کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ

$$\frac{ن ا}{ع س} = \frac{ن ب}{د س} = \frac{ن گ}{د س} = \frac{ن د}{ع س} = \dots \dots \dots \text{مس طہ}$$



پس محدودوں کی رقم میں $\frac{1-1}{1-1} = \frac{2-2}{2-2} = \frac{3-3}{3-3} = \dots = \frac{4-4}{4-4} = \frac{5-5}{5-5} = \dots$ مس ط
اگر کوئی نقطہ (لا، ما) اس خط پر بطور نمایندہ نقطہ کے لیا جائے۔


تو $\frac{1-1}{1-1} = \frac{2-2}{2-2} = \frac{3-3}{3-3} = \frac{4-4}{4-4} = \frac{5-5}{5-5} = \dots = \frac{ما-ما}{لا-لا} = \dots$ مس ط
یہ سب رشتے ایک ہی ہیں، ان میں سے کوئی ایک

$$ما - ب = مس ط (لا - 1) \dots \dots (1)$$

خط مستقیم کی مساوات ہے، خط مستقیم پر کے تمام نقطوں کے محدود اس مساوات کو پورا کرتے ہیں۔ برعکس اس کے مساوات (1) کے کوئی حل ہیں، یعنی لا، ما کی قیمتوں کے بے شمار جوڑے ہیں جو مساوات (1) سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان سب کو اگر مشتم کیا جائے تو ان سب جوڑوں سے نقطے ملینگے جو اس خط پر واقع ہونگے اور کہیں اور واقع نہیں ہو سکتے۔ خط مستقیم مساوات کا طریق یا لوکس کہلاتا ہے۔

اسی طرح دائرہ کے محیط پر کے سب نقطوں کی مشترک خاصیت یہ ہے کہ

ان نقطوں کا فاصلہ اس کے مرکز سے مستقل ہوتا ہے۔



اگر مبدا مرکز ہو اور نصف قطر ۲
اور محیط پر نقطے (لا، ما)، (لا، لا)، (لا، لا)، (لا، لا)،
ہوں تو اس ہندسی خاصیت کو یوں بیان
کر سکتے ہیں (لا، لا) + (لا، لا) = ۲

$$(لا، لا) + (لا، لا) = ۲$$

اگر ان سب نقطوں کا نمایندہ نقطہ (لا، ما) محیط پر کہیں واقع ہو تو حاصل ہوگا


$$(لا، لا) + (لا، لا) = ۲$$

$$لا + ما = ۲$$

جو دائرہ کی مساوات ہے اس مساوات کے حل کرنے سے (لا، ما) کی قیمتوں کے
بیشمار جوڑے لینے کے مرتسم کرنے سے وہ سب اس دائرہ کے محیط پر واقع ہونگے
پس دائرہ اس مساوات کا طریق ہے۔

اسی طرح دائرہ مرکز (لا، ب) اور نصف قطر حسب ذیل ہوگا جبکہ
(لا، ما) کوئی نمایندہ نقطہ اس کے محیط پر ہو

$$(لا، ب) + (لا، ب) = ۲ \dots (۱)$$




(ب)

پس (۱) دائرہ کی مساوات ہے اور
مساوات (۱) کا طریق دائرہ (ب) ہے
نیز فرض کرو ایک منحنی کی ہندسی
تعریف یہ ہے کہ اس پر کے کسی نقطہ

کے فاصلوں کا مجموعہ دو ثابت نقطوں سے مستقل رہتا ہے اس کی مساوات
مطلوب ہے۔ دو ثابت نقطے فرض کرو ع ص ہیں مبدا و ان کا
نقطہ وسطی لو۔

اس کی ہندسی تعریف $ع ن + ص ن =$ مستقل ہے، فرض کرو کہ



ع کے محدود $(۱، ۰)$ 'ص کے $(۰، ۱)$ اور ن کے $(لا، ۱)$ ہیں، اوپر کے تعلق کو ان محدودوں کی رقوم میں بیان کرنے سے

$$\sqrt{لا^2 + 1} = \sqrt{1 + 1} + \sqrt{لا^2 + 1} \quad \text{مستقل} = \sqrt{لا^2 + 1} \quad \text{ج}^2 \text{ (فرض کرو)}$$

$$\sqrt{لا^2 + 1} - \sqrt{1 + 1} = \sqrt{لا^2 + 1} - \sqrt{1 + 1} \quad \text{ج}^2 = \sqrt{لا^2 + 1} - \sqrt{1 + 1}$$


$$[لا^2 + 1] \text{ ج}^2 = (لا + 1) \text{ ج}^2$$

$$لا^2 (ج^2 - 1) = ج^2 - 1 \quad \text{ج}^2 = ج^2 - 1 \quad \text{ج}^2 = ج^2 - 1$$

$$1 = -\frac{لا^2}{ج^2 - 1} + \frac{لا^2}{ج^2}$$

یہ منحنی کی مساوات ہے، ہم آگے دیکھینگے کہ یہ قطع ناقص ہے جس کا مرکز مبدأ انیم محور اعظم ج اور نیم محور اصغر $\sqrt{ج^2 - 1}$ ہے۔
اسی طرح اطالب علم معلوم کرے کہ اس منحنی کی مساوات کیا ہے جس پر کہ ہر نقطہ کی ہندسی خاصیت یہ ہے کہ دو ثابت نقطوں سے اس کے فاصلوں کا فرق مستقل

$$ص ن - ع ن = \text{مستقل}$$



ہوتا ہے، یعنی

اسی طرح کی اور بے شمار مثالیں پڑھائی جاسکتی ہیں۔
پس ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی منحنی پر کے تمام نقطوں میں ایک مشترک ہندسی قیامت پائی جاتی ہے تو اس پر کے کسی نقطہ (لا، ما) کی رقوم میں ہمیں اس کے متاثر ایک جبریہ مساوات ملتی ہے۔ ہم نے صرف ایسے منحنیات پر غور کیا ہے جو دو ابعاد کی سطح میں واقع ہوتے ہیں، دو ابعاد میں نقطہ کے دو محدود ہونگے (لا، ما) اس لیے دو ابعاد والے منحنی کی مساوات دو محدودوں لا، ما میں حاصل ہوگی۔
ہم نے دیکھا ہے کہ خط مستقیم کی مساوات دو ابعاد (لا، ما) میں درجہ اول کی ہے، دائرہ قطع ناقص، مکافی کی (لا، ما) میں درجہ دوم کی ہے، اسی طرح اعلیٰ درجہ کے منحنیات کے لیے۔ بالعموم دو ابعاد میں کوئی منحنی ہونو اس کی مساوات ف (لا، ما) = ۰ کی شکل کی ہوگی جہاں ف تغا علی علامت ہے۔

مشق ۵

(۱) ایک نقطہ ایسے حرکت کرتا ہے کہ اس کے فاصلے دو نقطوں (۲، ۳) اور (۵، ۲) سے مساوی ہیں، طریق کی مساوات دریافت کرو۔

جواب لا - ما - ۲ = ۰
(۲) ایک نقطہ (ن) اس طرح حرکت کرتا ہے کہ نقطہ (۰، ۲) سے اس کا فاصلہ ہمیشہ دو چند رہتا ہے نقطہ (۲، ۰) سے اس کے فاصلہ کے - ن کا طریق دریافت کرو۔

جواب لا + ما + ۱۰ + ۲ = ۰
(۳) ایک نقطہ کا فاصلہ محور لا سے مساوی رہتا ہے نقطہ (۱، -۱) سے اس کے فاصلہ کے نقطہ کا طریق دریافت کرو۔

جواب لا - ۲ + ۱۱ + ۲ = ۰
(۴) (۱) ایسے نقطہ کے طریق کی مساوات مطلوب ہے محوروں سے جس کے فاصلوں کا مجموعہ ۵ ہے۔ جواب لا + ما = ۵

(ب) نقطہ کا طریق مطلوب ہے جس کا فاصلہ محور صا سے مساوی ہے نقطہ (۱، ۲)

لے جاتے ہیں اور نئے محور د لا ' و ما پُرانے محوروں کے متوازی رہتے ہیں یعنی ان کی سمت وہی رہتی ہے۔ ن کے مدد سے محوروں کے دوسرے (درازا) ہیں ن سے عمود ن مرل نکلاؤ۔

$$\text{لا} = \text{ول} = \text{وط} + \text{وم} = \text{ھ} + \text{لا}$$

$$\text{ما} = \text{لن} = \text{لر} + \text{رن} = \text{ک} + \text{ما}$$

پس پُرانے اور نئے محدودوں میں یہ رشتہ ہوگا $\text{لا} = \text{ھ} + \text{لا}$

$$\text{ما} = \text{ک} + \text{ما}$$

یعنی پُرانے لا کی بجائے مبداء کا فضلہ + نیا لا

اور پُرانے ما کی بجائے مبداء کا معین + نیا ما

رکھنا چاہیے۔

اور اگر پُرانے محوروں کے لحاظ سے کوئی مساوات ف (لا، ما) = دی گئی ہو جس کے طریق پر نقطہ ن (لا، ما) واقع ہوتا ہے تو یہی مساوات نئے محوروں کے لحاظ سے ف (ھ + لا، ک + ما) = ہو جائیگی یعنی نئی مساوات پُرانی مساوات میں لا کی بجائے ھ + لا اور ما کی بجائے ک + ما رکھنے سے ملے گی۔

مثال - دائرہ کی مساوات لا + ما = ا کیا ہو جائیگی جبکہ مبداء کو

(۱-۲) پر لے جائیں۔

$$\text{لا} = \text{ھ} + \text{لا} = \text{لا} + ۱ -$$

$$\text{ما} = \text{ک} + \text{ما} = \text{ما} + ۳ -$$

$$\text{پس لا + ما} = (\text{لا} + ۱ -) + (\text{ما} + ۳ -) = ۱$$


$$\text{یعنی لا}^۲ + \text{ما}^۲ - ۲\text{لا} - ۲\text{ما} + ۶ = ۹ \quad (۱)$$

اگر یہ ذہن میں رہے کہ اب مساوات نئے محوروں کے لحاظ سے ہے اور زبر حذف کر دیے جائیں تو مساوات ہوگی

$$\text{لا}^۲ + \text{ما}^۲ - ۲\text{لا} - ۲\text{ما} + ۶ = ۹ \quad (۲)$$

نئے مبدا (و) کے محمد یحیٰٰ پُرانے مبدا و کے (۱-۳) ہیں اور پُرانے مبدا (و) کے محمد یحیٰٰ پُرانے مبدا (و) کے (۱-۳) ہونگے، اس لیے مساوات کو واپس پُرانے مبدا پر لے جانے کے لیے مساوات (۱) میں لاکھی جگا +۱ لا اور ماکھی بجائے +۳ ماکھنا ہوگا، اس اندراج سے وہی پہلی مساوات لا + ۲ = ۱ حاصل ہوگی۔

(ب) محوروں کی تبدیلی - فرض کرو کہ سیداروی رہتا ہے، مگر محوروں کو زاویہ طہ میں سے گھما دیا جاتا ہے، ایک ہی نقطہ کے محدد ہر دو نظام کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔



دونوں صورتوں میں مبداء و مہمی ہے، پُرانے محور و لا، و ما ہیں اور نئے محور و لا، و ما زاویہ طہ پُرانے محروں کے ساتھ بناتے ہیں۔ کسی نقطہ ن کے محدود پُرانے محروں کے لحاظ سے (لا، ا) ہیں اور نئے محروں کے لحاظ سے (لا، ا، ما)۔

لا = وص = وم = صم = وم = ط = لاجمط = أجبط

ما = ص ن = ص ر + س ر ن = م ر ط + س ر ن = لا ج ب ط + ما ج م ط

اس لیے اگر پُرانے محوروں (یعنی حوالہ کے نظام) کے لحاظ سے کسی منحنی کی مساوات
 ف (لا، ما) = ۰ ہو تو نئے محوروں کے لحاظ سے یہ مساوات بدل کر ہو جائیگی۔
 ف (لا، جم طہ - ما، جب طہ، لا، جب طہ + ما، جم طہ) = ۰
 اگر یہ امر ذہن میں رہے کہ اب نئے محدودوں کی رقوم میں مساوات ہے
 تو زبروں کو حذف کیا جاسکتا ہے یعنی مساوات ہو جائیگی۔

$$نت (لا، جم طہ - ما، جب طہ، لا، جب طہ + ما، جم طہ) = ۰$$

اب فرض کرو کہ کوئی مساوات نئے محدودوں لا، ما کی رقوم میں دی ہوئی
 ہے اور اس کو پُرانے محدودوں کی رقوم میں تبدیل کرنا مقصود ہے تو ضروری ہے
 کہ لا، ما کو لا، ما کی رقوم میں بیان کیا جائے۔ اب واضح ہے کہ پُرانے محور
 نئے محوروں کو 'زاویہ' (-طہ) میں سے کھانے سے حاصل ہوتے ہیں اس لیے

$$لا = لا، جم (-طہ) - ما، جب (-طہ) = لا، جم طہ + ما، جب طہ$$

$$ما = ما، جب (-طہ) + ما، جم (-طہ) = لا، جب طہ + ما، جم طہ$$

اور کوئی مساوات فا (لا، ما) = تبدیل ہو کر فا (لا، جم طہ + ما، جب طہ - لا، جب طہ + ما، جم طہ) =
 ہو جائیگی۔

مثال ۱۔ ایک منحنی کی مساوات لا، ما = ۱ ہے محوروں کو مبدار کے
 گرد (- $\frac{\pi}{4}$) میں سے پھرا دیا گیا ہے، معلوم کرو کہ بدل کر مساوات کیا ہو جاتی ہے۔


$$لا = لا، جم (-\frac{\pi}{4}) - ما، جب (-\frac{\pi}{4}) = \frac{لا + ما}{\sqrt{2}}$$

$$ما = لا، جب (-\frac{\pi}{4}) + ما، جم (-\frac{\pi}{4}) = \frac{لا - ما}{\sqrt{2}}$$

$$لا - ما = ۱ ہو جاتی ہے نئے محدودوں کی رقوم میں $\left(\frac{لا + ما}{\sqrt{2}}\right) - \left(\frac{لا - ما}{\sqrt{2}}\right) = ۱$$$

$$\frac{1}{p} = \frac{m + لا م}{2} = 'ا' یعنی لا م = \frac{1}{p}$$

پس نئے محدودوں کی رقوم میں منحنی کی مساوات ہے $\frac{1}{p} = لا م$ (ج)۔ اگر مبداء کو (م، ک) پر لے جائیں اور محوروں کو زاویہ طہ میں سے گھمادیں تو پُرانے اہ نئے محدودوں میں یہ رشتہ ہوگا۔



$$\begin{aligned} لا &= م + لا = م + لا جم ط - ما جب ط \\ م &= ک + ما = ک + لا جب ط + ما جم ط \\ \text{پُرانی مساوات ف (لا، ما) = ۰ بدل کر ہو جائیگی} \end{aligned}$$

$$\text{ف (م + لا جم ط - ما جب ط، ک + لا جب ط + ما جم ط) = ۰}$$

جس میں نئے محدود استعمال کیے گئے ہیں۔

$$\text{مثال - بتاؤ کہ مساوات } لا^3 + لا^2 م + لا^2 م + لا^2 م + لا^2 م + لا^2 م + لا^2 م + لا^2 م + لا^2 م + لا^2 م = ۰$$

کیا ہو جاتی ہے جبکہ مبداء کو نقطہ (۱ - ۲) پر لے جائیں اور محوروں کو

زاویہ ۵۰° میں سے پھرا دیا جائے۔
پہلے مبدا کو (۱-۲) پر لے جاؤ اور اس میں کے نئے محوروں کو پرانے محوروں کے متوازی رکھو، اس طرح

$$لا + ۱ = ما ، ما + ۲ = -$$

مساوات میں درج کرنے سے

$$۳ (لا + ۱) + ۲ (لا + ۱) + ۳ (ما + ۲) - ۲ (ما + ۱) = ۰$$

$$۰ = ۱۰ + (ما + ۲) ۱۰ +$$

$$۳ لا + ۲ لا + ما - ۱ = ۰$$

اب محوروں کو ۵۰° میں سے پھرانے سے لا کی بجائے $\frac{لا - ما}{۲}$ اور ما کی

بجائے $\frac{لا + ما}{۲}$ رکھنے سے مساوات ہو جاتی ہے

$$۱ = ۳ \left(\frac{لا - ما}{۲} \right) + ۲ \left(\frac{لا - ما}{۲} \right) + ۳ \left(\frac{لا + ما}{۲} \right)$$

$$۱ = ۳ لا + ۲ لا + ما$$

$$۱ = ۳ لا + ۲ ما$$

مشق ۶

(۱)۔ مبدا کو (۱-۲) پر لے جانے سے، جبکہ محوروں کی سمتیں وہی رہیں، بتاؤ کہ مساوات $لا + ما = ۳$ بدل کر کیا ہو جاتی ہے۔

$$جواب لا + ما = ۲ + ۳ + ۱ = ۰$$

(۲) اگر محدودوں کی سمتیں وہی رہیں تو بتاؤ کہ ذیل کی مساواتیں کیا ہو جاتی

ہیں۔

$$(۱) ما = ۳ لا جبکہ مبدا کو (۰-۱) پر لے جائیں۔$$

- (ب) $3\bar{u} + \bar{m} = \bar{a} = 1$ جبکہ مقدار کو $(1 - \bar{a})$ پر لے جائیں۔
 (ج) $2\bar{u} - \bar{a} = \bar{a} = 1$ " " $(1 - \bar{a})$ پر لے جائیں۔
 (د) $2\bar{u} - \bar{a} + \bar{a} = 1$ " " $(1 - \bar{a})$ پر لے جائیں۔
 جواب - (ا) $\bar{a} = \bar{m} (1 - \bar{u})$

" (ب) $3\bar{u} + \bar{m} - \bar{a} = \bar{a} + \bar{m} + \bar{u} = 4$

" (ج) $2\bar{u} - \bar{a} - \bar{a} = \bar{a} - \bar{u} = 2$

" (د) $2\bar{u} - \bar{a} + \bar{a} = 2\bar{m}$

(۳) محدودوں کو ذیل کے زاویوں میں سے گھمانے کے ضابطے لکھو:

(ا) 30° (ب) 225° (ج) 15°

آخری صورت میں نئے محدودوں کو پُرانے محدودوں کی رقوم میں بیان کرو۔

جواب - (ا) $\frac{1}{\bar{p}} = \bar{u} (1 - \bar{a})$

$\frac{1}{\bar{p}} = \bar{a} (1 + \bar{a})$

" (ب) $\bar{u} = \frac{\bar{a} - \bar{u}}{\bar{p}}$

$\bar{u} = \frac{\bar{a} + \bar{u}}{\bar{p}}$

" (ج) $\bar{u} = \frac{\bar{a} - \bar{u}}{\bar{p}}$

$\bar{u} = \frac{\bar{a} + \bar{u}}{\bar{p}}$

اور $\bar{u} = \frac{\bar{a} + \bar{u}}{\bar{p}}$

$\bar{u} = \frac{\bar{a} - \bar{u}}{\bar{p}}$

(۴) بتاؤ کہ ذیل کی مساواتیں کیا ہو جاتی ہیں جبکہ مقدار دہری رہے اور محوروں کو ان

زاویوں میں سے گھما دیا جائے جن کی سوال میں نشان دہی کی گئی ہے۔

(ا) $\bar{a} + \bar{a} = 1$ ' زاویہ 90° میں سے

(ب) $۱۰ لا + ۴۳ لا۳ + ۳۱۳ = ۱$ زاویہ ۳۰ میں سے

(ج) $۱۰ لا + ۳۱ لا۳ + ۱۳۱ = ۱$ زاویہ ۳۰ میں سے

جواب (د) $۱۰ لا + ۱۳۱ = ۱$

(ب) $۱۰ لا + ۱۳۱ = ۱$

(ج) $۱۰ لا - ۱۳۱ = ۱$

(۵) بتاؤ کہ ذیل کی مساوات کیا ہو جاتی ہے جبکہ مبداء کو (۲، ۳) پر لے جائیں اور محوروں کو زاویہ ۳۰ میں سے پھر ادیا جائے

$$۱۰ لا + ۳۱ لا۳ + ۱۳۱ - ۱۰ لا - ۳۰ = ۰$$

جواب $۱۰ لا - ۳۰ = ۰$

(۶) مبداء کو نقطہ (۱، ۱) پر لے جانے سے مساوات

$$۱۰ لا + ۲۱ لا۳ + ۱۳۱ - ۱۰ لا - ۲۱ = ۰$$

کو بدلو اور (۱، ۱) کی قیمتیں معلوم کرو کہ تبدیل شدہ مساوات میں لا اور ا کے سر صفر ہوں۔

نیز اس سے یہ شرط دریافت کرو کہ تبدیل شدہ مساوات میں لا، ا کے سر صفر ہوں اور مستقل رقم بھی صفر ہو۔

$$\text{جواب } لا = \frac{۱۰ - ۲۱}{۱۰ - ۲۱} = ۱, \quad ا = \frac{۱۰ - ۲۱}{۱۰ - ۲۱} = ۱$$

$$۱۰ لا + ۲۱ لا۳ + ۱۳۱ - ۱۰ لا - ۲۱ = ۰$$

(۷) محوروں کو زاویہ ۳۰ میں گھمانے سے مساوات

$$۱۰ لا + ۲۱ لا۳ + ۱۳۱ - ۱۰ لا - ۲۱ = ۰$$

کو بدلو اور زاویہ ۳۰ کی قیمت دریافت کرو کہ تبدیل شدہ مساوات میں لا، ا والی رقم کا سر صفر ہو۔

$$\text{جواب } لا = \frac{۱۰ - ۲۱}{۱۰ - ۲۱} = ۱, \quad ا = \frac{۱۰ - ۲۱}{۱۰ - ۲۱} = ۱$$

دوسرا باب

خطِ مستقیم

۲۰ - سطح مستوی میں خطِ مستقیم کا تعین کئی طرح سے ہو سکتا ہے مثلاً اگر ذیل کے اجزاء دیے گئے ہیں تو خطِ مستقیم کا مل، دو ابعاد کی فضا میں معین ہو جاتا ہے۔

(ا) خط پر کا ایک نقطہ دیا گیا ہے نیز خط ایک ثابت سمت کے ساتھ جو زاویہ بنانا ہے وہ معلوم ہے۔

(ب) خط پر کئی کوئی دو نقطے معلوم ہیں۔

(ج) خط محوروں پر جو مقطوع بنانا ہے وہ معلوم ہیں۔

(د) مبداء سے خط پر جو عمود کھینچ سکتا ہے وہ معلوم ہے یہ عمود

ایک ثابت سمت مثلاً محور لا کے ساتھ جو زاویہ بنانا ہے وہ بھی معلوم ہے۔

(ع) خط کسی ایک محور کے متوازی ہے یا ایک نقطہ میں سے گذرتا

اور ایک دوسرے خط کے متوازی یا اعلیٰ القوام ہے وغیرہ کئی اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔


واضح ہو کہ ہر صورت میں دو شرطیں دی گئی ہیں اور خط کا مقام ان

دو شرطوں کے تابعِ مستوی میں معین ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ خط پر

کے کسی نقطہ (لا، ما) اور ان دی ہوئی شرطوں کے درمیان جبریہ رشتہ

معلوم کریں جو خط مستقیم کی مساوات ہوگی۔

۲۱۱۔ (۱) خط مستقیم کسی ایک محور کے متوازی ہے۔




مثلاً ایسے خط پر جو محور λ سے فاصلہ ۲ پر ہو، کوئی نقطہ $N(۱, ۱)$ ۔ جیسا ہم نے پہلے دیکھا ہے، اس خط پر کے تمام نقطوں کی مشترک خاصیت یہ ہے کہ $۲ = ۱$ خود محور λ کے لیے $۱ = ۰$ اور خط λ کے متوازی یہ ہو سکتے ہیں:

$$۱ = ۰ \text{ یا } ۱ = ۱ = ۲ = ۳ = ۲ \text{ اور بالعموم } ۱ = ۲ = ۳ = ۲$$

پس محور λ کے متوازی کسی خط کی مساوات $۱ = ۲$ یا $۱ = ۳$ ہے۔ اسی طرح محور μ کے متوازی خطوط کی مساوات $۱ = ۲$ ہے اور خود محور μ کی مساوات $۱ = ۰$ ہے۔

(ب) خط ایک دیے ہوئے نقطہ $(۱, ۱)$ میں سے گزرتا ہے اور محور λ کی مثبت سمت کے ساتھ زاویہ ط بنتا ہے۔ محور علی القوائم ہیں۔



خط ۱ ن ہے۔ یہ دونوں طرف غیر محدود ہے، اس پر کا ایک نقطہ ۱ (لا، ۱) دیا ہوا ہے اور زاویہ ۱ ن = ط بھی دیا ہوا ہے جسے مخالف سمت سماعت ناپا گیا ہے۔ اس لا تنہا ہی خط پر کوئی نقطہ کہیں پر ن (لا، ۱) کو مقصود یہ ہے کہ (لا، ۱) اور دی ہوئی چیزوں 'لا، ۱' ط میں جبریہ رشتہ معلوم کیا جائے جو اس خط پر کے کسی نقطہ (لا، ۱) کے لیے پورا ہوگا اور کسی ایسے نقطہ کے لیے پورا نہیں ہوگا جو اس خط پر واقع نہ ہو۔

ہندسی ربط جو خط پر کے نقطوں سے پورا ہوتا ہے (یعنی تمام اس خط پر کے نقطے ایک سیدھ میں واقع ہوتے ہیں) یعنی ایک طرح کا سیدھا پن ان میں پایا جاتا ہے (اُسے اس طرح بیان کرتے ہیں:

$$\frac{۱ ن}{۱ ط} = \frac{مس}{ط}$$

جس کی جبریہ شکل یہ ہے ۱ - ۱ = مس ط (لا - لا) (۱)

$$\frac{۱ - ۱}{جم ط} = \frac{لا - لا}{جم ط} \quad \text{جب } ط$$

$$یا \quad \frac{۱ - ۱}{جم (۹۰ - ط)} = \frac{لا - لا}{جم ط}$$

واضح ہو کہ محور لا کے ساتھ خط کا زاویہ ط ہے اور محور مل کے ساتھ (۹۰ - ط)

اس خط پر کا کوئی نقطہ (لا، ۱) یا تمام نقطے اس رشتہ (۱) کو پورا کرتے ہیں پس یہ خط مستقیم ۱ ن کی مساوات ہے۔

مثال - خط (۲۱ - ۲) میں سے گزرتا اور محور لا کے ساتھ ۹۰ کا زاویہ بناتا،

$$مساوات ہے ۲ - ۱ = مس ۹۰ (۱ + لا) یا ۲ - ۱ = ۳۱ (۱ + لا)$$

یعنی ۳۱ لا - ۱ = ۳۱ + ۲ + ۱ = خط کی مساوات ہے

مساوات ۱ - ۱ = مس ط (لا - لا) کو بالعموم اس طرح لکھتے ہیں


$$۱ - ۱ = ۱ \text{ م (لا - لا) } \dots \dots \dots (۲)$$

جہاں $۱ = ۱$ مس طہ یعنی طہ = مس ام
(ج) اگر خط محور ما کو مبدا سے فاصلہ ب پر کاٹے یعنی نقطہ (لا، ۱)
اس صورت میں (۰، ب) ہو تو خط کی مساوات ہوگی

$$۱ - ۱ = ۱ \text{ م (لا - لا) } \dots \dots \dots (۲)$$

$$۱ - ۱ = ۱ \text{ م (لا - لا) } \dots \dots \dots (۲)$$

$$۱ - ۱ = ۱ \text{ م (لا - لا) } \dots \dots \dots (۲)$$




جہاں $۱ = ۱$ مس ام - خط مستقیم کی اس صورت کو عماسی صورت کہتے ہیں۔ اگر
خط مبدا میں سے گزرے اور محور لا سے زاویہ طہ بنائے تو مساوات ہوگی۔

$$۱ = ۱ \text{ م (لا - لا) } \dots \dots \dots (۲)$$

$$۱ = ۱ \text{ م (لا - لا) } \dots \dots \dots (۲)$$

نوٹ:- ایک خط ن (لا، ۱) میں سے گزرتا اور محور لا سے زاویہ طہ بناتا ہے
اس خط پر کے کسی نقطہ کے محدودوں
سے فاصلہ پر ہو ہونگے۔




$$(۱ + ۱) \text{ م (لا - لا) } \dots \dots \dots (۲)$$

ر کو مختلف مثبت یا منفی قیمتیں دینے سے اس خط پر کے کسی نقطہ کے محدود لکھے جاسکتے ہیں۔
مثال - خط مستقیم $۱۲ - ۱۲ + ۱ = ۰$ کو عماسی شکل میں رکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{r-b}{(r-1)-r} = \frac{r+1}{1-r}$$

گزرتا ہے یہ ہوگی :
 یعنی $4 (r+1) + 3 (r-1) = 5$ یعنی $4r+4+3r-3=5$
 (ر) محوروں پر خط کے نقطوں (ر، ب) معلوم ہیں خط کی مساوات
 مطلوب ہے۔

خط کے نقطوں $1 = 0$ اور $0 = 1$ ب =
 خط پر کہیں کوئی نقطہ ن (لا، لا) ہو۔
 خط دو نقطوں (ر، ب) اور (ب، ر) میں سے گزرتا ہے۔




$$\frac{r-b}{r-b} = \frac{1-l}{1-l}$$

اس لیے
 یعنی $1 = 1 + (1-l) + 1 = 1 + 1 - l$
 ب = لا + لا = 1

اب پر تقسیم کرنے سے $\frac{1}{b} + \frac{1}{a} = 1$ (۶)
مثال - خط جو محوروں پر نقطے - ۳، ۱ بناتا ہے اس کی مساوات ہوگی

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{1} = 1 \text{ یعنی } ۱۳ - ۱۱ = ۳ + ۱ = ۰$$

(س) مبداء سے خط پر کے عمود ما کا طول ع دیا گیا ہے، نیز عمود محور ۱ سے جو زاویہ (ع) (مخالف سمت ساعت) بناتا ہے معلوم ہے خط کی مساوات مطلوب ہے۔ یہ عمودی شکل کھلاتی ہے۔



خط اب ہے جو محوروں سے ۱ اور ۳ بر ملتا ہے لیکن دونوں جانب غیر محدود ہے۔ خط پر عمود و ط = ع اور و ط = ع

خط پر کوئی نقطہ ن (لا، ما) کہیں واقع ہے۔ اب لا، ما، ع ط میں رشتہ مطلوب ہے۔ عین ن مر کھینچو، پھر مر سے و ط پر عمود مر ل اور اب پر عمود مر ع کھینچو۔

$$\text{اب } و ط = و ل + مر = و مرجم و ط + مر ن جب مر ن ع = لاجم ع + ما جب ع$$

$$> \text{مرن} = ۶ = > \text{وب} = ۲ = > \text{اوط} = ۴$$

پس خط کی مساوات ہے لاجم عہ + واجب عہ = عہ (۴)
واضح ہو کہ اس مساوات میں عمود کو ہمیشہ مثبت لیا جائیگا۔

عمودی شکل کی مساوات لاجم عہ + واجب عہ = عہ میں یہ یاد رہے کہ عہ (مبداء سے خط مستقیم پر ڈالے ہوئے عمود کا مطلق طول ہے) اور اسی شکل میں لا اور ما کے سر بالترتیب جم عہ اور جب عہ ہیں جن کے مربعوں کا مجموعہ ایک کے مساوی ہے (جم عہ + جب عہ = ۱)۔

$$\text{مثال - (۱) } \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} \text{ ایسا خط ہے جس پر مبداء سے}$$

عمود ۳ ہے اور یہ عمود محور کا سے ۲۰ زاویہ بناتا ہے۔

$$(۲) \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} \text{ اس مساوات کو عمودی شکل لاجم عہ + واجب عہ = عہ میں رکھ سکتے ہیں۔}$$

چونکہ عہ مثبت ہے اس لیے دی ہوئی مساوات میں بھی بائیں جانب کی مستقل رقم کو مثبت بنانے کے لیے تمام مساوات کی علامت بدل دینی چاہیے۔ پس

$$\text{لاجم عہ} + \text{واجب عہ} = \text{عہ}$$

$$\frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۲} - \frac{۱}{۲}$$

اگر یہ دونوں مساواتیں ایک ہی ہوں یعنی ایک ہی خط کو تعبیر کریں تو

$$\frac{۱}{۱۳۱} = \frac{\text{جم عہ}}{۲} = \frac{\text{جب عہ}}{۳} = \frac{\text{عہ}}{۵} = \frac{\sqrt{\text{لاجم عہ} + \text{واجب عہ}}}{\sqrt{۲(۳-۱) + ۲(۲-۱)}}$$

$$\text{یعنی جم عہ} = \frac{۲}{۱۳۱} \text{ اور جب عہ} = \frac{۳}{۱۳۱} \text{ اور عہ} = \frac{۵}{۱۳۱}$$

پس دی ہوئی مساوات عمودی شکل میں آجائیگی اگر تمام مساوات کو لا کے سروں کے مربعوں کے مجموعہ کے جذر $\sqrt{۲(۳-۱) + ۲(۲-۱)}$ پر تقسیم کر دیا جائے یعنی مساوات کی عمودی شکل ہے $\frac{۱}{۱۳۱} = \frac{۳}{۱۳۱} - \frac{۲}{۱۳۱}$

سادہ سے خط پر نمود $\frac{5}{13}$ ہے اور یہ محور کا سے زاویہ $\text{ج}^1 = \left(-\frac{2}{13} \right)$ بناتا ہے اندر جہدوں سے یہ زاویہ ہے

$$180 - \text{ج}^1 = \frac{2}{13} = 180 - \text{ج}^1 (55) = 180 - 56 \text{ تقریباً}$$

$$123 =$$

۱۲ | ۲ - خط مستقیم کی مساوات کی عام شکل، کارٹیزی محدودوں میں -
اوپر ہم نے خط مستقیم کی مساوات کی مختلف شکلیں حاصل کی ہیں:

$$(۱) \quad \text{ما} = \text{ب} + \text{م} \quad (\text{لا} - \text{لا})$$

$$(۲) \quad \text{ما} = \text{ب} + \text{م} \quad \text{ب} + \text{لا}$$

$$(۳) \quad \frac{\text{لا} - \text{لا}}{\text{لا} - \text{لا}} = \frac{\text{ما} - \text{ما}}{\text{لا} - \text{لا}}$$

$$(۴) \quad 1 = \frac{\text{ما}}{\text{ب}} + \frac{\text{لا}}{\text{لا}}$$

$$(۵) \quad \text{لاجم} = \text{ماجب} = \text{ع} \quad \text{غیرہ}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ خط مستقیم کی یہ سب مساواتیں دو بھول مستداروں
لا، ما میں اگر جہد اول کی مساواتیں ہیں اگر جہد اول کی عام سے عام مساوات
لا، ما میں یہ ہے

$$\text{لا} + \text{بب} + \text{ج} = 0$$

ہم ثابت کریں گے کہ یہ ایک خط مستقیم کو تعبیر کرتی ہے۔ بظاہر اس میں
تین مستقل ہیں کسی ایک مستقل مثلاً ج پر اتقیم کرنے سے صرف دو مستقل
رہ جاتے ہیں $\frac{\text{لا}}{\text{ج}} + \frac{\text{ما}}{\text{ج}} + 1 = 0$ یا جسے اس شکل

$$(۸) \quad \text{لا} + \text{ما} + 1 = 0$$


میں لکھا جاسکتا ہے۔ خط مستقیم کی عام سے عام مساوات میں فی الحقیقت دو غیر تابع متقل میں ان دو کے معلوم ہونے سے خط کا مقام سطح مستوی میں متعین ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اخط مستقیم پر دو شرائط عائد کیے جائیں تو ہندسی طور پر اس کا مقام متعین ہو جاتا ہے، مثلاً خط دو نقطوں میں سے گزرا جاسکتا ہے، مدار سے خط پر کے عمود کا طول دیا گیا ہے۔ نیز عمود کا میدان محور کا کے ساتھ معلوم ہے، وغیرہ یہ سب دو ہندسی شرائط کے مساوی ہیں۔ ہر شرط کے مثال ایک جبریتہ رشتہ یا مساوات حاصل ہوتی ہے، دو شرطوں سے دو مساواتیں حاصل ہونگی جو خط مستقیم میں کے متقل معلوم کرنے کے لیے کافی ہونگی۔

اب ثابت کیا جائیگا کہ لا، ما میں درجہ اول کی عام سے عام مساوات

(j) $\cdot = ج + ب + ا$

خطِ مستقیم کو تعمیر کرتی ہے۔

فرض کرو کہ (ا) جس ہندسی لوکس یا طریق کو بھی تبصیر کرے اُس پر دو نقطے
ن (ا، ا) اور ن (ا، ا) منتخب کر لیے گئے ہیں۔ یعنی کوئی اور تبصیر نقطہ
ن (ا، ا) اسی لوکس پر واقع ہے۔



ن ل ن ل ن ل مستین کھینچو اور ن سے محور لا کے متوازی خط کھینچو

جو 'ن' 'ن' سے 'س' 'س' پر 'ن' 'ن' کے محذور مساوات کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے

$$ل + لا + ب + ما + ج = .$$

$$ل + لا + ب + ما + ج = .$$

$$ل + لا + ب + ما + ج = .$$

$$ل + لا + ب + ما + ج = .$$

$$ل + لا + ب + ما + ج = .$$

$$\frac{ل + لا + ب + ما + ج}{ل + لا + ب + ما + ج} = \frac{ل + لا + ب + ما + ج}{ل + لا + ب + ما + ج}$$

$$\frac{ل + لا + ب + ما + ج}{ل + لا + ب + ما + ج} = \frac{ل + لا + ب + ما + ج}{ل + لا + ب + ما + ج}$$

اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ 'ن' 'ن' کے ملنے والے خط پر واقع

ہو۔ پس 'ن' یا کوئی اور نقطہ جس کے محذور ل + لا + ب + ما + ج = . کو پورا کرتے ہیں (اور ایسے نقطے بے شمار ہیں) ایک خط مستقیم پر واقع ہوتا ہے۔ پس 'لا' 'ما' میں درجہ اول کی عام مساوات ل + لا + ب + ما + ج = . ایک خط مستقیم کو تعبیر کرتی ہے۔

$$۲۵۱۳ - (۱) \text{ خط مستقیم کی عام مساوات } ل + لا + ب + ما + ج = .$$

ہے 'ما' کے سرب پر تقسیم کرنے اور باقی رقیوں کو دوسری طرف لے جانے سے مساوات ہو جاتی ہے

$$ما = ل - \frac{ل}{ب} - \frac{ج}{ب} \quad (۲)$$

ظاہر ہے کہ مساوات کو اگر کسی مستقل سے ضرب دے دیا جائے یا اسے کسی مستقل پر تقسیم کر دیا جائے تو مساوات نہیں بدلتی، یعنی لا، ما میں اس کی اصلیں وہی رہتی ہیں اور چونکہ لا، ما کی قیمتیں مرتسم کرنے سے مساوات کا طریق پیدا ہوتا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ مستقل سے ضرب یا تقسیم کرنے سے مساوات جس ہندی طریق کو تعبیر کرتی ہے وہ وہی رہتا ہے۔ یعنی ہندی طریق میں فرق نہیں آتا۔

مساوات (۱) کی ہم اسی شکل $ما = م لا + ب$ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ظاہر ہے کہ اگر محور علی القیام ہوں تو $م = - \frac{ب}{لا}$ یعنی مساوات $لا + ب + ما = ج = ۰$ کا ہندی طریق محور لا کی مثبت سمت کے ساتھ ایسا زاویہ بناتا ہے جس کا $ما$ $- \frac{ب}{لا}$ ہے۔ نیز یہ لو کہ محور $ما$ کو مبداء سے $- \frac{ب}{ج}$ فاصلہ پر کاٹتا ہے۔

(ب) نیز $لا + ب + ما + ج = ۰$ کو شکل

$$1 = \frac{\frac{ما}{ج}}{\frac{ب}{ج}} + \frac{\frac{لا}{ج}}{\frac{ج}{ج}}$$

میں لکھنے سے ظاہر ہے کہ خط کے مقطعے محوروں لا اور ما پر بالترتیب

$$- \frac{ج}{لا} - \frac{ب}{ج} \text{ ہیں۔}$$

(ج) نیز جس نقطہ پر خط $لا + ب + ما + ج = ۰$ محور لا کو کاٹتا ہے اس نقطہ کے محدودوں کے لیے خط کی اور محور لا دونوں کی مساواتیں ایک ساتھ پوری ہوتی ہیں، یعنی

$$لا + ب + ما + ج = ۰$$

$$= ما$$


کو بطور دو ہمزاد مساواتوں کے حل کرنا چاہیے پس نقطہ تقاطع کے محدود $(- \frac{ج}{لا})$ ہیں، اسی طرح جہاں خط محور $ما$ کو کاٹتا ہے وہاں پر خط اور محور $ما$ کی مساوات

$$لا + ب + ما + ج = ۰$$

$$= لا$$

$لا = ۰$ ، دونوں پوری ہونا چاہئیں، یعنی

ان کو ایک ساتھ حل کرنے سے خط کا نقطہ تقاطع محور ما کے ساتھ حاصل ہوتا ہے $(۰ - \frac{ج}{ب})$ ۔



(د) فرض کرو کہ خط 'ن'، 'لا + ب + ج = ۰' سے تعبیر ہوتا ہے اور محوروں کے متوازی میں کوئی نقطہ 'ق' (لا، با) ہے جو خط کے کسی ایک جانب واقع ہوتا ہے۔ 'ق' میں سے معین کھینچو جو خط سے 'ن' (لا، با) پر اور محور 'لا' سے 'ل' پر ملے۔ واضح ہو کہ 'ن' کا فاصلہ (لا) وہی ہے جو 'ق' کا، لیکن معین مختلف ہے۔

اب اگر نقطہ 'ق' کے محدود (لا، با) کو خط کی مساوات کے دائیں رکن میں مندرج کریں تو حاصل ہوتا ہے $لا + ب + ج =$
 $لا + ب + ج - (لا + ب + ج)$
 کیونکہ (لا، با) خط پر واقع ہونے کے باعث $لا + ب + ج =$
 $ب - با$

اگر ب مثبت ہو تو یہ جملہ مثبت ہوگا اگر $\lambda < \mu$ یعنی نقطہ 'ق' ن کے اوپر ہو اور یہ نتیجہ درست ہے اوپر کی جانب کے تمام نقطوں کے لیے یعنی اگر اوپر کی جانب کے کسی نقطہ کے محدود مساوات کے دائیں رکن $\lambda + \mu + \nu$ یہاں درج کر دیئے جائیں تو تمام صورتوں میں نتیجہ مثبت حاصل ہوگا اور بخلاف اس کے تمام نیچے کے نقطوں کے محدود درج کرنے سے نتیجہ منفی حاصل ہوگا اور خط پر کے تمام نقطوں کے لیے رکن $\lambda + \mu + \nu$ صفر کے مساوی ہوگا۔ اگر مساوات اس طرح $\lambda - \mu - \nu = 0$ لکھی ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ


$$- \lambda - \mu - \nu = 0 \quad - (\lambda - \mu - \nu) = 0$$

ہے اور شکل سے $\lambda - \mu - \nu$ مثبت ہے۔

اسی طرح خط کے نیچے کے نقطوں کے محدود اگر درج کیے جائیں تو $- \lambda - \mu - \nu$ مثبت ہوگا کیونکہ $\lambda - \mu - \nu$ منفی ہے۔

اب خط کی مساوات دونوں طرح سے $\lambda + \mu + \nu = 0$ یا $-\lambda - \mu - \nu = 0$ ۔

لکھی جاسکتی ہے اور $\lambda + \mu + \nu$ میں سے کوئی مثبت منفی ہو سکتے ہیں پس اوپر کے عمل سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ خط مستقیم محوروں کے مستوی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے



اگر ایک جانب کے تمام نقطوں 'ق'، 'ق'، 'ق'... کے محدود اس کے دائیں رکن $\lambda + \mu + \nu$ میں درج کیے جائیں تو ہر ایسے اندراج سے ایک عدد ملے گا اب ایک طرف کے نقطوں کے متعلق اندراج سے جو تمام بے شمار عدد ملیں گے

ان کی ایک ہی علامت ہوگی خواہ مثبت ہو یا منفی اور یہ علامت دوسری جانب کے نقطوں 'ق' 'ق' کے معدوں کے اندراج سے جو عدد لینگے ان کی علامت سے مختلف ہوگی یعنی اگر ایک طرف کے اندراج سے مثبت عدد ملتے ہیں تو دوسری طرف کے اندراج سے منفی عدد لینگے۔ بعض اوقات جس جانب کے اندراج سے مثبت عدد ملیں اُسے مثبت جانب کہتے ہیں اور دوسری جانب کو منفی۔ ظاہر ہوگا خط پر کے تمام نقاط مساوات کو پر کر رہے ہیں اور ایسے ہر نقطہ کے معدوں $a + b + c$ میں درج کرنے سے یہ رکن صفر کے مساوی ہوگا۔

مثال (۱) خط $a + b + c = ۵$ کو (۱) ماسی شکل میں لکھو اور اس کا زاویہ میلان محور a کے ساتھ معلوم کرو (ب) اس کے منقطعے محوروں پر معلوم کرو۔ (ج) بتاؤ کہ یہ خط محور a اور b کو کن نقطوں پر کاٹتا ہے۔ (د) بتاؤ کہ نقطہ (۲۰۱) اس کے کس جانب واقع ہے۔ کیا یہ نقطہ مبداء والی جانب واقع ہے؟

(۱) $a + b + c = ۵$ ماسی شکل $a = \frac{۵}{۲} - \frac{۱}{۲} - \frac{۱}{۲}$ اگر محور a کی مثبت سمت کے ساتھ زاویہ طے کیا جائے

تو مس طہ = $\frac{۲}{۲}$ طہ = مس $a = \left(\frac{۲}{۲}\right) = \text{مس} (۱۶۶۶)$

جددوں سے وہ زاویہ جس کا ماس a ہے ۲۵° ہے اس لیے طہ = $۱۸۰ - ۲۵ = ۱۵۵$

نیز یہ خط محور a کو مبداء سے نیچے فاصلہ $\frac{۵}{۲}$ پر ملتا ہے۔

(ب) خط اس شکل میں لکھا جاسکتا ہے $a = \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} - \frac{۱}{۲}$

محوروں پر منقطعے $\frac{۵}{۲}$ - $\frac{۵}{۲}$ ہیں۔

(ج) جہاں خط محور a سے ملتا ہے وہاں $a + b + c = ۵$ دونوں

مساواتیں ایک ساتھ پوری ہوگی
یعنی $(a = \frac{۵}{۲} - \frac{۱}{۲} - \frac{۱}{۲})$ نقطہ $(\frac{۵}{۲}, \frac{۵}{۲})$ حاصل ہوا۔

جہاں خط محور ما سے ملتا ہے وہ نقطہ ۲+۳+۵ = کو اکٹھا کرنے سے حاصل ہوا نقطہ ہے (۰، ۵)

(د) نقطہ (۲، ۱) کے محدود ۲+۳+۵ میں درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے ۲ (۱) ۲+ (۲) ۳+ ۵ = ۱۲ یعنی نقطہ ثبت جانب واقع ہے 'مبداء' کے محدود (۰، ۰) درج کرنے سے ۵+ حاصل ہوتا ہے 'پس نقطہ مبداء' والی جانب واقع ہے۔

مثال (۲) ثابت کرو کہ نقطے (۱، -۱) اور (۲، ۲) خط ۲-۳-۵ = کی مختلف جانبوں میں واقع ہیں 'خط کو مرسم کرو اور نقطوں کا مقام شکل میں دکھاؤ۔ مثال (۳) خط ۲+۳-۵ = کے مقطوعے محوروں پر دریافت کرو 'خط کو مرسم کرو اور دکھاؤ کہ نقطے (۳، -۵) (۲، ۴) خط کے ایک طرف واقع ہیں (ثبت جانب) اور نقطے (۱، -۲) اور (۲، -۳) خط کے دوسری طرف واقع ہیں (منفی جانب) اور نقطے (۱، ۵) (۲، ۳) (۳، ۵) خط پر واقع ہیں۔ تمام نقطوں کا مقام خط کے لحاظ سے مرسم کرو۔

مثال (۴) ثابت کرو کہ چار نقاط (۲، ۵) (۲، -۲) (۲، -۵) (۲، -۲) ایک ایک کر کے ان چار حصوں میں واقع ہیں جو دو خطوط مستقیم ۲+۳+۵ = اور ۲-۳-۵ = کے درمیان بنتے ہیں۔ خطوں کو مرسم کر کے نقطوں کا محل شکل میں دکھاؤ۔

۱۴ اور ۲- کسی نقطہ ن (۱، ۱) کا عمودی فاصلہ خط مستقیم

لاجم ع + ماجب ع = ع سے یا بالعموم خط ۱+۲+۳ = ج سے دریافت کرو۔ محور علی التوائکم ہیں۔

فرض کرو کہ خط ا ب کی مساوات لاجم ع + ماجب ع = ع ہے اور دیا ہوا نقطہ ن (۱، ۱) ہے۔

ن سے ا ب پر عمود ن ل کھینچا گیا ہے جس کا طول دی ہوئی مقدار ۱ (۱، ۱) اور خط کے دیکھے ہوئے مستقلوں ع اور ع کی رقوم میں حاصل کرنا مقصود ہے۔ واضح ہو کہ مبداء خط کی منفی جانب میں واقع ہے اور نقطہ ن (۱، ۱)

اب یہ خط آب نقطہ ن (لا، لا) میں سے گذرتا ہے اس لیے یہ مساوات (لا، لا) سے پوری ہوتی ہے

(۱) لاجم عہ ۰ = ماجب عہ = ع + د
یعنی عمود ن لی کا غل = د = لاجم عہ + ماجب عہ = ع
خط لاجم عہ + ماجب عہ = ع = ۰

سے نقطہ (لا، لا) کا عمودی فاصلہ صرف نقطہ کے محدود خط میں درج کر دینے سے حاصل ہوتا ہے۔

مثال۔ نقطہ (۱-۲) کا عمودی فاصلہ خط

۱-۳۲ + ۱ = ۶ = ۰ سے حاصل کرو۔

مبدأ اور نقطہ خط کے ایک ہی جانب میں (مثبت جانب) سب سے پہلے خط کو عمودی شکل میں لکھا جائے۔ لا اور ما کے سرور کے مربعوں کے مجموعہ کے جذور + ۱۳۲ = ۱۳۲۔ تمام مساوات کو تقسیم کرنے سے

۱۳۲ - ۱ = ۱۳۲ + ۱ = ۰ لاجم عہ ۱۳۲ + ماجب عہ ۱۳۲ + ۱ = ۰

پس عمود کا طول محض نقطہ کے محدود (۱-۲) خط کی مساوات میں درج کرنے سے ملتا ہے

۲ (۱/۳) - (۱/۳) = ۱۳۲ + ۱ = ۰

اگر (لا، لا) کا عمودی فاصلہ (لا + ب + ج) = ۰ سے مطلوب ہو تو پہلے مساوات کو عمودی شکل لاجم عہ + ماجب عہ = ع = ۰ میں لکھا جائے پھر صرف محدود لا، لا مساوات کے دائیں رکن میں درج کرنے سے عمود کا طول ملے گا۔

لا + ب + ج = ۰ کی عمودی شکل حاصل کرنے کے لیے، کوئی زاویہ عہ ایسا ملتا ہے کہ

لاجم عہ = جب عہ = ۱ / (لا + ب + ج) یعنی جرم عہ = ۱ / (لا + ب + ج) اور جب عہ = ۱ / (لا + ب + ج) پس مطلوب شکل حاصل ہوگی اگر مساوات کو لا + ب + ج پر

تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح حاصل ہوتا ہے

$$0 = \frac{ج}{۱+۱ب} + \frac{ب}{۱+۱ب} + \frac{لا}{۱+۱ب}$$

یعنی لاجم ع + ماجب ع + ع = ۰ جہاں ع = $\frac{ج}{۱+۱ب}$

یعنی مبداء سے خط لا + ب + ج = ۰ پر عمود کا طول ع = $\frac{ج}{۱+۱ب}$ ہے جو مثبت ہوگا اگر ج منفی ہے اور منفی ہوگا اگر ج مثبت ہے۔

پس خط لا + ب + ج = ۰ کی عمودی صورت $\frac{لا + ب + ج}{۱+۱ب} = ۰$ ہے اور (لا، ب) کا عمودی فاصلہ خط لا + ب + ج = ۰ سے محض محدود درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{لا + ب + ج}{۱+۱ب}$$

عمود کی علامت اور سمت - عددی مثال کے ذریعہ توضیح

زیادہ مناسب ہوگی - نقطہ (۱-۲) کا عمودی فاصلہ جو خط لا ۲ - لا ۳ - ع = ۰ کی عمودی صورت میں محدود درج کرنے سے حاصل ہوگا اس کی علامت معلوم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ (۱-۲) خط کے مثبت جانب واقع ہے۔ اس لیے محدود درج کرنے سے

$$\text{عمود کی مثبت علامت حاصل ہوگی یعنی عمود} = \frac{۴ - (۲)۳ - ۱ \times ۲}{۲(۳) + ۲} = \frac{۱}{۱۳}$$

منفی جانب واقع ہے اس لیے نقطہ اور مبداء سے عمود خط کی متقابل جانبوں میں واقع ہونگے۔

خط کی مساوات کو ۱ سے ضرب دے کر اس شکل میں بھی لکھا جاسکتا ہے

$$۲ - لا + ۳ + ع = ۰$$

خط وہی رہا، نقطوں کے مقام وہی ہیں مگر اب مبداء مثبت جانب واقع ہے اور نقطہ کے محدود (۱-۲) خط کے دائیں ہونے میں

بج کر کے دیکھتے ہیں $- (1) 2 + (2) 3 + 4 = 1 -$ یعنی نقطہ منفی جانب واقع ہے۔ پس مختد درج کرنے سے منفی عمود حاصل ہوگا

$$\frac{1-}{13} = \frac{4 + (2) 3 + (1) 2}{2(3) + 2} = \text{عمود}$$

پس (لا' ۱) سے خط ۱ + ۲ + ۳ = ۰ پر کے عمودی فاصلہ کے لیے جو جملہ اندراج سے حاصل ہوتا ہے اس کی علامت مثبت یا منفی دونوں ہو سکتی ہے اور یہ اس امر پر منحصر ہے کہ نقطہ خط کے مثبت یا منفی جانب واقع ہے۔ نیز خط کی شکل کے دائیں رکن میں مبداء اور نقطہ کے مختد لا' ۱ درج کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ نقطہ سے عمود اُسی سمت میں کھینچا گیا ہے جس سمت میں کہ مبداء ہے یا متقابل جانب میں۔

مثال (۱) نقاط (۱-۵) (۲-۳) اور مبداء کے عمودی فاصلے

خط ۱ + ۲ + ۳ = ۰ سے حاصل کرو اور بتاؤ کہ بلحاظ مبداء سے ڈالے ہوئے عمود کے ان نقطوں سے عمود کس سمت میں کھینچے گئے ہیں۔

$$\frac{1-}{5} = \frac{10 + (5) 3 + (1) 2}{3 + 2} = \text{عمود سے (۱-۵)}$$

$$\frac{24}{5} + = \frac{10 + 9 + 8}{5} = \text{ " " (۲-۳)}$$

$$2 + = \frac{10}{5} \text{ مبداء}$$

پس پہلے نقطہ سے متقابل جانب میں اور دوسرے سے مبداء والے عمود کی جانب میں عمود کھینچے گئے ہیں۔

مثال (۲) ثابت کرو کہ مبداء ۱۳ - ۱۰ = ۱۰ - ۱۲ + ۵ - ۲۶ =

اور ۱۲ + ۱۴ - ۵۰ = ۰ سے مساوی فاصلہ پر واقع ہے۔

مثال (۳) نقطہ (لا' ب) کا عمودی فاصلہ خط $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1$ سے

دریافت کرو۔ نیز (ب' ۱) کا فاصلہ خط $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = ۲$ سے

$$\text{جواب } \frac{1}{2} \text{ (ب' ۱)} \div \frac{1}{2} \text{ (ب' ۱)} = ۱$$

مشق ۷

(۱) مبدا میں سے گزرنے والے خطوں کی مساواتیں لکھو جو محور لا کے

ساتھ زاویہ (۱) ۰ (ب) ۳۰ (ج) ۴۵ (د) ۶۰ (ع) ۱۲۰ (ف) ۱۵۰ (گ) ۲۴۰ بنائیں۔ شکل میں ان کے مقام دکھاؤ۔

اگر یہ خط مبدا میں سے گزرنے کی بجائے نقطہ (۲۰) میں سے یا (۱-۰) میں سے یا بالعموم محور صا پر کے کسی نقطہ (ب' ۰) میں گزریں اور اگر سمتیں ان کی وہی ہیں جو اوپر دی گئی ہیں تو ان کی مساواتیں کیا ہونگی۔

جواب - (۱) ۰ = ۱ (ب) ۳۶۰ - ۱ = ۱ (ج) ۱۸۰ - ۱ = ۱ (د) ۱۸۰ - ۱ = ۱

(ع) ۱۸۰ + ۱ = ۱ (ف) ۳۶۰ - ۱ = ۱ (گ) ۱۸۰ - ۱ = ۱ (ط) ۰ = ۱

نقطہ (۲۰) میں سے گزرنے والے خط (۱) ۱ - ۲ = ۱ (ب) ۱ - ۲ = ۱

(ج) ۱۸۰ - ۲ = ۱ (د) ۱۸۰ - ۲ = ۱ (ع) ۱۸۰ - ۲ = ۱ (ف) ۱۸۰ - ۲ = ۱

(گ) ۱۸۰ - ۲ = ۱ (ط) ۱۸۰ - ۲ = ۱

اسی طرح نقطہ (۱-۰) میں سے گزرنے والے خط ہونگے (ب) ۱۸۰ - ۱ = ۱ وغیرہ

بالعموم نقطہ (ب' ۰) میں سے گزرنے والے خط (ب) ۱۸۰ - ۱ = ۱ (د) ۱۸۰ - ۱ = ۱ (ب' ۰) میں سے گزرتا اور محور لا کے ساتھ زاویہ

(۲) (۱) ایک خط نقطہ (۲-۳) میں سے گزرتا اور محور لا کے ساتھ زاویہ

۳۰ ۴۵ ۶۰ بناتا ہے ہر صورت میں خط کی مساوات دریافت کرو۔

(ب) ایک خط نقطہ (۲-۱) میں سے گزرتا اور محور لا کے ساتھ زاویہ

۱۲۰ ۱۵۰ بناتا ہے ہر صورت میں خط کی مساوات دریافت کرو۔

جواب (۱) ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۳۶۰ = ۱۸۰

۱۸۰ - ۱۸۰ = ۰

۱۸۰ - ۱۸۰ - ۳۶۰ = ۱۸۰

جواب (ب) $0 = 1 + 31 \cdot 2 + 6 + 31$

$0 = 2 + 31 + 6 \cdot 31 + 31$

(۳) (۱) ایک خط نقطہ ۲ (-۲، ۱) میں سے گزرتا ہے اور محور لا کے ساتھ ۳۰ کا زاویہ بناتا ہے، خط پر نقطہ ۱ سے فاصلہ ۵ پر جو نقطہ ہے اس کے محدود دریافت کرو۔

(ب) نقطہ ۵ (-۲، ۳) میں سے گزرنے والا خط محور لا کے ساتھ زاویہ ۶۰ بناتا ہے، ۳ سے فاصلہ ۳ پر نقطہ ن لیا گیا ہے اس کے محدود دریافت کرو۔

جواب۔ نقطہ ۱ کے محدود $(\frac{1}{2}, \frac{31 \cdot 5 + 31}{2})$ نقطہ ۲ کے محدود $(\frac{31 \cdot 2 + 1}{2}, \frac{31}{2})$

(۴) ذیل کے نقطوں کے جوڑوں میں سے گزرنے والے خطوں کی مساواتیں دریافت کرو:

(۱) (۲، ۰) (-۱، ۳) (ب) (۱، ۲) (-۳، ۱)

(ج) (۱، ۲) (-۳، ۴)

جواب (۱) ۵ - ۲ + ۶ = ۰ (ب) ۱ - ۶ = ۰ (ج) ۱ - ۶ + ۳ = ۰

(۵) خطوں کی مساواتیں معلوم کرو، محوروں پر مقطوعے جب ذیل دیے گئے ہیں:-

(۱) ۲، ۲ (ب) ۱ + ۵ = ۶

جواب (۱) ۳ - ۵ + ۶ = ۰ (ب) ۴ - ۶ - ۱ = ۰

(۶) خط کی مساوات معلوم کرو، مبدا سے خط پر کے عمود کا طول دیا گیا ہے، نیز عمود محور لا کے ساتھ جو زاویہ طہ بناتا ہے وہ بھی معلوم ہے۔

(۱) عمود = ۳، طہ = ۳۰

(ب) عمود = ۱، طہ = ۱۲۰

جواب (۱) ۳۱ - ۶ + ۲ = ۰ (ب) ۳۱ - ۶ + ۲ = ۰

(۷) (۱) ثابت کرو کہ نقطہ (۰، ۱) (-۲، ۳) خط ۳ - ۵ + ۶ = ۰ کی

مقابل جانبوں میں واقع ہیں۔

(ب) نیز نقطے $(-۳، ۱)$ ، $(۱، ۲)$ خط $۲ - ۱۳ = ۱ + ۰$ کے ایک ہی جانب واقع ہیں۔

(ج) نقطے $(۰، ۱)$ ، $(۲، ۱)$ ، $(۲، ۵)$ ، $(۱، -۱)$ ایک ہی خط مستقیم پر واقع ہیں۔

(۸) جن خطوں کی مساواتیں حسب ذیل ہیں انہیں مرتبہ کر دے ان کے ڈیٹال اور محوروں پر مقطوع معلوم کر دے نیز مبداء سے ان پر جو عمود کھینچ سکتے ہیں ان کے طول دریافت کرو۔

$$(۱) ۱۲ = ۱۳ + ۰ \quad (ب) ۱۲ = ۱۳ + ۰$$

$$(ج) ۱۲ = ۱۳ + ۰ \quad (د) ۱۲ = ۱۳ + ۰$$

$$\text{جواب: ڈیٹال } (۱) ۱ - (ب) \frac{۲}{۳} \quad (ج) \frac{۲}{۳} \quad (د) \frac{۲}{۳}$$

$$\text{مقطوعے } (۱) ۱، (ب) ۳ - ۲، (ج) ۳ - ۲، (د) ۳ - ۲$$

$$\text{مبداء سے عمود } (۱) \frac{۲}{۳}، (ب) \frac{۲}{۳}، (ج) \frac{۲}{۳}، (د) \frac{۲}{۳}$$

(۹) (۱) ایک خط نقاط $(۱، ۳)$ اور $(۳، -۵)$ کے نقطہ تقصیف میں گزرتا ہے اور محور ۵ کا زاویہ بناتا ہے اس کی مساوات معلوم کرو۔
(ب) اس خط کی مساوات معلوم کرو جو $(۱، ۳)$ میں سے گزرتا اور محوروں پر مساوی مقطوعے کاٹتا ہے۔

$$\text{جواب: } (۱) ۱۲ = ۱۳ + ۰ \quad (ب) ۱۲ = ۱۳ + ۰$$

(۱۰) اس خط کی مساوات معلوم کرو جو نقطہ $(۲، ۵)$ میں سے گزرتا ہے اور

$$(۱) \text{ خط } ۲ - ۱۳ = ۱ + ۰ \text{ کے متوازی ہے۔}$$

$$(ب) \text{ خط } ۱۲ = ۱۳ + ۰ \text{ کے متوازی ہے۔}$$

$$(ج) (۱، ۳) \text{ اور } (۲، -۵) \text{ کے ملائے والے خط کے متوازی ہے۔}$$

$$\text{جواب: } (۱) ۱۲ = ۱۳ + ۰$$

$$(ب) ۱۲ = ۱۳ + ۰$$

$$(ج) ۱۲ = ۱۳ + ۰$$

(۱۱) ایک دائرہ کا نصف قطر ۲ ہے، اس کے مرکز میں سے ایک قطر گزرتا ہے جو محور کا کے ساتھ ۴۵° کا زاویہ بناتا ہے، جن نقطوں پر یہ دائرہ سے ملتا ہے وہاں پر دائرہ کے ماس کھینچے گئے ہیں، مرکز میں سے جو قطران ماسوں کے متوازی ہیں اس کی مساوات حاصل کرو۔ نیز ان ماسوں کی مساواتیں لکھو۔
جواب - قطر ۴ = ۲ + ۲ = ۴، ماس ۱۱ = ۴ + ۴ = ۸۔

(۱۲) (۱) ایک مثلث کے نقاط رأس (۰، ۰)، (۳، ۲)، (۲، ۳) ہیں، ان کے اضلاع کی مساواتیں دریافت کرو۔

(ب) ایک مثلث کے نقاط رأس (۲، ۱)، (۳، ۲)، (۴، ۳) ہیں، اس کے اضلاع کی مساواتیں دریافت کرو۔

جواب (۱) اضلاع ۱۱ = ۲ + ۲ = ۴، ۱۲ = ۳ + ۲ = ۵، ۱۳ = ۲ + ۳ = ۵۔

(ب) ۱۱ = ۲ + ۳ = ۵، ۱۲ = ۳ + ۲ = ۵، ۱۳ = ۲ + ۳ = ۵۔

(۱۳) مثلث (۲، ۳)، (۳، ۲)، (۴، ۳) کے اضلاع کی مساواتیں دریافت کرو، نیز اس کے وسطانیوں کی مساواتیں حاصل کرو۔

جواب - اضلاع ۱۱ = ۲ + ۳ = ۵، ۱۲ = ۳ + ۲ = ۵، ۱۳ = ۲ + ۳ = ۵۔

وسطانی - ۱۱ = ۲ + ۳ = ۵، ۱۲ = ۳ + ۲ = ۵، ۱۳ = ۲ + ۳ = ۵۔

(۱۴) (۱) بتاؤ کہ خط ۳ + ۲ = ۵، نقاط (۳، ۳)، (۴، ۳) کے

ملانے والے خط کو کس نسبت سے تقسیم کرتا ہے۔ جواب - نسبت ۱:۱

(ب) بتاؤ کہ نقاط (۲، ۵)، (۳، ۵) اور (۱، ۱) کو ملانے والا خط قطنوں (۳، ۱)

اور (۲، ۳) کے ملانے والے خط کو کس نسبت سے تقسیم کرتا ہے۔

جواب - تقسیم کرتا ہے۔

(۱۵) (۱) نقاط (۳، ۳)، (۴، ۳)، (۵، ۳) سے جو مثلث بنتا ہے اس کے

اضلاع کی مساواتیں دریافت کرو، مبداء سے اضلاع پر جو عمود کھینچ سکتے ہیں ان کے طول دریافت کرو۔ نیز مثلث کے رأسوں سے مقابل کے اضلاع پر جو عمود کھینچے جاسکتے ہیں ان کے طول دریافت کرو۔

جواب - اضلاع ۱۱ = ۲ + ۳ = ۵، ۱۲ = ۳ + ۲ = ۵، ۱۳ = ۲ + ۳ = ۵۔

$$\frac{58 \cdot 19}{58} \quad \frac{53 \cdot 29}{53} \quad \frac{94 \cdot 4}{94}$$

رأسوں سے عمود کیے طول $\frac{55}{94}$ ، $\frac{55}{53}$ ، $\frac{55}{58}$

(۱۶) اُن خطوں کی مساواتیں دریافت کرو جو نقاط (۲) اور (۳) میں سے گزرتے ہیں اور خط $3 + 5 + 11 = 19$ کے متوازی ہیں اور ان کے درمیان عمودی فاصلہ دریافت کرو۔

جواب۔ مساواتیں $3 + 5 + 11 = 19$ ، $5 + 11 + 19 = 35$


عمودی فاصلہ $\frac{19}{12}$

۲۲۔ دو خطوں کے درمیان زاویہ۔

اب تک ایک خط اور اس کی مساوات کے متعلق بحث تھی۔ اب فرض کرو

(۱) دو خطوں کی مساواتیں $3 + 5 + 11 = 19$ اور $5 + 11 + 19 = 35$

ہیں اور ان کا درمیانی زاویہ مطلوب ہے۔



اگر خطوں کے زواہیے محور لا کی مثبت سمت کے ساتھ $\angle$ ، $\angle$ ہوں اور درمیانی

زاویہ فہ ہو

$$\text{مس طہ} = \text{م}^۱ \text{ مس طہ} = \text{م}^۱$$

$$\text{فہ} = \text{طہ} - \text{طہ}$$

$$\text{مس فہ} = \text{مس} (\text{طہ} - \text{طہ})$$

$$\frac{\text{م}^۱ - \text{م}^۱}{\text{م}^۱ + ۱} = \frac{\text{مس طہ} - \text{مس طہ}}{\text{مس طہ} + ۱}$$

پس فہ = مس^۱ $\frac{\text{م}^۱ - \text{م}^۱}{\text{م}^۱ + ۱}$ اور دوسرا درمیانی زاویہ ۳۳ - فہ ہو گا اور

$$\text{مس} (۳۳ - \text{فہ}) = - \text{مس فہ} = - \frac{\text{م}^۱ - \text{م}^۱}{\text{م}^۱ + ۱} = \frac{\text{م}^۱ - \text{م}^۱}{\text{م}^۱ + ۱} \text{ یعنی طہ کی علامت}$$

بدل جائیگی۔

خط باہم متوازی ہونگے اگر م = م اور باہم عمود وار ہونگے اگر م + م = ۱

یعنی م = - م

(ب) اگر خطوں کی مساواتیں ل + لا + ب + ج = ۰

اور ل + لا + ب + ج = ۰

$$\text{ہوں تو مس طہ} = \text{م}^۱ = - \frac{\text{ل}}{\text{ب}} \text{ مس طہ} = \text{م}^۱ = - \frac{\text{ل}}{\text{ب}}$$

$$\text{پس مس فہ} = \frac{\text{م}^۱ - \text{م}^۱}{\text{م}^۱ + ۱} = \frac{- \frac{\text{ل}}{\text{ب}} + \frac{\text{ل}}{\text{ب}}}{\frac{\text{ل}}{\text{ب}} + ۱} = \frac{\text{ل} - \text{ل}}{\text{ل} + \text{ب}}$$

خط متوازی ہونگے اگر ل - ل = ۰ یعنی اگر $\frac{\text{ل}}{\text{ب}} = - \frac{\text{ل}}{\text{ب}}$

اور باہم عمود وار ہونگے اگر ل + ل + ب + ج = ۰

پس خطوں کی مساواتیں یہ ہو سکتی ہیں:

$$۱ + ۵ = ۶$$

$$۱ + \frac{۱}{۵} = ۱\frac{۱}{۵}$$

خط نقطہ (۳، ۲) میں سے گزرتے ہیں، اس لیے

$$۳ = ۲ + (۱) = ۳ \text{ یعنی } ۱ = ۱$$

$$\text{اور } ۳ = ۲ + (۲) = ۴ \text{ یعنی } ۲ = ۲ - ۳ = -۱$$

$$۱ + ۵ = ۶$$

پس خط ہیں

$$\text{اور } ۱ = ۲ + (۱) = ۳ \text{ یعنی } ۱ = ۳ - ۲ = ۱$$

اور یہ ظاہر ہے کہ خط علی التوائم ہیں کیونکہ ڈھالوں کا حاصل ضرب $۵ = (\frac{۱}{۵}) = ۱$ ۔
طالب علم خطوں کو مرتب کر کے جملہ امور کی تصدیق کر لے۔

مثال (۵)۔ ان خطوں کے جوڑوں کے درمیان زاویے دریافت کرو۔

$$(۱) \quad ۱ + ۲ = ۳ \text{ اور } ۱ + ۳ = ۴ \text{ (ب) } ۱ + ۴ = ۵$$

$$۵ + ۱ = ۶ \text{ (ج) } ۲ + ۳ = ۵ \text{ اور } ۲ + ۴ = ۶$$

$$(د) \quad ۱ + ۳ = ۴ \text{ اور } ۲ + ۳ = ۵$$

جواب (۱) ۵۰ (ب) ۹۰ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $\frac{\pi}{2}$ (۵۱۲۵) ۹۰ تقریباً

مثال (۶) خطوں کی مساواتیں معلوم کرو جو (۱، ۱) (۲، ۲) (۳، ۳) (۴، ۴) (۵، ۵)

$$\text{میں سے گزرتے ہیں اور خطوط (۱) } ۱ + ۳ = ۴ \text{ (ب) } ۱ + ۴ = ۵$$

کے متوازی ہیں۔

$$\text{جواب (۱) } ۱ + ۳ = ۴ \text{ (ب) } ۱ + ۴ = ۵ \text{ (ج) } ۱ + ۵ = ۶$$

$$(د) \quad ۱ + ۶ = ۷ \text{ (ه) } ۱ + ۷ = ۸$$

مثال (۷) خط نقاط (۱، ۱) (۲، ۲) (۳، ۳) میں سے گزرتے

اور بالترتیب خطوں (۱) $۱ + ۲ = ۳$ (ب) $۱ + ۳ = ۴$ پر

علی التوائم ہیں ان کی مساواتیں دریافت کرو۔

$$\text{جواب (۱) } ۱ + ۲ = ۳ \text{ (ب) } ۱ + ۳ = ۴ \text{ (ج) } ۱ + ۴ = ۵$$

اگر تین خط ایک ہی نقطہ میں سے گزریں تو یہ کوئی عام خط نہیں ہو سکتے یعنی خطوں کے مستقل 'لا'، 'ب'، 'ج' وغیرہ جن سے خطوں کا محل معین ہوتا ہے ایک دوسرے سے غیر متعلق نہیں ہونگے، ان میں ایک رشتہ ہوگا یعنی ایک شرط ہوگی جسے ہم معلوم کرتے ہیں۔

نقطہ تقاطع تینوں خطوں کی مساواتیں پوری کریگا :

$$\text{لا} + \text{ب} + \text{ما} + \text{ج} =$$

$$\text{لا} + \text{ب} + \text{ما} + \text{ج} =$$

$$\text{لا} + \text{ب} + \text{ما} + \text{ج} =$$

آخری دو مساواتوں سے

$$\text{لا} = \frac{\text{ب} + \text{ج} - \text{ب} + \text{ج}}{\text{ب} - \text{ب}} = \text{ما}$$

یہ 'لا'، 'ما' کی قیمتیں پہلی مساوات کو پورا کرتی ہیں، ان کو درج کرنے سے

$$\text{لا} (\text{ب} + \text{ج} - \text{ب} + \text{ج}) + \text{ب} (\text{ج} - \text{لا} + \text{لا} - \text{ب}) + \text{ج} (\text{لا} - \text{ب} + \text{ب} - \text{ج}) =$$

جو مطلوبہ شرط ہے۔

طالب علم جو مقطعات کے نظریہ سے واقف ہے دیکھے گا کہ اوپر کی تین مساواتیں 'لا'، 'ما' کی ایک ہی قیمتوں کے لیے پوری ہوتی ہیں 'لا'، 'ما' کو ساقط کرنے سے

$$= \left| \begin{array}{cc} \text{لا} & \text{ب} \\ \text{لا} & \text{ج} \\ \text{لا} & \text{ب} \end{array} \right|$$

اس مقطوعہ کو پھیلانے سے اوپر کی شرط حاصل ہوتی ہے۔

طالب علم کئی صورتوں سے واقف ہے جن میں تین خط ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں، مثلاً مثلث کے وسطانیہ تین خط ہیں جو ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں، اسی طرح مثلث کے منصفہ، رؤسوں سے مقابل کے اضلاع پر گرائے ہوئے

عمود وغیرہ سب ایسی مثالیں ہیں جن میں تین خط ایک نقطہ میں سے گزرتے ہیں ہر صورت میں تین خطوں کی مساواتوں میں جو مستقل ہیں وہ اوپر کی شرط کو پورا کرینگے۔

مثال - ایک مثلث کے رأس (۳، ۲) (۳، ۱) (۱، ۳) ہیں اس کے وسطانیوں کی مساواتیں دریافت کرو اور ثابت کرو کہ یہ ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں۔

ایک وسطانیہ نقطہ (۳، ۲) کو نقاط (۱، ۳) اور (۳، ۱) کے وسطی نقطہ (-۱/۳، ۲) کے ساتھ ملاتا ہے اس کی مساوات

$$\frac{3-1}{3+3} = \frac{2-1}{\frac{1}{3}+2} \text{ یعنی } 12-11 = 9-6 = 3$$

اسی طرح باقی دو وسطانیہ ہیں ۱۲+۱۱=۶ اور ۱۱+۱۲=۶ اور ۱۱+۱۲=۶ اگر یہ تینوں ایک نقطہ میں سے گزرتے ہیں تو تینوں مساواتیں

$$\begin{array}{l|l} 12-11=9-6 & 1 \\ 11+12=6 & 1 \\ 11+12=6 & 2 \end{array}$$

ایک ساتھ پوری ہونگی۔ اور ان مساواتوں کے مستقلمات سے اوپر کی شرط پوری ہونا چاہیے۔

$$12(13 \times 9 - 2 \times 6) - (6 \times 1 - 9 \times 11) 5 - (11 \times 2 - 1 \times 13) =$$

$$836 + 265 - 262 = (93 -) 9 - (93) 5 - (31 -) \times 12 = 836 + 836 =$$

یہ شرط پوری ہوتی ہے۔

پہلی دو مساواتوں سے ۱ = ۱/۳ = ۱/۳ تیسری مساوات میں درج کرنے سے

$$0 = 1 + (1 -) 2 + (\frac{1}{3}) 9$$

یعنی تینوں مساواتیں نقطہ (۱، ۱/۳) کے لیے پوری ہوتی ہیں۔

نوٹ - ان مساواتوں کے دائیں رُکنوں کو بالترتیب '۱'، '۲' سے ضرب دینے سے

$$(1+63+9)2 - (11+613+76)1 + (9-65-112)1 \\ 2 - 11 + 9 - 6(8-13+5-) + 9(18-6+12) = \\ 0 = 0 + 6 \times 0 + 9 \times 0 =$$

اور یہ 'لا'، 'ما' کی تمام قیمتوں کے لیے صفر ہو گا۔ ایک نقطہ میں سے گزرنے والے تین خطوں کے رُکنوں کو مناسب مستقل مقداروں سے ضرب دے کر ایک جملہ مرتب کرنا ممکن ہے جو متماثل صفر ہو گا۔

۳۱ و ۲ - (۱) ایسے خط کی مساوات جو دو خطوط کے نقطہ تقاطع میں

سے گزرتا ہے۔

فرض کرو کہ دو معلومہ خط $لا + ب + ما + ج = ۰$ اور $لا + ب + ما + ج = ۰$ ہیں۔

$لا + ب + ما + ج + ل = (لا + ب + ما + ج) = ۰$ جہاں 'ل' کوئی اختیار ہی مستقل ہے۔ ایک خط مستقیم کی مساوات ہے کیونکہ یہ 'لا'، 'ما' میں درجہ اول کی مساوات ہے۔

نیز چونکہ خطوں $لا + ب + ما + ج = ۰$ اور $لا + ب + ما + ج = ۰$ کا نقطہ تقاطع ان دو خطوں کی مساواتوں کو پورا کرتا ہے، اس لیے اس کے محدود مساوات

$$لا + ب + ما + ج + ل = (لا + ب + ما + ج) = ۰ \quad (۱)$$

کو بھی پورا کرتے ہیں، کیونکہ ان نقطوں کے وچ کرنے سے اس مساوات کے رُکن الگ الگ صفر ہوتے ہیں۔ پس (۱) ایسے خط کی مساوات ہے جو دیے ہوئے خطوں کے نقطہ تقاطع میں سے گزرتا ہے۔

اب نقطہ تقاطع میں سے گزرنے والے بے شمار خط ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کو مناسب قیمت دینے سے خط (۱) سے کوئی دوسری شرط پوری کرائی جاسکتی ہے۔

مثال (۱) اس خط کی مساوات معلوم کرو جو $۲ + ۱۵ + ۳ لا = ۰$

اور $۲ لا - ۱۳ + ۲ = ۰$ کے نقطہ تقاطع کو مبداء سے ملاتا ہے۔

$$۰ = (۴ + ۱۳ - ۱۲) ل + ۲ + ۱۵ + ۱۳$$

ایسے کسی خط کی مساوات ہے جو دیے ہوئے خطوں کے نقطہ تقاطع میں سے گزرتا ہے جہاں ل کوئی مستقل ہے۔ اب یہ خط مبدا میں سے گزرتا ہے اس لیے مبدا کے متحدہ (۰، ۰) اس میں درج کرنے سے

$$\frac{۱}{۲} - ۰ = ل + ۲ + ۱۵ + ۱۳$$

$$۰ = (۴ + ۱۳ - ۱۲) \frac{۱}{۲} - ۲ + ۱۵ + ۱۳$$

یعنی واضح ہو کہ پہلے خطوں کے نقطہ تقاطع کے متحدہ معلوم کیے جاسکتے ہیں

اور اس نقطہ کو مبدا سے ملانے والے خط کی مساوات بہ آسانی حاصل ہو سکتی ہے۔

مثلاً نقطہ تقاطع سے $(\frac{۱۳}{۸}, \frac{۱}{۲})$ اور اس نقطہ کو مبدا سے ملانے والے خط کی مساوات

$$۰ = ۱۳ + ۱۴ ل + ۱۳ = \frac{۱۳}{۸} - \frac{۱}{۲}$$

مثال (۳) خطوط $۱۲ - ۱۳ = ۳ + ۱۴$ ، $۰ = ۴ + ۱۲ + ۱۳$ کے

نقطہ تقاطع میں سے ایک خط گزرتا ہے اور یہ (۱) محور کا کے متوازی ہے (ب) محور کا کے متوازی ہے (ج) مبدا میں سے گزرتا ہے۔ ہر صورت میں اس کی مساوات دریافت کرو۔

$$۰ = ۱۲ + ۱۳ (ج) ۰ = ۳ + ۱۲ (ب) ۰ = ۱ - ۱۲ (۱)$$

(۲) گذشتہ دفعہ میں تین خطوں کے ایک ہی نقطہ میں سے گزرنے کے

لیے شرط (۱) دریافت کی گئی تھی جو ایک مقطوعہ کی شکل میں بھی لکھی جاسکتی ہے۔ اب ہم دیکھینگے کہ یہی شرط ایک اور طرح بھی بیان ہو سکتی ہے۔ تین خط

$$ل + ۱۲ + ۱۳ = ۱ - ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ = ۱۲ + ۱۳ + ۱۴$$

ایک ہی نقطہ میں سے گزریں گے اگر ذیل کے جملہ میں 'مستقلات' ل' م' ن کے لیے

ایسی مناسب قیمتیں معلوم ہو سکیں کہ جملہ

ل (۱ لا + ب م + ج) + م (۱ لا + ب م + ج) + ن (۱ لا + ب م + ج) - (ص)
متماثل صفر کے مساوی ہو [یعنی لا، م کی سب قیمتوں کے لیے صفر ہو]
اگر پہلے دو خط لا، م آئیں سے گزریں تو

۱ لا + ب م + ج = ۰ اور ۱ لا + ب م + ج = ۰
اب چونکہ جملہ (ص) لا، م کی سب قیمتوں کے لیے صفر ہوتا ہے اس لیے
یہ لا، م کے لیے بھی صفر ہوگا، اس لیے ۱ لا + ب م + ج = ۰

یعنی لا، م خط ۱ لا + ب م + ج = ۰ پر بھی واقع ہے۔
پس اگر ل، م، ن کی مناسب قیمتیں معلوم ہو سکیں جن کے لیے (ص)
متماثل صفر ہو جائے تو تینوں خط ہم نقطہ ہونگے۔

یہ شرط فی الحقیقت وہی ہے جو پہلے معلوم ہوئی، کیونکہ متماثل صفر
ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا کا سر، م کا سر، اور مستقل رقم صفر ہوں یعنی
۱ ل + ۱ م + ۱ ن = ۰

۱ ل + ۱ م + ۱ ن = ۰


ج ل + ج م + ج ن = ۰

ل، م، ن کو ان تین مساواتوں سے ساقط کرنے سے وہ مقطعہ حاصل ہوتا ہے
جو پہلے لا، یا پہلی دو مساواتوں کو ل، م، ن کے لیے حل کر کے تیسری مساوات
میں درج کریں تو گذشتہ دفعہ کی شرط (۱) حاصل ہوگی۔

مثال - ایک مثلث کے اضلاع ۱، ۲، ۳ + ۱۱ + ۲ = ۰

۵ لا + ۴ م - ۲۲ = ۰، ۲ لا - ۴ م + ۱۵ = ۰، اس کے اضلاع کے
وسطی نقاط سے اضلاع پر عمود کھینچے گئے ہیں، ثابت کرنا کہ یہ تین عمود ایک ہی

نقطہ میں سے گزرتے ہیں -



اضلاع کے تقاطع سے نقاط اُس محل ہوتے ہیں | (۳، ۲) ب (-۱، ۵) ج (۲، ۴)
 ب ج کا وسطی نقطہ ہے $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$
 ب ج کے وسطی نقطے $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ میں سے عمود خط ۳ لا + ۱۱ + ۴ = ۰ پر

$$\frac{\frac{1}{2} + 6}{11} = \frac{\frac{1}{2} - 4}{3} \quad \text{ہے}$$

یعنی ۱۱ - ۱۱ - ۱۳ - ۷ = ۰
 ج ا کے وسطی نقطہ (۳، ۲) میں سے خط ۵ لا + ۴ - ۲۲ = ۰ پر عمود
 $\frac{\frac{1}{2} - 6}{3} = \frac{2 - 4}{5}$ یعنی ۸ - ۱۱ - ۱۰ - ۳۷ = ۰

ا ب کے نقطہ وسطی $(2, \frac{3}{2})$ میں سے خط ۱۲ - ۷ + ۱۷ = ۰ پر عمود
 $\frac{2 - 6}{4} = \frac{\frac{3}{2} + 4}{2}$ یعنی ۱۳ + ۱۲ + ۱۳ = ۰

اب جملہ (ص) ل (۱۱ - ۱۱ - ۱۳ - ۷) + م (۸ - ۱۱ - ۱۰ - ۳۷) + ن (۱۳ + ۱۲ + ۱۳) میں اگر ل، م، ن مستقلات ۱، ۲، ۱ کے متناسب لیے جائیں تو یہ جملہ

لا کی تمام قیمتوں کے لیے صفر ہوتا ہے کیونکہ لا، ما کے سر اور مستقل رقم الگ الگ صفر ہو جاتے ہیں۔ پس یہ تینوں خط یعنی مثلث کے وسطی نقاط سے اشتقاق کے عمود ایک نقطہ میں ملتے ہیں۔

(۳) اس کے لیے شرط یہ آسانی معلوم ہو سکتی ہے کہ تین نقطے (لا، با)، (لا، ما)، (لا، یا) ایک ہی خط پر واقع ہوں۔

فرض کرو کہ یہ تینوں نقطے خط لا + با + ب + ما + ج = پر واقع ہوتے ہیں۔

$$\text{تب} \quad لا + با + ب + ما + ج =$$

$$لا + با + ب + ما + ج =$$

$$لا + با + ب + ما + ج =$$

$$\text{پہلی دو مساواتوں سے} \quad \frac{ج}{لا - لا - لا} = \frac{ب}{لا - لا} = \frac{۱}{لا - لا}$$

تیسری مساوات میں درج کرنے سے

$$لا (لا - لا - لا) + لا (لا - لا) + لا (لا - لا) + لا (لا - لا) =$$

$$\text{یعنی} \quad لا - لا - لا + لا + لا + لا - لا - لا + لا - لا + لا - لا = \dots (ط)$$

یہ شرط ہے کہ تین نقطے ہم خط ہوں۔
اوپر کی تین مساواتوں سے 'ب'، 'ج' ساقط کر کے نتیجہ مقطعہ کی شکل میں

$$\text{لکھا جاسکتا ہے} \quad \begin{vmatrix} لا & با & یا \\ لا & ما & یا \\ لا & ما & یا \end{vmatrix} = 0$$


کہ تین نقطے اگر ہم خط ہیں تو ان سے جو مثلث بنتا ہے اس کا رقبہ صفر ہے۔

۴ و ۲ - دو خطوں کے درمیانی زاویوں کے منصفیوں کی مساواتیں

دریافت کرنا۔

$$(۱) \quad \text{خطوں کی مساواتیں} \quad لا + جم + ما + جب + ج = 0 \quad \text{اور}$$

لاجم عم + ما جب عم - ع = ہیں، ان کے درمیانی زاویوں کے منصفوں کی مساواتیں مطلوب ہیں۔



ا ب اور ج د دیے ہوئے خط ہیں اور ن، ن، ن، ن منصف ہیں۔ اگر ان منصفوں پر کہیں نقطہ (ا، ا) لیا جائے اور اس سے خطوط پر عمود نکالے جائیں تو ان عمودوں کے طویل مساوی ہونگے، عمودوں کے طویل مساوات کی عمودی شکل میں محض محدود دج کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، پس

لاجم عم + ما جب عم - ع = مثبت یا منفی دوسرے خط پر کا عمود

= ± (لاجم عم + ما جب عم - ع)

یہ نقطہ (ا، ا) دونوں منصفوں پر کہیں واقع ہو سکتا ہے، زبر نکال دینے سے منصفوں کی مساواتیں حاصل ہوتی ہیں

لاجم عم + ما جب عم - ع = ± (لاجم عم + ما جب عم - ع) (س)

واضح ہو کہ یہ منصف ایک دوسرے پر علی التوائم ہیں کیونکہ

$$(جم\ عم - جم\ عم) (جم\ عم + جم\ عم) + (جم\ عم - جم\ عم) (جم\ عم + جم\ عم) = 0$$

اب (س) سے جو دو منصف تعبیر ہوتے ہیں ان میں تمیز کرنا چاہیے کہ ان میں سے ایک مساوات کس منصف کو تعبیر کرتی ہے اور دوسری کس کو۔

خط ۱ ب اور ج د مستوی کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک حصہ ج ق ۱ میں مبدا واقع ہے۔ دو منصفوں میں سے ایک ن ن اس حصہ میں سے گزرتا ہے جس میں مبدا واقع ہے۔ اس منصف پر کا نقطہ (لآ، مآ) دونوں خطوں کے اسی جانب واقع ہے جس جانب مبدا ہے۔ اب مبدا سے خطوں پر عمود ہیں ع اور ح جو ان جملوں

$$-(لاجم\ عم + ماجب\ عم - ع) اور -(لاجم\ عم + ماجب\ عم - ع)$$

میں مبدا کے محدود درج کرنے سے ملینگے۔ پس ن ن پر کے نقطہ (لآ، مآ) سے عمود انہی جملوں میں محدود درج کرنے سے حاصل ہونگے۔ پس مبدا والے حصہ میں سے گزرنے والے منصف کی مساوات

$$لاجم\ عم + ماجب\ عم - ع = 0 \quad (لاجم\ عم + ماجب\ عم - ع)$$

اور دوسرے منصف کی مساوات ہے

لاجم\ عم + ماجب\ عم - ع = 0 \quad (لاجم\ عم + ماجب\ عم - ع)
(ب) خطوں کی مساواتیں لآ + ب + ج اور لآ + ب + ج = 0 ہیں، ان کے درمیانی زاویوں کے منصفوں کی مساواتیں مطلوب ہیں۔ (محور علی التوائم)۔
خطوں کو عمودی شکل میں لکھ کر اوپر کے استدلال کے بموجب منصفوں کی

مساواتیں ہیں:

$$(ق) \quad \frac{لا + ب + ۲ + ج}{لا + ب + ۲ + ج} = \pm$$

جس علامت کو لینے سے دونوں جانب متقل رتوں کی علامات وہی ہو جائیں اس کو اختیار کرنے سے وہ منصف حاصل ہوگا جو مبداء والے ربع میں سے گزرتا ہے۔

مثال (۱) $۲ + ۳ + ۴ = ۹$ اور $۵ - ۱۲ + ۱۳ = ۶$ کے درمیانی زاویوں کے منصفوں کی مساواتیں حاصل کرو اور بتاؤ کہ کونسا منصف مبداء والے حصہ میں سے گزرتا ہے۔

$$\frac{۱۳ + ۱۲ - ۵}{۱۳} = \pm \frac{۲ + ۳ + ۴}{۵}$$

$$(۱۳ + ۱۲ - ۵) ۵ = \pm (۲ + ۳ + ۴) ۱۳$$

یا مبداء والے حصہ میں سے گزرنے والا منصف ہے

$$(۱۳ + ۱۲ - ۵) ۵ = (۲ + ۳ + ۴) ۱۳$$

$$۰ = ۳۹ - ۶۹۹ + ۷۲۰$$

$$۰ = (۱۳ + ۱۲ - ۵) ۵ - (۲ + ۳ + ۴) ۱۳$$

$$۰ = ۹۱ + ۱۲۱ - ۷۷۰$$

$$۰ = ۲۰۶۹ - ۲۰۶۹ = (۲۱ -) \times ۹۹ + ۷۷ \times ۲۷$$

یہ دونوں علی التوا ہیں

مشق ۸

(۱) ذیل کی صورتوں میں خطوط مستقیم کی مساواتیں معلوم کرو:-

دو خطوں $۱۲ + ۱۳ - ۱۴ = ۰$ اور $لا + ۱۰ - ۱۱ = ۰$ کے نقطہ تقاطع میں سے خط گزرتا ہے اور (۱) محور لا کے متوازی ہے (ب) محور ما کے متوازی ہے

(ج) مبداء میں سے گزرتا ہے (د) نقطہ (۳) میں سے گزرتا ہے
(ع) خط $۱۱ + ۱۳ + ۱۲ = ۰$ کے متوازی ہے (ف) خط $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$
پر علی التواضع ہے۔

جواب - (۱) $\frac{۵۲}{۲} = ۲۶$ (ب) $\frac{۱۴}{۲} = ۷$ (ج) $\frac{۱۹}{۲} = ۹.۵$

س (د) $۱۱ + ۱۳ + ۱۲ = ۰$ (ع) $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$

(ف) $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$

(۲) تین خطوط $۱۱ + ۱۳ + ۱۲ = ۰$ ، $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$ ، $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$

سے جو مثلث بنتا ہے اس کے (۱) راسوں کے محدود معلوم کردہ (ب) مثلث کے زاویے معلوم کرو (ج) مثلث کے راسوں میں سے مقابل کے اضلاع کے متوازی خطوں کی مساواتیں دریافت کرو۔ (د) مثلث کے راسوں سے مقابل کے اضلاع پر جو عمود کھینچ سکتے ہیں ان کی مساواتیں حاصل کرو۔ اور ثابت کرو کہ وہ ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں (ع) مثلث کے منصفوں کی مساواتیں حاصل کرو اور ثابت کرو کہ وہ ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں۔

جواب - (۱) محدود ہیں (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

(ب) (۱) $\frac{۵۲}{۲} = ۲۶$ (۲) $\frac{۱۴}{۲} = ۷$ (۳) $\frac{۱۹}{۲} = ۹.۵$

(ج) $۱۱ + ۱۳ + ۱۲ = ۰$ ، $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$ ، $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$

(د) راسوں سے عمودوں کی مساواتیں $۱۱ + ۱۳ + ۱۲ = ۰$ ، $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$ ، $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$

$۱۱ + ۱۳ + ۱۲ = ۰$ ، $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$ ، $۱۱ + ۱۴ + ۱۲ = ۰$

(۱۱ + ۱۳ + ۱۲) - (۱۱ + ۱۴ + ۱۲) = (۱۱ + ۱۴ + ۱۲) - (۱۱ + ۱۳ + ۱۲)

(ع) مثلث کے اندر مبداء ہے، مبداء والے حصہ میں سے گزرنے والے

منصف ہیں

$\frac{۱۱+۱۳+۱۲}{۹۵} = \frac{۵+۱۴-۱۲}{۹۵} = \frac{۵+۱۴-۱۲}{۹۵} = \frac{۲۳-۱+۱۵}{۲۶}$

اور $\frac{۲۳-۱+۱۵}{۲۶} = \frac{۱۱+۱۳+۱۲}{۹۵}$ سب کو ایک طرف

اور ان کا نقطہ تقاطع دریافت کرو۔

(جواب) قطروں کی مساواتیں $۱۱۲ - ۱۱۱ + ۱۱۰ = ۱۰۰ - ۱۰۵ + ۱۰۴ = ۱۰۰$

اور ان کا نقطہ تقاطع $(\frac{۱۳}{۲}, \frac{۲۱}{۵})$

۲۵ - لا، م میں متجانس مساوات - ہم جانتے ہیں کہ م - لا =

$۱۱۲ + ۱۰۰ = ۱۱۱ + ۱۰۵$ ، مبداء میں سے گزرنے والے خطوں کی مساواتیں ہیں جس کے ڈھال بالترتیب $\frac{۲}{۱۱}$ ، $\frac{۱}{۱۱}$ ہیں۔ ایسی دو یا زیادہ مساواتوں کے رکنوں کو باہم ضرب دینے سے متجانس مساواتیں پیدا ہوتی ہیں مثلاً

$$(۱۱۲ - لا) (۱۰۰ - م) = (۱۱۱ - لا) (۱۰۵ - م) \quad (۱)$$

$$(۱۱۲ + ۱۰۰) (۱۱۱ - لا) = (۱۱۱ + ۱۰۵) (۱۰۰ - م) \quad (۲)$$

اسی طرح مبداء میں سے گزرنے والے خطوں کی مساواتوں کے رکنوں کو ضرب دینے سے لا، م میں 'ن' ویں درجہ کی متجانس مساوات پیدا ہوگی۔ برعکس اس کے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ لا، م میں دوسرے تیسرے، ن ویں درجہ کی متجانس مساوات بالترتیب مبداء میں سے گزرنے والے دو تین، ن خطوں کو تعبیر کرگی اور ان خطوں کی مساواتیں مساواتوں کے اجزائے ضربی کو الگ الگ صفر کے مساوی رکھنے سے حاصل ہونگی۔ مثلاً دوسرے رتبہ کی مساوات ہے

$$۱۱۲ + ۱۰۰ لا + ۱۱۱ م = ۱۰۰ \quad (۱)$$

$$۱۱۲ + ۱۰۰ لا + ۱۱۱ م = ۱۰۰ \quad (۲)$$

$$۱۱۲ + ۱۰۰ لا + ۱۱۱ م = ۱۰۰ \quad (۳)$$

$$۱۱۲ + ۱۰۰ لا + ۱۱۱ م = ۱۰۰ \quad (۴)$$

جو مبداء میں سے گزرنے والے دو خطوں کی مساواتیں ہیں متجانس مساوات درجہ دوم (۱) کا طریق یہ خطوط مستقیم ہیں یعنی مساوات (۱) کے تمام حل

(لا۱۱ میں) مرتسم ہونے پر ان خطوں پر واقع ہوتے ہیں اور ان خطوں پر کے سب نقطوں کے معدود مساوات (۱) کو پورا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خط حقیقی ہونگے اگر $ھ < ۱ب$ منطبق ہونگے اگر $ھ = ۱ب$ اور خیالی ہونگے اگر $ھ > ۱ب$ ۔

یاد رہے کہ $ھ$ ، لا۱۱ وانی رقم کا سر نہیں ہے بلکہ نصف سر ہے۔
مثال (۱) (۱) مساوات لا۱۱۔ لا۱۱۔ لا۱۱ = ۰۔

یعنی (۱۱ + لا۱۱) (۱۱ - لا۱۱) = ۰۔ دو خطوط مستقیم لا۱۱ + لا۱۱ = ۰ اور لا۱۱ - لا۱۱ = ۰ کو تعبیر کرتی ہے۔ جو حقیقی اور مختلف ہیں۔
(ب) لا۱۱ + لا۱۱ + لا۱۱ = ۰۔

۳ (لا۱۱ + لا۱۱ + لا۱۱) = ۰۔ $\frac{۱}{۲} = \frac{۱ - \sqrt{۱۱} \pm ۲}{۲} = \frac{\sqrt{۱۱} \pm ۲}{۲} = ۱ \pm \frac{\sqrt{۱۱}}{۲}$
پس ۳ (لا۱۱ + لا۱۱ + لا۱۱) = ۰ (۱ - لا۱۱) (۱ + لا۱۱) [۱ - لا۱۱] [۱ + لا۱۱] = ۰
جس سے خطوں کی الگ الگ مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔
(ج) لا۱۱ + لا۱۱ + لا۱۱ = ۰
یا ۱۱ (لا۱۱ + لا۱۱ + لا۱۱) = ۰

$\frac{۱۱ - ۱}{۵} \pm ۱ = \frac{۱۱ - ۱ \pm ۲}{۲} = \frac{۱۲ - ۲}{۲} \pm \frac{۲}{۲} = \frac{۱۰}{۲} = ۵$
پس ۵ (لا۱۱ + لا۱۱ + لا۱۱) = ۰ (۱ - لا۱۱) (۱ + لا۱۱) (۱۱ - لا۱۱) = ۰

خطوں کی الگ الگ مساواتیں حاصل ہوتی ہیں خط خیالی ہیں۔
مثال (۲) ذیل کی مساواتوں کو خطی مساواتوں میں تحلیل کرو:-

(۱) لا۱۱ + لا۱۱ - لا۱۱ = ۰

(ب) لا۱۱ - لا۱۱ + لا۱۱ = ۰

(ج) لا۱۱ - لا۱۱ + لا۱۱ = ۰

جواب (۱) $(۱۲-۱۳)(۵+۱۱) =$

(ب) $۲(۱-۱۱)(۱۱-۱۲) =$

(ج) $۵(۱-۱۱)(۱۱-۱۲) =$

۵۱ و ۲ - مساوات $۱۱ + ۲ = ۱۳$ ب $۱۱ =$ سے جو دو مقدار میں سے گزرنے والے خط تعبیر ہوتے ہیں ان کے درمیان زاویہ دریافت کرو۔ محور علی القوائم ہیں۔

فرض کرو کہ مساوات سے جو خط تعبیر ہوتے ہیں وہ $۱۱ = ۱۱$ ۔ $۱۱ = ۱۱$ ۔ ہیں۔

تب $ب(۱۱ + ۲ = ۱۳) = ب(۱۱ + ۲) =$

جس سے $۱۱ + ۲ = ۱۳$ ، $۱۱ = ۱۱$ ، $۲ = ۲$

$۱۱ - ۲ = ۹$ ، $۱۱ = ۱۱$ ، $۲ = ۲$

اگر خطوں کے درمیان زاویہ نہ ہو تو

مس فہ $= \frac{۱۱ - ۲}{۱۱ + ۲} = \frac{۱۱ - ۲}{۱۱ + ۲}$

مس فہ $= \frac{۱۱ - ۲}{۱۱ + ۲}$ (۱)

دوہری علامت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خطوں کے درمیان زاویہ نہ یا اس کا مکمل لیا جاسکتا ہے۔

خط منطبق ہونگے اگر $۱۱ = ۱۱$ یعنی جملہ $۱۱ + ۲ = ۱۳$ مربع کامل ہو۔

جہاں دو علامتوں کے مائل دو منصف ہیں۔ مشترک مساوات حاصل کرنے کے لیے دووں مساواتوں کو باہم ضرب دینے سے

$$(1 + m_1^2)(1 - m_1^2) - (1 + m_2^2)(1 - m_2^2) = 0$$

جس سے لاء $\{m_1^2 - (1 + m_1^2)\} - \{m_2^2 - (1 + m_2^2)\} = 0$

$$= \{m_1^2 - (1 + m_1^2)\} + \{m_2^2 - (1 + m_2^2)\}$$

$$= (m_1^2 - 1 - m_1^2) + (m_2^2 - 1 - m_2^2) = -2$$

$$\text{یا } (1 - m_1^2) - (1 + m_1^2) = -2 \quad (1) \quad \text{کیونکہ } m_1 - m_2 \neq 0$$

$$\text{اب } 1 + \frac{m_2^2}{b} + \frac{1}{b} = 1 - m_1^2 \quad (2)$$

جس سے $m_1 + m_2 = \frac{m_2^2}{b} - 1 = \frac{1}{b}$ پس یہ قیمتیں درج کرنے سے منصفوں کی مساوات ہو جاتی ہے:

$$(1 - m_1^2) - (1 + m_2^2) = \left(\frac{1}{b} - 1\right) \frac{1}{b}$$

یعنی $(1 - m_1^2) - (1 + m_2^2) = \frac{1}{b} - \frac{1}{b}$ پس منصفوں کی مساوات ہے

$$(1) \quad \dots \dots \dots \frac{1 - m_1^2}{b} = \frac{1 + m_2^2}{b}$$

مثال (۱) خطوط $1 - m_1^2 + m_2^2 = 0$ کے درمیان کے زاویوں کے منصفوں کی مساوات دریافت کرو اور محصلہ مساوات سے ثابت کرو کہ یہ علی القوائم ہیں۔

$$\frac{1 - m_1^2}{1} = \frac{1 + m_2^2}{1} \quad \text{منصفوں کی مساوات ہے}$$

یعنی $لا + ۲ لا ما - ما = ۰$

ظاہر ہے کہ $۱ + ۱ = ۱ - ۱ = ۰$ یعنی منصف علی القوائم نہیں۔
مثال (۲) ذیل کے خطوں کے درمیانی زاویوں کے منصفوں کی مساواتیں لکھو۔
اور دکھاؤ کہ وہ علی القوائم نہیں۔

(۱) $لا + ۲ لا ما - ۵ ما = ۰$

(ب) $لا + لا ما - ۲ ما = ۰$

(ج) $لا + ۵ لا ما + ۷ ما = ۰$

(د) $لا + ۳ لا ما + ۳ ما = ۰$

جواب (۱) $لا + ۲ لا ما - ما = ۰$

(ب) $لا + لا ما - ۱۰ ما = ۰$

(ج) $لا + ۸ لا ما - ۵ ما = ۰$

(د) $لا + لا ما - ۳ ما = ۰$

۶ ۳ - جن نقطوں پر خط ل لا + م ما + ن = ۰، منحنی

$لا + ۲ لا ما + ب ما + گ لا + ۲ ن ما + ج = ۰$ کو کاٹتا ہے

اُن کو مبداء سے ملانے والے خطوں کی مساوات دریافت کرو۔

مبداء میں سے گزرنے والے خطوں کی مساوات متجانس ہوگی اور

نقاط التقاطع نے لیے دونوں مساواتیں ایک ساتھ پوری ہونا چاہئیں اس لیے

خط مستقیم کی مساوات کی مدد سے منحنی کی مساوات کو ہم متجانس بناتے ہیں

$لا + ۲ لا ما + ب ما + (گ لا + ۲ ن ما) - (لا + لا ما + ج) = ۰$
..... (۱)

کیونکہ خط مستقیم کی مساوات سے $لا + لا ما = ۰$

مساوات (۱) 'لا' ما میں دوسرے درجہ کی متجانس مساوات ہے اس لیے

یہ مبداء میں سے گزرنے والے دو خطوں کو تعبیر کرتی ہے۔ نیز اگر خط اوڑھنچی کا

نقطہ تقاطع (لا' ما) ہو تو وہ (ا' ا) کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ الگ الگ خط مستقیم اور منحنی کی مساواتوں کو پورا کرتا ہے۔ پس (ا' ا) مطلوبہ مساوات ہے۔

مثال (۱) خط $۱ + ۱۲ + ۱۲ =$ منحنی $۱ + ۱۲ + ۱۲ = ۱ + ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ =$ سے جن نقاط پر ملتا ہے ان کو مبادا سے ملانے والے خطوط کی مساوات دریافت کرو اور ان خطوط کا درمیانی زاویہ دریافت کرو۔

خط کی مساوات - $(۱۲ + ۱۲) =$ اکی مدد سے منحنی کی مساوات کو متجانس بنانے سے
 $۱ + ۱۲ + ۱۲ - ۱ + ۱۲ + ۱۲ = (۱۲ + ۱۲) + (۱۲ + ۱۲) + (۱۲ + ۱۲) =$

یعنی لا' - لا - لا = ۵' ما = جو مبادا کو نقاط تقاطع سے ملانے والے خط ہیں

ان کا درمیانی زاویہ اگر نہ ہو تو مس نہ $\pm = \frac{۵ + (\frac{۱}{۲})}{۵ - ۱} \pm = \frac{۱۱}{۴} \pm$

$$۱۱۳۵ = \frac{۳۴۵۸۳}{۴} =$$

جس سے نہ = ۴۸۵۴ (تقریباً)۔

مثال (۲) ذیل کے خطوط مستقیم اور منحنیات کے نقاط تقاطع کو مبادا سے ملانے والے خطوط کی مساوات دریافت کرو اور خطوں کے درمیان کا زاویہ دریافت کرو۔

(ا) خط لا + لا = ۲' منحنی $۱ + ۱۲ + ۱۲ =$ منحنی $۱ + ۱۲ + ۱۲ =$

(ب) خط لا + لا = ۱ + ۱۲ + ۱۲ منحنی $۱ + ۱۲ + ۱۲ =$ منحنی $۱ + ۱۲ + ۱۲ =$

(ج) خط لا + لا = ۱ + ۱۲ + ۱۲ منحنی $۱ + ۱۲ + ۱۲ =$ منحنی $۱ + ۱۲ + ۱۲ =$

(د) خط لا + لا = ۵' دائرہ لا' + لا' + لا' + لا' + لا' + لا' = ۱۰

جواب (ا) $۱ + ۱۲ + ۱۲ = (۱ + ۱۲) (۱ + ۱۲) =$

زاویہ مس ۳

(ب) $۱ + ۱۲ + ۱۲ = ۱ + ۱۲ + ۱۲ = (۱ + ۱۲) (۱ + ۱۲) =$

زاویہ مس ۱۳

(ج) $۱ + ۱۲ + ۱۲ = ۱ + ۱۲ + ۱۲ = (۱ + ۱۲) (۱ + ۱۲) =$

خط منطبق۔

گ	ھ	ا
ف	ب	ھ
ج	ف	گ

..... (ب) =

پس، ہم نے یہ ضروری نتیجہ حاصل کیا کہ دو مچھول مقداروں لا، ما میں درجہ دوم کی عام سے عام مساوات دو خطوط مستقیم کو تعبیر کرے گی اگر مساوات کے مستقل سروں 'ا'، 'ب'، 'ج'، 'ف'، 'گ'، 'ھ' میں رشتہ (ب) پایا جائے۔

مثال - ثابت کرو کہ مساوات $۲۷ + ۱۱ لا - ۱۰ ما - ۲۷ - ۱۱ ج = ۲$ دو خطوط مستقیم کو تعبیر کرتی ہے، ان خطوں کی مساواتیں حاصل کرو اور ان کے درمیان زاویہ دریافت کرو۔

قیمتیں درج کرنے سے $ا = ج + ۲$ ، $ف = گ - ۲$ ، $ب = ج - ۲$ ، $ھ = ج - ۲$

$$(۲-)(۱۰-)-(\frac{9}{۲})(۶)-(\frac{11}{۲})(۲-)-(\frac{9}{۲})۲+(۲-)(۱۰-)(۶)=$$

$$-(\frac{11}{۲})(۲-)-$$

$$\frac{۱۲۱}{۲} + ۲۰ + \frac{۲۲۳}{۲} - ۹۹ - ۱۲۰ =$$

$$= ۳۲۰ \frac{۱}{۲} - ۳۲۰ \frac{۱}{۲} =$$

شرط پوری ہوتی ہے۔ یعنی درجہ دوم کی اوپر کی مساوات دو خطوط مستقیم کو تعبیر کرتی ہے۔ درجہ دوم کی رقموں کے اجزائے ضربی (۶۵ + ۷۲) (۶۵ + ۷۲) (۶۵ + ۷۲) ہیں اور آزمائش سے پوری مساوات کے وائیں رکن کے اجزائے ضربی ہیں

$$(۱ + ۶۲ - ۷۳) (۲ - ۶۵ + ۷۲)$$

پس خطوں کی جداگانہ مساواتیں یہ ہیں:

$$اور \quad = ۲ - ۶۵ + ۷۲$$

$$= ۱ + ۶۲ - ۷۳$$

$$\text{ان کے درمیان زاویہ مس فہ} = \frac{\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{2}{3}}{\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{3}\right) + 1} = \frac{19}{2} \text{ فہ} = \text{مس}^{-1} \left(\frac{19}{2}\right)$$

(ب) یہی شرط مساوات بالا کو لایا جائے، بطور مساوات درجہ کے حل کرنے سے یہ آسانی حاصل ہو سکتی ہے بشرطیکہ لا اور ما دونوں کے سر صفر نہ ہوں۔

فرض کرو کہ لا صفر نہیں ہے اور مساوات کو لا کی رقوم میں تزیب دینے سے

$$\text{لا} + 2 \text{ لا} + (\text{ما} + \text{گ}) + \text{ب} + \text{ا} + 2 \text{ ف} + \text{ج} = 0$$

جسے لا میں حل کرنے سے

$$\text{لا} = \frac{-(\text{ما} + \text{گ}) \pm \sqrt{(\text{ما} + \text{گ})^2 - 4(\text{ب} + \text{ا} + 2 \text{ ف} + \text{ج})}}{2}$$

یعنی لا + ما + گ = $\pm \frac{(\text{ما} + \text{گ})}{2} - \frac{(\text{ب} + \text{ا} + 2 \text{ ف} + \text{ج})}{2}$ منطقی اجزائے ضروری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جذر کے اندر کی رقم مربع کامل ہو

یعنی (ما + گ) - (ب + ا + 2 ف + ج) مربع کامل ہو

یعنی ما + (ما - ب) + 2 (ما - گ) + (گ - ا) + ج مربع کامل ہو

جس کے لیے شرط ہے $(\text{ما} - \text{گ}) - (\text{ا} - \text{ف}) - 2(\text{ب} - \text{ج}) = 0$

یعنی $2 \text{ ما} - \text{گ} - \text{ا} + \text{ف} + 2 \text{ ج} + \text{ب} = 0$

یعنی $\text{ا} - \text{ب} + 2 \text{ ج} + 2 \text{ ف} - \text{گ} - \text{ما} = 0$

مثال - ثابت کرو کہ مساوات

$$\text{لا} + 2 \text{ لا} + (\text{ما} + \text{گ}) + \text{ب} + \text{ا} + 2 \text{ ف} + \text{ج} = 0 \quad \text{(ب)}$$

دو خطوط مستقیم کو تغیر کرتی ہے۔ ان خطوں کی جداگانہ مساواتیں حاصل کرو اور ثابت کرو کہ (ب) سے جو خط حاصل ہوتے ہیں وہ ان خطوں کے متوازی ہیں جو صرف درجہ دوم کی رقتوں $۲\lambda^2 - \lambda\mu - \mu^2 = ۰$ کو لینے سے حاصل ہوتے ہیں جو مبداء میں سے گزرنے والے دو خط ہیں۔ پس خطوں کے جڑے (ب) کے درمیان کا زاویہ $۲\lambda^2 - \lambda\mu - \mu^2 = ۰$ کے درمیان کے زاویے کے مساوی ہے۔

مساوات کو λ کے لحاظ سے ترتیب دینے سے

$$۲\lambda^2 - (\lambda - \mu) - \mu^2 = ۰$$

$$\lambda = \frac{(\lambda - \mu) \pm \sqrt{(\lambda - \mu)^2 - 4 \times 2 \times (-\mu^2)}}{2 \times 2}$$

جذر کے اندر کا جملہ ہے $۲\mu^2 - \mu^2 - ۴\mu^2 = ۲۵ - ۴\mu^2$ جو مربع کامل ہے۔ خطوں کی جداگانہ مساواتیں حاصل ہوتی ہیں

$$۰ = (۳ + \mu^2 - \lambda) (۱ + \mu^2 + \lambda)$$

یعنی $۲ + \mu^2 + \lambda = ۰$ اور $۳ + \mu^2 - \lambda = ۰$ جو مبداء میں سے گزرنے والے خطوط $۲ + \mu^2 = ۰$ اور $۳ + \mu^2 = ۰$ کے بالترتیب متوازی ہیں اور $(۲ + \mu^2) (۳ + \mu^2) = (۲ - \lambda) (۳ - \lambda)$ جو مساوات کی درجہ دوم کی رقتیں ہیں۔ پس خطوں کے درمیان زاویہ وہی ہے جو خطوط $۲ - \lambda - \mu^2 = ۰$ کے درمیان ہے اور یہ زاویہ

$$\cos^{-1} \frac{12 + 2(\frac{1}{\mu^2} - \frac{1}{\mu^2})}{\sqrt{\frac{29}{\mu^2}}} = \cos^{-1} \frac{12}{\sqrt{29}}$$

$\cos^{-1} (\frac{12}{\sqrt{29}})$ پس زاویہ $\cos^{-1} \frac{12}{\sqrt{29}}$ ہے یا اس کا مکمل۔

(ج) اسی عمل کو ایک اور طرح بھی دیکھا جاسکتا ہے مبداء بدلنے

کے عمل کی یہ اچھی مثال ہے۔

$$۱\lambda^2 + ۲\lambda + \mu^2 + ۲\mu + ۳ = ۰$$

دو خطوط مستقیم کو تعبیر کرے تو فرض کرو کہ ان کا نقطہ تقاطع (۱، ۱) ہے اگر مبداء کو (۱، ۱) پر لے جائیں اور محوروں کی سمتیں وہی رہیں تو دفعہ ۱۹ سے نم جانے ہیں کہ مساوات کو نئے مبداء اور محوروں کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے لیے ہمیں رکھنا چاہیے

لا = لا + لا (جہاں لا نیا فعل ہے)

اور $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{m+n}$ (" مَ نیا معین ہے)

مساوات میں درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} & \text{ا(} \bar{\text{و}} + \bar{\text{و}}) + \text{ب(} \bar{\text{ا}} + \bar{\text{ا}}) + \text{ج(} \bar{\text{ا}} + \bar{\text{و}}) = \text{ف(} \bar{\text{ا}} + \bar{\text{ا}}) \\ & \quad + \text{گ(} \bar{\text{و}} + \bar{\text{و}}) \end{aligned}$$

یعنی $1\lambda^2 + 2\mu\lambda + \nu$ یا $(\lambda + \mu + \nu)$ یا $2\lambda + (\mu + \nu)$ یا $(\mu + \nu)$ یا ν یا 0

+ ل^۱ + ل^۲ + ل^۳ + ب^۱ + گ^۱ + ف^۱ + ج = ... (ط)

اب چونکہ نقطہ (لا، ما، نا) بیدار ہے اس کے لحاظ سے خطوں کی مساوات
نئے محدوں لا، ما میں درجہ دوم کی متجانس مساوات ہونا چاہیے، پس
لا، ما کے سر اور مستقل رقم سب صفر ہونا چاہئیں، پس

(۱) $\frac{1}{x^2} = x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

م لا + با + ف = . (ب)

اور ل + لا + ہ + لا + ب + گ + لا + ن + ج = . (ج)

آخری مساوات (ج) کو یوں بھی لکھا جاسکتا ہے:

لا (لا + هـ + باء + گ) + با (هـ + لا + ب + باء + ف) + گ (لا + ف + باء + ج) =

جو (ا) اور (ب) کی مدد سے نکھی جاسکتی ہے۔

گ لا + ف با + ج = .

یس (ا) (ب) (ج) سے لا، ساقط کرنے پر مائل ہوتا ہے کہ (ج)

پس (ا)، (ب)، (ج) سے لاہا ساقط کرنے پر حاصل ہوتا ہے کہ

= یعنی پہلے کی طرح شرط حاصل ہوتی ہے۔	ا	ھ	گ
	ھ	ب	ف
	گ	ف	ج

ا ب ج + ۲ ف گ ھ - ا ف ا - ب گ ا - ج ھ ا = (۱۱۱)

اور تحویل شدہ مساوات لمباظ لئے مبدا کے ہوگی ا لا ا + ۲ ھ لا ا + ب ما =
یا اگر یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اب محدود سے ہیں تو اول سے ہی زبریں نکال
دی جاسکتی ہیں۔ پس تحویل شدہ مساوات ہوگی ا لا ا + ۲ ھ لا ا + ب ما =
یعنی اصل مساوات کی درجہ دوم کی رقمیں باقی رہتی ہیں مگر حد دینے میں۔

نیز واضح ہو کہ اگر درجہ دوم کی عام سے عام مساوات دو خطوں کو تعبیر
کرے تو ان کا نقطہ تقاطع مساواتوں (۱) اور (ب) سے ملے گا

$$\text{یعنی } \frac{ا - ھ}{ا - ب} = \frac{ب - گ}{ا - ب} \text{ اور } \frac{گ - ھ}{ا - ب} = \frac{ا - ف}{ا - ب}$$

محدود فاصلے پر ہوگا بشرطیکہ ا ب ھ

مثال - مساوات ۲ لا ا + لا ا - ۶ ما + ۴ لا + ۴ ما + ۵ ھ =

دو خطوط مستقیم کو تعبیر کرتی ہے ان کا نقطہ تقاطع دریافت کرو اور تحویل شدہ مساوات
کی شکل دریافت کرو۔

فرض کرو کہ نقطہ تقاطع (ا، ب) ہے اس کو مبدا لینے اور محوروں
کو متوازی رکھنے سے مساوات میں رکھو

$$لا = لا + لا \text{ (یہ نیا فضلہ ہے زبر حذف کر دیا گیا ہے)}$$

$$\text{اور } ما = ما + ما \text{ (یہ نیا معین ہے)}$$

پس تبدیل شدہ مساوات ہو جاتی ہے:

$$۲(لا + لا) + (لا + لا) - (ما + ما) + ۶(ما + ما) + ۴(لا + لا) + ۴(ما + ما) + ۵ = ۰$$

یعنی $۲ لا + لا۱ - ۶ ما + لا (۴ لا + ما + لا) + ما (لا - ۱۲ ما + لا)$
 $+ لا۲ + لا۱ - ۶ ما + لا۴ + لا۳ + ۵ = ۰$ (ط)
 (لا، ما) مبداء ہے اور خطوں کا نقطہ تقاطع ہے، اس لیے تبدیل شدہ
 مساوات (ط) درجہ دوم کی متجانس مساوات ہونا چاہیے، اس لیے

جس سے $لا = -\frac{۱۳}{۲} ما = \frac{۳}{۲}$ (ص)
 $۴ لا + ما + لا = ۰$
 مستقل رقم اس طرح لکھی جاسکتی ہے:

$$لا (۲ لا + لا۱ + ما + لا) + (ما + لا - ۱۲ ما + لا) (ما + لا + ما + لا) = ۰$$

$$+ \frac{۴}{۲} لا + \frac{۴}{۲} ما + ۵ = ۰$$

یعنی $لا (۴ لا + ما + لا) + ما (لا - ۱۲ ما + لا) + لا۴ + لا۳ + ۵ = ۰$
 اب لا اور ما کے سر (ص) کی رُو سے صفر ہیں اور

$۴ لا + ما + لا = ۱۰ - (۱۳/۲) ما + (۳/۲) ما = ۱۰ - ۱۳ + ۳ = ۰$
 پس تحویل شدہ مساوات $۲ لا + لا۱ - ۶ ما = ۰$ ہے جس میں لا، مانے
 محدود ہیں بلحاظ نقطہ تقاطع کے۔

(د) درجہ دوم کی عام سے عام مساوات

$لا۴ + ۲ لا۳ + لا۲ + ما۳ + ما۲ + لا۲ + ما۲ + ج = ۰$ (ب)
 ہے۔ فرض کرو کہ یہ دو خطوط متقیم کو تعبیر نہیں کرتی، کسی اور کو کس یا طریق کو
 تعبیر کرتی ہے تاہم کسی اختیاری نقطہ (لا، ما) پر ہم مبداء لے جانے سے
 مساوات کو حسب بالا تحویل کرتے ہیں یعنی

$$لا۴ + ۲ لا۳ + ما۳ + لا۲ + لا۲ + ما۲ + ج = ۰$$

جس میں لا، مانے محدود ہیں بلحاظ نقطہ لا، ما کے ان کے ذریعوں کو حذف
 کر دیا گیا ہے۔

نقطہ (لا، با) اب تک اختیاری ہے، اسے ہم ایسا نقطہ لیتے ہیں جو ذیل کی مساواتوں کو پورا کرے

$$\begin{aligned} & \text{لا} + \text{ہ} + \text{با} + \text{گ} = . \\ & \text{ہ} + \text{لا} + \text{ب} + \text{ا} + \text{ف} = . \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (ص)$$

$$\text{جن سے لا} = \frac{\text{ہف} - \text{بگ}}{\text{اب} - \text{ہ}^2} = \text{با} = \frac{\text{گہ} - \text{اف}}{\text{اب} - \text{ہ}^2}$$

اور یہ نقطہ محدود فاصلہ پر ہوگا اگر اب - ہ^۲ صفر کے مساوی نہ ہو یعنی اصلی مساوات میں درجہ دوم کی رقیس مربع کامل نہ بنائیں۔
فرض کرو کہ اب - ہ^۲ = ۰، تو لا، با کی قیمت بالا لینے سے تحویل شدہ مساوات میں لا اور با سر دونوں صفر ہو جائے ہیں۔

اب جیسا ہم نے اوپر دیکھا ہے، منتقل رقم
 $\text{لا} + \text{ا} + \text{ہ} + \text{با} + \text{ب} + \text{با} + \text{گ} + \text{ا} + \text{ف} + \text{با} + \text{ج}$
 اس طرح لکھی جاسکتی ہے

$$\begin{aligned} & \text{لا} (\text{لا} + \text{ہ} + \text{با} + \text{گ}) + \text{با} (\text{ہ} + \text{لا} + \text{ب} + \text{ا} + \text{ف}) + \text{گ} (\text{ا} + \text{ف} + \text{با} + \text{ج}) \\ & = \text{گ} (\text{ا} + \text{ف} + \text{با} + \text{ج}) \text{ کیونکہ پہلی دو رقیس (ص) کی رو سے صفر ہو جاتی ہیں} \\ & = \text{گ} \left(\frac{\text{ہف} - \text{بگ}}{\text{اب} - \text{ہ}^2} \right) + \text{ف} \left(\frac{\text{گہ} - \text{اف}}{\text{اب} - \text{ہ}^2} \right) + \text{ج} \\ & = \frac{\text{ابج} + \text{ج} + \text{افگ} - \text{ہ} - \text{اف} - \text{بگ} - \text{جہ}^2}{\text{اب} - \text{ہ}^2} \end{aligned}$$

پس تحویل شدہ مساوات کی حسب ذیل شکل حاصل ہوتی ہے:

$$\text{لا} + \text{ا} + \text{ہ} + \text{با} + \text{ب} + \text{ا} + \text{ف} + \text{با} + \text{گ} + \text{ا} + \text{ف} + \text{با} + \text{ج} = \frac{\text{ابج} + \text{ج} + \text{افگ} - \text{ہ} - \text{اف} - \text{بگ} - \text{جہ}^2}{\text{اب} - \text{ہ}^2} \quad \dots\dots\dots (ع)$$

پس ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ دوم کی عام سے عام مساوات کو مبادر بدل کر

ایسی مساوات میں تحویل کر سکتے ہیں جس میں لا، ما کے سر صفر ہوں اور تحویل شدہ مساوات کی شکل (ع) ہو - واضح ہو کہ اس میں درجہ دوم کی تین اسی شکل کی ہیں جو اصلی مساوات میں صرف (ع) میں محدود نہ تھیں - اگر درجہ دوم کی عام مساوات دو خطوط مستقیم کو تعبیر کرے اور نیا مبدأ نقطہ تقاطع ہو تو مساوات کی شکل متجانس ہونی چاہیے - یعنی (ع) سے $ج + ۲ ف گ - ۱ ف - ۲ ب گ - ج = ۰$

مثال - مساوات درجہ دوم لا + ۱۰ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا - ۱۱۲ - ۱۱۲ = ۰

کو مبدأ بدلنے سے ایسی شکل میں تحویل کرو کہ لا، ما والی رقموں کے سر صفر ہو جائیں اور دیکھو کہ یہ مساوات دو خطوط کو تعبیر کرتی ہے یا نہیں -

مبدأ کو (لا، ما) پر لے جانے سے عام مساوات ہو جاتی ہے

$$۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا (۱۰ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا) + ۱۱۲ - ۱۱۲ = ۰$$

لا، ما والی رقموں کے سر صفر ہونگے اگر $۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰$

$$۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰$$

$$۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰ \quad \left[\begin{array}{l} ۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰ \\ ۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰ \end{array} \right]$$

$$۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰ \quad \left[\begin{array}{l} ۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰ \\ ۱۰ لا + ۲ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰ \end{array} \right]$$

پس تحویل شدہ مساوات ہو جاتی ہے

لا + ۱۰ لا + ۱۱ ما + ۱۲ لا = ۰ جو خطوط مستقیم کو تعبیر نہیں کرتی کیونکہ مستقل رقم صفر نہیں ہے -

متفرق مثالیں اور سوالات ۹

۱ - اور ب دو ثابت نقطے ہیں، ایک نقطہ ن اس طرح حرکت کرتا ہے کہ

$$(۱) \text{ ن } ۱ + \text{ ن } ۲ = \text{ مستقل}$$

$$(ب) \frac{\text{ن } ۱}{\text{ن } ۲} = \text{مستقل}$$


$$(ج) \text{ ن } ۱ \times \text{ ن } ۲ = \text{مستقل}$$

$$(د) \text{ ن } ۱ + \text{ ن } ۲ = \text{مستقل}$$

$$(ع) \text{ ن } ۱ - \text{ ن } ۲ = \text{مستقل}$$

ہر صورت میں ن کا طریق (لوکس) دریافت کرو۔

(لا، لا، لا)



ا، ب ثابت نقطے ہیں ان کے نقطہ تنصیف و کو مبداء مانو اور ب و ا محور لا اور اس کے علی القوائم ما کا محور و ما لو۔

فرض کرو کہ ب د = و ا = ا، تب ا کے محدود (ا،) ہیں اور ب کے محدود (ب،) اور نقطہ ن کے محدود ان محوروں اور مبداء کے لحاظ سے لا، ما ہیں۔

$$\text{صورت (۱) } \text{ ن } ۱ + \text{ ن } ۲ = \text{مستقل} = \text{ج } ۲$$

$$\text{یعنی (لا، لا) } ۱ + ۲ + \text{ (لا، لا) } ۱ + ۲ = \text{ج } ۲$$

لا + ما = ج = ا جو دائرہ ہے جس کا مرکز مبداء و ہے اور نصف قطر [ج - ا]

$$(ب) \frac{ن ا}{ن ب} = م یعنی \frac{ن ا}{ن ب} = م$$

$$\{ (لا - ۱) م^۲ + م^۲ \} = م^۲ \{ (۱ + لا) + م^۲ \}$$

$$لا (۱ - م^۲) + م^۲ (۱ - م^۲) - (۱ - م^۲) لا (۱ + م^۲) + [۱ + م^۲] = (۱ - م^۲) =$$

$$لا + م^۲ - لا (۱ + م^۲) = لا + م^۲ - لا - لا م^۲ = م^۲ - لا م^۲$$

$$\frac{م^۲}{۱ - م^۲} = \left(\frac{۱ + م^۲}{۱ - م^۲} \right) = \frac{۱ + م^۲}{۱ - م^۲}$$

مبداء کو نقطہ $\left(۱, \frac{۱ + م^۲}{۱ - م^۲} \right)$ پر لے جانے سے مساوات ہو جاتی ہے

$$لا + م^۲ = \frac{م^۲}{۱ - م^۲} \text{ پس طریق ایک دائرہ ہے جس کا مرکز } \left(۱, \frac{۱ + م^۲}{۱ - م^۲} \right) \text{ ہے}$$

اور نیم قطر $-\frac{م^۲}{۱ - م^۲}$

$$(ج) ن ا \times ن ب = ج$$

$$\{ (لا - ۱) م^۲ + م^۲ \} \{ (۱ + لا) + م^۲ \} = ج$$

$$(لا + م^۲ + م^۲ - لا) (لا + م^۲ + لا + ۱) = ج$$

$$(لا + م^۲ + م^۲ - لا) = ج \dots \dots \dots (ع)$$

$$لا + م^۲ + م^۲ - لا + لا + م^۲ - لا + م^۲ = ج$$

پس لا، م کا طریق یہ چوتھے رتبہ کا منحنی ہے۔ اسے کیسینی کا بیضہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس مساوات کو بدل کر قطبی محدودوں میں لے جائیں تو رکھنا ہوگا

$$لا = رجم طہ، م = رجب طہ$$

$$ع میں درج کرنے سے $(لا + م^۲) - م^۲ = رجم طہ = ج$$$

یعنی $r + r' + r'' - r' - r'' = 2r' - r'' = (1 + \text{جم } 2 \text{ ط}) = \text{ج}''$

یعنی $r + r' + r'' - r' - r'' = 2r' - r'' = \text{ج}''$ (۱)

اگر رکھیں $\text{ج} = 1 = \frac{\text{ص}}{r_1}$ تو

$$r + \frac{\text{ص}}{r_1} - \frac{\text{ص}}{r_2} = \text{جم } 2 \text{ ط} = \frac{\text{ص}}{r_3}$$

$r = \text{ص}'' - \text{جم } 2 \text{ ط} \dots \dots \dots$ (ب)

یہ کیسینی کے بیضوں کی خاص صورت ہے جو اٹیرن کی شکل سے مشابہت رکھتی ہے، اسے برنولی کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ شکل (د)، (ع) پہلے دی جا چکی ہیں۔

مثال (۲) (۱) ایک خط مستقیم ایک ثابت نقطہ (ف، گ) میں سے


گزرتا ہے اور دو ثابت علی القوام خطوں کو جو o پر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں نقاط a ، b پر کاٹتا ہے، مستطیل o اس b بنایا گیا ہے، اس کا طریق دریافت کرو۔

(ب) ایک خط، ایک ثابت نقطہ (ف، گ) میں سے گزرتا ہے، علی القوام محوروں کے درمیان یہ جو حصہ کاٹتا ہے اس کے نقطہ، تنصیف کا طریق دریافت کرو۔ (ج) نقطہ (لا، با) ایک خط کے مقطع کا نقطہ، تنصیف ہے جو علی القوام محوروں کے درمیان کٹتا ہے، خط کی مساوات دریافت کرو۔

(د) مبدا o میں سے ایک خط گزرتا ہے جو دونوں محوروں کے ساتھ مساوی زاویے بناتا ہے، اس خط پر کوئی ایک نقطہ لیا گیا ہے، ثابت کرو کہ اس نقطہ میں سے گزرنے والے سب خطوط کے جو مقطع محوروں پر کٹتے ہیں ان کے متکافیوں کا مجموعہ مستقل ہے۔

(ع) ایک خط علی القوام محوروں کے ساتھ جو مثلث کاٹتا ہے اس کا رقبہ مستقل ہے، خط کے وسطی نقطہ کا طریق دریافت کرو۔

حل حصہ (۱) خط ثابت نقطہ (ن، گ) میں سے گزرتا ہے 'فرض کرو کہ س کے محدود (ع، ب) ہیں جن میں رشتہ مطلوب ہے۔ اب $۱ = ۲ = ع'وب = ب$



پس خط اب کی مساوات $\frac{۱}{ب} + \frac{لا}{۱} = ۱$ ہے اور چونکہ خط (ن، گ) میں سے گزرتا ہے اس لیے $\frac{۱}{ع} + \frac{ن}{گ} = ۱$

پس یہ (ع، ب) کا طریق ہے، اگر (ع، ب) کی بجائے عام نقطہ (لا، ما) رکھ دیا جائے تو طریق اس شکل میں لکھا جاسکیگا۔

$$(۱) \dots\dots\dots ۱ = \frac{ن}{گ} + \frac{لا}{۱}$$


(ب) ثابت نقطہ (ن، گ) ہے۔ وسطی نقطہ (ع، ب)

کا طریق مطلوب ہے۔


$$۱ = ۲ = ع'وب = ۲$$

$$\frac{وب}{۱} = \frac{ث ل}{۱}$$


یعنی $\frac{گ}{ف-۲} = \frac{۲}{ف-۲}$ یعنی $\frac{گ}{ف-۲} = \frac{۲}{ف-۲}$ پس $گ - (۲ - ف) = ۲$ یا $گ + ف = ۲$ جو ۲ کا طریق ہے۔



ع' کی بجائے 'لا' مار کھنچے سے $\frac{ف}{۲} + \frac{گ}{۲} = ۲$ جو حسب معمول ترقیم میں طریق کی مساوات ہے۔
(ج) اب کا نقطہ تنصیف (لا، ما) دیا ہوا ہے خط کی مساوات مطلوب ہے۔



۱ = $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ اور $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ کی مساوات ہے (د) خطِ وٹ محوروں کے ساتھ مساوی زاویے بناتا ہے اس پر کوئی ثابت نقطہ (۱'۱) ہوگا جہاں ۱ معلومہ مقدار ہے۔




فرض کرو (۱'۱) میں سے گزرنے والے کسی خط کے مقطوعے محوروں پر 'بہ' ہیں تب اب کی مساوات $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ ہے۔

اب چونکہ خط (۱'۱) میں سے گزرتا ہے اس لیے $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ یعنی

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \text{ (مستقل مقدار) یہی مطلوب تھا۔}$$

(ع) مثلث د اب کا رقبہ مستقل ہے۔ (۱'۱) اب کا وسطی نقطہ ہے



اس لیے $۱ = ۲$ لا، $۲ = ۱$ وب

پس رقبہ $۱ = ۲$ لا $۱ = ۲$ لا = مستقل پس (لا، ۱) کا طریق لا $۱ = ۲$ لا = مستقل (ج، ۲) =


مثال (۳) (۱) خطوط $۱ = ۲$ لا $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا = ۰ کے درمیان جو مثلث بنتا ہے اس کا رقبہ دریافت کرو۔

(ب) خطوط $۱ = ۲$ لا $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا = ۰ کے درمیان جو مثلث بنتا ہے اس کا رقبہ دریافت کرو۔

(ج) خطوط $۱ = ۲$ لا $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا = ۰ کے درمیان جو مثلث بنتا ہے اس کا رقبہ دریافت کرو۔

(د) خطوط $۱ = ۲$ لا $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا = ۰ کے درمیان جو مثلث بنتا ہے اس کا رقبہ دریافت کرو۔

حل - (۱) نقطہ ۱ کے لیے $۱ = ۲$ لا $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا + $۱ = ۲$ لا = ۰




یعنی لا $= \frac{۱ - ۲}{۱ - ۲}$ اور ج $= \frac{۱ - ۲}{۱ - ۲}$

پس رقبہ ج ا ب $= \frac{1}{2} \times \frac{(۱ - ۲)}{(۱ - ۲)}$

$$(ب) \Delta ا ب ج = \Delta ا م م + \Delta م م ج - \Delta م م ب$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$



$$(ج) مثلث کا رقبہ = \frac{1}{2} \left(\frac{ج}{ب} + \frac{ج}{ب} \right) - \left(\frac{ج}{ب} + \frac{ج}{ب} \right)$$

$$= \frac{ج (ج - ب)}{ب (ج - ب)} + \frac{ج (ج - ب)}{ب (ج - ب)}$$

$$+ \frac{ج (ج - ب)}{ب (ج - ب)}$$

(د) نقطہ کے لیے $ا + ب + ج = ۱$

$$ا = \frac{ج}{ا + ب + ج} = \frac{ج}{۱}$$

$$\text{نقطہ ب کے محدد} = \left(\frac{ج}{ا + ب + ج} - \frac{ج}{ا + ب + ج} \right)$$

حل (۱) فرض کرو کہ ب $(\frac{1}{b} + \frac{1}{a})$ لا $\frac{1}{a}$

$$= \text{بب} (1 - \frac{1}{a}) (1 - \frac{1}{a})$$

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2}$$

اب دیے ہوئے خطوں پر علی القوائم خط ہونگے $1 - \frac{1}{a} = 1 - \frac{1}{a}$ جہاں $1 - \frac{1}{a} = 1 - \frac{1}{a}$


$$= \text{پس علی القوائم خط ہونگے} (1 + \frac{1}{a}) (1 + \frac{1}{a})$$

$$= \text{یعنی} 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}$$

$$= \text{یعنی} 1 + \frac{1}{a} + \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^2} \right)$$

$$= \text{یعنی} 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}$$

پس علی القوائم خطوں کا جوڑا ہے ب $1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}$ (ب) $1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}$ سے عمودوں کا حاصل ضرب



$$= \frac{1 - \frac{1}{a}}{1 + \frac{1}{a}} \times \frac{1 - \frac{1}{a}}{1 + \frac{1}{a}}$$

$$\text{پس } ۱ = ۱ + ۲م + ۳م^۲$$

$$\text{اور } ۱ = ۱ + ۲م + ۳م^۲$$

سے م سا قنط کرنے سے شرط حاصل ہوتی ہے -

$$\frac{۱}{۲م^۲ + ۳م + ۱} = \frac{۲}{۱ - ۲م - ۳م^۲} = \frac{۲}{۲م^۲ - ۳م - ۱}$$

پس شرط مطلوبہ ہے

$$(۱ - ۲م - ۳م^۲) + (۲م^۲ - ۳م - ۱) = ۰$$

مثال ۵۔ ایک مثلث کے راسوں 'ا'، 'ب'، 'ج' کے محدود بالترتیب

(۱۵، ۲)، (۱، ۱۶) اور (۲۲، ۱۹) ہیں؛ مثلث کے اندرونی دائرہ کے مرکز کے محدود معلوم کرو۔

$$\text{حل (ب ج ا)} = (۱۹ - ۱۶) + (۲۲ - ۱) = ۲۰ = ۲۲ + ۹$$

یعنی با ج = ۲۱۵

اس طرح سے ج ا = ۲۱۳ اور اب = ۲۱۴

اگر مثلث کے زاویہ 'ا' کا داخلی منصف مقابل کے ضلع ب ج سے

نقطہ د پر ملے تو د پر ب ج کی داخلی تقسیم ا ب : ج یعنی ۱۴ : ۱۳ کی نسبت میں ہوگی۔

$$\text{اس لیے د کا فضلہ} = \frac{(۱۶ \times ۱۳) + (۱۹ \times ۱۲)}{۱۳ + ۱۲} = \frac{۱۵۸}{۹}$$

$$\text{اور د کا معین} = \frac{(۱ \times ۱۳) + (۲۲ \times ۱۴)}{۱۳ + ۱۴} = \frac{۱۰۴}{۹}$$

اس لیے زاویہ 'ا' کے داخلی منصف 'د' کی مساوات ہوگی

$$\frac{۱}{۵} = \frac{\frac{۱۰۴}{۹} - ۱۵}{\frac{۱۵۸}{۹} - ۲} = \frac{۱۵ - ۶}{۲ - ۱۱}$$

یعنی $۱۵ + ۴۴ = ۰$ (۱)
اسی طرح سے زاویہ ب کے داخلی منصف ب ع کی مساوات ہوگی

$۱۵ + ۶ - ۴۹ = ۰$ (۲)

خطوط (۱) اور (۲) کا نقطہ تقاطع مثلث ا ب ج کا اندرونی مرکز ہے اور اندرونی مرکز کے متحدہ ہیں (۱۳، ۱۲) -

مشق (۱) سوال بالا میں مثلث ا ب ج کے رأس ۲ کے مقابل کے جانبی دائرہ کا مرکز معلوم کرو -

اشارہ - مطلوبہ مرکز زاویہ ا کے داخلی منصف اور زاویہ ب کے خارجی منصف کا نقطہ تقاطع ہے - زاویہ ب کے خارجی منصف کی مساوات ہوگی

$۱۵ - ۱۳ = ۰$ اس لیے مطلوبہ نقطہ کے متحدہ ہیں (۱۳، ۱۵) (۱۳، ۱۵)

مشق (۲) ایک مثلث کے رأسوں کے متحدہ (۲، ۱) (۲، ۵) اور (۲، ۹) ہیں - مثلث کے اندرونی مرکز کے متحدہ معلوم کرو -

[جواب (۱۱، ۱۱) (۱۱، ۱۱)]

باب دوم پر تفرق مشقی سوالات

(۱) ثابت کرو کہ نقاط (۳، ۰)، (۴، ۲)، (۴، ۴) اور (۰، ۴) ایک مربع کے رأس ہیں -

(۲) ایک مثلث کے رأسوں کے متحدہ (۴، ۰)، (۰، ۲)، (۰، ۰) (۱، ۰) ہیں - ثابت کرو کہ یہ مثلث قائم الزاویہ ہے - نیز ثابت کرو کہ اس مثلث کے وسطانیہ ہم نقطہ ہیں -

(۳) ایک قائم الزاویہ مثلث کے دو رأسوں کے متحدہ (۰، ۱)، (۰، ۰) ہیں - اس کے وتر کے وسطی نقطہ کے متحدہ معلوم کرو -

جواب (۱، ۱) (۱، ۱)

(۴) دریافت کرو کہ ذیل کے ہر حصہ میں جو تین خط دیے گئے ہیں وہ ہم نقطہ

ہیں یا نہیں؟

$$(۱) ۱ - ۱۱ = ۱ + ۱۲ - ۱۳ = ۲ + ۱۴ - ۱۵ = ۱۱$$

$$(ب) ۱ - ۱۱ = ۱ + ۱۲ - ۱۳ = ۲ + ۱۴ - ۱۵ = ۱۱$$

$$(ج) ۱ - ۱۱ = ۱ + ۱۲ - ۱۳ = ۲ + ۱۴ - ۱۵ = ۱۱$$

$$(د) ۱ - ۱۱ = ۱ + ۱۲ - ۱۳ = ۲ + ۱۴ - ۱۵ = ۱۱$$

(۵) ایک مثلث کے رؤسوں کے محدد (۱، ۲)، (۲، ۳)، (۳، ۱) ہیں۔

ثابت کرو کہ اس کے راسی زاویوں کے اندرونی منصفین ایک ہی نقطہ پر ملے ہیں۔

(۶) ثابت کرو کہ خطوط ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ کے درمیانی زاویوں

کے منصفین کی مشترک مساوات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ ہے۔

(۷) ایک چار ضلعی شکل کے اضلاع مساواتوں

$$۱ - ۱۱ = ۱ + ۱۲ - ۱۳ = ۲ + ۱۴ - ۱۵ = ۱۱$$

سے تعبیر ہوتے ہیں۔ ثابت کرو کہ یہ شکل ایک مستطیل ہے۔

(۸) اس خط کی مساوات معلوم کرو جس پر سیداء سے گرائے ہوئے عمود کا

سیلان ۱۲۵ ہو اور (۱) جس کے منقطعوں کا حاصل ضرب ۲، ۳ ہو (ب) جو نقطہ

(۳، ۴) میں سے گزرے (ج) نقطہ (۲، ۳) سے خط کا فاصلہ ۲۱۲ ہو۔

$$۱ - ۱۱ = ۱ + ۱۲ - ۱۳ = ۲ + ۱۴ - ۱۵ = ۱۱$$

$$(ج) ۱ - ۱۱ = ۱ + ۱۲ - ۱۳ = ۲ + ۱۴ - ۱۵ = ۱۱$$

(۹) اس خط کی مساوات دریافت کرو جو ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ کے متوازی ہو

اور جو خطوط ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ کے درمیانی فاصلہ کو

۱:۳ کی نسبت میں تقسیم کرے۔

$$۱ - ۱۱ = ۱ + ۱۲ - ۱۳ = ۲ + ۱۴ - ۱۵ = ۱۱$$

(۱۰) ایک مثلث کے اضلاع مساواتوں ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ کے

سے تعبیر ہوتے ہیں۔ نقطہ (۱، ۲) سے ان اضلاع پر عمود ڈالے گئے ہیں۔

ثابت کرو کہ ان عمودوں کے پائیں ایک ہی خط مستقیم میں واقع ہوتے ہیں۔

(۱۱) ان خطوط کی مساواتیں معلوم کرو جو نقطہ (۳، ۶) میں سے گزرتے ہیں اور اس نقطہ سے ۵ فاصلہ پر خط لا + م - ۲ = ۰ کو قطع کرتے ہیں۔

جواب: ۴ - لا - ۳ + م = ۰، ۳ - لا - ۳ + م = ۰، ۱۵ - لا + م = ۰

(۱۲) ک کی کس قیمت کے لیے مساوات لا - لا + م - لا + م + ک = ۰ دو خط مستقیم کو تعبیر کرگی۔ ان خطوں کا درمیانی زاویہ معلوم کرو۔

جواب: ک = ۱، درمیانی زاویہ = ۲۵°

(۱۳) دریافت کرو کہ ل کی کس قیمت کے لیے مساوات لا - لا + م = ۰

اور مساوات ل - لا - ۱۹ + م = ۰ ایک ہی خط مستقیم کو تعبیر کرینگے۔

جواب: ل = ۳

(۱۴) دو خطوط مستقیم ل اور ل نقطہ (۳، -۲) پر قطع کرتے ہیں

۱ پر کا مستقیم محور ما پر - ۶ ہے اور دونوں خطوں کا درمیانی زاویہ من ۳۰ ہے۔
دونوں خطوں کی مساواتیں معلوم کرو۔

جواب: ۴ + م + لا = ۰، لا - لا - ۱۸ = ۰، ۵۲ - لا = ۰

(۱۵) ایک مثلث کے اضلاع کی مساواتیں

لا + م - ۲ = ۰، لا - لا - ۳ + م = ۰، اور لا - لا - ۵ + م = ۰

ہیں۔ تحلیلی طریقہ پر تصدیق کرو کہ ۱ پر کا خارجی زاویہ ب اور ج پر کے داخلی زاویوں کے مجموعہ کے مساوی ہے۔

(۱۶) ک کی قیمت معلوم کرو جبکہ مساوات لا + ک - لا - لا + م = ۰

دو خط مستقیم کو تعبیر کرے۔ ان خطوں کی مجزاگانہ مساواتیں معلوم کرو اور ثابت کرو کہ یہ خطوط باہم علی التوا نہیں ہیں۔

جواب: ک = ۳، لا = ۲، لا + م = ۲

(۱۷) ایک مثلث کے تین اضلاع کی مساواتیں

لا - لا - ۲ = ۰، لا + م = ۲، لا + م = ۲

ہیں۔ اس مثلث کے اندرونی زاویے معلوم کرو۔

جواب: ۵۱°، ۳۱°، ۹۸° تقریباً۔

(۱۸) درجہ دوم کی دو مساواتوں $۳\lambda + ۱۱۱۳ - ۵۶\mu - ۲۴۷ - ۶۲۳\lambda + ۷۲۰ - ۲۴۷ = ۰$ سے چار خط حاصل ہوتے ہیں جو ایک چار ضلعی شکل بناتے ہیں۔ ثابت کرو کہ ان خطوں کے نقاط وسطی کو ملانے سے ایک متوازی الاضلاع حاصل ہوتا ہے۔

(۱۹) ایک مثلث کے راس (۳۰°) ، (۴۰°) ، (۵۰°) ہیں۔ اس مثلث کے اندرونی زاویے معلوم کرو:-

جواب: ۹۰° ، ۲۶° ، ۹۳° ۔


(۲۰) اگر ایک متوازی الاضلاع کے وتر مساوی ہوں تو ثابت کرو کہ یہ ایک مستطیل ہوگی۔

تیسرا باب

دائرہ

۳۱۔ تعریف۔ اگر ایک نقطہ اس طرح حرکت کرے کہ ایک ثابت نقطہ سے اس کا فاصلہ ہمیشہ مستقل رہے تو اس نقطہ کے طریق کو ”دائرہ“ ثابت نقطہ کو ”مركز“ اور مستقل فاصلہ کو ”نصف قطر“ کہتے ہیں۔

۳۲۔ دائرہ کی مساوات (مركز کو مبدا مان کر) فرض کرو کہ دائرہ کا مرکز O ہے اور نصف قطر r ۔



فرض کرو کہ x اور y حوالہ کے علی القوائم محور ہیں اور n دائرہ کے محیط پر کوئی نقطہ ہے جس کے محدد (الانما) ہیں۔ x اور y عمودین مرڈالو اور

ون کو ملاؤ تو


$$وم^۲ + من^۲ = ون^۲$$

لیکن ون = لا، وم = لا، من = ما اس لیے

$$لا^۲ + ما^۲ = لا^۲ \dots (۱)$$

دائرہ کی مطلوبہ مساوات یہی ہے اور یہ سادہ ترین شکل میں ہے۔ اس کو دائرہ کی "معیاری مساوات" بھی کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے درجہ کی مساوات ہے لیکن متجانس نہیں ہے۔

۲۱ و ۳ - ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک نقطہ قی دائرہ کے محیط پر واقع نہ ہو بلکہ اس کے اندر یا باہر کہیں واقع ہو تو محدودوں میں کیا رشتہ ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ نقطہ قی دائرہ کے اندر واقع ہے اور اس کے محدود (لا، ما) ہیں۔



نقطہ قی سے ولا پر عمودق مرڈالو اور مرق کو خارج کرو کہ دائرہ کے محیط سے نقطہ قی پر ملے۔

فرض کرو کہ مرق = ما، لیکن وم = لا، مرق = ما۔
نو چونکہ نقطہ قی دائرہ کے محیط پر ہے اس لیے

$$لا^۲ + ما^۲ = لا^۲$$

لیکن مرق > مرق یعنی ما > ما، اس لیے
لا^۲ + ما^۲ > لا^۲ یعنی لا^۲ + ما^۲ - لا^۲ > ۰


اسی طرح شکل بنا کر آسانی سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اگر نقطہ ق (لا، ما) دائرہ کے باہر واقع ہے تو

$$لا + ما < لا' + ما' - و < ۰$$

پس کسی نقطہ (لا، ما) کے متعلق یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ دائرہ لا + ما = و کے لحاظ سے کہاں واقع ہے تو جملہ لا' + ما' - و کی قیمت دریافت کرنی چاہیے۔ اگر یہ قیمت مثبت ہو تو نقطہ دائرہ کے باہر واقع ہے، اگر قیمت صفر ہو تو نقطہ دائرہ کے محیط پر واقع ہے اور اگر قیمت منفی ہو تو نقطہ دائرہ کے اندر واقع ہے۔

۳۲۲۔ کسی قائم محوروں کے لحاظ سے دائرہ کی مساوات

فرض کرو کہ ولا اور وما دو قائم محور ہیں۔
فرض کرو کہ دائرہ کا مرکز ج ہے جس کے محدود (ہ، ک) ہیں اور نصف قطر لا ہے۔



دائرہ کے محیط پر کوئی نقطہ ق لو اور فرض کرو کہ اس کے محدود (لا، ما) ہیں۔
محور ولا پر عمود ج م اور ق ن ڈالو۔

ن ق پر عمود ج ل ڈالو۔ اب

$$ج ل = ج م = و ن - و م = لا - ہ'$$

اور
 $ل ق = ن ق - ن ل = ن ق - م ج = ا - ک$
 پس چونکہ

$$ج ل + ل ق = ج ق$$

اس لیے
 $(۱) \dots\dots\dots ل = (ا - ک) + (لا - ہ) = ج ق$

جو مطلوبہ مساوات ہے۔ اس کو پھیلا کر یوں لکھ سکتے ہیں

$$(۲) \dots\dots\dots ل + ا - ۲ - لا - ک + م + ہ - ک - ل = ج ق$$

یہ دائرہ کی عام مساوات ہے۔ اس کے دیکھنے سے فوراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ مساوات درجہ دوم کی غیر متجانس ہے جس میں لا اور ا کے سر مساوی ہیں اور لا و ا والی رقم موجود نہیں ہے۔ یعنی لا ا کا سر صفر ہے۔

اس کے برعکس ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسرے درجہ کی مساوات جس میں یہ خاصیتیں پائی جائیں یعنی جس میں لا اور ا کے سر مساوی ہوں اور لا و ا والی رقم موجود نہ ہو ایک دائرہ کو تعبیر کرتی ہے۔ اس طرح کی عام سے عام مساوات ذیل کی شکل کی ہوگی:-

$$(۳) \dots\dots\dots ل + ا + م + گ - لا + ن + م + ج =$$

اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں:-

$$(۴) \dots\dots\dots ج = (لا + گ) + (ا + ن) - م - گ - ن - ج$$

مساوات (۴) کا مساوات (۱) کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک دائرہ کی مساوات ہے جس کا مرکز 'نقطہ' (گ - ن) ہے اور جس کا نصف قطر $م + گ + ن - ج$ کے مساوی ہے۔

۲۳ و ۳۴ :-

جس طرح دائرہ کی معیاری شکل کے لیے دفعہ ۲۱ و ۳۱ میں ہم نے شرط معلوم کی تھی کہ ایک نقطہ ن (لا، ما) دیے ہوئے دائرہ لا + ما = ۱ کے اندر یا باہر کب واقع ہوتا ہے اسی طرح دائرہ کی عام مساوات

$$لا + ما + ۲ گ + ۲ ف + ۲ ج = ۰ \dots\dots (۱)$$

کے لیے بھی ہم اسی طرح کی شرط معلوم کر سکتے ہیں۔ گذشتہ دفعہ کی مساوات (۲) کی جگہ سے (۱) کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں :-

$$(لا + گ) + (ما + ف) = ۲ گ + ۲ ف - ج \dots\dots (۲)$$

اب مبدا کو دائرہ کے مرکز (گ - ف) پر منتقل کر دو اور محوروں کو پڑانے محوروں کے متوازی رکھو۔ اس لیے دفعہ ۱۹ (۱) کے بموجب نئے محدودوں (لا، ما) اور پڑانے محدودوں (لا، ما) میں ذیل کارشتہ ہوتا ہے :-

$$لا = لا + گ، ما = ما + ف \dots\dots (۳)$$

اسی طرح دیے ہوئے نقطہ ن (لا، ما) کے محدود بدل کر (لا، ما) ہو جائینگے جہاں

$$لا = لا + گ، ما = ما + ف \dots\dots (۴)$$

دائرہ کی مساوات (۲) میں (۳) درج کرنے پر نئے محدودوں میں مساوات ہو جاتی ہے

$$لا + ما = ۲ گ + ۲ ف - ج \dots\dots (۵)$$

اب یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیا ہوا نقطہ ن (لا، ما) دائرہ (۵) کے اندر

یا باہر واقع ہے ہم دفعہ ۳۱ و ۳۲ کے نتیجہ کو استعمال کر سکتے ہیں جس سے حاصل ہوتا ہے کہ نقطہ ن دائرہ کے اندر یا باہر واقع ہے بموجب اس کے کہ

$$\text{لا}^2 + \text{ما}^2 - (\text{گ}^2 + \text{ن}^2 - \text{ج}^2) \geq 0$$

یعنی (۴) سے لا، ما کی قیمتیں درج کرنے پر ملتا ہے کہ ن دائرہ کے اندر یا باہر واقع ہے بموجب اس کے کہ

$$(\text{لا} + \text{گ})^2 + (\text{ا} + \text{ن})^2 - (\text{گ}^2 + \text{ن}^2 - \text{ج}^2) \geq 0$$

یعنی بموجب اس کے کہ

$$\text{لا}^2 + \text{ما}^2 + \text{گ}^2 + \text{ا}^2 + \text{ن}^2 + \text{ا}^2 - \text{ج}^2 \geq 0 \quad (۶)$$

غرض کہ اگر نقطہ (لا، ما) دائرہ کے اندر واقع ہو تو

لا + ما + گ + ا + ن + ا - ج کو منفی ہونا چاہیے اور اگر نقطہ (لا، ما) دائرہ کے باہر واقع ہو تو

$$\text{لا}^2 + \text{ما}^2 + \text{گ}^2 + \text{ا}^2 + \text{ن}^2 + \text{ا}^2 - \text{ج}^2 کو مثبت ہونا چاہیے۔$$

اس طرح دائرہ کی مساوات میں صرف نقطہ کے متعدد درج کرنے پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نقطہ دائرہ کے اندر یا باہر یا محیط پر واقع ہے۔

مثال (۱) اُس دائرہ کی مساوات دریافت کرو جس کا نصف قطر ۳ ہے

اور جس کا مرکز نقطہ (-۲، ۱) ہے۔

اس کے لیے ہم مساوات (۱) استعمال کرتے ہیں جس میں $h = -2$ ، $k = 1$

ک = ۲ اور $r = 3$

$$^2(3) = \left\{ 2-1 \right\} + \left\{ (1-) - 1 \right\}$$

$$9 = ^2(2-1) + ^2(1+1) \text{ یعنی}$$

$$\text{یعنی } 9 = 1^2 + 2^2 + 2^2 - 1^2 - 1^2 = 0$$

مطلوبہ مساوات ہے۔

$$\text{مثال (۲) مساوات } 1^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 - 1^2 - 1^2 - 1^2 - 1^2 = 0 \text{ سے}$$

تعبیر ہونے والے دائرہ کے مرکز کے محدود اور نصف قطر کا طول معلوم کرو۔

دی ہوئی مساوات کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں

$$34 + 25 + 39 = ^2(6+6) + ^2(5+5)$$

$$^2(10) = 100 =$$

اب مساوات (۱) سے مقابلہ کرنے پر ظاہر ہے کہ مرکز کے محدود (۶-۵) ہیں اور نصف قطر کا طول ۱۰ ہے۔

مثال (۳) اس دائرہ کی مساوات دریافت کرو جو تین نقطوں (۲،۱)، (۳،۲) اور (۵،۶) میں سے گزرتا ہے۔

فرض کرو کہ مطلوبہ دائرہ کی مساوات

$$1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 - 1^2 - 1^2 - 2^2 - 2^2 = 0$$

ہے۔ اب چونکہ یہ دائرہ دیے ہوئے تین نقطوں میں سے گزرتا ہے اس لیے تینوں نقطوں کے محدود اس مساوات کو پورا کرینگے جس سے گ، ف اور ج کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم کو تین ہمزاد مساواتیں حاصل ہوتی ہیں:-

$$5 - = 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 - 1^2 - 1^2 - 2^2 - 2^2$$

$$25 - = 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 - 1^2 - 1^2 - 2^2 - 2^2$$

$$41 - = 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 - 1^2 - 1^2 - 2^2 - 2^2$$

معمولی طریقہ سے ان مساواتوں کو حل کرنے پر حاصل ہوتا ہے

$$\text{گ} = ۱۱ - \text{ف} = ۲ - \text{ج} = ۲۵$$

اور اس لیے مطلوبہ دائرہ کی مساوات ہے

$$۰ = ۲۵ + ۱۴ - ۱۲۳ - ۱۴ + ۱۴$$

مثال (۴۱) اس دائرہ کی مساوات معلوم کر دو جو نقاط (۱، ۲) (۳، ۵) کو ملانے والے خط کو قطر مان کر کھینچا جائے۔

فرض کر دو کہ دائرہ کے محیط پر کوئی نقطہ (۱، ۲) ہے تو چونکہ زاویہ بن ا قائم ہے اس لیے ظاہر ہے کہ

$$\text{ب}^۲ = \text{ا}^۲ + \text{ن}^۲$$

$$\text{یعنی } \{۵-۲\}^۲ + \{۱-۳\}^۲ = \{۲-۱\}^۲ + \{۱-۱\}^۲ = \{۵-۱\}^۲ + \{۳-۱\}^۲$$

$$\text{یعنی } ۹ + ۴ = ۱۶ + ۴ = ۲۰$$

$$\text{یعنی } ۱۲ + ۱۴ - ۱۲۳ - ۱۴ + ۱۴ = ۰$$

$$\text{یعنی } ۱۴ + ۱۴ - ۱۲۳ - ۱۴ + ۱۴ = ۰$$

$$\text{یعنی } (۱ + ۲)^۲ = ۹ - \frac{۲۵}{۴} + ۱ = \frac{۲}{۴} (۴ - ۱۴) + ۱$$

اس آخری مساوات سے ظاہر ہے کہ دائرہ کا مرکز $(-۱, \frac{۱}{۲})$ اور نصف قطر $\frac{۵}{۲}$ ہے۔

مشق ۱۰

(۱) اس دائرہ کی مساوات معلوم کرو:-

- (۱) جس کا نصف قطر ۱ اور مرکز (۰، ۱) ہے۔
 (ب) نصف قطر $\frac{4}{3}$ مرکز $(-\frac{3}{4}, \frac{3}{4})$
 (ج) نصف قطر $\frac{3}{4}$ مرکز $(-\frac{1}{4}, 1)$
 (د) جس کا نصف قطر ۱ + پ اور مرکز (۱ - ب) ہے
 جواب (۱) $لا^۲ + ما^۲ + ۲ما = ۰$
 (ب) $لا^۲ + ما^۲ + ۱۱ما - ۱۱ = ۰$
 (ج) $لا^۲ + ما^۲ + ۱۱ما - ۱۱ = ۰$
 (د) $لا^۲ + ما^۲ - ۲ما + ۲ب = ۰$

(۲) ذیل کی مساواتوں سے تعبیر ہونے والے دائروں کے نصف قطر اور مرکزوں کے محدود معلوم کرو:-

- (۱) $لا^۲ + ما^۲ - ۱۱ما + ۱۱ = ۰$
 (ب) $لا^۲ + ما^۲ = ۱۱(۱ - ۱۱)$
 (ج) $(لا - ۱۱)(۲ - ۱۱) + (ما - ۱۱)(۳ - ۱۱) = ۰$
 (د) $لا^۲ + ما^۲ - ۱۱ما = ۱۱(۱ - ۱۱)$
 (ه) $لا^۲ + ما^۲ - ۱۱ما + ۱۱ = ۰$
 (و) $لا^۲ + ما^۲ = ۱۱(۱ - ۱۱) + ۱۱(۱ - ۱۱)$

- جواب (۱) $(۱، ۰)$ ، (۲) $(\frac{4}{3}, \frac{3}{4})$
 (ب) $(-\frac{3}{4}, \frac{3}{4})$
 (ج) $(-\frac{1}{4}, 1)$
 (د) $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$
 (ه) $(\frac{5}{8}, \frac{1}{8})$
 (و) $(1، 0)$

(۳) ان دائروں کی مساواتیں معلوم کرو جو ذیل کے نقطوں میں سے گزرتے ہیں:

$$(۱) (۱'۱) (۱-۲) \text{ اور } (۲'۳) -$$

$$(ب) (۰'۰) (۰'۲) (۰-۳) -$$

$$(ج) (۴'۱) (۲'۳) \text{ اور } (۳'۲) -$$

$$(د) (۱'۰) (۰'۱) \text{ اور } (۱'۲) -$$

$$\text{جواب } (۱) (۱'۱) + (۱-۲) = (۲'۳) -$$

$$(ب) (۰'۰) + (۰'۲) = (۰-۳) -$$

$$(ج) (۴'۱) + (۲'۳) = (۳'۲) -$$

$$(د) (۱'۰) + (۰'۱) = (۱'۲) -$$

(۴) اُس دائرہ کی مساوات معلوم کرو جو مبداء میں سے گزرتا ہے اور


محوروں پر جس کے مقطوعے ۳ اور ۴ ہیں -

$$\text{جواب } (۱) (۱'۱) + (۱-۲) = (۲'۳) -$$

۳ و ۳- دائرہ کے وتر کی مساوات :-

فرض کرو کہ ایک دائرہ پر ف اور ق دو نقطے ہیں۔ دائرہ کی مساوات

کو ہم معیاری شکل میں لیتے ہیں یعنی $(۱) \dots \dots \dots (۱)$



اب اگر ف اور ق کے متحدہ بالترتیب $(۱'۱)$ اور $(۱'۱)$ میں تو یہ دونوں دائرہ کی مساوات کو پورا کریں گے یعنی

$$(۱) \dots \dots \dots (۱) \dots \dots \dots (۱)$$

$$(۲) \dots \dots \dots (۲) \dots \dots \dots (۲)$$

اس لیے تفریق کرنے پر

$$0 = (a - b) + (a - b)$$

یعنی

$$(a - b)(a + b) - (a - b)(a + b) = 0$$

یعنی

$$(3) \dots\dots\dots \frac{a + b}{a + b} - \frac{a - b}{a - b} = 0$$

ہم کو معلوم ہے کہ دو نقطوں ف اور ق کو ملانے والے خط کی مساوات حسب ذیل ہوتی ہے۔

$$(4) \dots\dots\dots \frac{a - b}{a - b} = \frac{a - b}{a - b}$$

یعنی

مساوات (۴) کسی دو نقطوں کو ملانے والے خط کی مساوات ہے چاہے وہ کہیں واقع ہوں۔ لیکن زیر بحث صورت میں نقطے ف اور ق خاص طرح کے ہیں۔ یعنی دائرہ کے محیط پر واقع ہیں۔ پس وتر ف ق کی مساوات دریافت کرتے وقت ہم کو یہ امر بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم مساوات (۳) کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے $\frac{a - b}{a - b}$ کی قیمت مساوات (۴) میں بھرتی کرتے ہیں جس سے حاصل ہوتا ہے

$$(5) \dots\dots\dots \frac{a + b}{a + b} - \frac{a - b}{a - b} = 0$$

چلیپی ضرب دینے اور سب رقموں کو سیدھی طرف لے جانے پر ملتا ہے

$$(6) \dots\dots\dots (a - b)(a + b) + (a - b)(a + b) = 0$$

یہ دائرہ کے وتر کی مساوات ہے جو ایک متشکل صورت میں ہے۔
مثال۔ دائرہ $a^2 + b^2 = 25$ پر دو نقطے $A(-3, 4)$ اور $B(4, 3)$ ہیں

ان کو ملانے والے وتر کی مساوات دریافت کرو۔

نقاط ا اور ب کو ملانے والے خط کی مساوات حسب ذیل ہے:-

$$\frac{3-1}{3-2} = \frac{(3-1) - 1}{3-2} \quad \text{یعنی} \quad (3-1)(3-2) + (3-2)(3-1) = (3-2)(3-2)$$

$$\text{یعنی } 3+1 = 3-2 = 1 \quad (3-1) - 1 \quad \text{یعنی} \quad (3-1) - 1 = (3-1) - 1$$

$$\text{یعنی } 3+1 = 3-2 = 1$$


یہ وتر ا ب کی مطلوبہ مساوات ہے جو مساوات (۶) سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔
مشاہدہ: وتر کی مساوات کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں:

$$(3-1)(3-1) + (3-1)(3-1) = (3-1)(3-1) + (3-1)(3-1) + \dots + (3-1)(3-1)$$

اس مساوات میں دونوں طرف سے ۱ اور ۱ کے سرکٹ جاتے ہیں اس لیے دراصل یہ صرف پہلے درجہ کی مساوات ہے اور مساواتوں (۲) سے ظاہر ہے کہ نقاط ف اور ق کے متحد (۱، ۱) اور (۱، ۱) مساوات (۴) کو پورا کرتے ہیں اس لیے یہ خط نقاط ف اور ق میں سے گزرتا ہے یعنی مطلوبہ وتر ہے۔

وتر کی مساوات کو لکھنے کا یہ طریقہ عام ہے اور ہر دوسرے درجہ کے معنی کے لیے یعنی ہر مخروطی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۳۳۔ مماس۔ تعریف۔ ذیل کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ف اور ق



دائرہ یا کسی منحنی پر کے دو نقطے ہیں اور ان کو ملانے والا خط دائرہ یا منحنی کا وتر ہے۔ اب چاہیے قہ کیس واقع ہو یہ خط دائرہ یا منحنی کا وتر ہوگا۔ فرض کرو کہ ق کو اہم دائرہ یا منحنی کے محیط پر ف کے قریب بتدریج لاتے ہیں۔ جس وقت ق نقطہ ف کے اس قدر نزدیک آجائے کہ اس پر عین منطبق ہونے کو ہو تو اس انتہائی صورت میں جو خط حاصل ہوتا ہے اس کو دائرہ یا منحنی کا مماس کہتے ہیں۔

شکل بالا سے اس کی کافی وضاحت ہوتی ہے۔ مماس کا مفہوم بہت اہم ہے اور طالب علم کو اسے نہایت غور و احتیاط کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اس کا بنیادی اصول دراصل ایک تفاعل کی انتہا کے مفہوم پر منحصر ہے جو تقرقی احصاء میں تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔

۳، ۴۔ دائرہ کے مماس کی مساوات :-

اس مساوات کو اوپر کی تعریف کے بموجب ہم وتر کی مساوات سے اخذ کر سکتے ہیں۔

دفعہ (۳، ۳) کی مساوات (۶) میں ہم نے وتر ف ق کی مساوات شکل ذیل میں حاصل کی تھی:

$$(لا - لا) (لا + لا) + (لا - لا) (لا + لا) = (لا + لا) (لا - لا) \dots (۱)$$

اب ظاہر ہے کہ جب نقطہ ق نقطہ ف پر عین منطبق ہونے کو ہوگا تو لا کی قیمت لا کے قریب اور لا کی قیمت لا کے قریب آئیگی۔

پس مساوات (۱) میں لا کی بجائے لا اور لا کی بجائے لا رکھنے پر وہ ہو جاتی ہے:

$$(لا - لا) (لا) + (لا - لا) (لا) = (لا) (لا - لا) \dots (۲)$$

یعنی

$$لا (لا - لا) + لا (لا - لا) = لا (لا - لا) \dots (۲)$$

یہ ماس کی مساوات ہے لیکن ابھی یہ مطلوبہ شکل میں نہیں ہے مساوات (۲) سے حاصل ہوتا ہے۔

$$لا + لا + لا - لا - لا =$$

یعنی

$$(۳) \quad لا + لا = لا + لا \dots \dots \dots$$

لیکن (لا + لا) نقطہ ص کے محدود ہیں جو دائرہ پر واقع ہے اس لیے یہ دائرہ کی مساوات کو پورا کرتے ہیں یعنی

$$(۴) \quad لا + لا = لا$$

اس قیمت (۴) کو مساوات (۳) میں درج کرنے پر حاصل ہوتا ہے:

$$(۵) \quad لا + لا = لا$$

یہی ماس کی مطلوبہ مساوات ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم ذیل کی ترکیب اختیار کر سکتے ہیں :-
دائرہ کی مساوات لا + لا = لا کو پھیلا کر اس شکل میں لکھو

$$لا \times لا + لا \times لا = لا$$

پھر اس میں سبھی طرف ایک لا کی بجائے لا اور ایک لا کی بجائے لا رکھو تو

$$لا + لا = لا$$

حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ عام ہے اور آگے چل کر ہم دیکھینگے کہ تمام مخروطیوں کے ماس کی مساوات اس طرح اخذ کی جاسکتی ہے۔
ماس کی یہی مساوات وتر کی مساوات (۶) (دفعہ ۳ و ۳) سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے :-

چونکہ لا کی قیمت لا کے قریب اور با کی قیمت با کے قریب آتی ہے اس لیے ماس کی مساوات حسب ذیل ہے

$$(لا - لا) (لا - لا) + (لا - لا) (لا - لا) = لا - لا + لا - لا$$

$$\text{یعنی } ۲ - لا لا - لا لا - لا لا + لا + لا = لا - لا$$

مگر چونکہ لا + لا = لا + لا کیونکہ نقطہ (لا، لا) دائرہ پر واقع ہے

نقطہ (لا، لا) پر کے ماس کی مساوات حسب سابق

$$لا لا + لا لا = لا$$

ہے۔

مثال۔ دائرہ لا + لا = ۲۵ کے نقطہ ن (۳، ۴) پر کے

ماس کی مساوات دریافت کرو۔

فرض کرو کہ دائرہ پر ایک اور نقطہ ن (۴، ۵) (۳، ۴) واقع ہے جو نقطہ ن کے بہت قریب ہے یعنی ۵ اور ک بہت چھوٹے عدد ہیں۔

ن کے نزدیک (۴، ۵) کی مساوات ہوگی

$$(۶) \quad \frac{۳+۴}{۴-۵} = \frac{۳+۴}{۴-۵} \quad \text{یعنی} \quad \frac{۳+۴}{۴-۵} = \frac{۳+۴}{۴-۵}$$

ن پر کے ماس کی مساوات حاصل کرنے کے لیے نقطہ ن کو ن کے عین منطبق ہونے تک قریب لانا چاہیے یعنی ۵ اور ک کو اس قدر چھوٹا کرنا چاہیے کہ وہ عین صفر ہونے کو ہوں لیکن بالکل صفر نہ ہوں۔ مگر چونکہ نقطہ ن بہر حال دائرہ پر واقع ہے اس لیے

$$۲۵ = (۳+۴) + (۴+۵)$$

$$\text{یعنی } ۵۸ - ۶ک + ۵ + ۴ = ۰$$

لیکن چونکہ ۵ اور ک جس قدر چاہیں چھوٹے ہو سکتے ہیں اس لیے ۵ اور ک کو

فطرانہ از کیا جاسکتا ہے پس

$$۸ - ۶ = ۲ \text{ یعنی } ۲ = \frac{۶}{۸} = \frac{۳}{۴} \text{ ک } \dots (۴)$$

پس ماس کی مساوات حاصل کرنے کے لیے ۲ اور ک میں یہ رشتہ مساوات (۶) میں درج کرنا چاہیے

$$\frac{۲}{۳} = \frac{۲+۶}{۳} \text{ یعنی } ۲ = ۱۲ - ۲۵$$

ضابطہ (۵) میں ۱۲ = ۲ اور ۱۲ = ۳ - ۲۵ رکھنے پر بھی یہی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

۳۲ - ۳۳ ماس کی مساوات معلوم کرنے کے ذکرہ بالا طریقت کو واضح کرنے کے لیے ہم عام شکل میں یہ مساوات دریافت کریں گے تاکہ یہ طریقت طالب علم کے ذہن نشین ہو جائے۔

افرض کرو کہ دائرہ کی مساوات

$$(۱) \quad ۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ = ۰$$

ہے اور اس کے محیط پر کوئی دو نقطے ف اور ق ہیں جن کے محدب بالترتیب (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲) ہیں۔ چونکہ یہ دونوں نقطے دائرہ کی مساوات کو پورا کرتے ہیں اس لیے

$$۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ = ۰$$

$$۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ = ۰$$

پس تفریق کرنے پر

$$۰ = (۱ - ۱) + (۲ - ۲) + (۳ - ۳) + (۴ - ۴) + (۵ - ۵) + (۶ - ۶) + (۷ - ۷) + (۸ - ۸) + (۹ - ۹) + (۱۰ - ۱۰) + (۱۱ - ۱۱) + (۱۲ - ۱۲)$$

یعنی

$$۰ = (۱ - ۱) + (۲ - ۲) + (۳ - ۳) + (۴ - ۴) + (۵ - ۵) + (۶ - ۶) + (۷ - ۷) + (۸ - ۸) + (۹ - ۹) + (۱۰ - ۱۰) + (۱۱ - ۱۱) + (۱۲ - ۱۲)$$

یعنی

$$(۲) \quad \frac{۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲}{۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ + ۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲} = \frac{۱ - ۱}{۱ - ۱}$$

لیکن جیسا کہ گذشتہ دفعہ کی مساوات (۴) سے ظاہر ہے کسی دو نقطوں
ف اور ق کو ملانے والے خط کی مساوات حسب ذیل ہوتی ہے :

$$(3) \dots\dots\dots \frac{u - u}{b - b} = \frac{u - u}{b - b}$$

پس وترتف ق کی مساوات معلوم کرنے کے لیے مساوات (۲) سے

۱-۱ کی قیمت مساوات (۳) میں برقی کرتے ہیں جس سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{6 + 6 + 2}{6 + 6 + 2} = \frac{6 - 6}{6 - 6}$$

یعنی $(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 + \lambda_2 + g_2) + (\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 + \lambda_2 + f_2) = 0$ ۔
یہی اس عام صورت میں دائرہ کے وتر کی مساوات ہے۔

وترکی اس مساوات سے حاس کی مساوات اخذ کرنے کے لیے ہم وی استدلال کرتے ہیں جو اوپر معیاری صورت کے لیے کیا گیا تھا۔ یعنی نقطہ ق کو بتدریج نقطہ ف کے قریب لاتے ہیں اور انتہا میں جب نقطہ ق نقطہ ف پر عین منطبق ہونے کو ہو تو وترکی مساوات میں $\lambda = \lambda$ اور $\mu = \mu$ رکھتے ہیں۔ اس لیے مساوات (۲) سے حاصل ہوگا

$$(5) \dots\dots = (f_2 + b_2)(b - a) + (g_2 + u_2)(u - v)$$

مساوات کو (۲) پر تقسیم کرنے اور پھیلانے سے حاصل ہوتا ہے

[illegible]

لیکن چونکہ (لا' م) دائرہ پر واقع ہے اس لیے

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}g + \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}j$$

یعنی $لا + ا + گ + لا + ف + ا = (گ + لا + ف + ا + ج) \dots (4)$

مساواتوں (۶) اور (۷) سے ملتا ہے:

$$لا + ما + با + گ + لا + ف + ما + گ + لا + ف + با + ج =$$

یعنی $لا + ما + با + گ + لا + ف + ما + گ + لا + ف + با + ج =$ (۸)
اور یہی نقطہ ف پر کے ماس کی مطلوبہ مساوات ہے۔

اس عام صورت میں بھی ہم دفعہ ۳، ۳ کی مساوات (۷) کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔
دائرہ پر کے نقاط ف (لا، با) اور ق (لا، با) میں سے گزرنے والے وتر کی
مساوات حسب ذیل ہے:

$$(لا - لا) + (لا - با) + (ما - با) = لا + ما + با + گ + لا + ف + ما + ج (۹)$$

یہ ایک پہلے درجہ کی مساوات ہے اور نقاط ف، ق کے محدد اس کو پورا کرتے ہیں
اس لیے یہ وتر ف، ق کی مساوات ہے۔

ماس کی مساوات حاصل کرنے کے لیے اس مساوات میں لا = لا
با = با رکھنے پر ملتا ہے

$$(لا - لا) + (ما - با) = لا + ما + با + گ + لا + ف + ما + ج$$

یعنی

$$۲ - لا - ما - با + لا + ما + با = لا + ما + با + گ + لا + ف + ما + ج$$

لیکن چونکہ (لا، با) دائرہ پر واقع ہے اس لیے

$$لا + با + گ + لا + ف + ما + ج = ۰ \text{ یعنی } لا + با = -گ - لا - ف - ما - ج$$

پس نقطہ (لا، با) پر کے ماس کی مساوات حسب ذیل حاصل ہوتی ہے:-

$$۲ - لا - ما - با - گ + لا + ف + ما + ج = ۰$$

یعنی

$$لا + ما + با + گ + لا + ف + ما + ج = ۰$$

مثالی - دائرہ لا + ما - ہا - ج = ۰ کے نقطہ (۱، ۲) پر کے

ماس کی مساوات دریافت کرو:-

فرض کرو کہ دائرہ پر ایک اور نقطہ N ($۲ + ۱ - ک$) واقع ہے جو پہلے نقطہ کے بہت قریب ہے۔ پس

$$۰ = ۲ + (ک + ۱ -) - (۲ + ۱) - ۲ - (ک + ۱ -) + ۲ (۲ + ۱)$$

یعنی $۰ = ۲ - ۳ک + ۲ + ۲ک$ (۱۰)
لیکن N کو ملانے والے خط کی مساوات ہوگی

$$(۱۱) \quad \frac{۱ + ۱}{ک} = \frac{۲ - ۱}{۲} \quad \text{یعنی} \quad \frac{۱ + ۱}{۱ + ک + ۱ -} = \frac{۲ - ۱}{۲ - ۲ + ۲}$$

ن پر کے مماس کی مساوات حاصل کرنے کے لیے N کون کے قریب لانا چاہیے، یعنی ۲ اور $ک$ کو بہت چھوٹا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں مساوات (۱۰) میں ۲ اور $ک$ کو نظر انداز کر سکتے ہیں جس سے وہ مساوات ہو جاتی ہے (۱۲)

مساوات (۱۱) میں یہ قیمت درج کرنے پر حاصل ہوتا ہے:

$$۰ = (۱ + ۱) ۳ + (۲ - ۱) \quad \text{یعنی} \quad \frac{۱ + ۱}{ک} = \frac{۲ - ۱}{۳ - ۱}$$


یعنی مماس کی مطلوبہ مساوات $۱ + ۱ + ۳ = ۰$ ہے جو مضابطہ (۸) میں $۱ = ۲$ اور $۱ = ۳$ رکھنے پر بھی فوراً حاصل ہو سکتی ہے۔

۳۲، ۳۳: عماد - تعریف :-

دائرہ اور بالعموم کسی منحنی کے عماد کی تعریف حسب ذیل کی جاتی ہے :

فرض کرو کہ F دائرہ پر ایک نقطہ ہے۔ اور F ق دائرہ کا مماس ہے۔

نقطہ ف میں سے ایک خط ف ع کھینچو جو ماس ف ق پر
 علی القوائم ہو۔



خط ف ع کو نقطہ ف پر دائرہ کا عماد کہتے ہیں۔

عماد کی مساوات :-

اس تعریف کی بناء پر ہم دائرہ کے عماد کی مساوات آسانی
 حاصل کر سکتے ہیں۔
 فرض کرو کہ دائرہ کی مساوات

$$(۱) \dots\dots\dots لآ + ما = ل' \dots\dots\dots$$

ہے اور نقطہ ف کے محدود (لا، ما) ہیں۔

ماس ف ق کی مساوات دفعہ (۳، ۴۱) میں ہم نے
 معلوم کی تھی

$$(۲) \dots\dots\dots لا لا + ما ما = ل' \dots\dots\dots$$

اب ہم کو اس خط کی مساوات معلوم کرنا ہے جو نقطہ (لا، ما) میں سے
 گزرتا ہے اور خط (۲) پر علی القوائم ہے۔ اگر مطلوبہ خط کا زاویہ محور لا کے

ساتھ معلوم ہو جائے تو ہم اس کی مساوات فوراً لکھ سکتے ہیں۔ فرض کرو کہ یہ زاویہ طہ ہے۔

دفعہ (۲، ۱۳) میں ہم نے دیکھا کہ اگر ایک خط

$$1 \text{ لا} + \text{ب} + \text{ما} + \text{ج} = .$$

کا زاویہ محور لا کے ساتھ عہ ہو تو

$$\text{مس عہ} = \frac{1}{\text{ب}}$$

اب اگر خط مستقیم (۲) کو لیا جائے تو

$$\text{مس عہ} = \frac{\text{لا}}{\text{ب}} \dots \dots \dots (۳)$$

چونکہ عماد حماس پر علی القوائم ہے اس لیے

$$\text{مس طہ} = \frac{1}{\text{مس عہ}}$$

$$\dots \dots \dots (۴) \quad \frac{\text{ب}}{\text{لا}} =$$

اب عماد کی مساوات ہم لکھ سکتے ہیں

$$\text{ب} - \text{ا} = \text{مس طہ} (\text{لا} - \text{لا})$$

$$= \frac{\text{ب} - \text{ا}}{\text{لا} - \text{لا}}$$

$$\text{یعنی لا} (\text{ا} - \text{ب}) = \text{ب} (\text{لا} - \text{ا})$$

$$\dots \dots \dots (۵) \quad \text{لا} = \frac{\text{ب} (\text{لا} - \text{ا})}{\text{ا} - \text{ب}}$$

$$\text{یعنی} \quad \frac{\text{لا}}{\text{ب}} = \frac{\text{لا} - \text{ا}}{\text{ا} - \text{ب}}$$

یہی عماد کی مطلوبہ مساوات ہے :- اس مساوات سے پتہ چلتا ہے کہ عماد مرکز میں سے گزرتا ہے کیونکہ مرکز یعنی مبدا کے محدود (۰.۰) مساوات کو پورا کرتے ہیں -

عماد کی یہ خصوصیت ہم کو ابتدائی علم ہندسہ سے بھی معلوم ہے کہ مرکز کو نقطہ تماس سے ملانے والا نصف قطر تماس پر علی القوائم ہوتا ہے -

مشاہدہ ۱۱ - ہمیں عماد یعنی ایسے خط کی مساوات مطلوب ہے

جو لا' با میں سے گزرتا ہے اور تماس لا لا' + ما' = لا' پر علی القوائم ہے - جیسا باب دوم دفعہ ۲۴۲ میں بیان ہوا ایسے خط کی مساوات فوراً لکھی جاسکتی ہے -

$$\frac{\text{لا} - \text{لا}'}{\text{لا}} = \frac{\text{ما} - \text{ما}'}{\text{ما}} \quad (\text{یعنی تماس کی مساوات میں لا کا سر})$$

یا بالعموم ایسے خط کی مساوات جو (لا' با) میں سے گزرے اور لا' + با + ج = ۰ پر علی القوائم ہو یہ ہوگی $\frac{\text{لا} - \text{لا}'}{\text{لا}} = \frac{\text{با} - \text{با}'}{\text{با}}$ طالب علم تصدیق کرے -

مشق ۱۱

(۱) مذکورہ بالا طریقہ سے دائرہ لا' + ما' + گ' لا + ۲ + ف' ما + ج = ۰ کے عماد کی مساوات دریافت کرو اور تصدیق کرو کہ عماد مرکز کو نقطہ تماس سے ملانے والا خط ہے -

جواب : (ما - با) (لا + گ) = (لا - لا') (ما + ف)

(۲) دائرہ لا' + ما' = ۲۵ کے تماس کی مساوات نقطہ (۳'۳) پر معلوم کرو -

جواب : ۲۵ = ۱۳ + ۱۲

(۳) دائرہ لا' + ما' = ۱۶۹ کے تماس کی مساواتیں نقاط (۵'۱۲) اور (۱۲'۵)

پر دریافت کرو اور بتاؤ کہ یہ دونوں تماس کس نقطہ پر قطع کرتے ہیں اور ان کا درمیانی

زاویہ کیا ہے۔

جواب: $۵۱۲ + ۵۱۲ = ۱۰۲۴$ - $۵۱۲ = ۵۱۲$ - ۱۶۹ حاسوں کا نقطہ تقاطع (۱۶۹) زاویہ
(۴) حاس وہ خط ہے جو مرکز کو نقطہ تماس سے ملانے والے نصف قطر پر عمود ہے۔
اس خاصیت کو استعمال کر کے دائرہ کے حاس کی مساوات اخذ کرو۔
(۵) سوال (۳) کے دائرہ کا عماد نقطہ (۱۲، ۵) پر دریافت کرو۔

جواب: $۵۱۲ - ۵ = ۵۰۷$

(۶) دائرہ $۱۲ + ۱۲ = ۲۴$ - $۵ = ۱۹$ کے نقطہ (۲، ۲) پر کے
حاس اور عماد کی مساوات دریافت کرو۔

جواب: $۵۱۲ - ۵ = ۵۰۷$ - $۱۲ + ۱۲ = ۲۴$

(۷) دائرہ $۱۲ + ۱۲ = ۲۴$ - $۵ = ۱۹$ کے مبداء پر کے حاس اور عماد
کی مساوات دریافت کرو۔

جواب: $۵۱۲ - ۵ = ۵۰۷$ - $۱۲ + ۱۲ = ۲۴$

۵، ۳: دائرہ اور خط مستقیم کا تقاطع :-

علم ہندسہ سے ہم کو معلوم ہے کہ ایک خط دائرہ کو بالعموم
دونوں نقطوں پر قطع کرتا ہے۔ اب ہم تحلیلی طور پر ان تقاطع نقطوں کو معلوم کرینگے
اور اسی کے ضمن میں یہ بھی دریافت کرینگے کہ دیا ہوا خط کس صورت میں
دائرہ کو مس کرتا ہے۔

فرض کرو کہ دائرہ کی مساوات

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (1)$$

ہے اور دیا ہوا خط مستقیم

$$y = mx + c \quad (2)$$

ہے۔ اگر ان کا ایک نقطہ تقاطع (۱، ۱) ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نقطہ دائرہ
پر بھی واقع ہوگا اور خط مستقیم پر بھی۔ اس لیے اس کے خندہ دائرہ اور خط مستقیم
دونوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ پورا کرینگے۔ اس طرح دو مجموعوں x اور y کو

دریافت کرنے کے لیے ہمیں دو ہمنزاد مساواتیں ملتی ہیں۔ ان سے حسب معمول ہم پہلے ایک مجہول کو ساقط کر کے دوسرے کی قیمت دریافت کر سکتے ہیں۔ اس لیے مساوات (۱) سے مائی قیمت کو مساوات (۲) میں درج کرنے پر حاصل ہوتا ہے:

$$\text{لا} + (\text{م} + \text{لا} + \text{ج}) = \text{لا} \quad (۳)$$

یعنی $\text{لا} + (\text{م} + \text{لا} + \text{ج}) = \text{لا}$ (۲)
 ہم دیکھتے ہیں کہ لا میں یہ ایک دوسرے درجہ کی مساوات ہے اور اس سے ہم کو بالعموم لا کی دو قیمتیں لا اور لا ملتی ہیں جن کو ہم فوراً لکھ سکتے ہیں پھر ہم کو مائی دو قیمتیں ان کے مماثل حسب ذیل حاصل ہوتی ہیں:-

$$\text{لا} = \text{م} + \text{لا} + \text{ج}$$

اور

$$\text{لا} = \text{م} + \text{لا} + \text{ج}$$

اس طرح دو نقاط تقاطع (لا، لا) اور (لا، لا) مل جاتے ہیں۔
 مشق: دائرہ لا + لا = ۲ اور محیط مستقیم لا + لا = ۱ کے
 نقاط تقاطع کے محدود دریافت کرو۔

جواب: (۱-۱) اور (۱/۲، ۱/۲)

اب مساوات (۴) پر ہم پھر غور کرتے ہیں۔ جبر و مقابلہ سے ہم کو معلوم ہے کہ اس مساوات کی دونوں اصلیں حقیقی ہونگی یا منطبق ہونگی یا خیالی ہونگی بموجب اس کے کہ جلد

$$(\text{م} + \text{ج}) - (\text{م} + \text{ج}) = \text{لا} \quad (۵)$$

کی قیمت مثبت ہو یا صفر ہو یا منفی ہو۔ پہلی صورت میں خط مستقیم دائرہ کو دو حقیقی نقطوں پر قطع کرے گا، دوسری صورت میں بظاہر صرف ایک ہی نقطہ ملتا ہے لیکن اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو اصل دو نقطے ہیں جو ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہیں کہ ان میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت میں

خط مستقیم دائرہ کو کسی حقیقی نقطوں پر قطع نہیں کرتا، یعنی خط بالکلیہ دائرہ کے باہر واقع ہوتا ہے، لیکن جن خیالی نقطوں پر یہ کاٹتا ہے ان کے محدود مل سکتے ہیں۔

جملہ (۵) کو ہم آسانہ شکل میں تحویل کرتے ہیں۔ اس کو پھیلانے پر


$$م'ج' - ج' - م'ج' + ل' (۱ + م')$$

یعنی $ل' (۱ + م') - ج'$ (۶)
حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا نقاط تقاطع کے حقیقی یا منطبق یا خیالی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ

$$ل' (۱ + م') - ج' \geq 0$$

یعنی یہ کہ

(۷) $ج' \geq ل' (۱ + م')$
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خط مستقیم کی مساوات میں $م'$ کی قیمت کو ثابت کر دیا جائے یعنی محور لا سے خط کا میلان مستقل رہے تو نقاط تقاطع کا حقیقی یا منطبق یا خیالی رہنا دراصل $ج'$ کی قیمت پر منحصر ہے۔
بالفاظ دیگر بے شمار متوازی خطوں میں سے بعض خط دائرہ کو دو حقیقی نقطوں پر کاٹیں گے بعض دائرہ کے تماس ہونگے اور باقی بالکلیہ دائرہ کے باہر واقع ہونگے۔ اس کی توضیح ذیل کی شکل سے بخوبی ہوتی ہے۔



اس شکل میں چار متوازی خط ہیں جن میں سے (۱) دائرہ کو دو حقیقی نقطوں

ف اور ق پر قطع کرتا ہے۔ (۲) اور (م) دائرہ کو بالترتیب نقاط اور ت پر مس کرتے ہیں اور (۳) بالکلیہ دائرہ کے باہر واقع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ متوازی خطوں کے ایک نظام میں سے صرف دو خط دائرہ کو مس کرتے ہیں۔ ان دونوں ماسوں کے لیے ج کی قیمت شرط (۶) سے حاصل ہوتی ہے یعنی

$$ج^۲ = ل^۲ (۱ + م)$$

یا
 $ج = ل \pm \sqrt{ل^۲ + ۱}$ (۸)
 اوپر کی بحث میں ہم نے م کی قیمت کی کوئی تخصیص نہیں کی تھی یعنی خط کے میلان کو بالکل اختیار ہی رکھا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ م کی چاہے کچھ ہی قیمت ہو اگر ج کو (۸) میں سے کسی ایک قیمت کے مطابق منتخب کیا جائے تو یہ خط ضرور دائرہ کو مس کرے گا یعنی خط مستقیم

$$م = لا \pm \sqrt{لا^۲ + ۱}$$
 (۹)

م کی ہر قیمت کے لیے دائرہ کو مس کرے گا۔
 م کو مختلف قیمتیں دینے سے خطوط (۹) کا ایک قبیلہ ملتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمام خط دائرہ لا + لا' = ل' کو مس کرتے ہیں یعنی دائرہ ان میں سے ہر ایک خط کو مس کرتا ہے۔ اس خاصیت کی بناء پر اعلیٰ ریاضی میں دائرہ لا + لا' = ل' کو خطوط مستقیم کے قبیلہ (۹) کا "لقاف" کہتے ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان طالب علموں کو تفرقی احصاء میں ملیگا۔

۱۵۳: ایک نقطہ سے دائرہ کے ماس :-

علم ہندسہ سے ہم کو معلوم ہے کہ ایک بیرونی نقطہ سے دائرہ کے دو ماس کھینچے جاسکتے ہیں اور اگر نقطہ خود دائرہ پر واقع ہو تو صرف

ایک ہی ماس کھینچا جاسکتا ہے اور اگر نقطہ دائرہ کے اندر ہو تو کوئی ماس نہیں کھینچا جاسکتا۔ اس کی تصدیق تحلیلی طور پر ہم آسانی کر سکتے ہیں۔
فرض کرو کہ کوئی نقطہ (لا، ما) ہے۔ ہم نے گذشتہ دفعہ میں دیکھا ہے کہ دائرہ کا کوئی ماس شکل

$$(۱) \quad م = لا + ۱ \sqrt{۲م + ۱} \dots\dots\dots (۱)$$

کا ہوگا جہاں ایک خاص ماس حاصل کرنے کے لیے م کی ایک مناسب قیمت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ پس کسی نقطہ (لا، ما) میں سے گزرنے والے ماس کو دریافت کرنے کے لیے سوال یہی رہ جاتا ہے کہ م کی یہ قیمت معلوم کی جائے۔

فرض کرو کہ نقطہ (لا، ما) میں سے کھینچا ہوا ماس خط مستقیم (۱) سے تو چونکہ نقطہ (لا، ما) اس خط پر واقع ہے اس لیے اس کے محدود مساوات (۱) کو پورا کرینگے یعنی

$$(۲) \quad م = لا + ۱ \sqrt{۲م + ۱} \dots\dots\dots (۲)$$

$$یا \quad م - لا = ۱ \sqrt{۲م + ۱}$$

$$یا \quad (م - لا)^2 = ۱ (۲م + ۱)$$

یا م کی قوتوں کے لحاظ سے ترتیب دینے پر مساوات ہو جاتی ہے

$$(۳) \quad م^2 - (لا^2 - ۲م + ۱) = ۰$$

م میں یہ ایک دوسرے درجہ کی مساوات ہے اور اس لیے اس سے م کی بالعموم دو قیمتیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ (لا، ما) میں سے گزرنے والے بالعموم دو ماس ہوتے ہیں۔

اب مساوات (۲) سے م کی جو دو اصلیں حاصل ہوتی ہیں وہ

حقیقی ہونگی یا منطبق یا خیالی بموجب اس کے کہ جملہ

$$(لا\ مآ) - (لا\ لآ) (مآ\ لآ)$$

مثبت ہو یا صفر ہو یا منفی ہو یعنی بموجب اس کے کہ

$$(لآ - لآ + لآ + مآ)$$

مثبت ہو یا صفر ہو یا منفی ہو یعنی بموجب اس کے کہ

$$لا + مآ \leq لآ \dots \dots \dots (۴)$$

اگر $لا + مآ < لآ$ تو ہم نے دفعہ (۲۱ و ۳) میں دیکھا ہے کہ نقطہ (لا، مآ) دائرہ کے باہر واقع ہے اور چونکہ اس صورت میں م کی دونوں اصلیں حقیقی ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیرونی نقطہ سے دائرہ کے دو تماس کھینچے جاسکتے ہیں۔

اگر $لا + مآ = لآ$ تو نقطہ (لا، مآ) دائرہ پر واقع ہے اور چونکہ اس صورت میں م کی دونوں اصلیں منطبق ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ پر کے کسی نقطہ سے صرف ایک ہی تماس کھینچا جاسکتا ہے۔

اگر $لا + مآ > لآ$ تو دفعہ (۲۱ و ۳) کے بموجب نقطہ دائرہ کے اندر واقع ہے اور چونکہ اس صورت میں م کی دونوں قیمتیں خیالی ہیں اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اندرونی نقطہ سے دائرہ کا کوئی تماس نہیں کھینچا جاسکتا۔

مثال (۱) ثابت کرو کہ خط مستقیم $۳ لا + ۳ مآ - ۱۷ = ۰$ دائرہ $لا + مآ - ۱۲ - لا - ۱۲ + ۳ مآ + ۳ لا = ۰$ کو مس کرتا ہے۔ نقطہ تماس کے محد بھی معلوم کرو۔

$$\text{خط کی مساوات سے ملتا ہے } ۳ لا + ۳ مآ - ۱۷ = ۰$$

یہ قیمت دائرہ کی مساوات میں درج کرنے سے

$$۰ = ۴۴ + \left(\frac{۱۴-۱۴}{۳} \right) ۱۳ - ۱۳ - ۲ \left(\frac{۱۴-۱۴}{۳} \right) + ۱۴$$

یعنی پھیلائے پر اور مختصر کرنے پر حاصل ہوتا ہے

$$۲۵ - ۱۴ = ۱۱۰ + ۱۴ = ۱۰۰ = ۰ \text{ یعنی } (۱۰ - ۱۵) = ۰ = ۱۴ - ۲ = ۲$$

اس مساوات کی دونوں اصلیں منطبق ہیں اس لیے معلوم ہوا کہ دیا ہوا خط دائرہ کو دو منطبق نقطوں پر کاٹتا ہے، یعنی دائرہ کا مماس ہے۔

$$۳ = \frac{۹}{۳} = \frac{۲ \times ۳ - ۱۴}{۳} = \frac{۱۴ - ۱۴}{۳} = ۰ \text{ اب چونکہ } ۱ = \frac{۱۴ - ۱۴}{۳}$$

پس خط دائرہ کو نقطہ (۳، ۲) پر مماس کرتا ہے۔

مثال ۲۔ دائرہ لا + ما - ۵ لا - ما + ۴ = ۰ کے ان مماسوں کی

مساواتیں دریافت کرو جو محور لا سے زاویہ طہ بناتے ہیں جہاں مماس طہ = ۳۔ نیز نقاط مماس کے متحد بھی معلوم کرو۔

محور لا سے زاویہ طہ بنانے والے عام خط کی مساوات

$$ما = مماس طہ = لا + ک = ۳ لا + ک ہوگی$$

اب ک کی ایسی قیمت معلوم کرنی چاہیے کہ یہ خط دائرہ کو مماس کرے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ مساوات

$$۰ = ۴۴ + (۳ لا + ک) - ۵ لا - (۳ لا + ک) + ۱۴ = ۴۴ + (۳ لا + ک) - ۵ لا - ۳ لا - ک + ۱۴ = ۴۴ - ۲ لا = ۰$$

سے حاصل ہونے والی لاکھ دووں اصلیں منطبق ہونی چاہئیں۔ مساوات کو پھیلا کر مختصر کرنے سے

$$۰ = ۴۴ + ۲ لا - ۲ (۳ لا + ک) + (۳ لا + ک) - ۵ لا - (۳ لا + ک) + ۱۴ = ۴۴ + ۲ لا - ۶ لا - ۲ ک + ۳ لا + ک - ۵ لا - ۳ لا - ک + ۱۴ = ۴۴ - ۶ لا - ۲ ک + ۱۴ = ۰$$

گلتا ہے۔ اگر اس مساوات کی دونوں اصلیں منطبق ہوں تو

$$۰ = ۴۴ - ۶ لا - ۲ ک + ۱۴ = ۰$$

یعنی $ک^۲ + ۲ک + ۲۴ = ۰$

پس $ک = ۲$ یا $ک = ۱۲$

اس لیے دائرہ کے مطلوبہ مماسوں کی مساواتیں ہوں گی

$$۱۲ - لا۳ = ۱ \quad ۲ - لا۳ = ۱$$

اب فرض کرو کہ مماس $۱۲ - لا۳ = ۱$ دائرہ کو نقطہ (ھ، ک) پر مس کرتا

ہے۔ نقطہ (ھ، ک) پر دائرہ کے مماس کی مساوات ہوں گی

$$لاھ + ماک - \frac{۵}{۴} (لا + ھ) - \frac{۱}{۴} (ک + ما) = ۰$$

$$یعنی لا (۵ - ۴ھ) + ما (۱ - ۲ک) - ۵ھ - ک = ۸$$

یہ سب فرض یہ مساوات اسی مماس کو تعبیر کرتی ہے جو مساوات $۱۲ - لا۳ = ۱$ سے تعبیر ہوتا ہے اس لیے

$$\frac{۸ + ۵ھ - ک}{۲} = \frac{۱ - ۲ک}{۱} = \frac{۵ - ۴ھ}{۳}$$

ان ہمزاد مساواتوں کو حل کرنے سے $ھ = ۱$ ، $ک = ۱$ حاصل ہوتا ہے۔

پس مماس $۱۲ - لا۳ = ۱$ دیے ہوئے دائرہ کو نقطہ (۱، ۱) پر مس کرتا ہے۔

اسی طرح دوسرے مماس $۱۲ - لا۳ = ۱$ کے نقطہ مماس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں ذیل کی ہمزاد مساواتیں حل کرنی پڑیں گی:

$$\frac{۸ + ۵ھ - ک}{۱۲} = \frac{۱ - ۲ک}{۱} = \frac{۵ - ۴ھ}{۳}$$

جن کو حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے $ھ = ۴$ ، $ک = ۰$

یعنی مماس $۱۲ - لا۳ = ۱$ دیے ہوئے دائرہ کو نقطہ (۴، ۰) پر مس کرتا ہے۔

مشق ۱۲

(۱) دفعہ (۳۵) کے طریقہ پر ہزار مساواتوں کو حل کرنے سے معلوم کرو کہ کس صورت میں خط مستقیم $۱ = م + لا + ب$ دائرہ

$$لا^۲ + ما^۲ + ۲گ لا + ۲ف ما + ج = ۰$$

کو مس کریگا۔

جواب: $م (ف - ۲ج) + ۲گ (ب + ف) + ۲ب$

$$۲ف پ + ج$$

(۲) دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۲۹$ کے ان مماسوں کی مساواتیں دریافت

کرو جو محور لا سے ۶۰° کا زاویہ بناتے ہیں۔

جواب: $۱ = لا + ۱۳$ اور $۱ = لا - ۱۳$

(۳) دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۲۵$ کے ان مماسوں کی مساواتیں دریافت

کرو جو خط $۳ لا + ۲م = ۰$ کے متوازی ہیں۔

جواب: $۳ لا + ۲م + ۱۳ = ۲۵$ اور $۳ لا + ۲م - ۱۳ = ۲۵$

(۴) دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۱۶$ کے ان مماسوں کی مساواتیں دریافت کرو

جو خط $ما - لا = ۰$ پر علی القوائم ہوں۔

جواب: $لا + ما + ۲۱ = ۰$ اور $لا - ما - ۲۱ = ۰$


(۵) ثابت کرو کہ اگر خط $\frac{لا}{ل} + \frac{ب}{پ} = ۱$ دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ج$ کو

مس کرے تو

$$\frac{۱}{ج} = \frac{۱}{ب} + \frac{۱}{ل}$$

(۶) ثابت کرو کہ خط $۳ لا - ۲م = ۰$ دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۱۳$

دفعہ میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہر بیرونی نقطہ سے دائرہ کے دو مماس کھینچے جاسکتے ہیں۔ فرض کرو کہ یہ مماس دائرہ کو بالترتیب نقاط ف اور ق پر ملتے ہیں۔ ان دو نقطوں ف اور ق کو ملانے والا خط ف ق وترِ تماس کہلاتا ہے۔
اب ہم اس وتر کی مساوات دریافت کریں گے۔



فرض کرو کہ ن کے محدود (لا، ما) ف کے محدود (لا، ما) اور ق کے محدود (لا، ما) ہیں اور دائرہ کی مساوات لا + ما = ر^۲ ہے
نقطہ ف پر کے مماس ف ن کی مساوات

$$(۱) \quad لا + ما = ر^۲$$

اور نقطہ ق پر کے مماس ق ن کی مساوات

$$(۲) \quad لا + ما = ر^۲$$

مگر چونکہ یہ دونوں مماس نقطہ ن میں سے گذرتے ہیں اس لیے محدود (لا، ما) مساواتوں (۱) اور (۲) کو پورا کرتے ہیں یعنی

$$(۳) \quad لا + ما = ر^۲$$

$$(۴) \quad لا + ما = ر^۲$$

اب مساوات

لا لا + ما با = لا (۵)
 پر غور کرو۔ یہ پہلے درجہ کی مساوات ہے اس لیے ضرور ایک خط مستقیم کو تعبیر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مساواتوں (۳) اور (۴) سے ظاہر ہے کہ خط مستقیم (۵) نقطوں ف (لا، ما) اور ق (لا، ما) میں سے گزرتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ وترِ تماس ف ق کی مطلوبہ مساوات (۵) ہے۔
 نتیجہ صریح۔ مدار و کو نقطہ ن سے ملانے والے خط کی مساوات

$$\frac{لا}{لا} = \frac{ما}{ما}$$

ہے۔ اس خط کا "م" یعنی محور لا سے میلان کا تماس $\frac{لا}{لا}$ ہے۔
 خط مستقیم (۵) کا "م" $\frac{لا}{لا}$ ہے اور اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وترِ تماس ف ق خط مستقیم "ون پر علی القوائم" ہے۔

مثال۔ نقطہ (۱-، ۴-) سے دائرہ لا + ما = ۲۵ کے وترِ تماس

کی مساوات معلوم کرو۔ نیز نقاطِ تماس کے محدوبی دریافت کرو اور اس طرح تماسوں کی مساوات بھی لکھو۔

چونکہ (۱-، ۴-) + (۱-، ۴-) < ۲۵ اس لیے دیا ہوا نقطہ دائرہ کے باہر واقع ہے۔ پس وترِ تماس کی مساوات ضابطہ (۵) میں لا = ۱-، ما = ۴- درج کرنے پر ملتی ہے۔

$$لا - ۴ = ۲۵ = لا + ما + ۲۵ = ۰$$

نقاطِ تماس وہ نقطے ہیں جہاں پر یہ دائرہ کو قطع کرتا ہے پس

$$ما = ۰ - \frac{لا + ۲۵}{۴} \text{ کو دائرہ کی مساوات میں درج کر کے حاصل شدہ}$$

مساوات کو حل کرنا چاہیے۔

$$\text{یعنی } ۲۵ = \left(\frac{۲۵ + ۱۱}{۲} \right) + ۱۱$$

جس کو پھیلا نے اور مختصر کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$۱۵۰ + ۱۱۵۰ - ۶۰۰ = ۰ \text{ یعنی } ۱۱ + ۱۱ - ۱۲ = ۰$$

اس مساوات کے دو حل $۱۱ = ۳$ اور $۱۱ = ۴$ ہیں۔

$$\text{اور } ۱ = ۱ - \frac{۲۵ + ۳}{۲} = ۴ - \frac{۲۵ + ۴}{۲} = ۳$$

پس نقاط تماس $(۳ - ۴)$ اور $(۴ - ۳)$ ہیں۔

نقطہ $(۳ - ۴)$ پر کے تماس کی مساوات

$$۱۱ - ۱۱ - ۲۵ = ۰ \text{ ہے}$$

اور نقطہ $(۴ - ۳)$ پر کے تماس کی مساوات

$$۱۱ - ۱۱ - ۲۵ = ۰$$

نقطہ $(۱ - ۱)$ سے جو دو تماس کھینچ سکتے ہیں ان کی مشترکہ مساوات

ہوگی

$$۰ = (۱۱ - ۱۱ - ۲۵) (۱۱ - ۱۱ - ۲۵)$$

یعنی

$$۰ = ۱۱۱۲ - ۱۱۱۲ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۵ + ۱۱۲۵ = ۰$$

۳، ۴: قطب اور قطبی۔

تعریف :- اگر دائرہ کے اندرونی یا بیرونی نقطہ ن سے

کوئی خط مستقیم کھینچا جائے جو دائرہ کو نقطوں ف اور ق پر قطع کرے تو ف اور ق پر کے تماس کے نقطہ تقاطع کا طریق ن کا قطبی بلحاظ دائرہ کہلاتا ہے۔ نقطہ ن کو قطب کہتے ہیں۔

آئندہ دفعہ میں ہم ثابت کریں گے کہ یہ قطبی ایک خط مستقیم ہے اور نیز اس کی مساوات بھی دریافت کریں گے۔

۳۷۱: قطبی کی مساوات — فرض کرو کہ n کے محدود (۱) ہیں اور دائرہ کی مساوات

$\lambda^2 + \mu^2 = r^2$ ہے۔
فرض کرو کہ n دائرہ کا کوئی وتر ہے جو نقطہ n میں سے کھینچا گیا ہے۔ اور فرض کرو کہ n اور n پر کے ماس نقطہ n پر قطع کرتے ہیں جس کے محدود (۱) ہیں۔
پس خط n و n پر کے ماس ہے نقطہ n میں سے کھینچے ہوئے ماسوں کا اور اس لیے n کی مساوات گزشتہ دفعہ کے بموجب

$$\lambda^2 + \mu^2 = r^2 \quad (1)$$

ہے۔ لیکن خط n نقطہ n (۱) میں سے گزرتا ہے اس لیے n کے محدود (۱) مساوات (۱) کو پورا کرتے ہیں پس

$$\lambda^2 + \mu^2 = r^2 \quad (2)$$

مساوات (۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ (۱) جو ایک متغیر نقطہ ہے ہمیشہ مساوات

$$\lambda^2 + \mu^2 = r^2 \quad (3)$$

کو پورا کرتا ہے۔ یعنی n کا طریق ایک خط مستقیم (۳) ہے۔ اور یہی نقطہ n کے قطبی کی مطلوبہ مساوات ہے۔

مشاہدہ — مساوات (۳) وہی ہے جو دفعہ گذشتہ میں وتر تمام (۵) کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نقطہ n (۱) دائرہ کے باہر واقع ہو تو اس کا قطبی وہی خط ہے جو نقطہ n سے کھینچے ہوئے دائرہ کے ماسوں کا وتر تمام ہے۔ اگر نقطہ n (۱) دائرہ کے محیط پر واقع ہو تو اس کا قطبی اس پر کے ماس کے ساتھ منطبق ہوتا ہے۔

اگر نقطہ n دائرہ کے اندر واقع ہے تو یہی مساوات (۳) سے ظاہر ہے کہ قطبی خط حقیقی ہے، دفعہ (۵۱) میں ہم نے دیکھا کہ اس نقطہ میں سے

کھینچے ہوئے دائرہ کے دونوں تماس خیالی ہونگے اور اس لیے ان کے نقاط تماس بھی خیالی ہونگے۔ لیکن دفعہ (۶، ۳) کے موافق عمل کرنے سے ہم دیکھیں گے کہ اندرونی نقطہ کے لیے بھی آخر میں جو مساوات وتر تماس کی حاصل ہوتی ہے وہ حقیقی ہے اور یہ مساوات وہی ہے جو اوپر قطبی کے لیے حاصل کی گئی۔ طالب علم کے لیے اچھی مشق ہوگی کہ اندرونی نقطہ سے تماسوں کے خیالی نقاط تماس معلوم کرے اور ان کو ملانے والے خط کی مساوات حاصل کرے۔ ایسا کرنے سے معلوم ہوگا کہ اگرچہ نقاط تماس خیالی ہیں مگر وتر تماس کی مساوات حقیقی ہے غرض کہ نقطہ ن کے اندر واقع ہونے کی صورت میں بھی وتر تماس کی مساوات

$$لا + ما = لا'$$

ہوگی اور یہی ن کے قطبی کی مساوات ہے۔

پس ہر صورت میں ہم قطبی کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں :-
ایک دیے ہوئے نقطہ کا قطبی وہ خط مستقیم ہے جو اس دیے ہوئے نقطہ سے کھینچے ہوئے تماسوں کے نقاط تماس کو ملائے۔

نیز ایک دیے ہوئے خط مستقیم کا قطب وہ نقطہ ہے جو اس خط مستقیم اور دائرہ کے (حقیقی یا خیالی) نقاط تقاطع آیں سے کھینچے ہوئے تماسوں کے قطع کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔

مثال - دائرہ لا + ما = ۱۶ کے لحاظ سے نقطہ (-۱، ۲) کا قطبی

معلوم کرو :-

نقطہ (-۱، ۲) دائرہ کے اندر ہے کیونکہ $(-۱)^2 + (۲)^2 = ۵ < ۱۶$
ضابطہ (۳) میں لا = -۱، ما = ۲ رکھنے سے قطبی کی مساوات فوراً حاصل ہوتی ہے

$$لا + ما = ۱۶ \text{ یعنی } لا - ۲ = ۱۶$$

۳، ۴ : اب ہم عام صورت میں جبکہ مبداء کو دائرہ کے مرکز پر نہ لیا جائے قطبی کی مساوات دریافت کریں گے۔
فرض کرو کہ دائرہ کی مساوات

لا + ما + گ + لا + ف + ما + ج = ۰
ہے اور دائرہ کے باہر کسی نقطہ ن کے محدود (لا، ما) اور اس سے کہیں گے ہوئے
ماسوں کے نقاط تماس ف اور ق کے محدود بالترتیب (لا، ما) اور (لا، ما)
ہیں (دیکھو پچھلی دفعہ کی شکل)

نقطہ ف پر کے ماس ف ن کی مساوات

$$\text{لا} + \text{لا} + \text{ما} + \text{ما} + \text{گ} + (\text{لا} + \text{لا}) + \text{ف} + (\text{ما} + \text{ما}) + \text{ج} = ۰ \quad (۱)$$

اور نقطہ ق پر کے ماس ق ن کی مساوات

$$\text{لا} + \text{لا} + \text{ما} + \text{ما} + \text{گ} + (\text{لا} + \text{لا}) + \text{ف} + (\text{ما} + \text{ما}) + \text{ج} = ۰ \quad (۲)$$

ہے۔ مگر چونکہ یہ دونوں ماس نقطہ ن میں سے گزرتے ہیں اس لیے
محدود (لا، ما) مساواتوں (۱) اور (۲) کو پورا کرتے ہیں یعنی

$$\left. \begin{aligned} \text{لا} + \text{لا} + \text{ما} + \text{ما} + \text{گ} + (\text{لا} + \text{لا}) + \text{ف} + (\text{ما} + \text{ما}) + \text{ج} &= ۰ \\ \text{لا} + \text{لا} + \text{ما} + \text{ما} + \text{گ} + (\text{لا} + \text{لا}) + \text{ف} + (\text{ما} + \text{ما}) + \text{ج} &= ۰ \end{aligned} \right\} \quad (۳)$$

اب مساوات

$$\text{لا} + \text{لا} + \text{ما} + \text{ما} + \text{گ} + (\text{لا} + \text{لا}) + \text{ف} + (\text{ما} + \text{ما}) + \text{ج} = ۰ \quad (۴)$$

پر غور کرو۔ یہ پہلے درجہ کی مساوات ہے اس لیے ضرور ایک خط مستقیم کو
تعبیر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مساواتوں (۳) سے ظاہر ہے کہ خط مستقیم (۴)
نقطوں ف اور ق میں سے گزرتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ دائرہ تماس ف ق
کی مساوات (۴) ہے۔

اب قطبی کی مساوات دریافت کرنے کے لیے ہم دفعہ (۳، ۴) میں
دی ہوئی تعریف کو استعمال کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ دائرہ کے اندر یا باہر کوئی نقطہ ن ہے جس کے محدود (لا، ما)
ہیں۔ اور نقطہ ن میں سے ایک دائرہ ف ق کہیں گے کیا ہے۔ نقاط اور ق
پر دائرہ کے ماس کہیں جو ضرور آپس میں دائرہ کے باہر ایک نقطہ س پر

قطع کرینگے۔ فرض کرو کہ نقطہ s کے محدود (h) ہیں۔ پس خط $ف ق$ وترِ تناس ہے نقطہ s میں سے کھینچے ہوئے نماوں کا اور اس لیے $ف ق$ کی مساوات (۴) کے بموجب

$$لا + ہ + ماک + گ (لا + ہ) + ف (ما + ک) + ج = ۰ \quad (۵)$$

ہے۔ لیکن خط $ف ق$ نقطہ n میں سے گزرتا ہے جس کے محدود ($لا + ہ$) میں اس لیے

$$لا + ہ + ماک + گ (لا + ہ) + ف (ما + ک) + ج = ۰ \quad (۶)$$

مساوات (۶) سے ظاہر ہے کہ نقطہ (h) جو ایک متغیر نقطہ ہے، ہمیشہ مساوات

$$لا + ہ + ماک + گ (لا + ہ) + ف (ما + ہ) + ج = ۰ \quad (۷)$$

کو پورا کرتا ہے یعنی s (h) کا طریق خط مستقیم (۷) ہے اور اس لیے تعریف کے بموجب دائرہ کے لحاظ سے n کے قطبی کی مطلوبہ مساوات (۷) ہے۔

مثال۔ دائرہ $لا + ہ + ماک + گ (لا + ہ) + ف (ما + ہ) + ج = ۰$ کے لحاظ سے نقطہ n ($\frac{1}{p}$ ، $-\frac{1}{p}$) کا قطبی دریافت کرو۔ نقطہ n کے محدود دائرہ کی مساوات میں درج کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ دائرہ کے باہر واقع ہے۔ پس نقطہ n کا قطبی یعنی وترِ تناس دائرہ کو حقیقی نقطوں $ف$ اور $ق$ پر قطع کرے گا۔

n کے قطبی کی مساوات ضابطہ (۷) میں $لا = \frac{1}{p}$ ، $ہ = -\frac{1}{p}$ درج کرنے پر نکال ہوتی ہے :

$$\frac{1}{p} - لا - \frac{1}{p} + ماک - \frac{5}{p} (لا + ہ) - \frac{1}{p} (ما + ہ) + ج = ۰$$

جس کو مختصر کرنے پر ملتا ہے

$$۰ = ۳ - لا + ماک$$

یہی قطبی کی مطلوبہ مساوات ہے۔ اب نقاط ف و ر ق کے محدود معلوم کرنے کے لیے اس مساوات کو دائرہ کی مساوات کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔

خط کی مساوات سے ملتا ہے: $۷۲ - ۳ = ۷۵$
دائرہ کی مساوات میں درج کرنے پر

$$۰ = ۴ + (۷۲ - ۳) - ۷۵ - (۷۲ - ۳) + ۷۵$$

یعنی

$$۰ = ۱۰ + ۷۵ - ۷۵$$

جس کی اصلیں ہیں $۱ = ۷۵$ ، $۲ = ۷۵$
اس کے مقابل حاصل ہوتا ہے $۱ = ۷۵$ ، $۱ = ۷۵$
پس دائرہ اور قطبی کے نقاط تقاطع $(۱'۱)$ اور $(۱'۲)$ ہیں
نقطہ $(۱'۱)$ پر دائرہ کے ماس کی مساوات

$$۰ = ۴ + (۱ + ۷۵) \frac{۱}{۴} - (۱ + ۷۵) \frac{۵}{۴} - ۷۵ + ۷۵$$

یعنی $۰ = ۲ - ۷۵ - ۷۵$

نقطہ $(۱'۲)$ پر دائرہ کے ماس کی مساوات

$$۰ = ۴ + (۱ - ۷۵) \frac{۱}{۴} - (۲ + ۷۵) \frac{۵}{۴} - ۷۵ + ۷۵$$

یعنی $۰ = ۱ + ۷۵ + ۷۵$

ان ماسوں کی مساواتوں سے ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے پر علی التوائم ہیں۔

۳، ۳: قطب کے محدود

فرض کرو کہ دیے ہوئے خط مستقیم کی مساوات

$$(۱) \quad ۰ = ۴ + ۷۵ + ۷۵$$

اور دائرہ کی مساوات

$$(۲) \quad ۰ = ۴ + ۷۵ + ۷۵$$

ہے۔ اور فرض کرو کہ مطلوبہ قطب کے محدود $(۱'۱)$ ، $(۱'۲)$ ہیں۔

تب مساوات (۱) نقطہ (لا، با) کے قطب کی مساوات ہے یعنی
مساوات (۱) اس خط کو تعبیر کرتی ہے جو مساوات

$$لا + ما + با = ۱۶ \dots\dots\dots (۳)$$

سے تعبیر ہوتا ہے۔ اس لیے مساواتوں (۱) اور (۳) میں لا کا سر
ما کا سر اور مستقل رقیں متناسب ہونی چاہئیں، یعنی

$$\frac{لا}{۱} = \frac{با}{۲} = \frac{۱۶ - ۱۶}{۳}$$

یعنی

$$لا = \frac{۱}{۳} (۱۶ - ۱۶) = ۰ \quad با = \frac{۲}{۳} (۱۶ - ۱۶) = ۰ \dots\dots\dots (۴)$$

مثال - خط مستقیم ۳ لا + ۵ با - ۴ = ۰ کا قطب لمحاظ دائرہ

معلوم کرو

فرض کرو کہ مطلوبہ قطب کے محدود (لا، با) ہیں تو قطب کی مساوات

$$لا + ما + با = ۱۶$$

ہوگی۔ یہ مساوات اور دی ہوئی مساوات دونوں ایک ہی خط کو تعبیر کرتی ہیں
اس لیے

$$۱۶ = \frac{۱۶}{۳} = \frac{۱۶}{۵} = \frac{۱۶}{۴}$$

$$\therefore لا = ۱۶، با = ۲۰$$

یعنی قطب کے محدود (۲۰، ۱۶) ہیں۔

۴۴ ۳ - اس دفعہ میں ہم قطبی خطوں سے متعلق ایک اہم

خاصیت ثابت کریں گے جو تحلیلی طریقہ سے ہندسی طریقہ کی نسبت جلد اور
آسانی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔

مسئلہ - اگر ایک دائرہ کے لمحاظ سے ایک دیے ہوئے نقطہ ف کا

قطبی ایک دوسرے دیئے ہوئے نقطہ ق میں سے گزرے تو اسی دائرہ کے لحاظ سے ق کا قطبی نقطہ ف میں سے گذریگا۔

فرض کرو کہ ف کے محدود (لا، پا) اور ق کے محدود (لا، پا) ہیں۔ اور دائرہ کی مساوات لا + پا = ز' ہے۔
نقطہ ف کے قطبی کی مساوات

$$(۱) \dots\dots\dots \text{لا} + \text{پا} = \text{ز}'$$

اور چونکہ قطبی نقطہ ق میں سے گزرتا ہے اس لیے محدود (لا، پا) مساوات (۱) کو پورا کرتے ہیں یعنی

$$(۲) \dots\dots\dots \text{لا} + \text{پا} = \text{ز}'$$

اب نقطہ ق کے قطبی مساوات

$$(۳) \dots\dots\dots \text{لا} + \text{پا} = \text{ز}'$$

ہے اور ثابت کرتا ہے کہ نقطہ ف کے محدود (لا، پا) اس مساوات کو پورا کریں گے۔ مساوات (۳) سے ظاہر ہے کہ درحقیقت ف کے محدود مساوات (۳) کو پورا کرتے ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ ق کا قطبی نقطہ ف میں سے گذرتا ہے۔ ایسے دو نقطوں ف اور ق کو دائرہ کے لحاظ سے مزدوج نقطے کہتے ہیں۔
مثال۔ فرض کرو کہ ایک دائرہ

$$(۱) \dots\dots\dots \text{لا} + \text{پا} = ۲۳ - ۶ + ۱۲ = ۲۹$$

اور دو نقطے ۱ (۱-۴) اور ۲ (۱۵-۲۲) دیئے ہوئے ہیں۔ ہم ثابت کریں گے کہ یہ دونوں نقطے دائرہ (۱) کے لحاظ سے مزدوج ہیں۔

نقطہ ۱ (۱-۴) کا قطبی بلحاظ دائرہ (۱) حسب ذیل ہے

$$\text{لا} - ۶ + ۲ - (۱ + ۱) + ۳ = ۲۳ - (۴ - ۶) = ۲۵$$

یعنی

$$(۲) \dots\dots\dots \text{لا} + ۶ + ۳ = ۳۶$$

اب چونکہ ۱۵ - ۲۲ = ۳۶ = اس لیے معلوم ہوا کہ نقطہ ۱ کا قطبی (۲)

نقطہ ب میں سے گزرتا ہے - اس طرح نقطہ ب (-۱۵، ۲۲) کا قطبی لمباؤ دائرہ (۱۱) حسب ذیل ہے:

$$= ۱۵ - ۱۱ - ۲۲ - ۲ - (۱۵ - ۱۱) ۲ + ۳ - (۲۲ - ۱۱) ۳ = ۲۳ -$$


$$(۳) \quad = ۵۹ + ۱۱۹ + ۱۱۴ \quad \text{یعنی}$$

اور چونکہ ۱۴ (۱) + ۱۹ (-۳) + ۵۹ = اس لیے نقطہ ب کا قطبی (۳) نقطہ ۱ میں سے گزرتا ہے -

پس نقاط ۱ اور ب مزدوج نقطہ ہیں -

۳۷۸: بیرونی نقطہ سے دائرہ کے مماس کا طول -

(۱) فرض کرو کہ ن ایک بیرونی نقطہ ہے جس کے محدود (۱، ۲) ہیں اور دائرہ کی مساوات $۱^2 + ۲^2 = ۱^2$ ہے -



فرض کرو کہ ن سے دائرہ کا ایک مماس ن ت ہے جس کا طول دیا گیا ہے -
چونکہ زاویہ وت ن قائم ہے، اس لیے

$$(۱) \quad \text{ن}^۱ = \text{دن}^۲ - \text{وت}^۱ \dots\dots\dots$$

$$(۲) \quad \text{ون}^۲ = \text{لا}^۱ + \text{با}^۱ \dots\dots\dots \text{لیکن}$$

$$(۳) \quad \text{وت}^۱ = \text{زا}^۱ \dots\dots\dots$$

$$(۴) \quad \text{ن}^۱ = \text{لا}^۱ + \text{با}^۱ - \text{زا}^۱ \dots\dots\dots \text{اس لیے}$$

(ب) دوسری صورت میں فرض کرو کہ دائرہ کی مساوات عام سے عام ہے جبکہ محور علی القوائم ہوں

$$\text{لا}^۱ + \text{ما}^۱ + ۲\text{گ} + \text{لا} + ۲\text{ف} + \text{ما} + \text{ج} = ۰$$

ہے، اگر لا اور ما کا سر اکائی نہ ہو بلکہ ۱ ہو تو مساوات کو ۱ پر تقسیم کر کے اسے اس شکل میں لے آنا چاہیے۔ اس صورت میں مرکز کے محدود (۰.۰) نہیں بلکہ (گ - ف) ہیں۔

$$(۵) \quad \text{ون}^۲ = (\text{لا} + \text{گ})^۱ + (\text{با} + \text{ن})^۱ \dots\dots\dots \text{پس}$$

$$(۶) \quad \text{وت}^۱ = (\text{نصف قطر})^۱ = \text{گ}^۱ + \text{ف}^۱ - \text{ج} \dots\dots\dots \text{اور}$$

$$\text{ن}^۱ = \text{ون}^۲ - \text{وت}^۱ \dots\dots\dots \text{پس}$$

$$= (\text{لا} + \text{گ})^۱ + (\text{با} + \text{ن})^۱ - (\text{گ}^۱ + \text{ف}^۱ - \text{ج})$$

$$(۷) \quad \text{لا}^۱ + \text{با}^۱ + ۲\text{گ} + \text{لا} + ۲\text{ف} + \text{ما} + \text{ج} = ۰$$

دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ محاسس کے طول کا مربع دائرہ کی مساوات میں نقطہ کے محدود درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

مشق ۱۳

- ۱۔ نقطہ $(۲، ۱)$ کا قطبی لمحاظ دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۹$ معلوم کرو۔
جواب: $لا = ۲ + ما = ۹$ ۔
 - ۲۔ خط $لا + ما = ۱۸$ کا قطب لمحاظ دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۳۶$ معلوم کرو۔
جواب: $(۴، ۲)$
 - ۳۔ نقطہ $(۴، ۳)$ سے دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۱۶$ کے مماس کا طول معلوم کرو۔
جواب: ۳
 - ۴۔ دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۳$ کے وہ مماس دریافت کرو جو محور $لا$ سے $(۱، ۰)$ کے اور (ب) ۴ کے زاویے بناتے ہیں۔
جواب: $(۱) ۱ = ۳، ۲ \pm ۳$ (ب) $ما = لا = ۱$
 - ۵۔ دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۸$ کے لمحاظ سے خط $لا = ۱$ کا قطب معلوم کرو۔
جواب: $(۲، -۸)$
 - ۶۔ دائرہ $لا^۲ + ما^۲ + ۱۱۲ - ۱۵ = ۰$ کے لمحاظ سے نقطہ $(۳، ۱)$ کا قطبی معلوم کرو اور ثابت کرو کہ نقطہ $(-۴، ۴)$ اس کا ایک مزدوج نقطہ ہے۔
 - ۷۔ ایک مثلث $ا ب ج$ کے اضلاع کی مساواتیں
 $۱۱۲ - ۱۵ = ۰$ ، $لا = ۱$ ، $۵ = ۵ + ۱۱۲ + ۱۵ = ۰$ ہیں۔
دائرہ $لا^۲ + ما^۲ = ۲۵$ دیا ہوا ہے۔ ثابت کرو کہ مثلث $ا ب ج$ کا ہر رأس بقیہ دو رأسوں کا مزدوج نقطہ ہے۔
- ۹، ۳: توضیحی مثالیں۔

۱۔ ایک نقطہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ن ثابت نقطوں سے اس کے فاصلوں کے مربعوں کا مجموعہ مستقل رہتا ہے۔ ثابت کرو کہ نقطہ کا طرہ

ایک دائرہ ہے۔

فرض کرو کہ دیے ہوئے نقطے 'ف'، 'ق'، 'ن'،، 'ج' ہیں جن کے محدود
بالترتیب (لا، لا)، (لا، لا)، (لا، لا)،، (لا، لا) ہیں۔ اور فرض کرو کہ
ایک متحرک نقطہ 'ق' ہے جس کے محدود (لا، لا) ہیں۔ اب

$$(ق، ف) = (لا - لا) + (لا - لا)$$

$$(ق، ق) = (لا - لا) + (لا - لا)$$

$$(ق، ن) = (لا - لا) + (لا - لا)$$

پس دی ہوئی شرط کے مطابق

$$= \{ (لا - لا) + (لا - لا) \} + \{ (لا - لا) + (لا - لا) \} + \dots + \{ (لا - لا) + (لا - لا) \} + \{ (لا - لا) + (لا - لا) \}$$

مستقل = م

یعنی پھیلائے پر

$$ن (لا + لا) - لا (لا + لا + لا + \dots + لا + لا) - لا (لا + لا + \dots + لا + لا)$$

$$(۱) \quad = \{ (لا + لا) + (لا + لا) + \dots + (لا + لا) + (لا + لا) - م \}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{فرض کرو کہ} \quad گ = \frac{لا + لا + \dots + لا + لا}{ن} \end{array} \right.$$

$$(۲) \quad \left\{ \begin{array}{l} ف = \frac{لا + لا + \dots + لا + لا}{ن} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} ج = \{ (لا + لا) + (لا + لا) + \dots + (لا + لا) - م \} \end{array} \right.$$

تو مساوات (۱) کی شکل حسب ذیل ہو جاتی ہے

$$لا + لا + گ + ف + ج = ۰$$

اس سے ظاہر ہے کہ مساوات (۱) دائرہ کو تعبیر کرتی ہے یعنی نقطہ 'ق' کا
طریق ایک دائرہ ہے۔ اس دائرہ کا مرکز (گ، ف) یعنی (ج، ج) ہے

اور نصف قطر سے ہوتو

$$\text{رہ} = \text{گ}^2 + \text{ف}^2 - \text{ج} = \frac{1}{4} \{ (\text{لا}^2) + (\text{با}^2) - \{ (\text{لا}^2 + \text{با}^2) - (\text{لا}^2 + \text{با}^2) - \text{م} \} \}$$

$$۲ - \text{خط مستقیم لا} + \text{ب} + \text{ما} + \text{ج} = .$$

$$\text{اور دائرہ لا}^2 + \text{ما}^2 + \text{اگ}^2 + \text{لا}^2 + \text{ف}^2 + \text{ما} + \text{س} = .$$

کے نقاط تقاطع کو مبداء سے ملانے والے خطوط مستقیم کی مساوات دریافت کرو۔ ہم کو معلوم ہے کہ مبداء میں سے گزرنے والے دو خطوط مستقیم کی مساوات دوسرے درجہ کی متجانس ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ درجہ دوم کی ایک ایسی متجانس مساوات دریافت کریں جس کو خط مستقیم اور دائرہ کے نقاط تقاطع کے محدود پورا کریں۔

فرض کرو کہ خط مستقیم دائرہ کو نقاط (لا، با) اور (لا، با) پر قطع کرتا ہے۔ تو

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{لا} + \text{با} + \text{ب} + \text{ما} + \text{ج} = . \\ \text{لا}^2 + \text{با}^2 + \text{اگ}^2 + \text{لا}^2 + \text{ف}^2 + \text{ما} + \text{س} = . \end{array} \right. \dots (۱)$$

اور

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{لا} + \text{با} + \text{ب} + \text{ما} + \text{ج} = . \\ \text{لا}^2 + \text{با}^2 + \text{اگ}^2 + \text{لا}^2 + \text{ف}^2 + \text{ما} + \text{س} = . \end{array} \right. \dots (۲)$$

اب ہم دائرہ کی مساوات کو خط مستقیم کی مساوات کی مدد سے متجانس

بنائیں گے۔ خط مستقیم کی مساوات سے ظاہر ہے کہ
 $\text{لا} + \text{ب} + \text{ما} = - \text{ج}$

$$\text{اور اس لیے } (\text{لا} + \text{ب} + \text{ما})^2 = - \text{ج} (\text{لا} + \text{ب} + \text{ما}) = - \text{ج}^2 \dots (۳)$$

اب دائرہ کی مساوات میں دوسرے عدد ج کی رقموں کو ج سے پہلے درجہ کی رقموں کو { - ج (لا + ب + ما) } سے اور مستقل رقم کو (لا + ب + ما) سے ضرب دیں تو

نظاہر ہے کہ اس سے مساوات میں کوئی فرق نہیں آئیگا اور تیز سب رستہ میں دوسرے درجہ کی ہو جائیگی۔ یعنی مساوات ہو جائیگی

$$\text{ج}^2 (\text{ا} + \text{ا}^2) - ۲ \text{ج} (\text{گ} + \text{ا} + \text{ف} + \text{ا}^2) + (\text{ا} + \text{ا}^2 + \text{ب} + \text{ا}^2) = ۰ \quad (۴)$$

مساوات (۴) درجہ دوم کی اور متجانس ہے اور اس لیے مبداء میں سے گزرنے والے دو خطوط مستقیم کو تعبیر کرتی ہے۔

اگر اس میں $(\text{ا} + \text{ا}^2)$ ابھرتی کریں تو مساواتوں (۱) کی بناء پر معلوم ہوتا ہے کہ مساوات (۴) پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح $(\text{ا} + \text{ا}^2)$ بھرتی کریں تو مساواتوں (۲) کی بناء پر معلوم ہوتا ہے کہ مساوات (۴) پوری ہوتی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ مساوات (۴) نقاط تقاطع کو مبداء سے ملانے والے خطوط مستقیم کی مطلوبہ مساوات ہے۔

اس مساوات کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں:

$$\text{ا}^2 \{ \text{ج}^2 - ۲ \text{ج} (\text{گ} + \text{ا} + \text{ف} + \text{ا}^2) + (\text{ا} + \text{ا}^2 + \text{ب} + \text{ا}^2) \} + \dots = ۰ \quad (۵)$$

یعنی

$$\text{ا}^2 + ۵۲ \text{ا} + \text{ا}^2 + \text{ب} + \text{ا}^2 = ۰ \quad (۶)$$

اگر ان دونوں خطوط کا درمیانی زاویہ نہ ہو تو دفعہ ۲۵۲ سے ہم کو معلوم ہے کہ


$$\text{مس فہ} = \frac{۲ - ۲\text{ا} - \text{ا}^2}{\text{ا} + \text{ا}^2}$$

۳۔ ایک ثابت نقطہ سے کوئی خط کھینچا گیا ہے جو ایک دیے ہوئے دائرہ کو نقطہ ف پر ملتا ہے۔ خط وف پر ایک نقطہ ق ایسا لیا گیا ہے کہ وق ہمیشہ مستغل رہتا ہے۔ ثابت کرو کہ ق کا طریق ایک دائرہ ہے۔

فرض کرو کہ ثابت نقطہ و کو ہم مبدا لیتے ہیں اور اس میں سے کسی قائم
محوروں کے لحاظ سے دیئے ہوئے دائرہ کی مساوات

$$لا + ما' + ۲گ + لا + ۲ف + ما + ج = ۰ \dots \dots (۱)$$

ہے۔ و میں سے محور لا کے ساتھ زاویہ طہ بناتا ہوا کوئی خط کھینچتے ہیں جو دائرہ
سے نقطہ ف پر ملتا ہے۔



فرض کرو کہ نقطہ ف کے محدود (لا، ما) ہیں اور فاصلہ وف = ر تو ظاہر
ہے کہ

$$لا = ر \text{ جسم طہ، } ما = ر \text{ جب طہ}$$

اور چونکہ نقطہ ف دائرہ پر واقع ہے اس لیے

$$لا + ما' + ۲گ + لا + ۲ف + ما + ج = ۰$$

$$\text{یعنی } ر \text{ جسم طہ} + ر \text{ جب طہ} + ۲گ + ر \text{ جسم طہ} + ۲ف + ر \text{ جب طہ} + ج = ۰$$

$$\text{یعنی } ر + ۲گ + ر \text{ جسم طہ} + ۲ف + ر \text{ جب طہ} + ج = ۰ \dots \dots (۲)$$

اب فرض کرو کہ ق کے محدود (لا، ما) ہیں اور وق = ر

$$\text{اس لیے } لا = ر \text{ جسم طہ، } ما = ر \text{ جب طہ} \dots \dots (۳)$$

(۴) یعنی $لا + ا = ر$

لیکن سوال میں دیا ہوا ہے کہ وف $\times$ وق مستقل ہے پس
 $رر = مستقل = ک$ (فرض کرو)

(۵) اس لیے $ر = \frac{ک}{ر}$

پس مساوات (۳) سے حاصل ہوتا ہے :-

(۶) جم طہ $= \frac{لا}{ر} = \frac{ر}{ک}$

جب طہ $= \frac{ا}{ر} = \frac{ر}{ک}$

جم طہ اور جب طہ کی یہ قیمتیں مساوات (۲) میں رکھنے سے حاصل

ہوتا ہے :

$ر + ۲گ ر = لا + ۲ف ر = ا + ج = ۰$

یعنی

(۷) $ر = ۱ + ۲گ ر = لا + ۲ف ر = ا + ج = ۰$

لیکن مساوات (۴) سے

$لا + ا = ر = \frac{ک}{ر}$

(۸) اس لیے $ر = \frac{ک}{لا + ا}$

ر کی یہ قیمت مساوات (۷) میں رکھنے سے

$۰ = ج + \left\{ ۱ + ۲گ ر = لا + ۲ف ر \right\} \frac{ک}{لا + ا}$

یعنی $(لا + ا)$ سے ضرب دینے پر اور پھیلانے پر حاصل ہوتا ہے :

$$(۹) \quad ج (لا + ما) + ۲ گ ک لا + ۲ ف ک ما + ک^۲ = \dots$$

جو ایک دائرہ کی مسادات ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نقطہ ق کا طریق ایک دائرہ ہے۔
 ۳۔ ایک دائرہ کے مرکز سے دو نقطوں کے فاصلے ان عمودوں کے طول کے
 متناسب ہوتے ہیں جو ایک نقطہ سے دوسرے کے قطبی خط پر ڈالے جائیں۔
 فرض کرو کہ دائرہ کا مرکز و ہے اور و کو مبدا مان کر دائرہ کی مسادات

ہے

$$(۱) \quad لا + ما = ز$$

نیز فرض کرو کہ کوئی دو نقطے ن اور ن ہیں جن کے محد بالترتیب (لا، ما)
 اور (لا، ما) ہیں۔

ن کا قطبی لمحاظ دائرہ (۱) کے

$$(۲) \quad لا + ما = ز$$

اور ن کا قطبی لمحاظ دائرہ کے

$$(۳) \quad لا + ما = ز$$

ہے۔ فرض کرو کہ نقطہ ن سے ن کے قطبی (۳) پر ڈالے ہوئے عمود کا
 طول ع اور نقطہ ن سے ن کے قطبی (۲) پر ڈالے ہوئے عمود کا
 طول ع ہے تو

$$(۴) \quad \frac{لا + ما - ز}{لا + ما} = ع$$

$$(۵) \quad \frac{لا + ما - ز}{لا + ما} = ع$$

اب فرض کرو کہ دائرہ کے مرکز و سے نقطہ ن کا فاصلہ ر اور ن کا فاصلہ
 ر ہے تو

$$(۶) \quad \sqrt{لا + ما} = ر \quad \sqrt{لا + ما} = ر$$

$$(۷) \quad \frac{ر}{ع} = \frac{\sqrt{لا + ما} \cdot \sqrt{لا + ما}}{لا + ما - ز} = \frac{ر}{ع}$$

پس

(۸) یعنی $\text{ع} : \text{ع} = \text{ا} : \text{ا}$ کے طول نقطوں کے فاصلوں کے متناسب ہوتے ہیں۔

ساز ۵۔ خط مستقیم لا + ب + ما + ج = ۰ کا قطب دائرہ

(۱) لا + ما + گ + لا + ف + ما + س = ۰ کے لحاظ سے دریافت کرو۔

فرض کرو کہ مطلوبہ قطب نقطہ (لا، ما) ہے جہاں لا، ما کی قیمتیں ہیں دریافت کرنی ہیں۔ ہم نے دفعہ (۳، ۲) میں معلوم کیا ہے کہ نقطہ (لا، ما) کا قطبی لمحاظ دائرہ (۱) کے حسب ذیل ہوتا ہے:

(۲) لا + ما + گ + (لا + لا) + ف + (ما + ما) + س = ۰
اب چونکہ ہر خط ایک دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے ایک اور صرف ایک ہی نقطہ کا قطبی ہوتا ہے اور اس کے برعکس کسی دیے ہوئے نقطہ کا ایک دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے ایک اور صرف ایک ہی قطبی خط ہوتا ہے اس لیے دی ہوئی مساوات لا + ب + ما + ج = ۰ اور مساوات (۲) دونوں ایک ہی خط مستقیم کو تعبیر کرتے ہیں۔ مساوات (۲) کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں:

(۳) لا (لا + گ) + ما (ما + ف) + گ + لا + ف + ما + س = ۰ ...

مساوات (۳) اور دی ہوئی مساوات لا + ب + ما + ج = ۰ میں لا اور ما کے سر اور مستقل رقیس متناسب ہونی چاہئیں۔

$$(۴) \quad \frac{\text{لا} + \text{گ}}{\text{ج}} = \frac{\text{ما} + \text{ف}}{\text{ب}} = \frac{\text{گ} + \text{لا} + \text{ف} + \text{ما} + \text{س}}{\text{ج}}$$

لا اور ما کو دریافت کرنے کے لیے یہ دو مساواتیں ہیں جن سے حسب ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں:

$$\frac{\text{لا} + \text{س} + \text{ب} + \text{گ} + \text{ف} - \text{ج} + \text{گ}}{\text{ج} - \text{ف} - \text{ب}} = \frac{\text{ب} + \text{س} + \text{ا} + \text{گ} + \text{ف} - \text{ج} + \text{ب}}{\text{ج} - \text{ف} - \text{ب}}$$

۶۔ ایک دائرہ س اور دو مثبت نقطے ف اور ق دیے ہوئے ہیں۔

دائرہ میں کے لحاظ سے ف اور ق کے قطبی خط ایک دوسرے کو نقطہ میں سے قطع کرتے ہیں۔ تو ثابت کرنا ہے کہ سر کا قطبی نقطوں ف اور ق میں سے گزرنے والا خط ہوگا۔

قطبی خطوں سے متعلق دفعہ ۳، ۴ میں دی ہوئی خاصیت استعمال کی جائے تو ثبوت فوراً مل جاتا ہے۔ یعنی چونکہ ف کا قطبی سر میں سے گزرتا ہے۔ اس لیے سر کا قطبی ف میں سے گزرے گا۔ اسی طرح ق کا قطبی چمکہ سر میں سے گزرتا ہے اس لیے سر کا قطبی ق میں سے بھی گزرے گا۔ پس سر کا قطبی خط ف ق ہے۔

لیکن دفعہ ۴، ۳ کے مسئلہ کو استعمال کیے بغیر بھی اس مسئلہ کو باراست ثابت کر سکتے ہیں۔ فرض کرو کہ دائرہ کی مساوات $\lambda^2 + \mu^2 = \nu^2$ ف کے محدود (λ, μ) اور ق کے محدود (λ', μ') ہیں۔ نیز فرض کرو کہ ف اور ق کے قطبیوں کے نقطہ تقاطع سر کے محدود (λ'', μ'') ہیں۔ ظاہر ہے کہ (λ'', μ'') ذیل کی مساواتوں سے حاصل ہونگے:

$$\lambda'' = \lambda + \lambda' - \nu$$

$$\mu'' = \mu + \mu' - \nu$$

$$(1) \quad \frac{(\lambda - \lambda')}{\lambda - \lambda'} = \lambda'' = \frac{(\lambda - \lambda')}{\lambda - \lambda'} \quad \text{جس سے ملتا ہے کہ} \quad \lambda'' = \frac{(\lambda - \lambda')}{\lambda - \lambda'} \quad \mu'' = \frac{(\mu - \mu')}{\mu - \mu'}$$

اب دائرہ میں کے لحاظ سے نقطہ سر (λ'', μ'') کے قطبی کی مساوات ہوگی

$$\lambda'' + \mu'' = \nu \quad \text{یعنی} \quad \lambda'' = \frac{(\lambda - \lambda')}{\lambda - \lambda'} + \frac{(\mu - \mu')}{\mu - \mu'} = \nu$$

یعنی

$$(\lambda - \lambda') + (\mu - \mu') = (\lambda - \lambda') + (\mu - \mu') = \nu$$

$$(\lambda - \lambda') + (\mu - \mu') = \nu$$

یعنی

$$(لا - لا) (لا - لا) = (لا - لا) (لا - لا)$$


یعنی

$$(لا - لا) (لا - لا) = (لا - لا) (لا - لا)$$

مسادات (۲) ایک ایسے خط کی مسادات ہے جو (لا، لا) اور (لا، لا) میں سے گزرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نقطہ سر کا قطبی نقطوں ف اور ق میں سے گزرتا ہے یعنی خط ف ق ہے۔

۷۔ ایک دائرہ س اور ایک ثابت نقطہ و دیا ہوا ہے۔ و میں سے ایک خط کسی سمت میں کھینچا جاتا ہے جو دائرہ کو نقاط ف اور ق پر ملتا ہے۔ دائرہ س کے لحاظ سے و کا قطبی خط ف ق کو نقطہ سر پر قطع کرتا ہے۔ ثابت کرتا ہے کہ و ف و سر اور و ق موسیقی سلسلہ میں ہونگے یعنی بالفاظ دیگر و اور سر خط ف ق کی موسیقی تقسیم کریں گے۔

دیے ہوئے ثابت نقطہ و کو مبداء اور اس میں سے گزرنے والے کوئی قائم محور لے۔ فرض کرو کہ دائرہ س کی مسادات لا + ما + اگ لا + ف + ج = ہے۔ خط و ف ق کا زاویہ محور لا سے طہ نقاط ف، سر، ق کے کارٹیزی محدود بالترتیب (لا، لا)، (لا، لا)، (لا، لا) اور قطبی محدود (ر، طہ)، (ر، طہ)، (ر، طہ) ہیں۔



فرض کرو کہ خط ف ق پر کوئی نقطہ ن ہے جس کے کارٹیزی محدود (لا، لا)

اور قطبی محدود (ر' طہ) ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ لا = رجم طہ = ما = رجب طہ
اب اگر نقطہ ن دائرہ پر واقع ہو تو (رجم طہ رجب طہ) دائرہ میں
کی مساوات پورا کرینگے پس

$$\text{یعنی} \quad \text{ر} + \text{ر} (گجم طہ + فجب طہ) = \text{ج} + \text{ج} = ۰ \quad (۱)$$

اس مساوات کی دو اصلیں ہیں اور مساواتوں کے نظریہ سے ہم کو معلوم
ہے کہ

$$\text{ر} + \text{ر} = ۰ - ۲ (گجم طہ + فجب طہ) \quad (۲)$$

$$\text{اور} \quad \text{ر} = \text{ج} \quad (۳)$$

نیز دائرہ میں کے لحاظ سے نقطہ و (۰، ۰) کی قطبی مساوات ہوگی

$$\text{لا} + (۰) + \text{گ} (۰ + لا) + \text{ف} (۰ + ما) + \text{ج} = ۰$$

$$\text{یعنی} \quad \text{گ} لا + \text{ف} ما + \text{ج} = ۰ \quad (۴)$$

چونکہ نقطہ س (ر' طہ) اس قطبی (۴) پر واقع ہے اس لیے

$$\text{گ} (رجم طہ) + \text{ف} (رجب طہ) + \text{ج} = ۰$$

$$\text{یعنی} \quad \text{ر} (گجم طہ + فجب طہ) + \text{ج} = ۰$$

$$\text{ر} = - \frac{\text{ج}}{\text{گجم طہ} + \text{فجب طہ}} \quad (۵)$$

اب مساواتوں (۲) اور (۳) سے قیمتیں درج کرنے پر ملتا ہے کہ

$$\text{ر} = - \frac{\text{ج}}{\text{گجم طہ} + \text{فجب طہ}} = \frac{\text{ر} + \text{ر}}{۲} = \frac{۱}{\text{ر}} + \frac{۱}{\text{ر}} \quad (۶)$$

اور مساوات (۵) سے حاصل ہوتا ہے کہ

$$(۷) \quad \frac{۲}{۳} = ۲ - \frac{۲}{۳} \quad \text{گ جم ط + ف جب ط}$$

پس (۶) اور (۷) کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ

$$(۸) \quad \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۳} = \frac{۲}{۳}$$

اور یہی شرط ہے کہ ر، ر، ر، موسیقی سلسلہ میں ہوں۔ پس ثابت ہو گیا کہ نقاط ذہن نقاط ف، ق کے موسیقی مزدوج نقطے ہیں۔

اعلیٰ ریاضی میں دائرہ اور بالعموم کسی دوسرے درجہ کے منحنی میں کے لحاظ سے نقطہ و کے قطبی کی تعریف اسی خاصیت کی بنا پر کی جاتی ہے کہ اگر وہ کسی سمت میں خط مستقیم کھینچا جائے جو منحنی کو نقاط ف اور ق پر ملے اور پھر خط ف ق پر ایک نقطہ س ایسا معلوم کیا جائے کہ د، س خط ف ق کو موسیقی نسبت میں تقسیم کریں تو س کے طریق کو منحنی میں کے لحاظ سے و کا قطبی کہتے ہیں۔

مشاہدہ (۱) - مساوات (۳) سے ظاہر ہے کہ مساوات (۱) کی دونوں اصلوں ر، ر کا حاصل ضرب مستقل ہے یعنی زاویہ طہ کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہم کو علم ہندسہ سے بھی معلوم ہے کہ اگر ایک ثابت نقطہ و میں سے کسی سمت میں دائرہ کا قاطع و ف ق کھینچا جائے تو و ف x و ق کی قیمت مستقل ہوتی ہے اور و سے کھینچے ہوئے فاس کے طول کے مربع کے مساوی ہوتی ہے۔

مشق ۱۲

دائرہ پر متفرق سوالات

۱۔ ایک نقطہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ایک ثابت نقطہ سے اس کے فاصلہ کا مربع ایک ثابت خط مستقیم پر اس نقطہ سے عمود کے طول کے متناسب ہے۔

ثابت کرو کہ نقطہ کا طریق دائرہ ہے۔

۲۔ خطِ مستقیم لا + ما - ۲ = ۰ اور دائرہ لا + ما - لا - ۲ = ۰ کے نقاطِ تقاطع کو مبدا سے ملانے والے خطوطِ مستقیم کی مساوات دریافت کرو اور ثابت کرو کہ یہ دونوں خط باہم علی التوا عم ہیں۔
جواب: لا - لا - ۲ = ۰

۳۔ ثابت کرو کہ اس دائرہ کی مساوات جس کا قطر نقاط (لا، لا) اور (لا، لا) کو ملانے والا خط ہے (لا - لا) (لا - لا) + (ما - ما) (ما - ما) = ۰ ہے۔
۴۔ دائرہ لا + ما = ۲ کے اس مماس کی مساوات دریافت کرو جو خط لا + ما + ۲ = ۰ کے متوازی ہے۔
جواب: لا + ما + ۲ = ۰

۵۔ ثابت کرو کہ خط ما = لا + ج مماس دائرہ لا + ما = ج کو مماس کرتا ہے۔ نیز اس کا نقطہ مماس معلوم کرو۔
جواب: (ج، ج) - (ج، ج)

۶۔ دائرہ لا + ما = ج کا وہ مماس دریافت کرو جو خط ما = لا پر عمود ہو۔
جواب: لا + ما - ج = ۰

۷۔ خط لا + ما = ج دائرہ لا + ما = ج کو جن نقطوں پر ملتا ہے ان کو ملانے والے وتر کا طول دریافت کرو۔
جواب: ۲

۸۔ اس دائرہ کی مساوات دریافت کرو جس کا مرکز نقطہ (۱، ۱) پر واقع ہو اور جو خطِ مستقیم لا + ما = ۱ کو مماس کرے۔
جواب: لا + ما - ۱ = ۰

۹۔ اس دائرہ کی مساوات دریافت کرو جو محوروں کو فاصلوں ۳ اور ۲ پر

قطع کرے اور مبدا میں سے گزرے -

جواب: $لا + ما^2 + لا^3 - ما^5 = 0$

۱۰۔ نقطہ $(۳، ۲)$ کا قطبی لمحاظ دائرہ $لا + ما^2 - لا^3 - ما^5 = 0$ کے معلوم کرو۔

جواب: محمد ما

۱۱۔ خط مستقیم $لا^2 + ما + لا^3 = 0$ کا قطب لمحاظ دائرہ $لا + ما^2$ کے معلوم کرو۔

جواب: $(۱، ۲)$

۱۲۔ نقطہ $(۶، ۷)$ سے دائرہ $لا^3 + ما^3 - لا^4 - ما^6 = 0$ کا طول معلوم کرو۔

جواب: $۳\sqrt{۹}$

۱۳۔ ثابت کرو کہ $ع$ کی تمام قیمتوں کے لیے خطوط مستقیم

$لاجم ع + ماجب ع = ۱$ ، $لاجم ع - ماجب ع = ب$ کے نقطہ تقاطع کا طریق ایک دائرہ ہے۔

۱۴۔ تین نقطوں $(۱، ۰)$ ، $(۲، ۳)$ ، $(۳، ۱)$ میں سے گزرنے والے دائرہ کی مساوات معلوم کرو اور مرکز کو مبدا مان کر اس مساوات کی تحویل کرو۔

جواب: $لا^2 + ما^2 - لا^3 - ما^5 = 0$

۱۵۔ ایک ایسے دائرہ کی مساوات معلوم کرو جو مبدا میں سے گزرتا ہے اور محوروں پر جسے $ا$ ، $ب$ کا لگتا ہے۔

جواب: $لا + ما - لا^2 - ب = 0$

۱۶۔ دائرہ $لا^2 + ما^2 = ۱۳$ آپر کے نقطہ $(۵، ۱۲)$ پر عماد کی مساوات معلوم کرو۔

جواب: $لا^3 - ما^5 = 0$

۱۷۔ دائرہ $لا + ما^2 + لا^3 = 0$ کے ان ماسوں کی مساواتیں میناں کرو جو محور $لا$ کے ساتھ ۵۴° کا زاویہ بنائیں۔

- جواب: $ا = لا + \frac{1}{1-لا}$ ، $ا = لا - \frac{1}{1+لا}$
- ۱۸۔ ثابت کرو کہ دائرہ $لا + ا = ا^2$ کے دو نقاط $(لا، ا)$ اور $(لا، ا)$ درمیانی منسلک کا مربع $۲ (لا - لا - لا)$ ہے۔
- ۱۹۔ اگر ایک نقطہ سے دوہم مرکز دائروں کے مماس کھینچے جائیں تو ثابت کرو کہ ان کے مربعوں کا فرق نقطہ مذکورہ کے مقام پر منحصر نہیں ہے۔
- ۲۰۔ ایک خط مستقیم کا قطب بلحاظ دائرہ $لا + ا = ا^2$ کے خط مستقیم $لا + ب = ا$ پر واقع ہوتا ہے۔ ثابت کرو کہ خط مستقیم کی مساوات $لا - ا^2 = ج (ا - ب)$ ہے جہاں ج کوئی مستقل ہے۔
- ۲۱۔ نقطہ و میں سے ایک خط کسی سمت میں کھینچا گیا ہے اور یہ ایک ثابت خط مستقیم کے نقطہ ن پر ملتا ہے۔ اگر دن پر ایک نقطہ ق ایسا لیا جائے کہ سطح ون $\times$ وق مستقل ہو تو ثابت کرو کہ ق کا طریق ایک دائرہ ہے۔
- ۲۲۔ دائرہ $لا + ا = ا^2$ کے لمحاظ سے نقاط $(۱، ۲)$ ، $(۳، ۱)$ کے قطبی خطوط معلوم کرو اور ثابت کرو کہ یہ تینوں خط ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں۔

جواب: $لا + ا^2 = ا^2$ ، $ا^2 = لا + ا^2$ ، $ا^2 = لا - ا^2$ ، $ا^2 = لا - ا^2$

- ۲۳۔ دائرہ $لا + ا = ا^2$ اور خط مستقیم $لا - ا = ۲۵$ کے نقاط تقاطع معلوم کرو اور ثابت کرو کہ ان نقاط تقاطع پر دائرہ کے مماسوں کی مشترک مساوات $(لا - ا = ۲۵ + ا)$ ، $ا^2 = ۲۵ (لا + ا - ۲۵)$ ہے۔
- جواب: $(۳، ۴)$ ، $(۴، ۳)$

- ۲۴۔ خط مستقیم $لا - ا = ۳$ دائرہ $لا + ا = ا^2$ کو جن نقطوں پر قطع کرتا ہے ان سے دائرہ کے مماس کھینچے گئے ہیں۔ یہ مماس ایک دوسرے کو نقطہ ن پر قطع کرتے ہیں۔ ن کے محدود معلوم کرو۔


جواب: $(\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$

۲۵ - ثابت کرو کہ نقطہ $(1, 3)$ کا قطبی دونوں دائروں
 $لا^2 + ما^2 - ۱۰لا + ۱۰ما + ۱۰ = ۰$ اور $لا^2 + ما^2 - ۸لا + ۶ما - ۱۰ = ۰$ کے
 لحاظ سے ایک ہی ہے۔

۲۶ - ثابت کرو کہ مساوات $(ما - لا + ۳)^2 + ۲(لا - ۲)(۲ + ما) = ۰$
 ایک دائرہ کو تعبیر کرتی ہے۔ نیز ثابت کرو کہ خطوط $لا = ۲$ اور $ما + ۲ = ۰$ اس
 دائرہ کے مماس ہیں۔

چوتھا باب

قطع مکانی



۱۴۔ مخروطی تراشیں۔ طالب علم مخروط

کی شکل سے واقف ہے مثلاً ساتھ کی شکل میں ایک دوہرا مخروط دکھایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یونانیوں نے مستقیم خطوط اور دائروں سے بنی ہوئی اشکال کے خواص زیادہ حد تک معلوم کر لیے تو مخروط کی طرف انہوں نے اپنی توجہ مبذول کی۔ قائم مستدیر مخروط کو اگر مستوی سطحوں سے تراشا جائے تو مستوی منحنی پیدا ہوتے ہیں،

یعنی ایسے منحنی جن پر کے تمام نقطے ایک مستوی میں (کاغذ یا بورڈ کی سطح میں) آسکتے ہیں۔ واضح ہو کہ اگر قائم مستدیر مخروط کو ایک مستوی سے محور کے علی القوایم کاٹا جائے تو دائرہ

پیدا ہوتا ہے، ○ اگر مستوی تراش محو کے ساتھ مائل ہو تو ناقص دایرہ ○


اگر تراش مخروط کے کون کے متوازی ہو تو مکانی 'پ' اور اگر تراش کا

میلان محور کے ساتھ اور کم ہو جائے اور تراش دونوں مخروطوں کو کاٹے تو دو شاخیں

ایک ہی منحنی کی دو مخروطوں پر پیدا ہوتی ہیں 'د' جسے قطع زائد کہتے ہیں۔




- ایپولونیس (Apollonius) نے ان تین مخروطی تراشوں پر ایک مبسوط رسالہ لکھا جو سولہویں صدی عیسوی تک بطور درسی کتاب کے استعمال میں رہا۔



اس نے مخروط کی وہی معتم شکل استعمال کر کے مخروطی تراشوں کے لیے یہ مشترک خاصیت حاصل کی کہ $\frac{ن ل}{و ل \times ل و} = \text{مستقل (ناقص) (دائرہ اور زائد کے لیے)}$

اور $\frac{ن ل}{و ل} = \text{مستقل مکانی کے لیے}$ ۔ اس نے مخروطی تراشوں کے ماسکے




اور ان کے بعض مشہور خواص معلوم کیے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ناقص کی

صورت میں $س ن + س ن = \text{مستقل} = ل و$ اور زائد کی

صورت میں $س ن - س ن = \text{مستقل} = ل و$ - اس کے

پانچ سو سال بعد پیمپس (اسکندریہ) نے مرتبوں



لال اور لال کو دریافت کیا اور یہ معلوم کیا کہ ہر مرتبہ ساتھ کے اسکہ سے متعلق ہے۔ اور تینوں مخروطی تراشوں کے لیے "ماسکہ مرتب" خاصیت یا تعریف حاصل کی۔ یعنی یہ کہ ہر مخروطی تراش میں $\frac{س}{ن} =$ مستقل (ز) منحنی بدن کے تمام مقامات کے لیے اور یہ نسبت

اگر کم ہو ایک سے یعنی $ز > ۱$ تو منحنی قطع ناقص

اگر برابر ایک سے $ز = ۱$ تو منحنی "مکانی"

اگر بڑی ایک سے $ز < ۱$ تو منحنی "زائد" ہوگا۔


پس ان ہندسی تعریفوں سے ہم مخروطی تراشوں کی مساواتیں اور ان سے ان کے تمام خواص حاصل کر سکتے۔

۲، ۴۔ قطع مکانی ایک مخروطی تراش ہے، اس کی

تعریف یہ ہے :-

تعریف ۱۔ کسی مستوی سطح میں ایک ثابت نقطہ (س) ہے اور ایک ثابت خط (ص ل) ایک نقطہ (ن) اُسی مستوی میں اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ثابت نقطہ سے اس کا فاصلہ ہمیشہ مساوی رہتا ہے ثابت خط سے اس کے عمودی فاصلہ کے (س ن = ن ل) ن کے طریق کو قطع مکانی کہتے ہیں۔


تعریف ۲۔ ایک مستوی میں دو ثابت علی القوائم خط ہیں، ایک نقطہ ن خطوں کے مستوی میں اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ایک خط سے اس کے عمودی فاصلہ کا مربع ایسے بدلتا ہے جیسے دوسرے خط سے اس کا عمودی فاصلہ $(\frac{ن}{د} = \text{مستقل})$



نقطہ ن کا طریق قطع مکانی کہلاتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں تعریفوں سے ایک ہی قطع مکانی ملتا ہے
فی الحقیقت یہ دونوں تعریضیں ایک ہی ہیں۔
تعریف ۱ کے بموجب متحرک نقطہ ن اس ہندسی ربط کو پورا کرتا ہے

$$س ن = ن ل$$

جہاں س ثابت نقطہ ہے اور ص ل ثابت خط ہے، اس ہندسی ربط کو
الجبر کے اعداد میں بیان کرنا مقصود ہے۔



س سے ثابت خط پر عمود س ص کھینچو۔ ص ثابت نقطہ حاصل ہوگا اور ص ص ثابت خط ہوگا۔

نیز س ص ثابت فاصلہ ملے گا۔ فرض کرو کہ س ص = ۱۲، اگر
س ص کی نقطہ ۲ پر تعصیف کی جائے تو فاصلہ ص ۲ = ۱۲ س = ۱ جہاں
۱ مستقل مقدار ہے۔

اب ہم دو ثابت غلطوں ص ل اور ص س کو بالترتیب محاورہ اور لا

لیتے ہیں۔ اور ان کے نقطہ تقاطع ص کو مبداء - واضح ہوں نقاط ص '۲' اس
تینوں ثابت نقطے ہیں ان میں سے گزرنے والے ص ل کے متوازی خط
ثابت خط ہونگے، نقاط ص '۲' اس میں سے کسی کو مبداء لیا جاسکتا ہے اور
خط ص میں کو محور لا اور ان نقطوں میں سے ص ل کے متوازی خط کو محور ما۔
سب سے پہلے ہم مبداء نقطہ ص پر لیتے ہیں اور ص میں کو محور لا اور ص ل
کو محور ما۔

نقطہ س کے محد ہیں (۱۲، ۰) اور متحرک نقطہ ن کے (لا، ۱)۔
اب ہندسی رشتہ 'ن کے طریق کے لیے ہے س ن = ن ل

یعنی س ن = ن ل

$$(لا - ۱۲) + ۲ = ۲ لا \quad \text{کیونکہ } ن ل = ط ص = لا$$

$$- ۳ لا + ۳ = ۲ لا + ۲ = ۰$$

یعنی ما = ۳ ل (لا - ۱) (۱)

یہ ن کے طریق یعنی قطع مکانی کی مساوات ہے مبداء ص اور محوروں
ص س، ص ل کے لحاظ سے۔ اب مبداء کو نقطہ ۱ پر لا اور محور لا
خط ۲ اس اور محور ما خط ۱ ل جو ص ل کے متوازی ہے (دیکھو شکل بالا)۔
واضح ہو کہ مبداء کو ہم ص سے ہٹا کر ۲ پر لیجانا چاہتے ہیں اور نئے محوروں کو
پُرانے محوروں کے متوازی (محور لا وہی رہتا ہے) رکھتے ہیں۔ نئے مبداء ۱
کے محد بلحاظ پرانے مبداء اور محوروں کے (۱، ۰) ہیں پس نئے اور پُرانے
محدوں میں رشتہ ہوگا۔

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(پیرانا) لا} = \text{(نیا) لا} + ۱ \\ \text{(") ما} = \text{(") ما} + ۰ \end{array} \right. \quad \text{پس مساوات (۱) کے لا، ما کی بجائے}$$

جہاں لا، ما نئے محد ہیں۔ (۱) میں اس اندراج سے نئی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$۲ ما = ۳ ل (لا + ۱ - ۱)$$

یعنی $\lambda^2 = \lambda + 1$ یا اگر یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اب محدود نئے ہیں تو زبر حذف کر دیے جاسکتے ہیں پس نئی مساوات ہے

$$\lambda^2 = \lambda + 1 \quad (1)$$

جو سادہ ترین شکل میں ہے جسے معیاری صورت کہتے ہیں یاد رہے یہ مساوات بلحاظ λ مبدا اور محاور λ اس اور λ کے ہے۔ ان محوروں کو اصلی محور کہتے ہیں۔

اگر λ کو مبدا لیا جائے اور λ کو محور λ اور λ میں سے λ کے متوازی خط λ محزوبہ کو محور λ تو چونکہ نئے مبدا λ کے محدود بلحاظ λ کے (λ^2) ہیں۔ اس لیے بلحاظ λ حوالہ کے نظام کے منحنی کی مساوات اس تحویل سے حاصل ہوگی۔

$$\lambda^2 = \lambda + 1$$

$$\lambda^2 = \lambda + 1$$

(۱) میں اس اندراج سے مساوات حاصل ہوگی

$$\lambda^2 = \lambda + 1$$

یا اگر یہ ذہن میں ہے کہ مبدا λ ہے اور محور λ اور λ ہیں تو زبر نکال دینے سے مساوات حاصل ہوتی ہے

$$\lambda^2 = \lambda + 1 \quad (1)$$


اسی طرح کوئی اور نقطہ مبدا لیا جاسکتا ہے اور اس میں سے گزرنے والے پُرانے محوروں کے متوازی خط نئے محور لیے جاسکتے ہیں اور منحنی کی مساوات کو نئے محوروں کے لحاظ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ منحنی وہی ہے منحنی نہیں بدلتا مگر اس کا جبر یہ نام یا مساوات بدل جاتی ہے جیسے مبدا

اور محوروں کو بدلا جائے۔

مساواتوں (۱)، (۱')، (۱'') سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکانی کی مساوات درجہ دوم کی ہے، درجہ دوم کی رقم ما ہے جو مربع کا بل ہے۔

واضح ہو کہ مکانی کی سادہ سے سادہ مساوات $ما = م + لا$ سے اس مساوات سے ہم اس کی شکل کا اندازہ لگاتے ہیں۔ نیز ہم دیکھینگے کہ مکانی کے تمام خواص اس مساوات میں مضمر ہیں انھیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

تعریف ۲ سے



مستوی میں دو ثابت خط و مرا اور ول ماہیں

اور $\frac{ن}{لا} = \frac{م}{لا}$ مستقل

خطوں کے تقاطع کو مبدا، و لا اور جس خط پر عمود کا مربع لیا جاتا ہے اس کو محور لا اور دوسرے کو محور ما۔ اب

چونکہ $ن = م = لا$ پس $ن$ کے طریق کی مساوات حاصل ہوتی ہے $\frac{ن}{لا} = \frac{م}{لا} = \text{مستقل} = (۱)$


تو مساوات ملتی ہے $ما = م + لا$ جو وہی مساوات ہے جو پہلے حاصل ہوئی۔

ولا (یعنی ما = ۰) کو مکانی کا محور کہتے ہیں اور وما کو راس پرکاس - ہم ابھی دیکھینگے کہ ان ناموں کی کیا وجہ ہے۔

۳ و ۴ - مکانی کی شکل

اگر ۱ مبدا، لا محور لا، ما محور ما ہو تو منحنی کی مساوات $ما = م + لا$ ہے

جہاں $۲س = ص۲ = ۱ -$



(۱) ہم دیکھتے ہیں کہ سبدار ۱ (۰، ۰) منحنی پر واقع ہے کیونکہ مساوات $۲ = ۱$ لایں (۰، ۰) مندرج کریں تو مساوات پوری ہوتی ہے۔

(۲) مساوات $۲ = ۱$ لایں سے $۲ = ۱ \pm ۱$ لایں اگر کو مثبت مقدار مانا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لایں کسی مثبت قیمت کے لیے، لایں دو مساوی اور مختلف علامت قیمتیں حاصل ہوتی ہیں،

یعنی ا کے دائیں جانب، خط ۱ میں لا پر لا کی کسی قیمت کے مثل، اوپر نیچے مساوی فاصلوں پر منحنی پر نقطے واقع ہیں، اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ منحنی (مکانی) محور لا ۱ میں لا کے گرد متشاکل ہے، یعنی اس خط سے اوپر منحنی کا جو حصہ ہے وہ نیچے حصہ کی عین تصویر ہے۔

نیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لامنتی ہو تو ± 2 یا ± 1 سے لا کی حقیقی قیمتیں نہیں ملتیں، یعنی منحنی پر کے نقطے خیالی ہیں، یعنی ا کے بائیں جانب منحنی کا کوئی حصہ واقع نہیں ہوتا۔ پس منحنی بالتمام ا کے دائیں جانب واقع ہوتا ہے اور خط ۱ میں لا کے گرد متشاکل ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر خط ۱ لا پر کے کسی نقطہ سے عمود یا معین کھینچا جائے تو اس پر کے نقطے ن اور ن مکانی پر واقع ہونگے۔


اگر $س ن = ل ن = ص م$ اور یہ ص م معین کے پایہ کا فاصلہ ہے مرتب سے، پس ن، ن حاصل کرنے کے لیے، ص کو مرکز مان کر، م ص کی دوری پر ایک قوس کھینچو جو معین کو ن اور ن پر کاٹے، پس ن، ن دو نقطے محور ۱ لا سے مساوی عمودی فاصلہ پر مل گئے۔ اس طرح بے شمار نقطوں کے جوڑے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جب م ص پر ہو تو م ص $= 2$ ، اس میں کے معین پر نقاط ن، ن فاصلہ ۱ پر واقع ہونگے، ان کو اگر خ اور خ سے تعبیر کیا جائے تو $س خ = خ س = 2$ نیز ہم جانتے ہیں $ا س = 1$ ، $ا خ س خ$ کو وتر خاص کہتے ہیں۔ جب م، ا کے پاس ہو تو مرتب سے اس کا فاصلہ تقریباً $ا ص$ کے مساوی ہوگا اور م سے $ا ص$ کی دوری پر نقطہ ا کے پاس دائیں جانب اوپر اور نیچے ایک دوسرے کے نہایت قریب دو نقطے ن، ن ملینگے، گویا ا ہا ان دو نقطوں میں سے گزرنے والا خط ہوگا یعنی ا ہا منحنی کا نقطہ ۱ پر ماس ہوگا۔ جیسے م دائیں جانب حرکت کریگا، م ص بڑھتا جائیگا اور س ن جو م ص کے مساوی ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا جائیگا۔ گویا دائیں جانب منحنی لا انتہا فاصلہ تک پھیلتا ہے۔

مثال ۳۔ اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ α ما نقطہ α پر مکانی کا ماس ہے اسے ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ α ما کی مساوات $\alpha = 0$ ہے خط α ما جہاں منحنی $\alpha = 2$ α کو کاٹتا ہے وہاں پر دونوں مساواتیں $\alpha = 2$ α اور $\alpha = 0$ پوری ہوتی ہیں پس نقاط تقاطع کے یہ $\alpha = 0$ یعنی $\alpha = 0$ اس کے قائل لا کی قیمتیں صفر اور صفر حاصل ہوتی ہیں یعنی نقاط تقاطع مبداء اور مبداء ہیں۔ پس خط α ما پر کا ماس ہے α کے α کو مکانی کا محور کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس خط گرد منحنی متساوی ہے اوپر اور نیچے کے حصے گویا اس خط میں ایک دوسرے کے عکس ہیں۔ اس کو محور α لیا گیا ہے۔

نقطہ α مکانی کا رأس کہلاتا ہے۔ معیاری صورت حاصل کرنے کے لیے اس کو مبداء مانا گیا ہے۔

خط α ما رأس پر کا ماس ہے اس کو محور α مانا گیا ہے۔

α م معین ہے اور α م ن دوہر معین کہلاتا ہے۔ α م و تر خاص کا طول $\alpha = 1$ یا $\alpha = 2$ واضح ہو کہ مساوات $\alpha = 2$ α ہندسی خطوط کی رقوم میں حسب ذیل ہوگی۔




$$\frac{\alpha}{\alpha} = \text{تر خاص کا طول} = \alpha \text{ یا } \alpha = \alpha \times \alpha$$


مثال ۱۔ منحنی $\alpha = 2$ α میں و تر خاص کا طول $\alpha = 2$

پہلی صورت میں لاجب مثبت ہے تو ما خیالی ہوتا ہے اس لیے
منحنی ا حا کے دائیں جانب واقع نہیں ہوتا۔ لاجب منفی ہے تو ما کی
دو حقیقی قیمتیں ہوتی ہیں۔ $\text{خ} = ۱$ اور $\text{س} = ۲$ $\text{خ} = ۱$ سے $\text{س} = ۲$
جس سے منحنی کی شکل کا اندازہ ملتا ہے پوری صحت کے لیے اور نقطے ترسیم
کیے جائیں۔

۱۔ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$
لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱



جب لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱
اسی طرح اور نقطے ترسیم کیے جائیں۔




۱۔ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$
لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱ لا ۲ = ۱
اسی طرح اور دائیں جانب ترسیم ہے اور دائیں جانب
۱۔ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$ $\text{س} = ۱$ $\text{س} = ۲$

مثال ۴ - ذیل کے منحنیوں کی ترسیم بناؤ $لا^۲ = ۴ و ما^۲ = ۴$ اور ایک ہی شکل میں $لا^۲ = ۴ \pm و ما^۲ = ۴ \pm$ اور $لا کی ترسیم بناؤ$ ۔


مسافات سے $ول^۲ = ۴ و لا^۲ = ۴$

یا $مرن^۲ = ۴ و م و م$

یا $مرن^۲ = ۴ و م (مستقل)$




پس ن کا طریق مکانی ہے جس کا محور محور ما ہے اور راس پر کا ماس محور لا اور وتر خاص خ خ $= م و$ م کی قیمت مثبت نہیں ہو سکتی کیونکہ لا کی قیمت خیالی ہوگی۔



ما کی ہر منفی قیمت کے لیے لا کی دو قیمتیں ہیں، منحنی محور ما کے گرد متماثل ہے اور محور لا سے بالتمام نیچے واقع ہوتا ہے۔

$لا^۲ = ۴ \pm و لا^۲ = ۴$ کے گرد متماثل شکل ایک منحنی محور ما کے دائیں جانب واقع ہے دوسرا بائیں جانب۔

$لا^۲ = ۴ \pm و لا^۲ = ۴$ کے گرد متماثل ہیں، ایک منحنی محور لا سے اوپر



واقع ہے دوسرا نیچے۔

یعنی $۲ا + ۲ا - ۲ا = ۰$
یا زبریں حذف کرنے سے نئی مساوات حاصل ہوتی ہے

(۱) $۲ا + ۲ا - ۲ا = ۰$
ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ دوم کی رقیں مربع کامل بناتی ہیں، مستقل رقم نئی مساوات میں بھی موجود نہیں کیونکہ نقطہ خ منحنی پر واقع ہے۔
فرض کرو کہ مبداء کو کسی نقطہ (ھ، ک) پر لے جاتے ہیں تو $۲ا = ۲ا$ ہو جائیگی۔


$$(۲ا + ک) = ۲ا (۲ا + ھ)$$

$$۲ا + ۲ا - ۲ا - ۲ا + ۲ا - ۲ا = ۰$$

پس اگر مستوی میں کے کسی نقطہ کو مبداء مانا جائے اور نئے حوالہ کے محور پڑانے محوروں کے متوازی رہیں تو تبدیل شدہ مساوات کی یہ شکل ہوتی ہے

$$۲ا + ۲ا - ۲ا - ۲ا + ۲ا - ۲ا = ۰$$

مثال ۱- منحنی $۲ا - ۲ا - ۲ا + ۲ا = ۰$ کو مرتسم کرو۔



ماوالی رقموں کو ایک ساتھ لے کر مربع کامل بنانے سے

$$(۳-۲) = ۲-۲ = ۲ (۳-۲)$$

مبداء کو (۳، ۲) پر لے جانے سے مساوات ہو جاتی ہے

$۲ا = ۲ا$ جو قطع مکانی ہے اور جس کا وتر خاص ۲ ہے۔

اس کی ترسیم یہ ہوگی۔


$$۲ا - ۲ا - ۲ا + ۲ا = ۰$$

مثال ۲- $۲ا - ۲ا - ۲ا + ۲ا = ۰$ کی ترسیم بناؤ۔

اس سوال میں لا مساوات میں شریک ہوتا ہے، اور ما شریک نہیں ہوتا اس لیے لا والی رقموں کو ایک ساتھ لے کر مربع کامل بنانے سے

$$(لا - ۲) = ۹ + ۶۲ = ۶۱ \quad (۹ - ۶) = ۳$$

مبادا کو (۲، ۹) پر لے جانے سے لا = ۶۲



اس مکانی کا وتر خاص ۲ ہے۔ اس کی ترسیم اوپر کی شکل میں دی گئی ہے اس میں نیا محور لا، اس پر کا ما س ہے اور نئے محور ما کا منفی حصہ مکانی کا محور ہے۔

منحنی پرانے محور لا کو کاٹتا ہے جہاں اصلی مساوات میں ما = رکھنے سے لا - ۲ = ۵ = ۵ یعنی لا = ۵ یا - ۱ (نقاطہ ص) منحنی پرانے محور ما کو کاٹتا ہے جہاں اصلی مساوات میں لا = رکھنے سے ما = ۵ (نقطہ ص)

مثال ۳۔ ان منحنیوں کو مرتب کرو، رأس کے محدّد و ترّ خاص کا طول اور اس کی مساوات، مرتب اور محور کی مساواتیں دریافت کرو۔

$$(ا) \quad ۲ - ۲ - ۱۱۲ + ۱۸ = ۰$$

$$(ب) \quad ۲ - ۱۱۲ - ۱۴ + ۵ = ۰$$

$$(ج) \quad ۲ - ۱۱۲ - ۱۲ + ۷ = ۰$$

جواب (ا) رأس (۰، ۳) و ترّ خاص کا طول $\frac{۱}{۲}$ ، مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ،

مرتب کی مساوات $۱ + ۱۱۸ = ۰$ ، محور کی مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ،

(ب) رأس (۱، ۳) و ترّ خاص کا طول $\frac{۱}{۲}$ ، اس کی مساوات $۱ = ۰$ ،

مرتب کی مساوات $۱ + ۲ = ۰$ ، محور کی مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ،

(ج) رأس (۱، ۱۱۲) و ترّ خاص $\frac{۱}{۲}$ ، مساوات $۱ + ۱۱۸ = ۰$ ،

مرتب کی مساوات $۱ + ۱۱۸ = ۰$ ، محور کی مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ،

مثال ۴۔ ذیل کے منحنیوں کے رأس، اس کے، و ترّ خاص معلوم کرو

اور و ترّ خاص، رأس پر کے، مرتب کی مساواتیں دریافت کرو۔

$$(ا) \quad (۱ - ۱۱۸) = ۰$$

$$(ب) \quad (۱ - ۱۱۸) = ۰$$

$$(ج) \quad ۲ - ۱۱۲ + ۱۸ - ۶ = ۰$$

$$(د) \quad (۱ - ۱۱۸) = ۰$$

جواب (ا) رأس (۱، ۳) ماسک (۱، ۳) و ترّ خاص طول $\frac{۱}{۲}$ ،

و ترّ خاص مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ، رأس پر کا ماس مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ، مرتب $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ،

(ب) رأس (۱، ۲) ماسک (۲، ۲) و ترّ خاص طول $\frac{۱}{۲}$ ،

و ترّ خاص مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ، رأس پر کا ماس مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ،

مرتب $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ،

(ج) رأس (۲، ۲) ماسک (۲، ۲) و ترّ خاص $\frac{۱}{۲}$ ،

و ترّ خاص مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ، رأس پر کا ماس مساوات $۱ - ۱۱۸ = ۰$ ،

پس $\bar{a} - \bar{a} = \bar{a}$ کے صفر یعنی $\bar{a} - \bar{a} = \bar{a}$ ثابت ہے باہر کے نقطہ (لا، با) کے لیے، کیونکہ $\bar{a} = \bar{a}$ اور $\bar{a} - \bar{a} = \bar{a}$ کے صفر یعنی $\bar{a} - \bar{a} = \bar{a}$ منفی ہے اندر کے نقطہ (لا، با) کے لیے، کیونکہ $\bar{a} = \bar{a}$ اسی طرح کسی باہر اور اندر کے نقطوں کے لیے مسئلہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

(ب) ہم جانتے ہیں کہ اگر مکانی کے مستوی میں، مبداء کو کہیں پر لے جائیں اور حوالہ کے محور، مکانی کے محور اور راس کے ماس کے متوازی رہیں تو مکانی کی مساوات اس شکل کی ہو جاتی ہے

$$\bar{a} + \bar{a} + \bar{b} + \bar{a} = \bar{c}$$

اسے یوں لکھ سکتے ہیں:

$$(\bar{a} + \bar{a}) = \bar{a} = \bar{a} - \bar{a} + \bar{c} = \bar{a} - \bar{a} + \bar{c} = \bar{a} - \bar{a} + \bar{c}$$

مبداء کو $(\bar{a} - \bar{a} + \bar{c})$ پر لے جاؤ اور محور پُرانے محوروں کے

متوازی رہیں۔ تب مکانی کی مساوات ہو جائیگی $\bar{a} = \bar{a} - \bar{a} + \bar{c} \dots (1)$

جہاں (لا، با) نئے محمد ہیں (لا، با) کے مائل اور ان میں رشتے ہیں

$$\bar{a} = \bar{a} - \bar{a} + \bar{c} \text{ اور } \bar{a} = \bar{a} + \bar{c}$$

اب اگر کوئی نقطہ مکانی کے باہر واقع ہو اور اس کے محمد بلحاظ پُرانے محوروں کے (لا، با) ہوں اور بلحاظ نئے محوروں کے (لا، با) تو

اسی دفعہ میں اوپر ہم نے ثابت کیا ہے کہ جب مساوات معیاری شکل میں ہو جیسے (۱) ہے تو محض نقطہ کے محدود درج کرنے سے جو جملہ $\begin{matrix} \text{ب}^2 + \text{ا}^2 \\ \text{ا}^2 + \text{ب}^2 \end{matrix}$ پیدا ہوگا وہ مثبت ہوگا۔
اب $\begin{matrix} \text{ب}^2 + \text{ا}^2 \\ \text{ا}^2 + \text{ب}^2 \end{matrix}$ مثبت ہے واضح ہو کہ یہ رشتہ نقطہ کے محدودوں (ا^2 ، ب^2) میں ہے جو لحاظ نئے محوروں کے ہیں۔ اسی رشتہ کو نقطہ کے حامل پرانے محدودوں میں بیان کرنے کے لیے رکھنا ہوگا $\text{ا}^2 = \text{ا} + \frac{\text{ج}^2}{\text{ا}}$ اور $\text{ب}^2 = \text{ب} + \frac{\text{ج}^2}{\text{ب}}$ پس رشتہ پرانے محدودوں کی رقوم میں ہو جاتا ہے کہ اگر $\text{ا} = \text{ب} + \frac{\text{ج}^2}{\text{ب}}$ مکانی کے باہر ہو تو

$(\text{ا} + \frac{\text{ج}^2}{\text{ا}}) + (\text{ب} + \frac{\text{ج}^2}{\text{ب}})$ مثبت ہوتا ہے
یعنی $\text{ا} + \text{ا} + \text{ب} + \text{ب} + \text{ج} + \text{ج}$ مثبت ہوتا ہے اور اسی طرح کے عمل سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جب نقطہ (ا^2 ، ب^2) مکانی کے اندر ہو تو $\text{ا} + \text{ا} + \text{ب} + \text{ب} + \text{ج} + \text{ج}$ منفی ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب نقطہ (ا^2 ، ب^2) مکانی کے اوپر ہو تو $\text{ا} + \text{ا} + \text{ب} + \text{ب} + \text{ج} + \text{ج} = 0$ ۔
پس یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ خواہ مکانی کی مساوات، زیادہ عام شکل $\text{ا}^2 + \text{ب}^2 + \text{ج}^2 = 0$ کی کیوں نہ ہو، $\text{ا} + \text{ا} + \text{ب} + \text{ب} + \text{ج} + \text{ج}$ صفر ہو جب اس کے کہ (ا^2 ، ب^2) مکانی کے باہر واقع ہو یا اندر۔

مثال ۱۔ اس کا سائنہ کرو کہ نقاط (۳^2 ، ۲^2)، (۱^2 ، ۵^2)، (۴^2)، (۲^2)، (۱^2 ، ۵^2) مکانی $\text{ا}^2 = ۲$ کے لحاظ سے کہاں واقع ہیں۔
 $\text{ا}^2 = ۲$ ، (۳^2 ، ۲^2) مساوات میں درج کرنے سے $۹ - ۴ = ۵$ ،

$$۲- [م ن + مآ (ل + م) + (ل + م) (لا + ما) = ۰$$

یعنی لا، ما میں درجہ دوم والی رقیس مربع کامل بناتی ہیں۔

لا، ما میں درجہ دوم کی عام سے عام مساوات

$$۱لا + ۲لا + لا + ب + ما + ۲گ + لا + ۲ن + ما + ج = ۰$$

اگر یہ قطع مکانی کو تعبیر کرے تو درجہ دوم کی رقیس مربع کامل بنائیں گی جس کے لیے شرط یہ ہے کہ $ا ب = ص$ ۔ اس کا عکس بھی درست ہے یعنی اگر درجہ دوم کی عام سے عام مساوات میں، درجہ دوم کی رقیس مربع کامل بنائیں تو مساوات سے جو منحنی تعبیر ہوتا ہے وہ قطع مکانی ہوگا۔

مثال ۱۔ مکانی کا اسکہ (۱-۱) ہے اور اس کا مرتب $۱۲ - ۱۳ + ۱ = ۰$ ۔

اس کی مساوات دریافت کرو۔

منحنی پر نقطہ (لا، ما) فرض کرو۔ نقطہ (لا، ما) کا فاصلہ (۱-۱) سے مساوی ہوگا اس کے عمودی فاصلہ کے خط $۱۲ - ۱۳ + ۱ = ۰$ سے۔

$$\frac{۱ + ۱۳ - ۱۲}{۱۳} \pm = \sqrt{(۱ + ۱) + (۱ - لا)}$$

$$۱۳ یعنی \{ (۱ - لا) + (۱ + ۱) \} = (۱۲ - ۱۳ + ۱)$$

$$۱۹ یعنی ۱۲ + ۱۳ - ۱۲ - ۱۳ + ۱۳ = ۰$$

$$۱۳ یعنی (۱۲ + ۱۳) - ۱۳ = ۰$$

ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ دوم کی رقیس مربع کامل ہیں۔

اور وتر خاص کا طول، اسکہ سے مرتب پر کے دو چند فاصلہ کے مساوی ہے


$$\frac{۱۲}{۱۳} = \frac{۱۲}{۱۳} = \frac{۱ + (۱ - ۱) \times ۲}{۱۳} \times ۲ = \text{وتر خاص}$$

مثال ۲۔ (۱) اُس مکانی کی مساوات دریافت کرو جس کا ماسک (۱) ہے اور مرتب لا + ۱ = ۰ اس کے وتر خاص کا طول بھی دریافت کرو۔

جواب م = ۲ لا + ۱ وتر خاص ۲ و
(ب) اُس مکانی کی مساوات مطلوب ہے جس کا ماسک (۲-۳) ہے اور مرتب لا - ۱ + ۱ = ۰

جواب (لا + ۱) - ۱ = ۱۵ + ۱۱۲ + ۱۱۰ وتر خاص طول ۳۱۶

۴۱ و ۴۲۔ مکانی کو مرتب کرنے کا حیلہ طریقہ۔



فرض کرو کہ ہمیں ایک مکانی مرتب کرنا ہے جس کا ماسک م ہے اور مرتب م م۔
م م پر ایک پیڑی کا کنارہ رکھو۔

اور ایک اور پٹری ل ن ع کو پٹری م م پر عمود وار رکھو۔

ایک بے ٹچک ڈوری جو جس کا طول پٹری ل ع کے طول کے مساوی ہو اور ڈوری کا ایک سر پٹری ل ع کے سر سے ل پر اور دوسرا سر ا ثابت نقطہ س پر باندھو۔ اب پنسل کی نوک کے ذریعہ ڈوری کو اس طرح تنا کر پکڑو کہ پنسل کی نوک ل ن پٹری ل ع پر رہے اور ڈوری کے دونوں حصے ل ن اور ن س تنے میں اگر ان شرائط کے ماتحت پٹری ل ع کو اس طرح ہٹایا جائے کہ ل ع عمود وار رہے م م پر تو پنسل کی نوک ل ن ایک مکانی مرسم کریگی۔ جس کا ماسکہ س ہے اور مرتب م م ہے۔

چونکہ ڈوری کا طول پٹری ل ن ع کے طول کے مساوی ہے

اس لیے $ل ن + ن س = ل ع = ل ن + ن ع$

اس لیے $ن س = ن ع$

یعنی متحرک نقطہ ن سے ثابت نقطہ س کا فاصلہ ثابت خط م م سے نقطہ ن کے عمودی فاصلہ ن ع کے مساوی ہے۔

اس لیے مکانی کی ماسکہ مرتب تعریف کی رو سے متحرک نقطہ ن کا طریق ایک مکانی ہوگا جس کا ماسکہ س ہے اور مرتب م م ہے۔

سوال :- ایک دائرہ ایک ثابت نقطہ میں سے گزرتا ہے اور ایک ثابت خط کو س کرتا ہے۔ دائرہ کے مرکز کا طریق معلوم کرو۔

۵ و ۴۔ مکانی کی مساوات $م = ل ا ل ا یے$ (۱) اس پر کے


دو نقطوں (لا، با) (لا، با) کے ملانے والے وتر کی مساوات دریافت کرو (ب) اس پر کے نقطہ (لا، با) پر ماس کی مساوات دریافت کرو۔ (ج) اس پر کے نقطہ (لا، با) پر عماد کی مساوات دریافت کرو۔ محمد علی القوائم ہیں۔

(۱) مستوی میں کے کسی دو نقطوں (لا، با) اور (لا، با)

کے ملانے والے خط کی مساوات (ابھی تک یہ ضروری نہیں کہ وہ مکانی پر واقع ہیں)

$$\frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_2} = \frac{l_1 - l_2}{l_1 - l_2}$$

$$\checkmark \quad m_1 - m_2 = (l_1 - l_2) \frac{m_1 - m_2}{l_1 - l_2}$$



محور قائم ہوں تو خط کا ڈھال $\frac{m_1 - m_2}{l_1 - l_2}$ ہے۔ اب اگر نقطے n, n' مکانی پر واقع ہوں تو

$$m_1 = m_2, l_1 = l_2 \quad \text{یعنی} \quad m_1 - m_2 = m_2 - m_1 = (l_1 - l_2)$$

$$\text{یعنی} \quad \frac{m_1 - m_2}{l_1 - l_2} = \frac{m_2 - m_1}{l_1 - l_2}$$

پس خط کی مساوات میں ڈھال کی یہ قیمت درج کرنے سے مکانی کے وتر کی یہ مساوات حاصل ہوتی ہے $m_1 - m_2 = (l_1 - l_2) \frac{m_1 - m_2}{l_1 - l_2}$

(ب) نقطہ (لا، ما) پر کے ماس کی مساوات حاصل کرنے کے لیے ہمیں وتر کی مساوات کی انتہائی شکل معلوم کرنا ہے۔ چونکہ نقطہ (لا، ما) مکانی پر حرکت کر کے نقطہ (لا، ما) کے بے حد قریب آجائے۔ اس لیے مطلوبہ ماس کی مساوات ہوگی

$$\frac{ما - لا}{لا - لا} = \frac{ما - لا}{لا - لا} = \left(\frac{ما - لا}{لا + لا} \right)$$

$$\text{یعنی } ما - لا = لا - لا = ۲ - لا$$

$$\text{یعنی } ما - لا = لا - لا = ۲ - لا \quad \text{کیونکہ (لا، ما) مکانی } ما = ۲ - لا \text{ پر کا نقطہ ہے}$$

$$\text{یعنی } ما = لا + لا = ۲$$

نوٹ :- ماس کی اس مساوات سے معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ (لا، ما) پر کے ماس کی مساوات حاصل کرنے کے لیے ہمیں مکانی کی مساوات میں ما کی بجائے ما اور لا کی بجائے (لا + لا) درج کرنا چاہیے۔ اسی کے قائل قاعدے ناقص اور زائد کی صورت میں بھی درست پائے جائیں گے۔

$$(ج) \text{ نقطہ (لا، ما) پر کے ماس کا ڈھال ہے } \frac{ما}{لا}$$

چونکہ مطلوبہ عماد نقطہ (لا، ما) پر کے ماس پر عمود وار ہے اس لیے عماد کا ڈھال = $\frac{ما}{لا}$ اس لیے (لا، ما) پر کے عماد کی مساوات ہے -

$$\frac{ما}{لا} - \frac{ما}{لا} = \frac{ما - لا}{لا - لا}$$

$$\text{یعنی } ما (لا - لا) + لا (ما - لا) = ۰$$

مثال (۱) مکانی ما = ۸ لا کے نقطہ ن (۲، ۴) پر کے ماس کی

مساوات حاصل کرو -

اولاً ہم دیے ہوئے نقطہ ن (۲، ۴) کے محدود مکانی کی مساوات میں درج کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ نقطہ ن (۲، ۴) مکانی ما = ۸ لا پر ہے

کیونکہ $(۴) = ۸ = (۲)$ فرض کرو کہ $(۴) = (۲)$ مکانی پر کا ایک اور نقطہ ہے۔

$$تب \quad ۸ = ۲$$

$$نیز \quad (۴) = ۸ = (۲)$$

$$۸ - ۲ = (۴) = ۸ - (۲)$$

$$یعنی \quad (۴ - ۲) = (۸ - ۲) = ۶$$

$$(۱) \quad \dots \dots \dots \frac{۸}{۴ + ۲} = \frac{۴ - ۲}{۲ - ۲} \quad \text{یعنی}$$

نقاط $(۴، ۲)$ اور $(۲، ۴)$ میں سے گزرنے والے خط کا ڈھال

$$(۱) \quad \frac{۸}{۴ + ۲} = \frac{۴ - ۲}{۲ - ۲} =$$

اس لیے نقاط $(۴، ۲)$ اور $(۲، ۴)$ میں سے گزرنے والے وتر کی مساوات ہوگی

$$(۲) \quad \dots \dots \dots \frac{۸}{۴ + ۲} = \frac{۴ - ۲}{۲ - ۲}$$

اب وتر کی مساوات (۲) کی انتہائی شکل جبکہ $(۲، ۴)$ مکانی پر حرکت کر کے نقطہ $(۴، ۲)$ کے بے حد قریب آ جاتا ہے اور بالآخر $(۴، ۲)$ پر منطبق ہوتا ہے مکانی کے نقطہ $(۴، ۲)$ پر کے ماس کی مساوات ہوتی ہے۔

اس لیے مکانی $۸ = ۲$ کے نقطہ $(۴، ۲)$ پر کے ماس کی مساوات ہے

$$۱ = \frac{۸}{۴ + ۲} = \frac{۸}{۴ + ۲} = \frac{۴ - ۲}{۲ - ۲}$$

$$۲ - ۲ = ۴ - ۲ \quad \text{یعنی}$$

یعنی لا - ۱ = ۲ + ۰
 نوٹ :- اگر ہم ماس کی مساوات کھنکھنے کے لیے دفعہ گذشتہ کے
 نتیجہ (ب) کو استعمال کریں تو مساوات حسب ذیل ہوگی $۲ + ۱ = (۲) ۱ = (۲ + ۱) ۲$
 یعنی $۲ + ۱ = ۱$
 یعنی لا - ۱ = ۲ + ۱
 یہ وہی مساوات ہے جو اوپر کی مثال میں ہم نے ابتدائی اصول سے
 حاصل کی ہے۔

مشقی سوالات ۱۵

(۱) مکانی ۱ = ۱۲ کے نقطہ (-۶، ۳) پر کے ماس کی مساوات ابتدائی
 اصول سے حاصل کرو۔

[جواب $۱ = ۳ - ۶ + ۱۲$]
 (۲) مکانی لا + ۱ = ۰ کے نقطہ (۲، -۱) پر کے ماس کی مساوات
 حاصل کرو۔

[جواب لا + ۱ = ۰]

مثال ۳- مکانی ۱ = ۱۲ - ۱۱ + ۶ = ۰ کے نقطہ (۶، ۵)
 پر کے ماس اور مادی مساواتیں حاصل کرو۔ عددی مثالوں میں سب سے پہلے
 ہمیں اس بات کی تصدیق کرنا چاہیے کہ دیا ہوا نقطہ ہی ہوئی ترسیم پر
 ہے یا نہیں۔

اس مثال میں (۵) - ۱۱ + ۶ = ۰ کے نقطہ (۶، ۵) پر کے ماس کی مساوات
 اس لیے دیا ہوا نقطہ (۶، ۵) دیے ہوئے مکانی پر ہے۔
 (یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دیا ہوا نقطہ دیے ہوئے مکانی پر نہ ہو تو اس
 نقطہ پر کے ماس کے کوئی معنی نہیں ہوتے)۔

یعنی لا - ۲ = ۴ + ۰
پس معلوم ہوا کہ مکانی ما - ۳ - لا ۲ = ۹ + ۰ کے نقطہ ن (۵'۶)
پر کے ماس کی مساوات لا - ۲ = ۴ + ۰ ہے۔
ماس کی اس مساوات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکانی کے نقطہ ن (۵'۶)
پر کے ماس کا میلان $\frac{1}{4}$

اس لیے اسی نقطہ پر کے عماد کا میلان ۲ - =
اس لیے مکانی کے نقطہ (۵'۶) پر کے عماد کی مساوات حسب ذیل ہوگی:-

$$۲ - = \frac{۵ - ۱}{۶ - ۱}$$

$$۱۲ + لا ۲ - = ۵ - ۱$$

یعنی
۰ = ۱۷ - ۱ + لا ۲

مشقی سوالات ۱۶

(۱) مکانی ما = ۳ لا کے نقطہ (۶'۹) پر کے عماد کی مساوات حاصل کرو اور اس عماد اور حوالہ کے محدودوں سے بننے والے مثلث کا رقبہ معلوم کرو۔

[جواب - عماد کی مساوات ہے $۳۳ - ۱ + لا ۳ = ۰$

مثلث کا رقبہ ہے $(۱۸۱ \frac{1}{4})$ مربع اکائی۔

(۲) مکانی ما = ۱۶ لا کے وتر خاص کے سروں کے محدود معلوم کرو۔
نیز وتر خاص کے سروں پر کے ماسات اور عمادوں کی مساواتیں معلوم کرو۔ نیسز
ان چار خطوط سے بننے والے مربع کا رقبہ معلوم کرو۔

[جواب - نقاط (۸'۴) (۸ - ۴) وتر خاص کے سرے ہیں۔ ان نقطوں

پر کے ماسات ہیں لا - ۱۶ + ۰ اور لا + ۱۶ + ۰ = ۰ اور عمادیں

لا + ۱۶ - ۰ اور لا - ۱۶ = ۰ مربع کا رقبہ ۱۲۸ مربع اکائی ہے۔

(۳۳) مکانی ما' = ۱۲ + ۱۴ + ۲ = ۰ کے نقطہ (۲، ۴) پر کے مماس اور عماد کی مساواتیں معلوم کرو۔

$$\left[\begin{array}{l} \text{جواب لا} - ۱۴ = ۱ + ۱۴ \\ ۰ = ۲۰ - ۱۴ + ۱۲ \end{array} \right]$$

(۳۴) مکانی لا' = ۱۴ - ۱۴ = ۰ کو مرتسم کرو۔ مکانی کے نقطہ (۳، ۶) پر کے مماس اور عماد کی مساواتیں معلوم کرو۔ نیز اس نقطہ پر کے مماس، عماد اور مکانی کے محور سے بننے والے مثلث کا رقبہ معلوم کرو۔

$$\left[\begin{array}{l} \text{جواب لا} - ۱۲ = ۹ - ۱۴ \\ ۰ = ۱۲ - ۱۲ + ۱۲ \\ \Delta \text{ کا رقبہ} = ۲۰ = \text{مربع اکائی} \end{array} \right]$$

✓ (۵) مکانی ما' = ۸ لا کے نقطہ (۴، ۲) پر کا عماد مکانی کے محور سے گگ پر ملتا ہے اور ن سے محور پر عمود ن ع نکالا گیا ہے۔ تصدیق کرو کہ ع گ کا طول مکانی کے نیم وتر خاص کے مساوی ہے۔

✓ (۶) تصدیق کرو کہ مکانی ما' = ۲ لا کے وتر خاص کے سروں پر کے مماسات ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر مکانی کے محور اور مرتب کے نقطہ تقاطع پر قطع کرتے ہیں۔

✓ (۷) مکانی ما' = ۴ لا کے نقطہ (۱، ۲) (۱، ۲) پر کا مماس اور عماد مکانی کے محور سے بالترتیب ت اور گ پر ملتے ہیں اور ن سے عمود پر عمود ن ع نکالا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ زیر مماس یعنی ت ع کا وسطی نقطہ مکانی کے راس ۲ پر ہے اور زیر عماد یعنی ع گ کا طول مکانی کے نیم وتر خاص کے مساوی ہے۔

[نوٹ۔ اولاً تصدیق کرو کہ ت کی ہر قیمت کے لیے نقطہ (۱، ۲) (۱، ۲) مکانی ما' = ۴ لا پر واقع ہوتا ہے۔]

۴ و ۳۔ مکانی ما' = ۲ لا اور خط مستقیم ما = م لا + ج کے نقاط تقاطع کے محدود معلوم کرو۔

دیے ہوئے مکانی اور دیے ہوئے خط مستقیم کا مشترک نقطہ یا نقطہ معلوم کرنے کے لیے ہم مکانی اور خط مستقیم کی مساواتوں کو ہمزاد مساواتوں کی طرح حل کرتے ہیں۔ اس فرض سے ان دو مساواتوں میں سے ایک نامعلوم مقدار مثلاً λ کو ساقط کرتے ہیں۔

λ کو ساقط کرنے کے لیے مکانی کی مساوات میں λ کی بجائے $(\mu + \lambda)$ درج کرو۔ حاصل ہوگا $(\mu + \lambda) = 2 = 2$ (۱)

یعنی $\mu + \lambda + 2 = 2$ (۲) (۱) + (۲) = ۰

یہ لائن درجہ دوم کی مساوات ہے۔ اس کی دو اصلیں ہونگی جو (۱) حقیقی اور مختلف یا (۲) حقیقی اور منطبق یا (۳) خیالی ہوسکتی ہیں۔ اور یہ اصلیں مکانی $\mu = 2$ اور خط مستقیم $\mu = \mu + \lambda$ کے نقاط تقاطع کے فصلوں کو تعبیر کرتی ہیں۔

فرض کرو کہ لائن درجہ دوم کی مساوات (۱) کی اصلیں λ اور μ ہیں۔ یعنی مکانی اور خط مستقیم کے نقاط تقاطع کے فصلے λ اور μ ہیں۔ ان کے جواب میں معینوں کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے ہم خط مستقیم کی مساوات $\mu = \mu + \lambda$ میں λ کی بجائے علی الترتیب λ اور μ درج کرتے ہیں اور اس طرح سے ترتیب وار نقاط تقاطع کے معین μ اور λ حاصل کرتے ہیں۔

λ کے جواب میں حاصل ہوتا ہے $\mu = \mu + \lambda$

اور μ کے جواب میں حاصل ہوتا ہے $\mu = \mu + \lambda$

اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ مکانی $\mu = 2$ اور خط مستقیم

$\mu = \mu + \lambda$ کے نقاط تقاطع (μ, λ) اور (μ, λ) کی اصلیں ہیں۔

مثال:- مکانی $\mu = 2$ اور خط مستقیم $\mu = \mu + \lambda$ کے

نقاط تقاطع معلوم کرو۔

مکانی اور خط مستقیم کے نقاط تقاطع کے فصلے معلوم کرنے کے لیے دی ہوئی دو مساواتوں میں سے λ کو ساقط کر کے لائن ایک مساوات

حاصل کرو۔
اس غرض سے مکانی کی مساوات میں ماکہ بجائے $۱۲ + ۶$ درج کرو۔

$$\text{حاصل ہوگا } ۱۲ + ۶ = ۱۸$$

$$\text{یعنی } ۱۸ - ۱۲ = ۶$$

$$\text{یعنی } ۱۸ - ۹ = ۹$$

$$\text{یعنی } (۱۸ - ۹) (۱۸ - ۱۲) = ۹۰$$

اس مساوات کی اصلیں ہیں ۱۱ اور ۹
پس معلوم ہوا کہ مکانی اور خط مستقیم کے نقاط تقاطع کے فصلے ۱ اور ۹
ہیں۔ فصلوں کی ان قیمتوں کے جواب میں نقاط تقاطع کے معینوں کی
قیمتیں معلوم کرنے کے لیے ہم خط مستقیم کی مساوات میں ۱۲ کی بجائے
ترتیب وار ۱۱ اور ۹ درج کرتے ہیں۔ ماکہ تناظر قیمتیں ہیں ۸ اور ۲۲
پس معلوم ہوا کہ مکانی $۱۲ = ۱۸$ اور خط مستقیم $۱۲ = ۱۸ + ۶$ کے
نقاط تقاطع (۱۸) اور (۲۲) ہیں۔

مشقی سوالات

(۱) مکانی $۱۲ = ۱۸$ اور خط مستقیم $۱۲ = ۱۸ + ۶$ کے نقاط تقاطع کے
محدود معلوم کرو۔

[جواب (۲۲) پر دو منطبق نقطے]

(۲) بتاؤ کہ خط مستقیم $۱۲ = ۱۸ + ۶$ مکانی $۱۲ = ۱۸$ کو مس کرتا ہے
یعنی دو منطبق نقطوں پر قطع کرتا ہے۔

[جواب نقطہ تماس (۲۲) ہے]
(۳) ثابت کرو کہ خط مستقیم $۱۲ = ۱۸ + ۶$ مکانی $۱۲ = ۱۸$ کو دو خیالی
نقطوں

پر قطع کرتا ہے۔
(۴) مکانی $ما^۲ = لا۲ + ا$ اور خط مستقیم $لا - ۲ = ما + ۲ = ۰$ کے
نقاط تقاطع کے محدّد معلوم کرو۔

اشارہ :- دیے ہوئے خط کی مساوات کو شکل $ما = \frac{۲+لا}{۲}$ میں
لکھو اور مکانی کی مساوات میں $ما$ کی بجائے $\frac{۲+لا}{۲}$ درج کرو۔

[جواب (۳،۴) اور (۱،۰)]

(۵) مکانی $لا - ۲ = ما - ۲ = ۰$ اور خط مستقیم $ما = لا - ۳ = ۰$ کے
نقاط تقاطع کے محدّد معلوم کرو۔

اشارہ :- خط کی مساوات شکل $لا = ما + ۳$ میں لکھو اور مکانی کی
مساوات میں $لا$ کی بجائے $ما + ۳$ درج کرو۔ اس طرح سے $ما$ میں درجہ دوم
کی ایک مساوات حاصل ہوگی جس کی اصلیں دیے ہوئے مکانی اور خط مستقیم کے
نقاط تقاطع کے معینوں کو تعبیر کریں گی۔ نقاط تقاطع کے معینوں کی ان قیمتوں
کے جواب میں خط مستقیم کی مساوات کی مدد سے نقاط تقاطع کے فضلوں کی
قیمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔

[جواب (۱-۲) (۳،۶)]

(۶) ثابت کرو کہ خط مستقیم $لا - ۲ = ما = ۰$ مکانی $ما - ۲ = لا + ۲ = ۰$
کو مس کرتا ہے۔ نیز نقطہ تماس کے محدّد معلوم کرو۔

[جواب (۲،۱)]

۴۶۱۔ تماس کی شرط۔

خط مستقیم $ما = لا + ج$ مکانی $ما = لا$ کو مس کریگا اگر اس
خط اور مکانی کے نقاط تقاطع منطبق ہوں۔ اس صورت میں دفعہ ۶۴ کی
مساوات (۱) یعنی $ما^۲ = لا^۲ + (م - ج - ۱)۲$ $ج = ۰$ کی
اصلیں مساوی ہوں گی۔ اس درجہ دوم کی مساوات کی اصلیں مساوی ہوں گی
اگر $(م - ج - ۱)۲ = ما^۲$ ج

یعنی اگر $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ م ج = ۰

یعنی اگر $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ م

پس معلوم ہوا کہ خط مستقیم م = م + ج مکانی م = ۲ ولا کو

میں کرچکا اگر ج = $\frac{1}{2}$

یعنی م کی ہر قیمت کے لیے خط مستقیم م = م + ج مکانی م = ۲ ولا

کو مس کرچکا۔ نقطہ تماس کے محدود معلوم کرنے کے لیے ہم مکانی م = ۲ ولا اور خط م = م + ج کو ہمزاد مساواتوں کی طرح حل کر کے ان کے

نقاط تقاطع (جو ایک دو ٹکڑے پر منطبق ہیں) کے محدود معلوم کرتے ہیں۔

مکانی کی مساوات م = ۲ ولا اور ماس کی مساوات م = م + ج میں سے م کو ساقط کرنے سے لا میں ذیل کی درجہ دوم کی مساوات حاصل

ہوتی ہے:

$$(م + لا + \frac{1}{2}) = ۲ ولا$$

$$یعنی م + لا + \frac{1}{2} - ۲ ولا = ۰$$

$$یعنی م + لا - \frac{1}{2} = ۰$$

$$یعنی (م + لا - \frac{1}{2}) = ۰$$

اس مساوات کی دونوں اصلیں مساوی ہیں اور ہر ایک اصل کی قیمت

$\frac{1}{2}$ ہے۔

پس معلوم ہوا کہ خط م = م + ج مکانی م = ۲ ولا کو جس نقطہ پر

مس کرتا ہے اس کا فاصلہ $\frac{1}{2}$ ہے۔ نقطہ تماس کا معین معلوم کرنے کے لیے ماس

کی مساوات میں لا کی بجائے $\frac{1}{2}$ درج کرو۔ حاصل ہوگا م = $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = ۱$

پس معلوم ہوا کہ خط م = م + ج مکانی م = ۲ ولا کو مس کرتا ہے

اور نقطہ تماس کے محدود $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ م کی ہر قیمت کے لیے خط مستقیم $ما = م لا + \frac{1}{م}$
 مکانی $ما^۲ = ۲ لا$ کو نقطہ $(\frac{1}{م}, \frac{1}{م})$ پر مس کرتا ہے۔

۶۲ و ۴۔ مکانی کی تبدیلی تعبیر

مکانی کے ماس $ما = م لا + \frac{1}{م}$ کا میلان م ہے اور ماس کے
 میلان م کی رقوم میں ماس کے نقطہ تماس کے محدود شکل $(\frac{1}{م}, \frac{1}{م})$
 میں حاصل ہوتے ہیں۔

اگر ہم $\frac{1}{م} = ت$ لکھیں تو نقطہ تماس کے محدود ہونگے

($ت^۲$ ، $۲ت$) اور ماس کا میلان $م = \frac{1}{ت}$
 چونکہ ت کی ہر قیمت کے لیے نقطہ ($ت^۲$ ، $۲ت$) مکانی $ما^۲ = ۲ لا$
 پر واقع ہوتا ہے اس لئے $لا = ۲ت$ ، $ما = ۲ت$ مکانی $ما^۲ = ۲ لا$
 کی تبدیلی تعبیر ہے۔ اس میں ت تبدیل ہے اور تبدیل ت کی قیمت
 اور نقطہ زیر بحث پر کے ماس کے میلان م میں ذیل کا رشتہ
 درست ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مکانی $ما^۲ = ۲ لا$ پر کے کسی نقطہ کے
 محدود ایک تبدیل کی رقوم میں معلوم ہوں تو تبدیل کی رقوم میں اس نقطہ پر کے
 ماس کا میلان معلوم ہو سکتا ہے اور ماس کی مساوات بھی فوراً
 لکھی جاسکتی ہے۔

۴ و ۴۔ عماد کی مساوات۔ مکانی $ما^۲ = ۲ لا$

کے نقطہ ن ($ت^۲$ ، $۲ت$) پر کے ماس کا میلان $م = \frac{1}{ت}$
 اس لیے اس نقطہ پر کے عماد کا میلان $ت = ت$
 اس لیے نقطہ ($ت^۲$ ، $۲ت$) پر کا عماد وہ خط مستقیم ہے جو

نقطہ (۱ت' ۲ت) اس سے گزرتا ہے اور جس کا میلان = - ت

اس لیے نقطہ (۱ت' ۲ت) پر کے عماد کی مساوات ہوگی

$$(۱ - ۲ت) = - ت (۱ - ۲ت)$$

یعنی ۱ + ت لا = ۲ت + ۱ت (۱)

مشقی :- مکانی ما' = ۸ لاکے نقطہ (۴' ۲) پر کے عماد کی

مساوات اوپر کے ضابطہ کی مدد سے لکھو۔

مکانی کی دی ہوئی مساوات کا مقابلہ معیاری مساوات ما' = ۴ لا

کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲ = ۱

اگر دیئے ہوئے نقطہ (۴' ۲) پر متبادل کی قیمت ت ہو تو نقطہ کے

محدود ہونگے (۱ت' ۲ت) یعنی (۲ت' ۴ت)

لیکن دیئے ہوئے نقطہ کے محدود (۴' ۲) ہیں -

اس لیے ۲ت' = ۲

اور ۴ت = ۴

اس سے حاصل ہوتا ہے کہ ت = ۱

اس لیے عماد کی مندرجہ بالا مساوات (۱) کی مدد سے دیئے ہوئے مکانی کے

نقطہ (۴' ۲) پر کے عماد کی مساوات ذیل کی شکل میں حاصل ہوتی ہے

$$۱ + (۱) لا = ۲ + ۱ \times ۲ \times ۲ (۱)$$

یعنی لا + ۱ = ۶ + ۴ (۱) + ۴ (۱)

نوٹ :- عماد کی یہ مساوات دفعہ ۵ (ج) کے طریقہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے -

۸ و ۴ - منحنی اور خط مستقیم کے نقاط تقاطع اور

تاس کی شرط - اگر کسی منحنی اور خط مستقیم کی مساواتیں دی گئی ہوں تو منحنی اور خط مستقیم کے نقاط تقاطع کے محدود معلوم کرنے کے لیے ہم منحنی اور خط مستقیم کی مساواتوں کو ہمزا د مساواتوں کی طرح اعل کرتے ہیں -

اگر منحنی کی مساوات درجہ دوم کی ہو تو منحنی اور خط مستقیم کے دو تقاطع قائل ہونگے جو (۱) حقیقی اور مختلف یا (۲) حقیقی اور منطبق یا (۳) خیالی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں تقاطع قاطع منطبق ہوں تو دیا ہوا خط مستقیم دیے ہوئے منحنی کو مس کرتا ہے یعنی خط مستقیم منحنی کا مماس ہے۔ مندرجہ بالا اصول کو استعمال کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کس شرط کے پورا ہونے پر ایک دیا ہوا خط ایک دیے ہوئے منحنی کو مس کرتا ہے۔ یعنی مماس کی شرط معلوم کر سکتے ہیں۔

مثلاً دفعہ ۴ میں یہ ثابت کیا گیا کہ خط مستقیم $MA = M + LA + J$ مکانی

$$MA = 2 \text{ ولا کو مس کرے گا اگر } J = \frac{1}{M}$$

یعنی مکانی $MA = 2 \text{ ولا اور خط مستقیم } MA = M + LA + J$ کے مماس کی شرط $J = \frac{1}{M}$ ہے۔

مثال :- معلوم کرو کہ J کی کس قیمت کے لیے خط مستقیم

$LA - MA + J = 0$ مکانی $MA - LA - 62 + 9 = 0$ کو مس کرتا ہے۔
نیز J کی اس قیمت کے لیے نقطہ مماس کے عدد معلوم کرو۔
دیے ہوئے خط کی مساوات ذیل کی شکل میں لکھی جاسکتی ہے:

$$\frac{J + LA}{2} = 1$$

اس لیے مکانی اور خط مستقیم کے تقاطع قاطع کے فصلے ذیل کی مساوات کی اصلیں ہیں :-

$$0 = 9 + (J + LA) - 62$$

$$0 = 36 + (J + LA) - 62$$

$$\text{یعنی } LA + 2(J + LA) - 62 = 0 \quad (1)$$

دیا ہوا خط مستقیم مکانی کو مس کر گیا اگر اس مساوات کی اصلیں مساوی ہوں۔

$$\text{یعنی اگر } (ج - ۱۰) = (۳۶ - ۴ ج + ج^۲)$$

$$\text{یعنی اگر } ۱۶ ج = ۶۴$$

$$\text{یعنی اگر } ج = ۴$$

پس معلوم ہوا کہ خط مستقیم لا - ۱۲ + ۴ = مکانی ما - ۳ - لا - ۱۲ + ۹ = ۰ کو مس کرتا ہے۔

اگر ج = ۴ تو مساوات (۱) ہو جاتی ہے

$$\text{لا}^۲ - ۱۲ لا + ۳۶ = ۰$$

یعنی لا = ۶ یعنی نقطہ تماس کا فاصلہ ۶ ہے۔

فصلہ کی اس قیمت کو تماس کی مساوات لا - ۱۲ + ۴ = ۰ میں درج کرنے سے نقطہ تماس کے معین کی قیمت ۵ حاصل ہوتی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ اگر تماس کی شرط پوری ہو تو نقطہ تماس کے

محدد (۵، ۶) ہیں۔

مشقی سوالات ۱۸

(۱) کس شرط کے پورا ہونے پر خط مستقیم ما = م + لا + ج مکانی لا = م + ب کو مس کر گیا ؟

$$\text{[جواب - ب}^۲ \text{ + ج}^۲ \text{ = ۰]}$$

(۲) اس کے لیے شرط معلوم کرو کہ خط لا جم م + ما جم م = ع مکانی ما = م لا کو مس کرے۔

$$\text{[جواب - ع جم م + ا جم ب = ۰]}$$

× (۳) اس کے لیے شرط معلوم کرو کہ خط مستقیم ل لا + م + ن = ۰۔
مکانی ما' = ۲ لا کو مس کرے۔

[جواب لوم' = ن ل]

(۴) کس شرط کے پورا ہونے پر خط مستقیم ما = م لا + لہ
مکانی ما' + لگ لا + ۲ ف + ما + ج = ۰ کو مس کرے گا؟

[جواب (م لہ + لگ + م ف) = م' (لہ + ۲ ف + لہ + ج)]

(۵) مکانی ما' = ۸ لا کے اُس ماس کی مساوات معلوم کرو جو زا - محور
کے ساتھ ۲۵ کا زاویہ بناتا ہے۔

[جواب ما = لا + ۲]


(۶) مکانی ما' = ۲ لا + ما + ۱ = ۰ کے اُس ماس کی مساوات
حاصل کرو جو خط مستقیم لا - ۳ ما + ۲ = ۰ کے متوازی ہے۔

[جواب لا - ۳ ما = ۰]

(۷) مکانی ما' = ۴ لا - ۲ ما + ۲ = ۰ کے اُس ماس کی مساوات معلوم
کرو جو خط مستقیم لا + ۲ ما + ۳ = ۰ پر عمود وار ہے۔

[جواب لا - ۲ ما = ۰]

۹۔ وتر ماس کی مساوات۔



دفعہ ۶۱ کی نوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مکانی ما' = ۲ لا کے ماس کا

میلان م دیا جائے تو ماس کی مساوات بالکل معین ہو جاتی ہے اس لیے مکانی کی صورت میں ایک ہی میلان والے دو ماس نہیں کھینچے جاسکتے ہیں۔
اس لیے اگر مکانی کے تقاطع اور ت پر ماس کھینچے جائیں تو یہ مساوات ایک دوسرے کو قطع کرینگے۔ فرض کرو کہ ان مساوات کا نقطہ تقاطع ن

اس مطلب کو ہم اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ نقطہ ن سے مکانی تک کھینچے ہوئے مساوات ن مت اور ن ت ہیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نقطہ سے مکانی کے دو ماس کھینچ سکتے ہیں۔

اور نقاط ماس ت اور ت میں سے گزرنے والا خط مستقیم نقطہ ن سے مکانی تک کھینچے ہوئے مساوات کا وتر ماس کہلاتا ہے۔
اب ہم نقطہ ن (لا' م) سے مکانی م' = ۲ لا تک کھینچے ہوئے مساوات کے وتر ماس کی مساوات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

فرض کرو کہ تقاطع ماس ت (لا' م) اور ت (لا' م) ہیں۔

ت (لا' م) پر کے ماس کی مساوات ہے

$$م' = ۲ لا (لا + لا)$$

چونکہ یہ ماس نقطہ ن (لا' م) میں سے گزرتا ہے

$$اس لیے م' = ۲ لا (لا + لا)$$

$$یعنی م' = ۲ لا (لا + لا) \quad (۱)$$

اسی طرح سے چونکہ نقطہ ت (لا' م) پر کا ماس بھی نقطہ ن (لا' م) میں سے گزرتا ہے اس لیے م' = ۲ لا (لا + لا) \quad (۲)

$$اب درجہ اول کی مساوات$$

$$پر غور کرو۔ م' = ۲ لا (لا + لا) \quad (۳)$$

چونکہ مساوات (۳) درجہ اول کی ہے اس لیے ایک خط مستقیم کو تعبیر کرتی ہے۔

رشتہ (۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط (۳) نقطہ ت (لا' م) میں سے

گزرتا ہے۔ اور رشتہ (۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط (۳) نقطہ $ت$ (لا، ما) میں سے بھی گزرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مساوات (۳) اُس خطِ مستقیم کی مساوات ہے جو نقاطِ تماس $ت$ اور $ت$ میں سے گزرتا ہے۔
یعنی ثابت ہوا کہ نقطہ $ن$ (لا، ما) سے مکانی $ما = ۴$ والا تک کھینچے ہوئے مساوات کے نقاطِ تماس میں سے گزرنے والے خط یعنی وترِ تماس کی مساوات

$$۱۱ = ۲ (لا + لا) \text{ ہے } \dots\dots\dots (۴)$$

نوٹ (۱) اس مساوات کی شکل بالکل وہی ہے جو نقطہ (لا، ما) پر کے ماس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ ماس کی صورت میں ضروری ہے کہ نقطہ (لا، ما) مکانی پر واقع ہو۔ وترِ تماس کی صورت میں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔

نوٹ (۲) اگر نقطہ (لا، ما) مکانی کے باہر ہو تو مساوات حقیقی ہونگے۔ اس لیے نقاطِ تماس بھی حقیقی ہونگے اور ان نقاطِ تماس میں سے گزرنے والے وترِ تماس کی مساوات اوپر کی شکل (۴) سے حاصل ہوگی۔ اگر نقطہ (لا، ما) مکانی کے اوپر ہو تو دونوں مساوات نقطہ (لا، ما) پر کے ماس پر منطبق ہونگے اور وترِ تماس وہی خط ہوگا جو (لا، ما) پر کا ماس ہے۔ اگر (لا، ما) مکانی کے اندر ہو تو مساوات خیالی ہونگے اور وترِ تماس ان خیالی نقاطِ تماس میں سے گزرنے والا خط ہوگا۔ چونکہ وترِ تماس کی مساوات حقیقی ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ان خیالی نقاطِ تماس میں سے گزرنے والا خط حقیقی ہے۔

۹۱۔ قطبی اور قطب۔ دائرہ کے بیان میں دفعہ ۴، ۳

میں دائرہ کے لحاظ سے ایک دیے ہوئے نقطہ کے قطبی کی جو تعریف اختیار کی گئی اُسی کے مائل تعریف مکانی کی صورت میں بھی اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی مکانی کے لحاظ سے نقطہ $ن$ کا قطبی وہ خطِ مستقیم ہے جو $ن$ سے مکانی تک کھینچے ہوئے مساوات کے نقاطِ تماس میں سے گزرتا ہے۔

اس لیے مکانی $ما = ۴$ والا کے لحاظ سے نقطہ $ن$ (لا، ما) کے قطبی

کی مساوات ہے۔

$$۱۱ = ۲ (لا + لا)$$

نوٹ :- ن، (لا، ما) کا قطبی فی الحقیقت وہی خط ہے جو دفعہ ۴۱۹ میں دیکھا گیا۔
کے نام سے موسوم کیا گیا۔

اگر مکانی کے محاذ سے نقطہ ن، کا قطبی خط مستقیم ل، ہو تو نقطہ ن مکانی کے محاذ سے خط مستقیم ل، کا قطب کہلاتا ہے۔

۹۲ و ۴ - مکانی ما = ۱۲ لا کے محاذ سے خط مستقیم ما = م لا + ج
کے قطب کے محدّد معلوم کرو۔ فرض کرو کہ مطلوبہ قطب کے محدّد (لا، ما) ہیں۔
تب مکانی ما = ۱۲ لا کے محاذ سے نقطہ (لا، ما) کے قطبی کی مساوات
ہوگی

$$ما = ۱۲ (لا + لا)$$

لیکن اسی خط کی مساوات ما = م لا + ج ہے۔
چونکہ یہ دونوں خطی مساواتیں ایک ہی خط کو تعبیر کرتی ہیں اس لیے ان میں
نظیر کی رقموں کے سر تقنا سب ہونگے۔

$$\frac{۱۲ لا}{ج} = \frac{۱۲ م}{م} = \frac{۱۲}{۱} \text{ یعنی}$$

$$\frac{۱۲}{م} = \frac{ج}{م} \text{ اور } \frac{۱۲}{م} = ۱$$

پس معلوم ہوا کہ مکانی ما = ۱۲ لا کے محاذ سے خط مستقیم ما = م لا + ج
کا قطب نقطہ (ج، م) ہے۔

مثال :- مکانی ما = ۸ لا کے محاذ سے خط مستقیم لا - ما + ۱ =

کے قطب کے محدّد معلوم کرو۔

فرض کرو کہ (لا، ما) مطلوبہ قطب ہے۔
تب مکانی ما = ۸ لا کے محاذ سے (لا، ما) کے قطبی کی مساوات ہوگی
ما = ۸ (لا + لا)

لیکن اسی خط کی مساوات لا - ما = ۱ + ۰ = ۰ ہے یعنی ما = لا + ۱ ہے۔
چونکہ یہ دونوں خطی مساواتیں ایک ہی خط کو تعبیر کرتی ہیں اس لیے
ان میں نظیر کی رقموں کے سرمتناسب ہونگے

$$\text{اس لیے } \frac{۱۲}{۱} = \frac{۴}{۱} = \frac{۴}{۱}$$

یعنی لا = ۱ اور ما = ۴

پس مطلوبہ قطب کے محدود (۴، ۱) ہیں۔

نوٹ :- مکانی کے لحاظ سے ایک دیے ہوئے خط مستقیم کا قطب مکانی اور دیے ہوئے
خط مستقیم کے نقاط تقاطع پر کے مساوات کا نقطہ تقاطع ہے۔

مشقی سوالات ۱۹

(۱) مکانی ما = ۱۲ کے لحاظ سے نقطہ (۱، -۳) کے قطبی کی مساوات
حاصل کرو۔

[جواب لا = ۲ + ۶ + ۱۲ = ۰]
(۲) مکانی لا = ۸ ما کے لحاظ سے نقطہ (۱، ۵) کے قطبی کی مساوات
حاصل کرو۔

[جواب لا = ۴ - ۶ - ۲۰ = ۰]
(۳) مکانی ما = ۴ لا کے لحاظ سے نقطہ (۳، -۱) کے قطبی
کی مساوات حاصل کرو۔

[جواب لا = ۶ + ۶ = ۰]
(۴) ثابت کرو کہ مکانی ما = ۴ لا کے لحاظ سے ماسکس (۰، ۱) کا
قطبی مکانی کا مرتب ہے۔

(۵) ثابت کرو کہ مکانی کے لحاظ سے مکانی کے کسی ماس کا قطب اس

ماس کا نقطہ تماس ہوتا ہے۔

(۶) مکانی $ما' = ۴$ لاکے لحاظ سے خط مستقیم $۱ = ۲ + ۳$ کا قطب معلوم کرو۔

[جواب (۱'۲)]

(۷) مکانی $لا' + ۴ = ۰$ کے لحاظ سے خط مستقیم $۱ + ۲ + ۳ = ۰$ کا قطب معلوم کرو۔

[جواب (۱'۲)]

(۸) خط مستقیم $۱ + ۲ + ۳ = ۰$ اور مکانی $ما' + ۱ = ۰$ کے نقاط تقاطع پر کے مماسات کا نقطہ تقاطع معلوم کرو۔

[جواب (۱'۳)]

(۹) دائرہ $لا' + ۲ = ۲۵$ کے کسی ماس کا قطب مکانی $ما' = ۴$ لاکے لحاظ سے لیا گیا۔ قطب کے طریق کی مساوات معلوم کرو۔

[جواب $۲۵ - ۲لا' = ۱۰۰$]

(۱۰) مکانی $ما' = ۲۴$ لاکے لحاظ سے مکانی کے اُس ماسکی وتر کا قطب معلوم کرو جو محور کے ساتھ ۴۵° کا زاویہ بناتا ہے۔

[جواب (۱۲'۶-)]

مکانی پر متفرق سوالات ۲۰

(۱) مکانی کا رأس مبدا پر ہے اور محور تشاکل لا۔ محور پر اور مرتب خط لا = ۶
پر۔ مکانی کی مساوات معلوم کرو۔ نیز وتر خاص کا طول اور وتر خاص کے سروں کے
محدود معلوم کرو۔

[جواب۔ مکانی کی مساوات ہے $۱۰ + ۲۲ = ۰$ ۔ وتر خاص کے سروں

(۱۲، ۶) (۱۲، ۶) ہیں]

(۲) مکانی کا رأس نقطہ (۳، ۲) پر ہے اور مرتب ما۔ محور کے متوازی ہے۔
نیز مکانی نقطہ (۸، ۴) میں سے گزرتا ہے۔ مکانی کی مساوات معلوم کرو۔ نیز مکانی کے
وتر خاص کا طول، ماسک کے عدد اور مرتب کی مساوات حاصل کرو۔

[جواب۔ مکانی کی مساوات ہے $۴ = ۲(۳ - ۸)$ ۔ وتر خاص کا طول = ۴ ماسک نقطہ

(۴، ۴) ہے مرتب کی مساوات لا = ۲ ہے۔

(۳) مکانی کا رأس نقطہ (۳، ۲) پر ہے اور ماسک (۳، ۵) پر ہے۔ مکانی

کی مساوات معلوم کرو۔

[جواب (۳ - ۶) = ۲ (۱۲ - ۲)]

(۴) مکانی کا رأس نقطہ (۲، ۲) پر ہے اور مرتب خط مستقیم لا = ۱ ہے۔ مکانی

کی مساوات حاصل کرو۔

[جواب (۲ - ۶) = ۲ (۱۲ - ۲)]

(۵) مکانی کا رأس نقطہ (۳، ۶) پر ہے اور محور تشاکل ما۔ محور کے متوازی ہے۔

اور مکانی نقطہ (۴، ۱۰) میں سے گزرتا ہے۔ مکانی کی مساوات معلوم کرو۔

[جواب (۲ - ۶) = ۳ (۳ - ۶)]

(۶) مکانی ما = ۳ لا پر دو نقاط ن اور ن اس طرح لیے گئے ہیں کہ ان

میں سے ہر ایک مکانی کے ماسک سے فاصلہ (۱۰) پر واقع ہے۔ نقاط ن اور ن کے

محدود معلوم کرو۔

[جواب (۶۹) ' (۶۹)]

(۷) مکانی 'ا' = ۸ لا کے اندر ایک مثلث مساوی الاضلاع بنایا گیا ہے جس کا ایک راس مکانی کے راس پر ہے۔ مثلث کے دوسرے دو راسوں کے محدود اور مثلث کے ضلع کا طول معلوم کرو۔

[جواب (۲۳) ' ۸ (۳۱) ، ضلع کا طول = ۱۶ (۳۱)]

(۸) مکانی 'ا' = ۱۲ لا کے کسی نقطہ ن سے مکانی کے محور پر عمود ن ع نکالا گیا ہے۔ ع ن کے وسطی نقطہ کے طریق کی مساوات چل کر دے اور ثابت کرو کہ یہ طریق بھی ایک مکانی ہے۔

[جواب 'ا' = ۱۳ (۱۱)]

(۹) ثابت کرو کہ ایک دیے ہوئے خط کے متوازی مکانی کا ایک اوصاف ایک ماسکس کھینچ سکتا ہے۔

(۱۰) مکانی 'ا' = ۴ لا کے اُن ماسات کی مساواتیں علیحدہ علیحدہ معلوم کرو جو نقطہ (۲، ۳) میں سے گزرتے ہیں۔ نیز ان ماسات کا درمیانی زاویہ معلوم کرو۔

[جواب - ماسات ہیں 'ا' = ۱ + ۱ اور 'ا' = ۲ + ۲ اور ان ماسات کا درمیانی زاویہ = مس (۱) (۱)]

(۱۱) مکانی کے کسی نقطہ ن پر کا ماس راس پر کے ماس سے ہا پر ملتا ہے۔ ثابت کرو کہ ن سے ماس نقطہ ن پر کے ماس پر عمود وار ہے جہاں سے مکانی کا ماسکس ہے۔

(۱۲) مکانی 'ا' = ۴ لا کے نقطہ (۶، ۹) کے جواب میں زیر ماس اور زیر عماد کے طول معلوم کرو۔

[جواب - زیر ماس ۱۸ ، زیر عماد = ۲]

(۱۳) مکانی کا ماسکس ہے۔ مکانی کے کسی نقطہ ن پر کا ماس مکانی کے محور سے مت پر ملتا ہے۔ ثابت کرو کہ ن سے ماسکس = ماسکس۔

(۱۴) نور کی شعاعوں کے پیل کی ہر شعاع مکانی کے محور کے متوازی ہے۔

ثابت کرو کہ مکانی کے معقر حصہ پر منعکس ہونے کے بعد یہ شعاعیں مکانی کے ماسک میں سے گزرتی ہیں -

(۱۵) مکانی $م^۱ = ۸$ لا اور خط مستقیم $۲ - ۱۳ - ۵ = ۰$ کے نقاط تقاطع پر کے مساوات کا نقطہ تقاطع معلوم کرو -

[جواب (۱) - $\frac{۵}{۲}$ ، ۶]

(۱۶) اگر مکانی $م^۱ = ۴$ لا کے لحاظ سے نقطہ $ن$ کا قطبی نقطہ $ن$ میں سے گزرے تو ثابت کرو کہ نقطہ $ن$ کا قطبی نقطہ $ن$ میں سے گزرے گا -

نوٹ :- ایسے دو نقطہ مکانی کے لحاظ سے مزدوج نقطہ کہلاتے ہیں -

(۱۷) مکانی $م^۱ = ۴$ لا کے لحاظ سے خط مستقیم $۱ - ۳ - ۵ - ۷ - ۹ = ۰$ کے قطب کے محدود معلوم کرو -

[جواب (۱) - $\left(\frac{۲-۴}{۱} \right)$]

(۱۸) دائرہ $لا + م^۱ = ۴$ کے کسی ماس کا قطب مکانی $م^۱ = ۳$ لا کے لحاظ سے لیا گیا ہے - قطب کے طریق کی مساوات حاصل کرو -

[جواب (۱) - $لا - م^۱ = ۴$]

(۱۹) مکانی $م^۱ = ۲$ لا کے وتر $۱ - ۳ = ۰$ کے وسطی نقطہ کے محدود معلوم کرو -

[جواب (۱) - $(۱، ۱)$]

(۲۰) مکانی $م^۱ = ۱۲$ لا کے وتر $۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ = ۰$ کے وسطی نقطہ کے محدود معلوم کرو -

[جواب (۱) - $(۱، ۱)$]

(۲۱) مکانی $م^۱ = ۱۲$ لا کے ۱۱ عمادوں کی مساوات میں معلوم کرو جو نقطہ (۹، ۰) میں سے گزرتے ہیں -

[جواب $لا + م - ۹ = ۰$ اور $لا - م - ۹ = ۰$]

(۲۲) ثابت کرو کہ مکانی کے مرتب پر کے کسی نقطہ کا قطبی جو مکانی کے لحاظ سے

لیا گیا ہے مکانی کے ماسکہ میں سے گزرتا ہے ۔
 (۲۳) مکانی کے مرتب پر کے کسی نقطہ سے مکانی کے حماسات کا جوڑا کھینچا گیا ہے
 ثابت کرو کہ یہ حماسات ایک دوسرے پر عمود وار ہیں ۔
 (۲۴) ثابت کرو کہ مکانی کے دو علی التوالم حماسات کا نقطہ تقاطع مکانی کے مرتب پر
 ہوتا ہے ۔

(۲۵) مکانی $\alpha = \mu$ لا اور دائرہ $\alpha + \mu = \alpha$ کا زاویہ تقاطع معلوم کرو ۔
 نوٹ : - دو منحنیوں کے زاویہ تقاطع سے مراد ان کے نقطہ تقاطع پر ان کے حماسات
 کا درمیانی زاویہ ہے ۔

[جواب : - دائرہ مکانی کو دو متبعی نقطوں پر قطع کرتا ہے ۔ اور ان نقطوں پر
 مکانی اور دائرہ ایک دوسرے کو ایک ہی زاویہ پر قطع کرتے ہیں ۔ یہ زاویہ

[۹۰°]

پانچواں باب

قطع ناقص

۱۵۔ قطع ناقص کی تعریف۔ ایک ثابت خط مستقیم

وَك اور ایک ثابت نقطہ سے دیے ہوئے ہیں۔ ایک متغیر نقطہ ن اس طرح حرکت کرتا ہے کہ اگر ن سے وَك پر عمود ن مَر ڈالا جائے تو

$$س ن = ز \times ن مَر \dots\dots\dots (۱)$$


جہاں ز ایک کسر واجب ہے جو ایک سے کم ہے۔ متحرک نقطہ ن کے طریق کو "ناقص" کہتے ہیں۔ ثابت نقطہ سے کو "ماسکما" اور ثابت خط وَك کو "مہر تب" اور کسر ز کو خروج المہر کہتے ہیں۔

۱۱۔ ناقص کی مساوات (میاری شکل) :-

فرض کرو کہ ماسکہ سے مرتب وَك پر عمود سے و ڈالا گیا ہے اور فاصلہ

$$س و = د \dots\dots\dots (۲)$$

و کو مبدأ خط و س کو محور لا اور خط و ک کو محور ما لیتے ہیں ۔



فرض کرو کہ ناقص پر کے کسی نقطہ ن کے محدود (لا، ما) ہیں۔ تو چونکہ

$$ن س \times ز = ن م$$

$$\text{اس لیے } (ن س) = ز (ن م)$$

$$\text{یعنی } (لا - د) = م + ز لا$$

$$\text{یعنی } لا (1 - ز) = م + ۲ لا د - د = م + ۲ لا د - د$$

$$\text{یعنی } (1 - ز) = م + \left\{ \frac{۲ لا د}{۱ - ز} - لا \right\}$$

اس آخری مساوات میں سیدھے طرف بڑے قوسین کے اندر کے جملہ کو ہم کامل مربع بناتے ہیں اور اسی قدر رقم کا بائیں طرف اضافہ کرتے ہیں تاکہ مساوات میں فرق نہ آئے :-

$$(1 - ز) + \frac{د}{۱ - ز} = م + \left\{ \frac{د}{۱ - ز} + \frac{۲ لا د}{۱ - ز} - لا \right\}$$

$$\text{یعنی } (۱-ز) \left\{ \frac{د}{ز-۱} - لا \right\} = م^۲ + \frac{د^۲}{ز-۱}$$

$$\text{یعنی } (۱-ز) \left\{ \frac{د}{ز-۱} - لا \right\} = م^۲ + \frac{د^۲}{ز-۱} \quad (۳)$$

مساوات (۳) ناقص کی ایک مساوات ہے لیکن ابھی یہ معیاری شکل میں نہیں ہے۔ سادہ سے سادہ شکل میں مساوات حاصل کرنے کے لیے ہمیں مبدأ کو سیدھی طرف نقطہ ج پر منتقل کرنا چاہیے جو خط و مس پر واقع ہے

اور جس کا فاصلہ و سے $\frac{د}{ز-۱}$ ہے۔ اب چونکہ $ز > ۱$ اس لیے

$$د < \frac{د}{ز-۱}$$

$$\text{یعنی } و ج < و س \quad (۴)$$

اس لیے معلوم ہوا کہ نیا مبدأ ج نقطہ مس کی سیدھی طرف واقع ہے۔ نقطہ ج میں سے نئے محوروں (لا، ما) کو ہم پُرانے محوروں کے متوازی لیتے ہیں تو نئے محدود پُرانے محدود کی رقوم میں حسب ذیل حاصل ہوتے ہیں

$$(۵) \quad \begin{cases} لا = لا - \frac{د}{ز-۱} \\ ما = ما \end{cases}$$

مساوات (۳) میں (۵) کو درج کرنے پر حاصل ہوتا ہے

$$(۶) \quad لا^۲ + \frac{د^۲}{ز-۱} = \frac{د^۲}{ز-۱} + \frac{ما^۲}{ز-۱}$$

اب ہم اس مساوات میں سے زیروں کو نکال دیتے ہیں لیکن یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ مساوات نقطہ ج کو مبدأ لینے پر حاصل ہوئی ہے اور

مساوات (۳) نقطہ و کو مبدار لینے پر حاصل ہوئی تھی۔ زبریں نکال دینے سے مساوات ہو جاتی ہے:

$$(۴) \dots\dots\dots \frac{z^2}{z^2 - 1} = \frac{a^2}{z^2 - 1} + 1$$

اب ہم لکھتے ہیں

$$\frac{z^2}{z^2 - 1} = 1$$

$$(۵) \dots\dots\dots \frac{z^2}{z^2 - 1} = 1$$

یعنی

تو مساوات (۴) ہو جاتی ہے

$$1 = \frac{a^2}{z^2 - 1} + 1$$

اور دونوں طرف ۱ پر تقسیم کرنے سے

$$(۶) \dots\dots\dots 1 = \frac{a^2}{z^2 - 1} + 1$$

پھر ہم لکھتے ہیں

$$(۷) \dots\dots\dots 1 = \frac{a^2}{z^2 - 1} + 1$$

تو مساوات (۶) ذیل کی شکل اختیار کرتی ہے

$$(۸) \dots\dots\dots 1 = \frac{a^2}{z^2 - 1} + 1$$

ناقص کی یہ مساوات (۸) سادہ ترین شکل میں ہے اور اسی کو معیاری مساوات کہتے ہیں۔ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ نقطہ ج (جس کو ناقص کا ”مہر کس“ کہتے ہیں) کو مبدار لینے کے متوازی خط کو محور مابا اور ماسک سے مرتب پر علی التواضع خط کو محور لا لینے سے یہ معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{a^2}{z^2 - 1} &= 1 \\ \frac{a^2}{z^2 - 1} + 1 &= 1 \\ \frac{a^2}{z^2 - 1} + 1 &= 1 \end{aligned}$$

۱۲ ر ۵ - ناقص کی شکل -

یہ دریافت کرنے کے لیے کہ محور لا ناقص کو کہاں قطع کرتا ہے ہم گذشتہ دفعہ کی مساوات (۱۱) میں $a = ۰$ رکھتے ہیں جس سے ملتا ہے

$$a^2 = ۰ \text{ یعنی } a = ۰ \text{ یا } a = -۰$$

فرض کرو کہ $a = ۰$ کے جواب میں ناقص پر نقطہ ۱ اور $a = -۰$ کے جواب میں نقطہ ۲ ملتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱ ۱ کا طول ۲ ہے یعنی

$$(۱) \quad ۱۲ = ۰$$

پھر یہ دریافت کرنے کے لیے کہ محور ناقص کو کہاں قطع کرتا ہے ناقص کی مساوات میں ہم $a = ۰$ رکھتے ہیں تو ملتا ہے

$$a^2 = ۰ \text{ یعنی } a = ۰ \text{ یا } a = -۰$$

فرض کرو کہ $a = ۰$ کے جواب میں ناقص پر نقطہ ب اور $a = -۰$ کے جواب میں ناقص پر نقطہ ب ملتے ہیں تب ظاہر ہے کہ ب ب کا طول ۲ ہے یعنی

$$(۲) \quad ب ب = ۰$$

اس کے علاوہ ناقص کی مساوات کو ذیل کی شکلوں میں سے کسی شکل میں لکھ سکتے ہیں:


$$(۳) \quad a^2 = ۰ \text{ یا } a^2 = -۰$$

$$(۴) \quad a^2 = ۰ \text{ یا } a^2 = -۰$$

مساوات (۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر $a < ۰$ یعنی اگر $a < ۰$ یا $a > ۰$ تو مابقی حقیقی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ منحنی کا کوئی حصہ نقطہ ۱ کی سیدھی طرف یا نقطہ ۱ کی بائیں طرف واقع نہیں ہے۔

اسی طرح مساوات (۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر $ما < ب$ یعنی
 اگر $ما < ب$ یا $ب > ما$ تو لا کی حقیقی قیمت حاصل نہیں ہوتی اس لیے ظاہر ہے
 کہ منحنی کا کوئی حصہ نقطہ ب کے اوپر یا نقطہ ب کے نیچے واقع نہیں ہے۔
 اگر لا کی قیمت - ۱ اور + ۱ کے درمیان واقع ہو تو مساوات (۳)
 سے ما کی دو مساوی اور مختلف علامت قیمتیں ملتی ہیں جس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ منحنی محور لا کے گرد متشاکل ہے۔
 اسی طرح اگر ما کی قیمت - ب اور + ب کے درمیان واقع ہو
 مساوات (۴) سے لا کی دو مساوی اور مختلف علامت قیمتیں ملتی ہیں جس
 سے ظاہر ہے کہ منحنی محور ما کے گرد متشاکل ہے۔
 گزشتہ دفعہ کی مساوات (۱۰) میں ہم نے دیکھا تھا کہ
 $ب = ۱$ (۱-۱)

لیکن چونکہ $ز > ا$ اس لیے ا - ز اور اس لیے
 $ب > ۱$ یعنی $ب > ۱$ (۵)
 اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خط ب ب چھوٹا ہے خط ا ا سے۔
 اسی لیے ا ا کو محور اعظم اور ب ب کو محور اصغر کہتے ہیں۔
 ذیل میں ناقص کی شکل دی گئی ہے جس میں مذکورہ بالا نقطوں اور
 خطوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔



نقاط ا اور ا کو ناقص کے راس کہتے ہیں۔

۲ و ۵ - اس دفعہ میں ہم ج س کا فاصلہ دریافت کریں گے اور اس کو ۱ اور ز کی رقوم میں بیان کریں گے۔ دفعہ (۱۱، ۵) کی مساواتوں (۲) (۵) اور (۸) کی بنا پر معلوم ہے کہ

$$وَس = د$$

$$وَج = \frac{د}{۱ - \frac{د}{ز}}$$

$$اَج = ۱ = \frac{دز}{ز - د}$$

اس لیے

$$س ج = و ج - وَس$$

$$= د - \frac{د}{۱ - \frac{د}{ز}} = \frac{دز}{ز - د}$$

$$= ز \times ا ج = ز \dots (۱)$$

اسی طرح

$$و ج = ا ج \times \frac{۱}{ز}$$

$$= \frac{۱}{ز} \dots (۲)$$

مساواتیں (۱) اور (۲) مرکز سے بالترتیب ماسکہ اور مرتب کے فاصلہ کو ظاہر کرتی ہیں۔


۳ و ۵ - اب ہم ثابت کریں گے کہ ناقص کا ایک دوسرا ماسکہ اور اس کے جواب میں ایک دوسرا مرتب ہوتا ہے۔ مرکز ج سے سیدھی طرف محور اعظم پر ایک نقطہ سے اس طرح لو کہ

$$ج س = س ج = ۱ ز \dots (۱)$$

اور اسی طرح محور اعظم محدودہ پر سیدھی طرف ایک نقطہ و

ایسا لو کہ

(۲) $\frac{1}{ز} = ج و = ج$



نقطہ 'و' سے وک خط و و پر عمود کھینچو۔
اب ہم ثابت کریں گے کہ نقطہ 'س' ناقص کا دوسرا ماسک اور
خط وک دوسرا مرتب ہے۔

ناقص پر کوئی نقطہ 'ن' جو جس کے معدود (لا، ما) ہیں۔ 'ن' میں کو
ملاؤ اور 'ن' سے خط وک پر عمود 'ن' مر اور خط ج و پر عمود 'ن' ڈالو۔
تب

ن م = ل و

ج و = ج ل

(۳) $لا - \frac{1}{ز} =$

اور $ن س = س ل + ن ل = (ج ل - ج س) + ن ل = (لا - ل و ز) + م ا ... (۴)$

اب چونکہ نقطہ 'ن' کے معدود ناقص کی مساوات کو پورا کرتے ہیں اس لیے

$$۱ = \frac{ما}{ب} + \frac{لا}{ز}$$

$$1 = \frac{1^2}{1} + \frac{1^2}{(1-1)^2}$$

یعنی

$$1^2 = 1^2 + (1-1)^2$$

اس مساوات کو پھیلانے اور مختلف ترتیب دینے سے حاصل ہوتا ہے

$$1^2 + 2^2 = 1^2 + 2^2 + 2^2$$

پھر دونوں طرف ۲ وزلا تفریق کرنے سے ملتا ہے

$$1^2 - 2^2 + 2^2 = 1^2 + 2^2 - 2^2 + 2^2$$

$$= 1^2 - 2^2 + 2^2 + \frac{2^2}{2}$$

$$1^2 - 2^2 + 2^2 + \frac{2^2}{2} = 1^2 + 2^2 - 2^2 + \frac{2^2}{2} \dots (5)$$

مساواتوں (۳) (۴) اور (۵) سے ظاہر ہے کہ

$$1^2 - 2^2 + 2^2 = 1^2 + 2^2 - 2^2$$

یعنی

$$1^2 - 2^2 + 2^2 = 1^2 + 2^2 - 2^2 \dots (6)$$

مساوات (۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ ۱ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ایک ثابت نقطہ ۱ سے اس کا فاصلہ تناسب ہے ایک ثابت خط تقسیم وک پر ۱ سے عمود کے۔


پس نقطہ ۱ اس ناقص کا ماسکہ اور خط وک ناقص کا مرتب ہے۔

۳۱ اور ۵ - اس دفعہ میں ہم ناقص کی ایک بہت زیادہ مشہور اور اہم خاصیت ثابت کریں گے۔

ناقص پر کوئی نقطہ ۱ لو اور اس کو دونوں ماسکوں ۱ اور ۱ سے ملاؤ۔ ہم ثابت کریں گے کہ خواہ نقطہ ۱ کہیں واقع ہو ۱ اور ۱ کا مجموعہ

مستقل ہوگا اور ۲ کے برابر ہوگا یعنی ہم ثابت کرینگے کہ

$$ن س + ن س^۲ = مستقل = ۱۲ \dots\dots\dots (۱)$$



اس سلسلہ کا ثبوت ہم پہلے بالکل تحلیلی طریقہ پر دیں گے۔

$$ن س^۲ = س ل + ل ن^۲$$

$$= (ج ل - ج س) + ل ن^۲$$

$$= (لا - ل ز) + ل ن^۲ \dots\dots\dots (۲)$$

لیکن ناقص کی مساوات

$$۱ = \frac{لا^۲}{ز(ز-۱)} + \frac{ل ن^۲}{ز}$$

سے حاصل ہوتا ہے

$$ل ن^۲ = ز(ز-۱) - لا^۲$$

$$= ز - ل ز - لا^۲ + لا ز \dots\dots\dots (۳)$$

اس قیمت کو مساوات (۲) میں رکھنے سے ملتا ہے:

$$ن س^۲ = (ل - ل ز) + ل^۲ - ل ز^۲ - ل^۲ + ل ز^۲$$

$$= ل - ل ز + ل ز^۲ + ل ز^۲ - ل ز^۲ - ل^۲ + ل ز^۲$$

$$= ل - ل ز + ل ز^۲ + ل ز^۲$$

$$= (ل - ل ز)$$

پس

$$ن س = ل - ل ز \quad (۳)$$

اسی طرح

$$ن م^۲ = م ل + ل ن$$

$$= (م ج + ج ل) + ل ن$$

$$= (ل ز + ل^۲) + ل^۲$$

$$= (ل ز + ل^۲) + (ل^۲ - ل ز^۲ - ل^۲ + ل ز^۲)$$

$$= ل ز^۲ + ل ز + ل + ل - ل ز^۲ - ل^۲ + ل ز^۲$$

$$= ل ز + ل ز + ل ز + ل ز$$

یعنی

$$ن س = ل + ل ز \quad (۵)$$

اس لیے مساواتوں (۳) اور (۵) سے

$$ن س + ن م = (ل - ل ز) + (ل + ل ز)$$

$$= ل + ل \quad (۶)$$

جس سے ہمارا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔

متبادل ثبوت : اسی مسئلہ کا ایک نہایت مختصر ہندسی ثبوت بھی دیا جاسکتا ہے۔
 ناقص کی تعریف کے بموجب ہمیں معلوم ہے کہ

$$ن س = ز \times ن م$$

$$اور \quad ن س = ز \times ن م$$

پس

$$ن س + ن س = ز (ن م + ن م)$$

$$ز \times م م =$$

$$ز \times و و =$$

$$ز \times ج و =$$

$$ز \times ج و = \frac{1}{2} \quad (\text{کیونکہ } ج و = \frac{1}{2})$$

$$12 =$$

اسی طرح ن س اور ن س کی قیمتیں علیحدہ علیحدہ حسب ذیل طریقہ پر بھی معلوم کی جاسکتی ہیں :-

$$ن س = ز \times ن م = ز \times ل و$$

$$ز (ج و - ج ل) =$$

$$ز (\frac{1}{2} - ل) =$$

$$ک و - ز ل =$$

اور

$$ن س = ز \times م م = ز (و ل)$$

$$= ز (وَج + ج ل)$$

$$= ز \left(\frac{1}{ز} + لا \right)$$


$$= لا + ز لا$$

غرض اس مسئلہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ناقص پر کے کسی نقطہ کے ماسکی فاصلوں کا مجموعہ محور اعظم کے برابر ہوتا ہے۔

نوٹ - ہم نے اس مسئلہ کے دو ثبوت عہد آدے دیے ہیں۔ اس کتاب میں اب تک طالب علم کو علم ہندسہ کے مشہور مسائل سے سابقہ پڑا ہوگا جن کے ثبوت تحلیلی طریقہ پر نہایت آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک پہلو ہے۔

بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کا اقلیدسی ثبوت تحلیلی ثبوت کی بنسبت زیادہ مختصر اور آسان ہوتا ہے۔ زیر بحث مسئلہ سے یہ امر کافی طور پر واضح ہے۔ تاہم یہ یاد رہنا چاہیے کہ تحلیلی طریقہ ہندسہ کی طریقہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع اور طاقتور ہے اور ہر مسئلہ پر اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔

۳۲۵ - اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ گذشتہ مسئلہ کا عکس بھی صحیح ہے یعنی یہ کہ اگر کوئی نقطہ ن ایک مستوی میں اس طرح حرکت کرے کہ دو ثابت نقطوں س اور سن سے اس کے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو تو اس نقطہ ن کا طریقہ ایک ناقص ہوگا۔



خط سن کے نقطہ تنصیف ج کو مبدا فرض کرو اور اس خط کو محور لا لو۔

فرض کرو کہ

$$(۱) \dots\dots\dots ۱۲ = ن س + ن س$$

تو ظاہر ہے کہ ج س اور ج س میں سے ہر ایک ۱۲ سے کم ہے۔
فرض کرو کہ

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ = ج س = ز ۱$$

جہاں ز ایک کسر واجب ہے یعنی اکائی سے کم ہے۔
اب فرض کرو کہ ن کے متحد (لا، ما) ہیں تو

$$ن س^۱ = (ج ل - ج س)^۲ + ن ل^۲$$

$$(۳) \dots\dots\dots ۱ = (لا - ۱ ز)^۲ + ما^۲$$

اور اسی طرح

$$ن س^۱ = (ج ل + س ج)^۲ + ن ل^۲$$

$$(۴) \dots\dots\dots ۱ = (لا + ۱ ز)^۲ + ما^۲$$

پس ان قیمتوں کو مساوات (۱) میں رکھنے پر

$$۱۲ = \sqrt{ما^۲ + (لا + ۱ ز)^۲} + \sqrt{ما^۲ + (لا - ۱ ز)^۲} \quad \text{یعنی}$$

$$\sqrt{ما^۲ + (لا + ۱ ز)^۲} - ۱۲ = \sqrt{ما^۲ + (لا - ۱ ز)^۲}$$

دونوں طرف مربع لینے سے ملتا ہے

$$(لا - ۱ ز)^۲ + ما^۲ = ۴۱۲ - ۲۴ \sqrt{ما^۲ + (لا + ۱ ز)^۲} + (لا + ۱ ز)^۲ + ما^۲$$

مختصر کرنے اور ترتیب دینے سے حاصل ہوتا ہے

$$۴۱۱ (لا + ز) + ۲۱۱ = ۲۱۱ (لا + ز) - (لا - ز) + ۴۱۱$$

$$۴۱۱ + ۲۱۱ =$$

یعنی

$$۲۱۱ (لا + ز) + ۲۱۱ = ۲۱۱ (لا + ز)$$

پھر دوبارہ مربع لینے پر ملتا ہے

$$(لا + ز) = ۲۱۱ + ۲۱۱$$

یعنی پھیلانے پر حاصل ہوتا ہے

$$لا + ۲۱۱ + ۲۱۱ + ۲۱۱ = ۲۱۱ + ۲۱۱ + ۲۱۱ + ۲۱۱$$

اس کو مختصر کرنے اور ترتیب دینے پر ملتا ہے

$$لا (لا - ۱) = ۲۱۱ (لا - ۱)$$

اس مساوات کو دونوں طرف $(لا - ۱)$ پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے -

$$۱ = \frac{لا}{لا - ۱} + \frac{۲۱۱}{لا - ۱}$$

اور بالآخر اگر $(لا - ۱)$ کو جو ایک مستقل ہے ب سے تعبیر کریں تو مساوات ہو جاتی ہے

$$۱ = \frac{لا}{ب} + \frac{۲۱۱}{ب}$$


جو ایک ناقص کی مساوات ہے۔۔ پس معلوم ہوا کہ ن کا طریق ایک ناقص ہے۔

۳۳۵۔ ناقص کو ترسیم کرنے کا حلی طریقہ۔
 ناقص کی مذکورہ بالا خاصیت کی بنا پر ہمیں اس منحنی کو ترسیم کرنے کا
 ایک حلی طریقہ مانتے آتا ہے۔

دھاگہ کا ایک ٹکڑا لو جس کا طول مطلوبہ ناقص کے محور اعظم کے برابر ہو۔
 اور اس کے سروں کو دو ثابت نقطوں میں اور میں پر باندھ دو۔ یہ نقطے
 ناقص کے ماسکے ہیں۔

ایک پینل کی نوک کو کاغذ پر اس طرح حرکت دو کہ نوک ہمیشہ دھاگہ کو
 مس کرتی رہے اور اس کے علاوہ پینل اور ثابت نقطوں کے درمیانی دونوں
 حصے ہمیشہ بالکل تنے ہوئے رہیں۔ اگر پینل کی نوک ان شرائط کے ساتھ
 ایک پورا چکر کرے تو اس سے ایک ناقص مرتسم ہوگا۔ کیونکہ پینل کی نوک
 ہمیشہ ایسے مقام پر ہوگی کہ میں اور میں سے اس کے فاصلوں کا مجموعہ دھاگہ
 کے طول یعنی محور اعظم کے برابر ہوگا۔

۳۴۵۔ ناقص کا وتر خاص۔



تحریریں۔ ماسک میں سے محور اعظم پر علی القواہم ایک خط
 کھینچو جو منحنی کو دونوں طرف نقطوں ل اور ل پر ملے۔ خط ل ل کو ناقص کا

”وترِ خاص“ کہتے ہیں اور $س ل$ کو ”نصف وترِ خاص“ -
 ہم نصف وترِ خاص $س ل$ کا طول معلوم کریں گے۔ فرض کرو کہ یہ طول $ل$ ہے تو
 نقطہ $ل$ کے محدود (ج س، س ل) یعنی (ل ز، ل) ہونگے اور چونکہ نقطہ $ل$
 ناقص پر واقع ہے اس لیے یہ محدود ناقص کی مساوات کو پورا کریں گے۔ پس

$$۱ = \frac{ل^۲}{ب^۲} + \frac{(ل ز)^۲}{ر^۲}$$

یعنی $ل^۲ = ب^۲ (۱ - ز^۲)$ (۱)

لیکن چونکہ $ل ز = ب^۲ (۱ - ز^۲)$

اس لیے $۱ - ز^۲ = \frac{ب^۲}{ر^۲}$ (۲)

مساواتوں (۱) اور (۲) سے ملتا ہے۔

$$\frac{ب^۲}{ر^۲} = ل$$

اس لیے $ل = \frac{ب^۲}{ر}$ (۳)

پس وترِ خاص $ل = ۲ = ۲ \frac{ب^۲}{ر}$ (۴)

۳۵ و ۵ - اب ہم خروج المکرز (ز) کی قیمت محوروں کی رقوم
 میں معلوم کریں گے۔

اگدشتہ دفعہ کی مساوات (۲) سے حاصل ہوتا ہے

(۱) $۱ - ز^۲ = \frac{ب^۲}{ر^۲}$

$$\text{پس } z = 1 - \frac{b^2}{a^2}$$

$$= \frac{1}{a^2} (a^2 - b^2)$$

$$\text{اور } z = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \quad (2)$$

$$= \frac{1}{a} \sqrt{a^2 - b^2} \quad (3)$$

مثال - ناقص $\frac{a}{425} + \frac{b}{300} = 1$ کا خروج المکرر اور

وتر خاص کا طول معلوم کرو۔

یہاں $1 = 25$ ، $b = 20$ اس لیے

$$z = \frac{1}{a} \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{1}{425} \sqrt{425^2 - 20^2} = \frac{1}{425} \sqrt{180000 - 400} = \frac{1}{425} \sqrt{179600}$$

$$\text{اور } 1 = \frac{25}{25} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{400}{179600}$$

$$\text{پس وتر خاص } = 1 = 32$$

$$\text{نیز چونکہ } b^2 = a^2 (1 - z^2)$$

$$\text{اس لیے } 1 = \frac{b^2}{a^2} = \frac{a^2 (1 - z^2)}{a^2} = (1 - z^2)$$


$$25 = (1 - \frac{4}{179600})$$

اس طرح سے بھی وتر خاص کی قیمت وہی ۳۲ حاصل ہوتی ہے۔

۴ و ۵ - اب ہم یہ دریافت کریں گے کہ اگر نقطہ ن ناقص پر واقع نہ ہو بلکہ

اس کے اندر یا باہر کہیں واقع ہو تو محدودوں میں کیا رشتہ ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ نقطہ ن ناقص کے اندر واقع ہے اور اس کے محدود (لا، ما) ہیں۔ نقطہ ن سے محور اعظم ج ۱ پر عمود ن ق ڈالو اور ق ن کو اوپر اس قدر



بڑھاؤ کہ ناقص کے منحنی سے نقطہ ن پر ملے۔ فرض کرو کہ ق ن = ما
لیکن ج ق = لا اور ق ن = ما -

اب چونکہ نقطہ ن ناقص پر واقع ہے اس لیے اس کے محدود (لا، ما) ناقص کی مساوات کو پورا کرتے ہیں یعنی

$$1 = \frac{لا^2}{ا^2} + \frac{ما^2}{ب^2}$$

لیکن ق ن > ق ن یعنی ما > ما اس لیے

$$\frac{لا^2}{ا^2} + \frac{ما^2}{ب^2} > \frac{لا^2}{ا^2} + \frac{ما^2}{ب^2}$$

پس معلوم ہوا کہ

$$(1) \dots\dots\dots 1 > \frac{لا^2}{ا^2} + \frac{ما^2}{ب^2}$$

اسی طرح اگر نقطہ ن (لا، ما) ناقص کے باہر واقع ہو تو شکل بنا کر آسانی سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ < \frac{لَا^۲}{ب^۲} + \frac{لَا^۲}{ر^۲}$$

پس کسی نقطہ (لَا ، مَا) کے متعلق یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ ناقص $\frac{لَا^۲}{ر^۲} + \frac{لَا^۲}{ب^۲} = ۱$ کے لحاظ سے کہاں واقع ہے تو جملہ $\frac{لَا^۲}{ر^۲} + \frac{لَا^۲}{ب^۲}$ کی قیمت دریافت کرنی چاہیے۔ اگر قیمت اکائی سے کم ہے تو نقطہ ناقص کے اندر واقع ہے۔ اگر قیمت اکائی کے برابر ہے تو نقطہ ناقص کے سطح پر واقع ہے اور اگر قیمت اکائی سے بڑی ہے تو نقطہ ناقص کے باہر واقع ہے۔

مثال - ایک ناقص کی مساوات $\frac{لَا^۲}{۲۵} + \frac{لَا^۲}{۱۶} = ۱$ ہے۔

دریافت کرد کہ نقاط ۱ (۳-، ۲) ب (۵-، ۰) ج (۴-، ۳) اس ناقص کے لحاظ سے کہاں واقع ہوتے ہیں۔
نقطوں کے محدود ناقص کی مساوات کے دائیں رکن میں درج کرتے ہیں۔

$$۱ > \frac{۴}{۱۶} + \frac{۹}{۲۵} = \frac{(۲-)^۲}{۱۶} + \frac{(۳-)^۲}{۲۵}$$

$$۱ = ۰ + \frac{۲۵}{۲۵} = \frac{(۰-)^۲}{۱۶} + \frac{(۵-)^۲}{۲۵}$$


$$۱ < \frac{۹}{۱۶} + \frac{۱۶}{۲۵} = \frac{(۳-)^۲}{۱۶} + \frac{(۴-)^۲}{۲۵}$$

۵، ۵ - امدادی دائرہ -

تعریف - اگر محور اعظم AA' کو قطر مان کر ایک دائرہ کھینچا جائے تو اس دائرہ کو ناقص کا "امدادی دائرہ" کہتے ہیں۔

فرض کرو کہ ناقص پر کوئی نقطہ F ہے اور N اس نقطہ کا معین ہے۔ خط NF کو اوپر کی طرف خارج کرو کہ وہ امدادی دائرہ سے

نقطہ ق پیرمے -



فرض کرو کہ

(۱) ج ن = لا' ن ف = ما' ن ق = با
توف کے محدود (لا' ما) اور ق کے محدود (لا' با) ہونگے -
اب چونکہ نقطہ ف ناقص پر واقع ہے اس لیے

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ = \frac{لا'}{با} + \frac{لا'}{ا}$$

اور چونکہ نقطہ ق دائرہ لا' + ما' = ا' پر واقع ہے اس لیے

$$(۳) \dots\dots\dots ا' = با' + لا'$$

پس مساوات (۲) سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{لا'}{ا} - ۱ = \frac{لا'}{با}$$

$$(۴) \dots\dots\dots یعنی \dots\dots\dots با' = (ا' - لا') \frac{لا'}{ا}$$

اور مساوات (۳) سے حاصل ہوتا ہے

$$(۵) \dots\dots\dots با' - لا' = ا' - لا' = ا' - (ا' - لا') \frac{لا'}{ا}$$

مساواتوں (۳) اور (۵) سے ملتا ہے کہ

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{a^2}{b^2}$$

یعنی

$$(۶) \quad \frac{b}{a} = \frac{a}{b}$$

$$(۷) \quad \frac{b}{a} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$$

امدادی دائرہ پر کے نقطہ ق کو ناقص پر کے نقطہ ف کا "متناظر" نقطہ کہتے ہیں۔

مساوات (۶) کو الفاظ میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ ناقص پر کے کسی نقطہ کے معین کو امدادی دائرہ پر کے متناظر نقطہ کے معین سے وہی نسبت ہے جو ب کو ا سے ہے یعنی جو ناقص کے محور اصغر کو محور اعظم سے ہے۔ اس نتیجہ سے ظاہر ہے کہ ناقص کی تعریف حسب ذیل طریقہ پر بھی کی جاسکتی ہے:-

ایک دائرہ لو اور اس کا کوئی منظر ا ا کھینچو۔ دائرہ پر کے کسی نقطہ ق سے خط ا ا پر عمود ق ن ڈالو۔ عمود ق ن پر ایک نقطہ ف ایسا لو جو اس کو ایک مستقل دی ہوئی نسبت سے تقسیم کرے۔ تب نقطہ ف کا طریق ایک ناقص ہوگا۔

۱۵-۵۔ خارج المکرز زاویہ۔

تعریف۔ فرض کرو کہ ناقص پر کوئی نقطہ ف ہے۔ ف کا معین ف ن کھینچو اور امدادی دائرہ پر ف کا متناظر نقطہ ق لو۔ ق کو مرکز ج سے ملاؤ۔

تو زاویہ ن ج ق کو ناقص پر کے نقطہ ف کا "خارج المکرز زاویہ" کہتے ہیں اور اس کو ف سے تعبیر کرتے ہیں۔

نقطہ ف کے محدودوں کو زاویہ ذ کی رقوم میں حسب ذیل طریقہ پر بیان کر سکتے ہیں :-

$$(۱) \quad \text{ج ن} = \text{ج ق جب ف} = \text{رجم ف} \dots \dots \dots$$

$$\text{اور} \quad \text{ن ق} = \text{ج ق جب ف} = \text{رجم ف}$$

لیکن گذشتہ دفعہ کی رو سے ہم جانتے ہیں کہ

$$\text{ن ف} = \frac{\text{ن ق}}{\text{ر}}$$

اس لیے

$$(۲) \quad \text{ن ف} = \frac{\text{ن ق}}{\text{ر}} = \text{رجم ف} = \text{ب جب ف} \dots \dots \dots$$

پس نقطہ ف کے محدودوں کو (لا، ما) کی بجائے (رجم ف، ب جب ف) سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

۵۲، ۵۱ - مثال (۱)۔ اس ناقص کی مساوات معلوم کرو جس کا

ماسکس نقطہ (لا، ما) مرتب خط لا + ب + ما + ج = ۰

اور خروج المرکز (ز) ہے۔
فرض کرو کہ ناقص پر کا کوئی نقطہ ن (لا، ما) ہے۔ تو

$$(۱) \quad \text{ن م} = \{ (\text{لا} - \text{لا}^۲) + (\text{ما} - \text{ما}^۲) \} \dots \dots \dots$$

نقطہ ن سے مرتب لا + ب + ما + ج = ۰ پر عمود ن کا ڈالو تو

$$(۲) \quad \text{ن ک} = \frac{\text{لا} + \text{ب} + \text{ما} + \text{ج}}{\text{لا} + \text{ب}}$$

اب ناقص کی تعریف کے بموجب

$$\text{ن س} = \text{ز} \times \text{ن ک}$$

$$\text{یعنی } \left\{ (لا - لا) + (ما - ما) \right\}^{\frac{1}{2}} = \frac{لا + لا + ما + ج}{لا + لا + ما + ج}$$

جنہوں کو دور کرنے کے لیے مربع لینے سے حاصل ہوتا ہے

$$(۳) \dots\dots \frac{(لا + لا + ما + ج)^2}{لا + لا + ما + ج} = (لا - لا) + (ما - ما)$$

ساوات (۳) سے نقطہ (لا، ما) کا طریق حسب ذیل ہوتا ہے :

$$(۴) \dots\dots \frac{(لا + لا + ما + ج)^2}{لا + لا + ما + ج} \times ز = (لا - لا) + (ما - ما)$$

جو ناقص کی مطلوبہ مساوات ہے ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مساوات درجہ دوم کی ہے لیکن متجانس نہیں ہے ۔ اس مساوات کو پھیلانا اور ترتیب دے کر اس طرح لکھ سکتے ہیں :

$$لا \left(\frac{لا + لا + ما + ج}{لا + لا + ما + ج} - ۱ \right) + ما \left(\frac{لا + لا + ما + ج}{لا + لا + ما + ج} - ۱ \right) + \dots\dots = \text{مستقل رقم}$$

$$\begin{aligned} & \frac{لا + لا + ما + ج}{لا + لا + ما + ج} - ۱ = \frac{لا + لا + ما + ج - (لا + لا + ما + ج)}{لا + لا + ما + ج} \\ & = \frac{لا + لا + ما + ج - لا - لا - ما - ج}{لا + لا + ما + ج} = \frac{۰}{لا + لا + ما + ج} = ۰ \end{aligned}$$

< ۔ (کیونکہ ز ناقص کے لیے اکائی سے کم ہے)
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناقص کی مساوات (۵) میں

(لا کا سر) × (ما کا سر) - (لا + لا کا سر)
مثبت ہے ۔ ناقص کی ہر مساوات میں یہ خاصیت ضرور پائی جاتی ہے چنانچہ

معیاری مساوات پر بھی اس کی تصدیق آسانی ہو سکتی ہے۔ آگے چل کر طالعیم کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی دوسرے درجہ کی مساوات میں یہ خاصیت پائی جائے تو وہ مساوات ایک ناقص کو تعبیر کرتی ہے۔

مثال (۲) مساوات

$$۱۶ \text{ لا} + ۲۵ \text{ با} - ۳۲ \text{ لا} - ۱۵۰ \text{ با} = ۱۱۱$$

سے جو ناقص تعبیر ہوتا ہے اس کا مرکز 'ا' کے مرتب 'خروج المکرز' اور محوروں کے طول معلوم کرو۔

مساوات بالا کو ہم اس طرح ترتیب دیتے ہیں:

$$۱۶ \text{ لا} - ۳۲ \text{ لا} + ۲۵ \text{ با} - ۱۵۰ \text{ با} = ۱۱۱$$

یعنی

$$۱۶ \text{ لا} - ۳۲ \text{ لا} + ۲۵ \text{ با} - ۱۵۰ \text{ با} = ۱۱۱$$

یعنی قوسین کے اندر والے جملوں کو کامل مربع بنانے پر حاصل ہوتا ہے

$$۱۶ \text{ لا} - ۳۲ \text{ لا} + ۲۵ \text{ با} - ۱۵۰ \text{ با} = ۱۱۱$$

یعنی

$$۱۶ \text{ لا} - ۳۲ \text{ لا} + ۲۵ \text{ با} - ۱۵۰ \text{ با} = ۱۱۱$$

اب طرفین کو ۴۰۰ پر تقسیم کرنے سے

$$۱ = \frac{۲۵ \text{ لا} - ۳۲ \text{ لا} + ۲۵ \text{ با} - ۱۵۰ \text{ با}}{۴۰۰}$$

مبدأ کو نقطہ (۳، ۲) پر منتقل کرنے سے آخری مساوات تبدیل ہو کر

$$۱ = \frac{۲۵ \text{ لا} - ۳۲ \text{ لا} + ۲۵ \text{ با} - ۱۵۰ \text{ با}}{۴۰۰}$$

حاصل ہوتا ہے جو ناقص کی معیاری مساوات ہے۔ چونکہ نقطہ (۳، ۲) کو مبدأ لینے پر یہ مساوات حاصل ہوتی ہے اس لیے معلوم ہوا کہ ناقص کا مرکز ج یہی نقطہ یعنی (۳، ۲) ہے اور نیز محور اعظم $۵ = ۱$ اور محور صغیر $۴ = ۲$ ۔ اب خروج المکرز ۵ دفعہ (۵، ۳) کی

مسادات (۳) میں دیا ہوا رشتہ استعمال کرتے ہیں

$$\frac{1}{5} = \frac{16}{25} \quad \frac{1}{3} = \frac{10}{30} \quad \frac{1}{2} = \frac{6}{12}$$

یعنی $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$ پھر ہم جانتے ہیں کہ ماسکے میں اور میں محور اعظم پر مرکز سے فاصلہ + لوز اور - لوز پر واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کے محدود (۲ + لوز ۳) اور میں کے محدود (۲ - لوز ۳) ہیں یعنی میں کے محدود (۳، ۵) اور میں کے محدود (۳، ۳) ہیں۔ چونکہ مرتب محور اعظم پر علی القوام ہوتے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ وہ محور کے متوازی ہوں گے۔ اور نیز اگر مرکز سے مرتبوں پر عمودوں کے پائین و اوپر ہوں تو ہمیں معلوم ہے کہ

$$\frac{25}{3} = \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \quad \frac{25}{3} = \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{10}{30} = \frac{25}{30} + 2 = 10$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{12} = \frac{25}{12} - 2 = 6$$

$$\frac{1}{5} = \frac{16}{20} = \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$

مثال (۳) ثابت کرو کہ ایک ناقص کے کسی دو علی القوام قطروں

کے معکوس مربعوں کا مجموعہ مستقل ہوتا ہے۔

[دائرہ کی طرح ناقص کے قطر سے مراد بھی وہ وتر ہے جو مرکز میں سے گزرتا ہے۔]

فرض کرو کہ ناقص پر کے کسی نقطہ ن کے قطبی محدود (ر، ط) ہیں یعنی

$$ج ن = ر، \quad ناویہ ج ن = ط$$

اگر n کے کارٹیزی محدود (a, b) ہوں تو ہم کو معلوم ہے کہ

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta$$

ناقص کی مساوات میں درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$1 = \frac{a^2 \cos^2 \theta}{r^2} + \frac{b^2 \sin^2 \theta}{r^2}$$

یعنی $\frac{1}{r^2} = \frac{a^2 \cos^2 \theta}{r^2} + \frac{b^2 \sin^2 \theta}{r^2} \dots (1)$

اب ناقص پر ایک دوسرا نقطہ (x, y) ایسا لیتے ہیں کہ زاویہ θ ج n

قائم ہو۔ فرض کرو کہ (x, y) کے کارٹیزی محدود (a, b) کے جواب میں قطبی محدود (r, θ) حاصل ہوتے ہیں یعنی

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

اس لیے $\theta = \theta$ زاویہ θ ج $n = \theta$ زاویہ θ ج $n + \theta$ زاویہ θ ج n

یعنی $\frac{1}{r^2} = \frac{a^2 \cos^2 \theta}{r^2} + \frac{b^2 \sin^2 \theta}{r^2} \dots (2)$
اب مساوات (۱) کی طرح ناقص کی مساوات میں (x, y) کے قطبی محدود بھرتی کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$1 = \frac{a^2 \cos^2 \theta}{r^2} + \frac{b^2 \sin^2 \theta}{r^2} \dots (3)$$

مساوات (۳) میں مساوات (۲) درج کرنے سے ملتا ہے کہ

$$\frac{a^2 \cos^2 \theta}{r^2} + \frac{b^2 \sin^2 \theta}{r^2} = \frac{1}{r^2}$$

$$\frac{a^2 \cos^2 \theta}{r^2} + \frac{b^2 \sin^2 \theta}{r^2} = \frac{1}{r^2} \dots (4)$$

مساواتوں (۱) اور (۴) کو جمع کرنے سے چل ہوتا ہے

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \quad \text{..... (۵)}$$

مساوات (۵) میں طرفین کو ۴ پر تقسیم کرنے سے ملتا ہے

$$\frac{1}{4r_1} = \frac{1}{4r_2} + \frac{1}{4r_3} \quad \text{..... (۶)}$$

جس سے مطلوب مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔

مشق ۲۱

(۱) اُس ناقص کی مساوات معلوم کرو جس کا مرکز مبدأ پر محور اعظم محور لاکہ سمت میں محور اصغر محور ماکہ سمت میں واقع ہو اور جو نقطوں (۲،۳) اور (۱،۳) میں سے گزرے۔

$$\text{جواب } ۳۲ = ۶۵ + ۲۳$$

(۲) اُس ناقص کی مساوات دریافت کرو جس کا ماسکہ نقطہ (۲،۳) مرتب

$$\text{خط } ۱۴ = ۱ - ۶۳ + ۱۰ \text{ اور خروج مرکز } \frac{۵}{۴} \text{ ہے۔}$$

$$\text{جواب } ۲۰ = ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ + ۱۲۰۸ - ۱۱۳۸ + ۲۶۴ = ۰$$

(۳) اس ناقص کی مساوات دریافت کرو جس کا مرکز مبدأ پر وتر خاص کا

$$\text{طول } ۸ \text{ اور خروج مرکز } \frac{۲}{۵} \text{ ہے۔}$$

$$\text{جواب } ۶۲۵ = ۲۵ + ۱۶$$

(۴) اُس ناقص کی مساوات دریافت کرو جس کے ماسکے نقاط (۳،۰) اور

$$\text{(-۳،۰) ہیں اور جس کا خروج مرکز } \frac{۱}{۳} \text{ ہے۔}$$

$$\text{جواب } ۱ = \frac{۲۸}{۱۲۸} + \frac{۱۴}{۱۴۴}$$

(۵) مساوات $۹\lambda^2 + ۵\lambda - ۳۰ = ۰$ سے تعبیر ہونے والے ناقص کا وترِ خاص 'خروج' مرکز اور ماسکوں کے متحد معلوم کرو۔

جواب $ل = \frac{۱۰}{۳} = ز = \frac{۲}{۳}$ س (۱۰) س (۵۰)

(۶) مساوات $۲۵\lambda^2 + ۱۶\lambda + ۵۰ = ۰$ سے

تعبیر ہونے والے ناقص کے محوروں کا طول 'خروج' مرکز اور ماسکوں کے متحد معلوم کرو۔

جواب $ل = ۱۳ = ب = ۵ = ز = \frac{۱۲}{۱۳}$ س (۱۱) س (۱۳)

(۷) ناقص پر کے نقطہ 'ف' کے جواب میں امدادی دائرہ پر نقطہ 'ق' ہے۔

نقطہ 'ف' سے خط 'ق' ج کے متوازی ایک خط کھینچا گیا ہے جو محورِ اعظم سے نقطہ 'ل' پر اور محورِ اصغر سے نقطہ 'م' پر ملتا ہے ثابت کرو کہ

$$فل = ب' ف م = ل$$

[اشارہ: 'ف' سے محورِ اعظم پر عمود 'ف ن' ڈالو اور خارج مرکز

زاویہ 'ف ن' کی رقوم میں 'ف' کے محدودوں کے لیے جو جملے دفعہ (۵۱) میں حاصل کیے گئے ہیں ان کو استعمال کرو۔]

(۸) ذیل کی مساواتوں سے تعبیر ہونے والے ناقص کے ماسکوں کے متحد

معلوم کرو:

$$(۱) ۴\lambda^2 + ۴\lambda - ۱۲ = ۰ \quad (ب) ۱۶\lambda^2 + ۲۵\lambda - ۳۰۰ = ۰$$

$$(ج) ۴\lambda^2 + ۲۵\lambda - ۱۰۰ = ۰$$

جواب (۱) $(\frac{۳}{۲}, -\frac{۳}{۲})$ (ب) $(۰, ۳)$ (۰, ۳)

(ج) $(\frac{۳}{۲}, -\frac{۳}{۲})$ (۰, ۳)

(۹) اس ناقص کی مساوات معلوم کرو جس کے ماسکوں کے متحد (۰, ۳) اور (۳, ۰)

ہیں اور جس کے محورِ اعظم کا طول ۱۲ ہے۔

$$جواب ۲۰\lambda^2 + ۶۲\lambda - ۱۸۰ = ۰$$

(۱۰) اس ناقص کی مساوات معلوم کرو جس کے ماسکوں کے متحد (۲, ۰) اور (۰, ۳)

ہیں اور جس کے محورِ اعظم کا طول ۱۲ ہے۔ جواب $۱ = \frac{(۲-۰)^2}{۲۳} + \frac{(۰-۳)^2}{۲۹}$

(۱۱) ناقص لا' + ما' = ۹ کے وترِ خاص کا طول معلوم کرو۔

جواب $\frac{۲۰}{۳}$
(۱۲) اُس ناقص کی مساوات معلوم کرو جس کا رأس (۳۶۰) اور ماسکہ (۲۶۰) ہے۔

جواب $۹ لا' + ۵ ما' = ۳۵$
(۱۳) اُس ناقص کی مساوات معلوم کرو جس کا خروج المکرز $\frac{۱}{۲}$ اور رأس (۶۰) ہے۔

جواب $۲۴ لا' + ۳۶ ما' = ۹۴۲$
(۱۴) اُس ناقص کی مساوات معلوم کرو جس کا وترِ خاص ۱۰ اور خروج المکرز $\frac{۲}{۳}$ ہے۔

جواب $۳۶ ما' + ۴ لا' = ۳۶۳۵$
(۱۵) اُس ناقص کی مساوات معلوم کرو جس کا مرکز (۲۱) محورِ اعظم کا طول ۱۰ اور محورِ اصغر کا طول ۶ ہے۔

$$\text{جواب } ۱ = \frac{۲(۲-۶)}{۳۶} + \frac{۲(۱-۶)}{۱۰۰}$$

۶، ۵۔ ناقص کے وتر کی مساوات —

فرض کرو کہ ناقص پر کوئی دو نقطے ف اور ق ہیں جن کے محدود بالترتیب (لا'، ما') اور (لا'، با') ہیں۔ چونکہ یہ دونوں نقطے ناقص پر واقع ہیں اس لیے

$$۱ = \frac{لا'}{۲} + \frac{ما'}{۲}$$

$$۱ = \frac{لا'}{۲} + \frac{با'}{۲}$$

دوسری مساوات کو پہلی میں سے تفریق کرنے پر حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = - \frac{1}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = - \frac{1}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} \quad (1)$$

اب ہم کو معلوم ہے کہ کسی دو نقطوں $(\frac{1}{a}, \frac{1}{b})$ اور $(\frac{1}{a'}, \frac{1}{b'})$ کو ملانے والے خط کی مساوات حسب ذیل ہوتی ہے

$$\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}} = \frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}}$$

یعنی

$$\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}} = \frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}} \quad (2)$$

مساوات (۱) سے $\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}}$ کی قیمت مساوات (۲) میں درج کرنے پر حاصل ہوتا ہے کہ

$$\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}} = \frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}} \quad (3)$$

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{b'} = (\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}) (\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}) + (\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}) (\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}) \quad (4)$$

مساواتوں (۳) اور (۴) میں سے کسی ایک کو ہم ناقص کے وتر ف ق کی مساوات لے سکتے ہیں۔

۶۱ و ۵۔ ناقص پر کے کسی نقطہ سے ناقص کے

ماس کی مساوات۔

وتر ف ق کے لیے گزشتہ دفعہ میں جو مساوات حاصل کی گئی ہے اُس سے ہم حسب معمول فوراً ماس کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

وتر ف ق کی مساوات (۴) دفعہ (۵۶) صحیح ہے خواہ نقاط ف اور ق ناقص پر کہیں واقع ہوں۔ فرض کرو کہ نقطہ ف ثابت رہتا ہے اور نقطہ ق ناقص پر حرکت کرتے ہوئے نقطہ ف کے قریب آتا ہے۔ آہٹا میں جبکہ نقطہ ق نقطہ ف پر عین منطبق ہونے کو ہو ہمیں نقطہ ف پر کا ماس حاصل ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس وقت مساوات (۴) دفعہ (۵۶) میں

رکھنا چاہیے۔ پس نقطہ ف پر کے ماس کی مساوات حسب ذیل حاصل ہوتی ہے :-

$$ب^2 = (لا - لا) (لا) + (لا^2) + (لا - لا) (لا) = ۰$$

یا ۲ و ب پر تقسیم کرنے سے مساوات ہو جاتی ہے

$$۰ = \frac{لا (لا - لا)}{لا} + \frac{لا (لا - لا)}{لا}$$

یا مختلف ترتیب دینے سے ملتا ہے

$$(۱) \dots\dots\dots \frac{لا}{لا} + \frac{لا}{لا} = \frac{لا}{لا} + \frac{لا}{لا}$$

لیکن چونکہ نقطہ ف ناقص پر واقع ہے اس لیے اس کے محدود (لا، لا) ناقص کی مساوات کو پورا کر نیگے

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ = \frac{لا}{لا} + \frac{لا}{لا}$$

مساوات (۲) کو مساوات (۱) میں درج کرنے پر حاصل ہوتا ہے

$$(۳) \dots\dots\dots ۱ = \frac{لا}{لا} + \frac{لا}{لا}$$

یہی ناقص کے ماس کی مطلوبہ مساوات ہے جو بیاری شکل میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماس کی مساوات ناقص کی مساوات سے اسی

قاعدہ کی بناء پر لکھی جاسکتی ہے کہ لا کی بجائے لا لا، ما کی بجائے ما ما،
۲ لا کی بجائے لا + لا اور ۲ ما کی بجائے ما + ما رکھ دیا جائے۔ یہ قاعدہ
ماس کی مساوات کو یاد رکھنے کے لیے بہت مفید ہے اور دوسرے
درجہ کی ہر مساوات کے لیے صحیح ہے۔

۵۶۲۔ عماد کی مساوات -

ماس کی مساوات حاصل ہو جانے کے بعد عماد کی مساوات
حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ فرض کرو کہ ہم نقطہ ف پر
جس کے محدد (لا، ما) ہیں عماد کی مساوات دریافت کرنا چاہتے ہیں۔
نیز فرض کرو کہ نقطہ ف پر کا عماد محور لا سے زاویہ طہ اور نقطہ ف پر
کا ماس محور لا سے زاویہ طہ بناتا ہے۔ گزشتہ دفعہ میں حاصل
کی ہوئی ماس کی مساوات (۳) کو اس طرح لکھ سکتے ہیں:

$$(۱) \quad \frac{ب^۲}{ما} = ۱ - \left(\frac{لا}{لا} \right) \dots \dots \dots (۱)$$

خط مستقیم کے بیان سے ہم کو معلوم ہے کہ اگر خط (۱) محور لا سے
زاویہ طہ بنائے تو

$$(۲) \quad \text{مس طہ} = \frac{ب^۲}{لا} \dots \dots \dots (۲)$$

لیکن چونکہ عماد ماس پر علی القوائم ہوتا ہے اس لیے

$$(۳) \quad \text{مس طہ} = \frac{۱}{\frac{لا}{ب^۲}} \dots \dots \dots (۳)$$

اب عماد چونکہ نقطہ (لا، ما) میں سے گزرتا ہے اس لیے اس کی
مساوات فوراً حاصل ہوتی ہے

$$ما - ب = \text{مس طہ} (لا - لا) = \frac{ب^۲}{لا} (لا - لا)$$

یعنی $\text{ب}^۲ \text{لا} (\text{لا} - \text{لا}) = (\text{لا} - \text{لا}) \text{لا} (\text{لا} - \text{لا}) \dots \dots (۴)$

$$\frac{(\text{لا} - \text{لا}) \text{لا}}{\text{لا}} = \frac{(\text{لا} - \text{لا}) \text{لا}}{\text{لا}}$$

جو عماد کی مطلوبہ مساوات ہے۔

مثال (۱) مساوات $\text{لا} + \text{ب}^۲ + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{ج} = ۰$ ایک ناقص کو تعبیر کرتی ہے۔ اس پر کے کسی نقطہ ف (لا، لا) پر کے حماس کی مساوات دریافت کرو۔

فرض کرو کہ ناقص پر ایک اور نقطہ ق (لا، لا) ہے۔ تو

$$\text{لا} + \text{ب}^۲ + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{ج} = ۰$$

$$\text{لا} + \text{ب}^۲ + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{لا} + \text{ج} = ۰$$

تفریق کرنے سے

$$\text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ب} - \text{ب} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ج} - \text{ج} = ۰$$

یعنی $\text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ب} - \text{ب} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ج} - \text{ج} = ۰$

یعنی $\text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ب} - \text{ب} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ج} - \text{ج} = ۰ \dots \dots (۱)$

پس وتر ف ق کی مساوات ہوگی

$$(۲) \dots \dots \frac{\text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ب} - \text{ب} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ج} - \text{ج}}{\text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ب} - \text{ب} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{لا} - \text{لا} + \text{ج} - \text{ج}} = \frac{\text{لا} - \text{لا}}{\text{لا} - \text{لا}} = \frac{\text{لا} - \text{لا}}{\text{لا} - \text{لا}}$$

نقطہ ف پر کے حماس کی مساوات حاصل کرنے کے لیے مساوات (۲) میں

$$\text{لا} = \text{لا} \text{ اور } \text{لا} = \text{لا} \text{ رکھنا چاہیے جس سے حاصل ہوتا ہے}$$

(۳) ثابت کرو کہ ان تمام ناقصوں کے جن کے محورِ اعظم ایک ہی ہوں، ان نقطوں پر کے مماس اجن کا فضلہ دیا ہوا ہو محور لا کو ایک ہی نقطہ پر قطع کرتے ہیں۔ اس طرح سے معلوم کرو کہ ایک دائرہ کے مماس کی مدد سے ایک ناقص کا مماس کس طرح کھینچا جاسکتا ہے بشرطیکہ نقطہ مماس ن دیا ہوا ہو۔

[نصف محورِ اعظم کے نصف قطر والا ایک دائرہ کھینچو اور دائرہ پر وہ نقطہ دریافت کرو جس کا فضلہ نقطہ مماس ن کے فضلہ کے مساوی ہو۔ اس نقطہ پر دائرہ کا مماس کھینچو جو فرض کرو کہ محور لا سے مت پر ملتا ہے۔ ت ن ناقص کا مطلوبہ مماس ہوگا۔]

(۴) ناقص $۹\lambda + ۲۵\mu + ۵۴\lambda - ۱۲۰۰ - ۸۴۳ = ۰$ کے نقطہ (۹۶) پر کے مماس اور عماد کی مساواتیں معلوم کرو۔

جواب مماس $۸۱\lambda + ۱۲۵\mu - ۱۶۱۱ = ۰$ عماد $۱۱۲۵\lambda - ۸۱\mu - ۲۱ = ۰$

(۵) ناقص $۹\lambda + ۱۶\mu + ۳۶\lambda - ۱۲۸\mu - ۱۳۸ = ۰$ کے نقطوں

(۱) $(-۲, ۴)$ (ب) $(۲, ۲)$ (ج) $(۱, ۲)$ اور (د) $(-۶, ۲)$ پر کے مماسوں اور عمادوں کی مساواتیں دریافت کرو۔

جواب (۱) $۴ - ۱۶\mu = ۰$ (ب) $۲ - ۱۶\mu = ۰$ (ج) $۱ - ۱۶\mu = ۰$

(د) $۲ + ۱۶\mu = ۰$ $۳ - ۱۶\mu = ۰$

(۶) ناقص $۱۱\lambda + ۲۵\mu - ۱۹۶\lambda - ۱۲۰۰ - ۱۴۴ = ۰$ کے نقطوں

(۱) $(-۲, ۴)$ اور (ب) $(۳, ۰)$ پر کے مماسوں اور عمادوں کی مساواتیں دریافت کرو۔

جواب (۱) $۲ + ۱۱\lambda = ۰$ (ب) $۳ - ۱۱\lambda = ۰$

(۷) ناقص $۲\lambda + ۱۶\mu - ۱۶\lambda - ۱۴۴ = ۰$ کے نقطہ (۴، ۸) پر کے مماس

اور عماد کی مساواتیں دریافت کرو۔

جواب $۲ - ۱۶\mu = ۰$ $۱۶ - ۱۶\mu = ۰$

۵۔ ناقص اور خطِ مستقیم کا تقاطع۔

فرض کر دو کہ ناقص کی مساوات

$$(۱) \dots\dots\dots ۱ = \frac{۲}{۲} + \frac{۲}{۲}$$

ہے اور دیا ہوا خط مستقیم

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ = م + لا + ج$$

سے تعبیر ہوتا ہے۔ ہم اوپر اکثر بیان کر چکے ہیں کہ کسی دو منحنیوں کے نقاط تقاطع کو دریافت کرنے کے لیے دونوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے لا اور ما کی قیمتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ پس (۲) سے ما کی قیمت (۱) میں درج کرنے پر ملتا ہے:

$$۱ = \frac{۲}{۲} + \frac{(م + لا + ج)}{۲}$$

یعنی پھیلانے اور ترتیب دینے پر

$$۲ = لا + ۱ + (م + لا + ج) - ۲$$

$$(۳) \dots\dots\dots ۱ = (۲ - ج) + لا + ۱$$

لا میں یہ ایک دوسرے درجہ کی مساوات ہے اور اس سے ہم کو عام طور پر لا کی دو قیمتیں لا اور لا ملتی ہیں جن کو ہم چاہیں تو فوراً لکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کے جواب میں ما کی دو قیمتیں حسب ذیل حاصل ہوتی ہیں:

$$۱ = م + لا + ج$$

$$۱ = م + لا + ج$$

اس طرح دو نقاط تقاطع (لا، ما) اور (لا، ما) مل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خط مستقیم ایک ناقص کو دو اور صرف دو نقطوں پر قطع کرتا ہے۔ اب جبر و مقابلہ سے ہم کو معلوم ہے کہ مساوات (۳) کی دونوں صلیب حقیقی ہونگی، یا منطبق ہونگی، یا خیالی ہونگی، بموجب اس کے کہ جذر

(۲) $\frac{1}{2} \text{ م ج } - \frac{1}{2} \text{ (ب}^2 + \text{م}^2) \times \text{ا}^2 \text{ (ج}^2 - \text{ب}^2) \dots (۵)$
 کی قیمت ثبت ہو یا صفر ہو یا منفی ہو۔ پہلی صورت میں خط مستقیم ناقص کا وتر ہوگا
 دوسری صورت میں خط ناقص کا ماس ہوگا اور تیسری صورت میں وہ ناقص کے بالکل باہر
 واقع ہوگا۔

جلد (۵) کو $\frac{1}{2}$ پر تقسیم کرنے اور پھیلا کر سادہ شکل میں تحویل کرنے پر

$$\text{ب}^2 (\text{ب}^2 + \text{م}^2) - \text{ب}^2 \text{ ج}^2$$

ملتا ہے اور پھر اس جگہ کو $\frac{1}{2}$ پر تقسیم کریں تو

$$\text{ب}^2 + \text{م}^2 - \text{ج}^2 \dots (۶)$$

حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا نقاط تقاطع کا حقیقی، منطبق یا خیالی ہونا اس پر منحصر ہے کہ
 جلد (۶) کی قیمت مثبت، صفر یا منفی ہو یعنی اس پر منحصر ہے کہ

$$\text{ج}^2 \geq \text{ب}^2 + \text{م}^2 \dots (۷)$$

اب اگر م کو مستقل کر دیا جائے یعنی خط ایک دی ہوئی سمت میں کھینچا جائے
 تو یہ ناقص کو اُس وقت سر کرے گا جبکہ

$$\text{ج}^2 = \text{ب}^2 + \text{م}^2 \dots (۸)$$

یعنی

$$\text{ج} = \sqrt{\text{ب}^2 + \text{م}^2} \text{ یا } -\sqrt{\text{ب}^2 + \text{م}^2} \dots (۹)$$

اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دی ہوئی سمت طہ میں کھینچے ہوئے بے شمار
 متوازی خطوں میں سے صرف دو خط ناقص کو مس کرتے ہیں جن کی مساویں
 حسب ذیل ہیں:—

$$\text{ا} = \text{لا مس طہ} + \sqrt{\text{ا}^2 \text{ مس طہ} + \text{ب}^2} \dots (۱۰)$$

اور

$$۱ = لا مس طه - \sqrt{لا^۲ مس^۲ طه + ب^۲} \dots\dots (۱۱)$$

جہاں $مس طه = م$
 اس میں زاویہ طہ کی قیمت کے متعلق ہم نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے اور خواہ
 طہ کی قیمت کچھ ہی لی جائے خطوط (۱۰) اور (۱۱) ناقص کو ضرب و بس کرینگے۔

۱۷۵ - اوپر کی دفعہ میں ناقص کے ماس کے لیے جو مساوات نیکل

$۱ = م لا + \sqrt{لا^۲ م^۲ + ب^۲}$
 میں ملی ہے اس کو ہم دفعہ (۱۷۶) کی مساوات کی مدد سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
 اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے نقطہ تماس کے متحد بھی آسانی مل جاتے ہیں۔
 ہم کو معلوم ہے کہ ناقص پر کے نقطہ (لا، ما) پر کے ماس کی مساوات
 حسب ذیل ہے:-

$$۱ = \frac{لا}{لا} + \frac{ما}{ب}$$

یعنی اس کو دوسری طرح ترتیب دینے سے نقطہ (لا، ما) پر کی مساوات
 ملتی ہے

$$۱ = - \frac{ب^۲ لا}{لا^۲} + لا \dots\dots (۱)$$

فرض کرو کہ

$$- \frac{ب^۲ لا}{لا^۲} = م \dots\dots (۲)$$

اب ہمیں مساوات (۱) میں کی مستقل رقم $\frac{ب^۲ لا}{لا^۲}$ کی قیمت م کی قوم میں
 معلوم کرنا ہے۔
 مساوات (۲) سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{ب^۲ لا}{لا^۲} = - م$$

یعنی

$$(۳) \dots\dots\dots \frac{م^۲}{ک^۲} = \frac{ب^۲}{ا^۲}$$

لیکن چونکہ نقطہ (لا، ما) ناقص پر واقع ہے اس لیے

$$۱ = \frac{ا^۲}{ب^۲} + \frac{ک^۲}{ا^۲}$$

یعنی

$$\frac{ب^۲ - ا^۲}{ا^۲} = \frac{ک^۲}{ا^۲} - ۱ = \frac{ک^۲}{ا^۲}$$

پس

$$(۴) \dots\dots\dots \frac{ب^۲}{ا^۲(ب^۲ - ا^۲)} = \frac{۱}{ک^۲}$$

مساوات (۴) سے $\frac{۱}{ک^۲}$ کی قیمت مساوات (۳) میں رکھنے پر حاصل ہوتا ہے

$$\frac{ب^۲}{ا^۲} = م^۲ \frac{ا^۲}{ا^۲(ب^۲ - ا^۲)} = \frac{ب^۲}{ب^۲ - ا^۲}$$

ضرب چلیپائی دینے اور مختلف ترتیب دینے سے ملتا ہے

$$ا^۲(ا^۲ + م^۲) = ب^۲$$

یعنی

$$\frac{ا^۲}{ا^۲ + م^۲} = \frac{ب^۲}{ا^۲}$$

اس لیے

$$(۵) \dots\dots\dots \frac{ا^۲}{ا^۲ + م^۲} \pm \frac{ب^۲}{ا^۲} = ۱$$

ماس کی مساوات (۱) میں قیمتیں (۲) اور (۵) رکھنے سے یہ مساوات ہو جاتی ہے

$$ما = م لا \pm \frac{ا^۲}{ا^۲ + م^۲} + \frac{ب^۲}{ا^۲}$$

جو مطلوبہ مساوات ہے۔ مساوات (۵) سے ملتا ہے

(۶) \dots\dots\dots \frac{ب^۲}{ا^۲ + م^۲} \pm \frac{ا^۲}{ا^۲ + م^۲} = ۱

اور پھر مساوات (۲) میں یہ قیمت درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$(۷) \quad \frac{لا^۲ - م^۲}{لا \times م} = \frac{لا^۲ - م^۲}{لا \times م + م^۲ + لا^۲} \quad (۷)$$

پس معلوم ہوا کہ ماس = م لا + لا م + م + لا کا نقطہ تماس

$$(۸) \quad \left(\frac{لا^۲ - م^۲}{لا \times م + م^۲ + لا^۲} \right) \times \left(\frac{لا^۲ - م^۲}{لا \times م + م^۲ + لا^۲} \right) \quad (۸)$$

ہے اور ماس = م لا - لا م - م + لا کا نقطہ تماس

$$(۹) \quad \left(\frac{لا^۲ - م^۲}{لا \times م + م^۲ + لا^۲} \right) \times \left(\frac{لا^۲ - م^۲}{لا \times م + م^۲ + لا^۲} \right) \quad (۹)$$

مثال (۱) ثابت کرو کہ خط

$$(۱) \quad لا جم ع + م جب ع = ع$$

ناقص کو مس کرتا ہے اگر ع = لا جم ع + م جب ع
خط مستقیم کی مساوات (۱) کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں

$$(۲) \quad ۱ = \frac{ع - لا جم ع}{م جب ع} \quad (۲)$$

ما کی قیمت (۲) کو ناقص کی مساوات میں درج کرنے پر ملتا ہے

$$۱ = \frac{ع - لا جم ع}{م جب ع} + \frac{لا^۲}{لا \times م}$$

یعنی لا^۲ جب ع + لا (ع - لا جم ع) - لا جب ع = ۰

$$(۳) \quad لا^۲ (لا جم ع + م جب ع) - ع (لا جم ع + م جب ع) = ۰ \quad (۳)$$

خط مستقیم (۱) ناقص کا ماس ہوگا اگر مساوات (۳) میں لا کی دونوں قیمتیں مساوی ہوں
یعنی اگر

$$ل^۱ (ل^۱ م^۱ + ب^۱ ج^۱ م^۱) (ع^۱ - ب^۱ ج^۱ م^۱) = ع^۱ ل^۱ ج^۱ م^۱$$

یعنی اگر $ل^۱ ب^۱ ج^۱ م^۱ + ل^۱ ب^۱ ج^۱ م^۱ + ل^۱ ب^۱ ج^۱ م^۱ - ع^۱ - ل^۱ ب^۱ ج^۱ م^۱ =$

یعنی اگر $ع^۱ = ل^۱ ج^۱ م^۱ + ب^۱ ج^۱ م^۱ \dots \dots \dots (۴)$

مثال (۲) ثابت کرو کہ خط مستقیم

$$ل + م + ن = \dots \dots \dots (۵)$$

ناقص کو مس کریگا اگر $ل^۱ + ب^۱ م^۱ = ن^۱$
مساوات (۱) سے ملتا ہے

$$ل - ن = ل^۱ \dots \dots \dots (۶)$$

مساوات (۶) سے م کی قیمت کو ناقص کی مساوات میں درج کرنے پر حاصل ہوتا ہے

$$۱ = \frac{ل - ن}{ب^۱ م^۱} + \frac{ل^۱}{ل}$$

یعنی پھیلانے اور ترتیب دینے پر

$$ل (ل^۱ + ب^۱ م^۱) - ل^۱ ن + ل ل + ل (ن - ب^۱ م^۱) = \dots \dots \dots (۷)$$

دیا ہوا خط (۵) ناقص کو مس کریگا اگر

$$ل (ل^۱ + ب^۱ م^۱) \times ل (ن - ب^۱ م^۱) = ل^۱ ن ل$$

ان کو پھیلانے اور مختصر کرنے پر مطلوبہ شرط حاصل ہو جاتی ہے۔

مشق ۳۳

(۱) معلوم کرو کہ نقاط (۰.۶۹، ۰.۶۹) اور (۰.۶۴، ۰.۶۴)

ناقص $لا^۲ + ما^۲ = ۴$ کے اندر ہیں یا باہر -
 (۲) معلوم کرو کہ ت کی کن قیمتوں کے لیے خط مستقیم $لا = ۱ + ت$ کا $ما = ۲$ پر کے نقطے ناقص $لا^۲ + ما^۲ = ۱$ کے اندر واقع ہوں گے۔

جواب: ت = ۱ سے لے کر ت = $\frac{۴}{۵}$ تک -
 (۳) ثابت کرو کہ خط مستقیم $لا + ما = ۱۱$ ناقص $لا^۲ + ما^۲ = ۱۱$ کا ایک تماس ہے۔ نقطہ تماس کے محدود بھی دریافت کرو۔

جواب: (۱، ۲)
 (۴) ثابت کرو کہ خط مستقیم $لا + ما + ن = ۰$ ناقص $لا^۲ + ما^۲ = ۱$ کو جن نقطوں پر قطع کرتا ہے ان پر ناقص کے تماس کی مشترکہ مساوات حسب ذیل ہے:

$$(لا + ما + ن) = ۱ - \left(\frac{لا^۲}{۱} + \frac{ما^۲}{۱} \right) (۱ - \frac{لا^۲}{۱} - \frac{ما^۲}{۱} - ن)$$

(۵) خطوط مستقیم (۱) $لا + ما + ن = ۱۵۰$ (ب) $لا + ما + ن = ۱۵۰$ (ج) $لا + ما + ن = ۱۰$ ہیں ان کے نقاط تصنیف کے محدود معلوم کرو۔

جواب (۱) (۱، ۲۰)، (ب) $(\frac{۱}{۲}, \frac{۳}{۲})$ (ج) $(۱ + \frac{۹}{۴}, -\frac{۱}{۴})$
 (۶) ناقص $لا^۲ + ما^۲ = ۲۰$ کے وتر $لا + ما = ۱$ کا نقطہ وسطی دریافت کرو۔

جواب: $(\frac{۵}{۲}, \frac{۵}{۲})$
 (۷) ثابت کرو کہ خط مستقیم $لا + ما + ن = ۰$ ناقص $لا^۲ + ما^۲ = ۱$ کو جس وتر پر قطع کرتا ہے اس کے نقطہ تصنیف کے محدود $(\frac{لا}{۲}, \frac{ما}{۲})$ ہیں۔

۵، ۸ - وتر تماس کی مساوات

فرض کرو کہ کوئی نقطہ ن جس کے محدود (لا، ما) ہیں ناقص کے باہر واقع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیرونی نقطہ سے ناقص کے دو تماس کھینچے جاسکتے ہیں۔

فرض کرو کہ یہ ماس ناقص کو نقاط ف اور ق پر ملتے ہیں جن کے محدود
بالترتیب (لا، ما) اور (لا، ما) ہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ وتر ف ق کی مساوات دریافت کریں۔
نقطہ ف (لا، ما) پر کے ماس ن کی مساوات ہے

$$1 = \frac{لا}{ب} + \frac{ما}{ا}$$

لیکن چونکہ یہ ماس نقطہ ن (لا، ما) میں سے بھی گزرتا ہے اس لیے

$$(1) \quad 1 = \frac{لا}{ب} + \frac{ما}{ا}$$

اسی طرح نقطہ ق (لا، ما) پر کے ماس ق ن کی مساوات ہے

$$1 = \frac{لا}{ب} + \frac{ما}{ا}$$

اور چونکہ یہ ماس بھی نقطہ ن (لا، ما) میں سے گزرتا ہے اس لیے

$$(2) \quad 1 = \frac{لا}{ب} + \frac{ما}{ا}$$

اب مساوات

$$(3) \quad 1 = \frac{لا}{ب} + \frac{ما}{ا}$$

پر غور کرو۔ یہ ایک خط مستقیم کی مساوات ہے جس کو (لا، ما) اور (لا، ما)

پورا کرتے ہیں۔ یعنی خط مستقیم (۳) نقطوں ف اور ق میں سے گزرتا ہے
جن کا وتر تماس ہے۔

پس نقطہ (لا، ما) کے وتر تماس کی مطلوبہ مساوات (۳) ہے۔

۵۸۔ قطب اور قطبی: — دائرہ کے بیان

دفعہ (۳۷) میں ہم قطب اور قطبی کی تعریف بتا چکے ہیں۔ اس کے

ماثل تعریف کو ہم کافی 'ناقص' اور زائد کے لیے اختیار کرتے ہیں گویا ناقص کے لیے قطبی کی تعریف حسب ذیل ہوگی :-
اگر ناقص کے اندرونی یا بیرونی کسی نقطہ 'ن' سے کوئی خط مستقیم کھینچا جائے جو ناقص کو نقطوں 'ف' اور 'ق' پر قطع کرے تو 'ف' اور 'ق' پر کے ماسوں کے نقطہ تقاطع کا طریق "ن" کا قطبی بلحاظ ناقص کہلاتا ہے۔
نقطہ 'ن' کو قطب کہتے ہیں۔

۵۱۸۲۔ قطبی کی مساوات — یہ مساوات

بھی بعینہ اسی طریقہ سے حاصل کی جاتی ہے جو دائرہ کی شکل میں اختیار کیا گیا تھا۔

فرض کرو کہ 'ن' کے محدود (لا، م) ہیں اور فرض کرو کہ 'ن' میں سے گزرتا ہوا کوئی وتر کھینچا گیا ہے جو ناقص کو نقاط 'ف' اور 'ق' پر ملتا ہے۔ نیز فرض کرو کہ 'ف' اور 'ق' پر کے ماس بیرونی نقطہ 'س' پر قطع کرتے ہیں جس کے محدود (ھ، ک) ہیں۔ پس خط 'ف' و 'ق' وتر 'ماس' ہے نقطہ 'س' میں سے کھینچے ہوئے ماسوں کا اور اس لیے 'ف' و 'ق' کی مساوات گزشتہ دفعہ کے بموجب

$$(۱) \dots\dots\dots ۱ = \frac{\text{ماک}}{\text{ب}} + \frac{\text{لا، ھ}}{\text{ر}}$$

ہے۔ لیکن خط 'ف' و 'ق' نقطہ 'ن' (لا، م) میں سے گزرتا ہے اس لیے

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ = \frac{\text{ماک}}{\text{ب}} + \frac{\text{لا، ھ}}{\text{ر}}$$

مساوات (۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ (ھ، ک) جو ایک متغیر نقطہ ہے ہمیشہ مساوات

$$(۳) \dots\dots\dots ۱ = \frac{\text{س، م}}{\text{ب}} + \frac{\text{لا، ر}}{\text{ر}}$$

کو پورا کرتا ہے۔ یعنی نقطہ 'س' کا طریق ایک خط مستقیم ہے جس کی مساوات (۳)

پس یہی نقطہ 'ن' کے قطبی کی مطلوبہ مساوات ہے۔
نوٹ۔ اگر نقطہ 'ن' (لا، ما) ناقص پر واقع ہو تو مساوات (۳) بالکل وہی ہے جو نقطہ 'ن' پر کے ماس کی مساوات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناقص پر کے کسی نقطہ کا قطبی اس نقطہ پر کا ماس ہی ہوتا ہے۔

نیز اگر نقطہ 'ن' ناقص کے باہر واقع ہو تو مساوات (۳) وہی ہے جو نقطہ 'ن' کے وتر تماس کی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ ایک بیرونی نقطہ 'ن' کا قطبی اس نقطہ کا وتر تماس ہی ہوتا ہے۔

۸۳ دھ۔ قطب کے محدود۔ فرض کرو کہ خط مستقیم

(۱) $لا + با + ج = ۰$
دیا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا قطب لمحات ناقص دریافت کریں یعنی وہ نقطہ دریافت کریں جس کا قطبی دیا ہوا خط مستقیم (۱) ہے۔
فرض کرو کہ قطب کے مطلوبہ محدود (لا، ما) ہیں۔
ہم گذشتہ دفعہ میں دیکھ چکے ہیں کہ نقطہ (لا، ما) کے قطبی کی مساوات حسب ذیل ہے:

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ = \frac{لا}{ب} + \frac{ما}{ج}$$

مساواتیں (۱) اور (۲) دونوں (لا، ما) کے قطبی یعنی ایک ہی خط کو تعبیر کرتی ہیں یعنی یہ دونوں مساواتیں زیادہ سے زیادہ صرف ایک مستقل جزو ضربی کے لمحات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ پس

$$\frac{۱}{ج} = \frac{\frac{لا}{ب}}{ب} = \frac{\frac{لا}{ب}}{۱}$$

$$(۳) \dots\dots\dots یعنی لا = \frac{۱}{ج} ، ما = \frac{ب}{ج}$$

یعنی خط مستقیم (۱) کا قطب نقطہ $(\frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1})$ ہے۔

مثال (۱) - ناقص $\frac{1}{9} + \frac{1}{9} = 1$ کے لحاظ سے نقطہ (۱-۲) کا قطبی معلوم کرو۔

نقطہ (۱-۲) میں سے کوئی خط کھینچو جو ناقص کو نقاط 'ق' پر قطع کرتا ہے۔ فرض کرو کہ 'ق' اور 'ق' پر کے ماس ایک دوسرے کو بیرونی نقطہ (لا، ما) پر قطع کرتے ہیں تو خط 'ق' نقطہ سرہ کا وتر تماس ہوگا اور اس لیے اس کی مساوات

$$1 = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} \text{ ہوگی}$$

لیکن چونکہ خط 'ق' دیے ہوئے نقطہ (۱-۲) میں سے گزرتا ہے اس لیے

$$1 = \frac{1}{9} - \frac{1}{9}$$

اس لیے (لا، ما) کا طریق یعنی دیے ہوئے نقطہ (۱-۲) کا قطبی حسب ذیل خط ہوگا۔

$$1 = \frac{1}{9} - \frac{1}{9} \text{ یا } 18 = 69 - 52$$

مثال (۲) - ناقص $\frac{1}{16} + \frac{1}{36} = 1$ کے لحاظ سے

خط ۲-لا-۵-۸ کا قطب معلوم کرو۔

فرض کرو کہ مطلوبہ قطب (لا، ما) ہے تو دیے ہوئے ناقص کے لحاظ سے (لا، ما) کے قطبی کی مساوات

$$1 = \frac{1}{16} + \frac{1}{36}$$

ہوگی۔ پس یہ مساوات اسی خط کو تعبیر کرنی چاہیے جو ۲-لا-۵-۸ سے تعبیر ہوتا ہے

لہذا
$$\frac{1}{8} = \frac{1}{5 \times 16} = \frac{1}{2 \times 32}$$

پس
$$10 + \frac{80}{8} = 10 + 10 = 20$$

پس قطب کے محدود (۱۰، ۹) ہیں۔

ناقص پر متفرق سوالات

(۱)۔ ذیل کی مساواتوں سے تعبیر ہونے والے ناقصوں کے محور اعظم اور محور اصغر کے طول اور مساواتیں خروج مرکز اور ماسکوں کے محدود معلوم کرو اور ناقصوں کو مرتسم کرو:-

(۱)
$$0 = 11 - 61x - 51y + 19x^2 + 13y^2$$

جواب (۱)
$$0 = 1 - 61x - 51y + 19x^2 + 13y^2$$

(۱، ۵) (۲، -)

(ب)
$$0 = 11x^2 + 13y^2 + 12x + 14y - 1$$

جواب (ب)
$$0 = 11x^2 + 13y^2 + 12x + 14y - 1$$

(۰، ۳۶) (۲، -)

(ج)
$$0 = 51x^2 + 61x + 12y^2 + 13y - 1$$

جواب (ج)
$$0 = 51x^2 + 61x + 12y^2 + 13y - 1$$

(۵، -) (۲، -)

(د)
$$1 = 61x^2 + 51y^2 + 12x + 14y - 1$$

جواب (د)
$$0 = 61x^2 + 51y^2 + 12x + 14y - 2$$

(۰، ۱) (۱، ۰)

(۲) ایک ناقص کا محدود اعظم محور لا کے متوازی اور مرکز (۱، -۲) ہے۔ محدودوں کے طول بالترتیب ۸ اور ۴ ہیں۔ ناقص کی مساوات دریافت کرو اور ناقص کی

ترسیم بناؤ۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2(2+6)}{16} + \frac{2(1+1)}{4}$$

(۳) ایک ناقص کے ماسکوں کے محدود (۱-۳) (۱-۵) پر ہیں اور محور اعظم کا طول ۸ ہے۔ ناقص کی مساوات دریافت کرو اور اس کی ترسیم بناؤ۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2(1+6)}{36} + \frac{2(1+1)}{4}$$

(۴) ایک ناقص کے رأس نقطوں (۲-۲) اور (۲-۴) پر ہیں اور خروج مرکز $\frac{1}{4}$ ہے۔ ناقص کی مساوات دریافت کرو اور اس کی ترسیم بناؤ۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2(1-6)}{16} + \frac{2(2-1)}{4}$$

(۵) ایک ناقص کا مرکز (۱-۲) خروج مرکز $\frac{1}{4}$ ، محور اعظم محور $\hat{a}$ کے متوازی اور محور اعظم کا طول ۶ ہے۔ ناقص کی مساوات دریافت کرو اور اس کی ترسیم بناؤ۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2(1-6)}{36} + \frac{2(2-1)}{4}$$

(۶) ایک ناقص کے رأس نقطوں (۰-۰) اور (۰-۵) پر ہیں اور ایک ماسکہ (۰-۲) ہے۔ ناقص کی مساوات دریافت کرو اور اس کی ترسیم بناؤ۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2}{4} + \frac{2(\frac{5}{2}+1)}{25}$$

(۷) ایک ناقص کے محور اعظم اور محور اصغر دیے گئے ہیں۔ پٹری اور پرکار کی مدد سے ناقص کے دونوں ماسکے دریافت کرو۔

(۸) ایک مثلث کے قاعدہ کا طول ۴ اور باقی دو اضلاع کا مجموعہ ۶ ہے۔ مثلث کے رأس کا طریق معلوم کرو۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{16}{9} + \frac{4}{9} \quad (\text{قاعدہ محور لا اور نقطہ تنصیف مبداء ہے})$$

(۹) ثابت کرو کہ ناقص کا محور اصغر، اس کے محور اعظم اور نیم وتر خاص کے درمیان وسط تناسب ہے۔

(۱۰) ثابت کرو کہ ناقص پر کے کسی نقطہ N پر کا ماسک ماسکی دتروں N سے اور N سے کے درمیان خارجی زاویہ کی تنصیف کرتا ہے۔

[فرض کرو کہ N کے محدود (لا، لا) ہیں۔ N پر کا ماسک محور لا سے T پر ملتا ہے تو $CT = \frac{1}{2}$]

$$\begin{aligned} \text{اب س ت} &= \text{س ج} + \text{ج ت} = \frac{1}{p} + \frac{2}{p} = \frac{3}{p} \quad (1 + 2) \text{ اور} \\ \text{س ت} &= \text{ج ت} - \text{ج س} = \frac{2}{p} - \frac{1}{p} = \frac{1}{p} \quad (2 - 1) \text{ اور} \\ \therefore \frac{\text{س ت}}{\text{س ت}} &= \frac{3}{1} = \frac{3}{1} \end{aligned}$$

(۱۱) ایک ناقص کا محور اصغر ۲ ہے، دونوں ماسکے اور مرکز محور اعظم کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ناقص کی مساوات دریافت کرو۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2}{5.4} + \frac{2}{4.6}$$

(۱۲) دائرہ کو ایک ناقص مان کر جس میں $1 = b$ ہو ماسکے مرتب اور خروج مرکز دریافت کرو۔

جواب: ماسکے مرکز پر منطبق ہیں، خروج مرکز صفر ہے اور مرتب لائن ہی بر واقع ہیں۔

(۱۳) ایک ناقص کا مرکز (۱۰، ۲) ایک مرتب $2 = 3$ اور خروج مرکز $\frac{3}{4}$ ہے۔ ناقص کی مساوات حاصل کرو۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2(2-6)}{43} + \frac{2(10-11)}{34}$$

(۱۴) ایک ناقص کا مرکز (۳، ۴) اور محور اعظم محور 4 کے متوازی ہے۔ ناقص کے دو نقطے (۲، ۴) اور (۴، ۰) ہیں۔ ناقص کی مساوات دریافت کرو۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2(4-6)}{16} + \frac{2(3-11)}{25}$$

(۱۵) ایک ناقص کا مرکز (۴، ۲) محور اعظم محور 4 کے متوازی اور محور اصغر کا طول ۱۲ ہے۔ ناقص پر کا ایک نقطہ (۸، ۴) ہے۔ ناقص کی مساوات دریافت کرو۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{2(2-6)}{9} + \frac{2(4-11)}{144}$$

(۱۶) زمین کا طریق ایک ناقص ہے جس کے ایک ماسکہ پر سو بروج واقع ہے۔
 طریق کے محورِ اعظم کا طول ۱۸۵۸ لاکھ میل اور خروج مرکز $\frac{1}{4}$ ہے۔ زمین اور سو بروج
 کے درمیان بعید ترین اور قریب ترین فاصلوں کا فرق معلوم کرو۔
 جواب نم ۶۱۶۹ لاکھ میل تقریباً۔

(۱۷) ناقص کے کسی نقطہ N سے محورِ اعظم پر عمود n مرتب ہے۔ ماسکہ S
 میں سے کھینچے ہوئے وتر خاص SN کے سرے F پر کا ماس mn من مخروط
 کو سرا پر قطع کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ $ms = FN$ ۔

چھٹا باب

قطع زائد

۶/۱۔ زائد کی تعریف — ایک ثابت خط مستقیم


وک اور ایک ثابت نقطہ میں دیے ہوئے ہیں۔ ایک متغیر نقطہ ن اس طرح حرکت کرتا ہے کہ اگر ن سے خط وک پر عمود ن م ڈالا جائے تو

$$س ن = ز ن \times م ن \dots \dots \dots (۱)$$

جہاں ز ایک مستقل عدد ہے جو اکائی سے بڑا ہے۔ متحرک نقطہ ن کے طریق کو ”سراسل“ کہتے ہیں۔ ثابت نقطہ س کو زائد کا ”ماسکہ“، ثابت خط وک کو زائد کا مرتب اور عدد ز کو زائد کا ”خروج المہرکن“ کہتے ہیں۔

۶/۱۱۔ زائد کی مساوات (معیاری شکل)۔

فرض کرو کہ ماسکہ س سے مرتب وک پر عمود س و ڈالا گیا ہے اور فاصلہ

(۱) $س و = د$ 

ہم نقطہ و کو مبداء خط و س کو محور لا اور خط وک کو محور ما بیٹیں
 فرض کرو کہ زاہد پر کے کسی نقطہ ن کے محدود (لا، ما) ہیں۔ تو چونکہ
 گذشتہ دفعہ کی رو سے

$$ن س = ز \times ن م$$

اس لیے $ن س^۲ = ز^۲ \times ن م^۲$ (۲)

$$یعنی (لا - د)^۲ = ما^۲ + ز^۲ لا^۲$$

یعنی پھیلانے اور ترتیب دینے سے حاصل ہوتا ہے

$$لا^۲ (ز^۲ - ۱) + ۲ لا د - ما^۲ = د^۲$$

$$یعنی (ز^۲ - ۱) \left\{ \frac{۲ لا د}{ز^۲ - ۱} + لا^۲ \right\} = د^۲ - ما^۲$$

بڑی قوسوں کے اندر کے جملہ کو کامل مربع بنانے پر حاصل ہوتا ہے۔

$$(1-z^2) \left\{ \frac{d}{1-z^2} + \frac{2}{1-z^2} + \frac{2}{1-z^2} + \frac{2}{1-z^2} \right\} = \frac{d}{1-z^2} + \frac{2}{1-z^2}$$

$$\text{یعنی } (1-z^2) \left\{ \frac{d}{1-z^2} + \frac{2}{1-z^2} \right\} = \frac{d}{1-z^2} + \frac{2}{1-z^2}$$

یعنی $(1-z^2)$ پر تقسیم کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے،

$$(3) \dots \frac{d}{1-z^2} = \frac{d}{1-z^2} - \left(\frac{d}{1-z^2} + \frac{2}{1-z^2} \right)$$

اب ہم مبداء کو خط و س پر نقطہ و کے بائیں جانب نقطہ ج پر منتقل کرتے ہیں جس کا فاصلہ نقطہ و سے $\frac{d}{1-z^2}$ ہے یعنی بالفاظ دیگر ہم مبداء کو نقطہ $(-\frac{d}{1-z^2}, 0)$ پر منتقل کرتے ہیں۔ نقطہ ج میں سے نئے محوروں کا 'ما' کو ہم پرانے محوروں کے متوازی لیتے ہیں تو محدودوں کی تبدیلی کے قاعدہ کی رو سے نئے محدود پرانے محدودوں کی رقوم میں حسبِ ذیل حاصل ہوتے ہیں:

$$(4) \dots \begin{cases} \frac{d}{1-z^2} + \frac{2}{1-z^2} = \frac{d}{1-z^2} \\ \frac{2}{1-z^2} = \frac{2}{1-z^2} \end{cases}$$

مساوات (۳) میں (۴) کو درج کرنے پر حاصل ہوتا ہے

$$(5) \dots \frac{d}{1-z^2} = \frac{d}{1-z^2} - \frac{2}{1-z^2}$$

اب ہم سہولت کی خاطر اس مساوات میں سے زبروں کو نکال دیتے ہیں تو حاصل ہوتا ہے

$$(۶) \dots\dots\dots \frac{۲}{۱-۲} = \frac{۲}{۱-۲} - \frac{۲}{۱-۲}$$

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مساوات (۶) میں محدود (لا، ما) نقطہ ج کو مبداء مان کر لیے گئے ہیں اور مساوات (۳) میں محدود (لا، ما) نقطہ د کو مبداء مان کر لیے گئے ہیں۔
اب ہم لکھتے ہیں

$$(۷) \dots\dots\dots \frac{۲}{۱-۲} = ۱$$

تو مساوات (۶) ہو جاتی ہے

$$\frac{۲}{۱-۲} = \frac{۲}{۱-۲} - \frac{۲}{۱-۲}$$

اس مساوات کو دونوں طرف $\frac{۲}{۱-۲}$ پر تقسیم کرتے ہیں تو

$$(۸) \dots\dots\dots ۱ = \frac{\frac{۲}{۱-۲}}{\frac{۲}{۱-۲}} - \frac{\frac{۲}{۱-۲}}{\frac{۲}{۱-۲}}$$

چونکہ زائد کے لیے خروج المیز کی قیمت ایک سے بڑی ہوتی ہے اس لیے $\frac{۲}{۱-۲}$ مثبت ہے۔ پس ہم لکھ سکتے ہیں:

$$(۹) \dots\dots\dots ۱ = \frac{۲}{۱-۲} - \frac{۲}{۱-۲}$$

اب مساوات (۸) ذیل کی شکل اختیار کرتی ہے

$$(۱۰) \dots\dots\dots ۱ = \frac{۲}{ب} - \frac{۲}{ا}$$

زائد کی اس مساوات (۱۰) کو معیاری مساوات کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ ج (جس کو زائد کا گھر کن کہتے ہیں) کو مبداء مرتب کے متوازی خط کو محور ما اور ماسکہ سے مرتب پر علی القواہم خط کو محور لا لینے سے یہ معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

ناقص کے بیان میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ناقص کی جو معیاری مساوات اسی طرح کی چھل ہوتی ہے وہ سادہ ترین مساوات ہے لیکن زائد کے لیے یہ امر صحیح نہیں ہے۔ آگے چل کر دفعہ ۶۵۶۲ میں ہم زائد کے لیے اس معیاری مساوات سے سادہ تر ایک اور مساوات حاصل کریں گے۔ بہر حال سوائے ان صورتوں کے جن میں ”متقاربوں“ کی خاصیت سے بحث ہوتی ہے زائد کے لیے اکثر یہی مساوات (۱۰) استعمال ہوتی ہے۔

۶۵۱۲ - زائد کی شکل — یہ دریافت کرنے کے لیے

کہ محور لا زائد کو کہاں قطع کرتا ہے
زائد کی مساوات

$$(۱) \quad \frac{a}{b} = \frac{a}{b} - \frac{a}{b}$$

میں $a = 0$ رکھتے ہیں جس سے ملتا ہے

$$a = 0 \text{ یعنی } a = 0 + 0 \text{ یا } a = 0$$

فرض کرو کہ $a = 0$ کے جواب میں زائد پر نقطہ a اور $a = 0$ کے جواب میں نقطہ a ملتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

$$(۲) \quad a = 0$$

نقاط a اور a کو زائد کے ”سر اُس“ اور خط a کو زائد کا ”قاطع محور“ کہتے ہیں کیونکہ یہ خط زائد کو دو حقیقی نقطوں پر قطع کرتا ہے۔

پھر یہ دریافت کرنے کے لیے کہ محور ما زائد کو کہاں قطع کرتا ہے زائد کی مساوات (۱) میں ہم $a = 0$ رکھتے ہیں تو ملتا ہے

$$(۳) \quad a = 0$$

ظاہر ہے کہ مساوات (۳) سے مائی خیالی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں یعنی محور ما زائد کو حقیقی نقطوں پر قطع نہیں کرتا۔ محور ما کو یعنی مرکز ج میں سے

قاطع محور ۱۲ پر علی التواضع خط کو ”ہند دوج محور“ کہتے ہیں۔ اب ہم زائد کی مساوات (۱) کو ذیل کی شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں لکھ سکتے ہیں :

$$(۴) \dots\dots\dots 1 - \frac{a^2}{b^2} \dots\dots\dots \pm b = a$$

$$(۵) \dots\dots\dots 1 + \frac{a^2}{b^2} \dots\dots\dots \pm a = b$$

مساوات (۴) سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر $a > b$ یعنی اگر لا کی قیمت $+ a$ اور $- a$ کے درمیان واقع ہو تو a کی کوئی حقیقی قیمت حاصل نہیں ہوتی یعنی نقاط a اور $-a$ کے درمیان منحنی کا کوئی حصہ واقع نہیں ہوتا۔ $a < b$ کے لیے یعنی لا کی ان قیمتوں کے لیے جبکہ $a < b$ یا $a > b$ ہو مساوات (۴) سے معلوم ہوتا ہے کہ a کی دو مساوی اور مختلف علامت قیمتیں ہیں۔ پس زائد کا منحنی محور لا کے گرد متشکل ہے۔ اس کے علاوہ جب لا کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو a کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ لا کی بہت بڑی (لاتناہی) قیمت کے لیے a کی بہت بڑی (لاتناہی) قیمت حاصل ہوتی ہے۔ مساوات (۵) سے معلوم ہوتا ہے کہ a کی تمام قیمتوں کے لیے لا کی دو مساوی اور مختلف علامت قیمتیں حاصل ہوتی ہیں یعنی منحنی محور a کے گرد بھی متشکل ہے۔

ان امور کی بنا پر اگر زائد کی ترسیم بنائیں تو دفعہ گذشتہ میں دی ہوئی شکل کا منحنی حاصل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منحنی کے دو حصے ہیں جن میں سے ایک حصہ پر اس a واقع ہے اور وہ محور لا کی مثبت سمت میں لاتناہی تک بڑھتا جاتا ہے اور دوسرے حصہ پر اس a واقع ہے اور وہ محور لا کی منفی سمت میں بڑھتا جاتا ہے۔

۶۱۲ - اس دفعہ میں ہم ج س اور ج و کے فاصلوں کو لا اور ز کی رقوم میں بیان کریں گے۔ دفعہ ۱۱۱ کی مساواتوں (۱)، (۲) اور (۷) سے معلوم ہے کہ

$$و س = د$$

$$ج و = \frac{د}{۱-۲ز}$$

$$ج ۱ = ۱ = \frac{د ز}{۱-۲ز}$$

اس لیے

$$ج س = ج و + و س$$

$$= د + \frac{د ز}{۱-۲ز} = \frac{د}{۱-۲ز}$$

$$= ز \times \frac{د ز}{۱-۲ز} = ز \times ج ۱ = ۱ ز$$

یعنی

$$ج س = ۱ ز \dots \dots \dots (۱)$$

اسی طرح

$$ج و = \frac{د}{۱-۲ز}$$

$$= \frac{د ز}{۱-۲ز} \times \frac{۱}{ز} =$$

$$= \frac{۱}{ز} \times ج ۱ = \frac{۱}{ز}$$


یعنی

$$ج و = \frac{۱}{ز} \dots \dots \dots (۲)$$

چونکہ زائد کے لیے $ز < ۱$ اس لیے ہمیں ذیل کے رشتے حاصل ہوتے ہیں۔

$$ج س < ج ۱ < ج و \dots \dots \dots (۳)$$

یعنی زائد کا مرتب، مرکز اور ماسکہ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔
 برخلاف اس کے ناقص کے متعلق ہم نے دیکھا ہے کہ ناقص کا
 ماسکہ مرکز اور مرتب کے درمیان واقع ہوتا ہے۔
 ۶۲۲۱ - اب ہم ثابت کریں گے کہ ناقص کی طرح زائد کا بھی
 ایک دوسرا ماسکہ اور دوسرا مرتب دونوں موجود ہیں۔



مرکز ج سے بائیں طرف قاطع محور محدودہ پر ایک نقطہ سن اس طرح لو کہ

$$(۱) \quad \text{سن ج} = \text{ج س} = \frac{1}{2} \dots \dots \dots$$

اسی طرح قاطع محور پر ج سے بائیں طرف ایک اور نقطہ و ایسا لو کہ

$$(۲) \quad \text{و ج} = \text{ج و} = \frac{1}{2} \dots \dots \dots$$

نقطہ و سے خط و و پر عمود وک کھینچو۔

اب ہم ثابت کریں گے نقطہ سن زائد کا دوسرا ماسکہ اور خط وک
 متناظر مرتب ہے۔

زائد پر کوئی نقطہ ن لو جس کے محمد (لا، ما) ہیں۔ ن س کو
لاؤ۔ اور ن سے خط و ک پر عمود ن مَر ڈالو اور نیزن سے خط
و و پر عمود ن ل ڈالو۔ تب

$$مَر ن = و ل = و ج + ج ل$$

$$(۳) \dots\dots\dots لا + \frac{۱}{ز} =$$

$$اور ن س = س ل + ل ن$$

$$= (س ج + ج ل) + ل ن$$

$$(۴) \dots\dots\dots (لا + لا) + ما =$$

چونکہ نقطہ ن کے محمد زائد کی مساوات کو پورا کرتے ہیں اس لیے

$$۱ = \frac{لا}{ل} - \frac{ما}{ب}$$

$$۱ = \frac{لا}{ل} - \frac{ما}{(۱-ز)ل}$$

یعنی

یعنی

$$لا (۱-ز) - ما = ل (۱-ز)$$

اس مساوات کو پھیلانے اور مختلف طور پر ترتیب دینے سے حاصل
ہوتا ہے

$$لا ز + ل = لا + ل ز + ما$$

پھر دونوں طرف ۲ ل ز لا جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$لا ز + ۲ ل ز لا + ل = لا + ل ز + ل ز لا + ما$$

یعنی

$$ز (لا + ل ز لا + ل ز لا) = (لا + ل ز لا + ل ز لا) + ما$$

یعنی $ز^۲ \times (لا + لز) = (لا + \frac{ل}{ز})^۲$ (۵) ما

مساواتوں (۳) اور (۴) کو مساوات (۵) میں درج کرنے پر ملتا ہے


$$ن س^۲ = ز^۲ \times ن م^۲$$

یعنی

$$ن س^۲ = ز^۲ \times ن م^۲ \quad (۶) \dots\dots\dots$$

مساوات (۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ ن اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ایک ثابت نقطہ م سے اس کا فاصلہ تناسب ہے ایک ثابت خط مستقیم وک پر ن سے عمود کے۔ اور نیز یہ کہ تغیر کا مستقل ز ہے یعنی بڑا ہے ایک ہے۔ پس نقطہ م زائد کا دوسرا ماسک اور خط وک تناظر مرتب ہے۔

۳ و ۶۔ اب ہم زائد کی وہ خاصیت ثابت کرینگے جو دفعہ ۳۱ و ۵۱ میں بیان کی ہوئی ناقص کی خاصیت کے تناظر ہے۔



زائد پر کوئی نقطہ ن لو اور اس کو دونوں ماسکوں س اور س سے بلاؤ۔ ہم ثابت کرینگے کہ خواہ نقطہ ن کہیں واقع ہوں مں اور ن س کا

فرق ہمیشہ مستقل ہوگا اور ۱۲ کے برابر ہوگا یعنی ہم ثابت کرینگے کہ

$$(۱) \quad \dots\dots\dots ۱۲ = ن س - ن س$$

نقطہ ن سے مرتب وک پر عمود ن م اور مرتب وک پر عمود ن م ڈالو
تو زائد کی تعریف کے بموجب ہم کو حاصل ہوتا ہے

$$(۲) \quad \dots\dots\dots ن س = ن ز \times ن م$$

اور

$$(۳) \quad \dots\dots\dots ن س = ن ز \times ن م$$

پس (۳) میں سے (۲) کو تفریق کرنے پر حاصل ہوتا ہے

$$ن س - ن س = ن ز (ن م - ن م)$$

$$= ن م \times ن ز - ن م \times ن ز$$

$$(۴) \quad \dots\dots\dots ن ز \times ج و = ج و \times ن ز$$

لیکن دفعہ ۲۶۲ کی مساوات (۲) سے ہم کو معلوم ہے کہ

$$(۵) \quad \dots\dots\dots ج و = \frac{۱}{ن ز}$$

ج و کی قیمت (۵) کو مساوات (۴) میں درج کرنے پر ملتا ہے

$$(۶) \quad \dots\dots\dots ن س - ن س = ن ز \times \frac{۱}{ن ز} = ۱۲$$

جس سے سلسلہ ثابت ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ

$$ن س = ن ز \times ن م = ن ل \times ن ز$$

$$= ن ز (ن ل - ج و)$$

$$= ن ز (ن ل - \frac{۱}{ن ز})$$

$$(۷) \dots\dots\dots ۱ - ز =$$

$$\text{اور } ن س = ز \times ن م = ز \times و ل$$

$$ز = (ج ل + و ج)$$

$$ز = (۱ + \frac{۱}{ز})$$

$$(۸) \dots\dots\dots ۱ + ز =$$

مساواتوں (۷) اور (۸) سے ن س اور ن س کی قیمتیں مل جاتی ہیں اور (۸) میں سے (۷) کو تفریق کرنے پر ہمیں مساوات (۶) مل جاتی ہے۔

۳۱۔ زائد کا وتر خاص — زائد کے وتر خاص

کی تعریف بعینہ وہی ہے جو ناقص یا مکافی کے لیے ہے۔ ماسکہ س میں سے اگر قاطع محور پر علی القواہم خط کھینچا جائے جو زائد کو دو نقطوں ق اور ق پر ملے (دیکھو گزشتہ دفعہ کی شکل) تو خط مستقیم ق س ق کو ”وتر خاص“ کہتے ہیں۔

فرض کرو کہ نصف وتر خاص ق س کا طول ل ہے۔ نقطہ ق سے مرتب وک پر عمود ق ع ڈالو تو چونکہ نقطہ ق زائد پر واقع ہے اس لیے تعریف کے بموجب

$$ق س = ز \times ق ع = ز \times و س = ز \times (ج س - ج و)$$

$$\text{یعنی } ل = ز (۱ - \frac{۱}{ز})$$

$$(۱) \dots\dots\dots ۱ = (ز - ۱) \dots\dots\dots (۱)$$

لیکن دفعہ ۱۱ ر ۶ کی مساوات (۹) کے بموجب

$$ب^۲ = ز (۱ - ز)$$

اس لیے $ز^۲ = ۱ - \frac{ب^۲}{ز}$ (۲)

مساوات (۲) سے $ز^۲ - ۱$ کی قیمت مساوات (۲) میں درج کرنے پر ملتا ہے

$$ل = ۱ - \frac{ب^۲}{ز} = \frac{ب^۲}{ز}$$

یعنی نصف وتر خاص کی قیمت محوروں کی رقوم میں بعینہ اسی شکل کی ہے جو ناقص کے لیے حاصل ہوئی تھی۔
مساوات (۲) سے ہم کو خروج المکرز کی قیمت بھی محوروں کی رقوم میں ملتی ہے۔

$$ز^۲ = ۱ + \frac{ب^۲}{ز} = \frac{ب^۲ + ز^۳}{ز}$$

اس لیے $ز = \frac{ب^۲ + ز^۳}{ز}$ (۴)

مشق ۲۴

(۱) دفعہ ۳، ۶ میں بیان کی ہوئی خاصیت کہ $ن - ن = ۲$ کو بالکل تحلیلی طریقہ پر ثابت کرو۔ (مقابلہ کرو دفعہ ۳۱، ۵)

(۲) ثابت کرو کہ اگر نقطہ (أ، أ) زائد کے باہر واقع ہو تو $\frac{ب^۲}{ز} - \frac{ب^۲}{ب} < ۱$ اور اگر نقطہ زائد کے اندر واقع ہو تو $\frac{ب^۲}{ز} - \frac{ب^۲}{ب} > ۱$ ۔

(۳) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کے قاطع محور کا طول ۴ اور مزدوج محور کا طول ۱۰ ہو: جواب $۱ = \frac{ب^۲}{۱} - \frac{ب^۲}{۴}$

(۴) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کے مزدوج محور کا طول ۵ اور جس کے دونوں ماسکوں کا درمیانی فاصلہ ۱۳ ہے۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{21}{25} - \frac{21}{13^2}$$

(۵) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جو نقاط (۰، ۳) اور (۴، ۰) میں سے گذرے۔

$$\text{جواب: } 1 = \frac{21}{17} - \frac{21}{9}$$

(۶) مساوات ۹ - ۱۱ - ۱۸ - ۴ = ۰ سے تعبیر ہونے والے زائد کا مرکز اور وتر خاص معلوم کرو۔

$$\text{جواب: } (۰، ۱) \quad \frac{9}{4}$$

(۷) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کے قاطع محور کا طول ۱۲ ہے اور جس کا راس مرکز اور ماسک کے نقطہ تضییف پر واقع ہے۔

$$\text{جواب: } 13 = 2 - 1$$

(۸) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کا ماسک اس نقطہ (۱، ۲) پر واقع ہے، مرتب خط مستقیم ۱۲ - ۱۳ - ۱ = ۰ اور خروج مرکز $\frac{5}{9}$ ہے۔

فرض کرو کہ زائد پر کے کسی نقطہ ن کے محدود (۱، ۲) ہیں۔ اور نقطہ ن سے مرتب پر عمود ن م ڈالا گیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ

$$\frac{1 - 13 - 12}{5} = \frac{1 - 13 - 12}{2^2 + 2^2} = \text{ن م}$$

چونکہ زائد کی تعریف کے بموجب

$$\text{ن م} \times \frac{5}{9} = \text{ن ل} \times \text{ن م}$$

$$\text{اس لیے ن س} = \left(\frac{5}{9}\right) \cdot \text{ن م}$$

$$\text{یعنی } \frac{2(1 - 13 - 12)}{25} \cdot \left(\frac{5}{9}\right) = 2(1 - 1) + 2(2 - 1)$$

پس زائد کی مساوات حاصل ہوتی ہے اگر زبروں کو دور کر دیا جائے

$$r(1-b-r-ur) \frac{1}{1-q} = r(1-b) + r(r-u)$$

یعنے پھیلائے اور ترتیب دینے پر زائد کی مساوات ملتی ہے

$$= 49 + 638 - 057 - 6020 + 164$$

اس مساوات میں ہم دیکھتے ہیں کہ

$$122 = 12 - 2 \times 0 = {}^2(2 \text{ لا کا سر}) - (2 \text{ لا کا سر}) \times (2 \text{ لا کا سر})$$

.

یعنی زائد کی مساوات میں (لا' کاسر) $\times$ (ما' کاسر) - (لا' کاسر) منفی ہوتا ہے
عام صورت میں بھی یہ خاصیت آسانی ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کرو کہ
ماسکہ نقطہ (لا، ما) ہے مرتب خط لا + ب + ما + ج = ۰ اور
خروج المرکز ہے۔

اب دفعہ ۵۲ء کی مثال (۱) میں جو عمل ہم نے کیا تھا بعینہ لفظ یہ لفظ وہی عمل یہاں بھی کرنا ہوگا اور زائد کے لیے بھی وہی مساوات (۵) دفعہ ۵۲ء حاصل ہوگی۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ زائد کے لیے خروج المکرر ایک سے بڑا ہے۔ غرض کہ زائد کی مساوات ہوگی

$$\frac{r(b+1+ll)}{r_b + r_l} \quad r = r(b-b) + r(l-l)$$

یعنی پھیلا کر لکھنے اور ترتیب دینے پر حاصل ہوتا ہے

$$\left(1 - \frac{r_j r_i}{r_i + r_j}\right) r_i + \left(\frac{r_j r_i}{r_i + r_j}\right) u r + \left(1 - \frac{r_j r_i}{r_i + r_j}\right) u$$

+ پہلے درجہ کی رقمیں + مستقل رقم =

یہاں بھی ہم کو اسی طرح حائل ہوتا ہے کہ

$$\cdot \rightarrow 2 - 1 = (2 \text{ لاکھ}) - (1 \text{ لاکھ}) \times (1 \text{ لاکھ})$$

کیونکہ $ز < ا$ - زائد کی ہر مساوات میں یہ خاصیت ضرور پائی جاتی ہے کہ جملہ $\{ لا^۲ کا سر \times ما^۲ کا سر - (۲ لا ما کا سر) \}$ منفی ہوتا ہے۔ آگے چل کر طالب علم کو معلوم ہو گا کہ اگر دوسرے درجہ کی مساوات میں یہ شرط پوری ہو تو وہ مساوات یقیناً زائد کو تعبیر کرتی ہے۔ اگر دوسرے درجہ کی عام سے عام مساوات دی ہوئی ہو

$$لا^۲ + ۲ لا ما + ما^۲ + ۲ گ لا + ۲ ف ما + ج = ۰$$

اور یہ مساوات دو خطوط مستقیم کو تعبیر نہ کرے تو ہمیں حسب ذیل نتائج ملتے ہیں :

- (۱) $ا ب - ہا < ۰$ تو مساوات ناقص کو تعبیر کرتی ہے۔
- (۲) $ا ب - ہا > ۰$ تو مساوات زائد کو تعبیر کرتی ہے۔
- (۳) $ا ب - ہا = ۰$ تو مساوات مکافی کو تعبیر کرتی ہے کیونکہ اس صورت میں دوسرے درجہ کی رقبہیں کامل مربع بناتی ہیں۔

۴۴۔ چونکہ زائد کی مساوات ناقص کی مساوات سے صرف اس بات میں مختلف ہے کہ زائد کی مساوات میں $ب^۲$ کی بجائے $- ب^۲$ ہے اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زائد کے لیے بہت سے مسائل ناقص کے متعلق متناظر مسائل سے اخذ کیے جاسکتے ہیں بشرطیکہ $ب^۲$ کی علامت بدل دی جائے۔ ہم یہاں صرف ان مختلف نتیجوں کو بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔ یہ مساواتیں ناقص کے متعلق متناظر مساواتوں سے صرف $ب^۲$ کی علامت بدل کر لکھ دی گئی ہیں۔ طالب علم کے لیے یہ اچھی مشق ہوگی اگر وہ ان نتیجوں کو براہ راست ابتدائی اصول سے اسی طرح تفصیلی عمل کے ساتھ حاصل کرے جیسے کہ ہم نے ناقص کے بیان میں متناظر مسئلوں کو حاصل کیا ہے۔

(۱) زائد پر کے کسی دو نقطوں $(لا، ما)$ اور $(لا، پ)$ کو ملانے والے

وتر کی مساوات ہے

$$(۱) \quad \frac{لا - لا}{لا - لا} \times \frac{لا}{لا} = \frac{لا + لا}{لا + لا}$$

(ب) زائد پر کے کسی نقطہ (لا، لا) پر کے تماس کی مساوات ہے

$$(۲) \quad ۱ = \frac{لا - لا}{لا} - \frac{لا}{لا}$$

(ج) زائد پر کے کسی نقطہ (لا، لا) پر کے تماس کی مساوات ہوگی

$$(۳) \quad لا + لا = (لا - لا) + لا$$

(د) خط لا = م لا + ج زائد کو مس کرتا ہے اگر

$$(۴) \quad ج = لا + م - لا$$

(ه) خط مستقیم لا بم م + ما جب م = ع زائد کو مس کرتا ہے اگر

$$(۵) \quad ع = لا + م - م$$

(و) کسی بیرونی نقطہ ن (لا، لا) کے وتر تماس کی مساوات ہے

$$(۶) \quad ۱ = \frac{لا - لا}{لا} - \frac{لا}{لا}$$

(ز) زائد کے لحاظ سے کسی نقطہ ن (لا، لا) کے قطبی کی مساوات ہے

$$(۷) \quad ۱ = \frac{لا - لا}{لا} - \frac{لا}{لا}$$

(ط) زائد کے لحاظ سے کسی خط مستقیم لا + م + ج =

کے قطب کے معدود ہیں

$$\left(\frac{لا}{ج} - \frac{لا}{ج} \right)$$

(ی) زائد کا امدادی دائرہ وہ دائرہ ہے جس کا مرکز ج اور

نصف قطر $\frac{1}{2}$ ہے۔

(ل) زائد کا مرتب دائرہ وہ دائرہ ہے جس کا مرکز ج اور نصف قطر $\frac{1}{2}$ ہے۔ یہ دائرہ صرف اُس صورت میں حقیقی اور ممکن ہے جبکہ $\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$ ب۔ اگر $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ب تو صرف ایک نقطہ یعنی مرکزی ایسا نقطہ ہے جہاں سے زائد کے دو عملی القوائِم ماس کیمنیجے جاسکتے ہیں۔ اگر $\frac{1}{2} > \frac{1}{2}$ ب تو زائد کے کوئی دو عملی القوائِم ماس نہیں کیمنیجے جاسکتے۔

۶۵۔ متقارب

تعریف۔ کسی مغنی کے متقارب سے مراد وہ خط مستقیم ہے جو مغنی کو ایسے دو نقطوں پر قطع کرے کہ دونوں نقاط تقاطع لاتنا ہی پر واقع ہوں لیکن خود خط مستقیم بالکل لاتنا ہی پر واقع نہ ہو۔

۵۱ کو ۶۔ اب ہم اس تعریف کے بموجب زائد کے متقابروں کی مساواتیں دریافت کریں گے اور نیز یہ بھی ثابت کریں گے کہ زائد کے دو اور صورت دو متقارب ہوتے ہیں۔

فرض کرو کہ خط مستقیم

$$(۱) \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ م} + \frac{1}{2} \text{ ج}$$

زائد کا متقارب ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر خط زائد کا متقارب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کو دریافت کرنا چاہیے کہ م اور ج کن شرائط کو پورا کریں کہ خط (۱) متقارب ہو۔ پہلے ہم خط مستقیم (۱) اور زائد

$$(۲) \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ م} - \frac{1}{2} \text{ ج}$$

کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہیں۔ مساوات (۱) سے م کی قیمت مساوات (۲) میں درج کرو۔

$$1 = \frac{1}{2} \text{ م} - \frac{1}{2} \text{ ج}$$

اس مساوات کو بھیلنے اور لاکھ قوتوں کے لحاظ سے ترتیب دینے پر ملتا ہے

$$\text{لا} (\text{ب}^2 - \text{ا}^2 \text{م}) - ۲ \text{ا}^2 \text{م ج لا} - \text{ا}^2 (\text{ج}^2 + \text{ب}^2) = ۰ \dots (۳)$$

اگر خط مستقیم (۱) زائد کا متقارب ہو تو تعریف کے بموجب دونوں نقاط تقاطع لائناری پر ہونے چاہئیں یعنی مساوات (۳) کی دونوں اصلیں لائنیں ہونی چاہئیں۔

جبر و مقابلہ سے ہم کو معلوم ہے کہ مساوات درجہ دوم کی دونوں اصلیں لائنیں ہونگی بشرطیکہ لا کا سر اور لا کا سر دونوں صفر ہوں۔ پس حاصل ہوتا ہے

$$\text{ب}^2 - \text{ا}^2 \text{م} = ۰ \dots \dots \dots (۴) \quad \text{اور}$$

$$\text{ا}^2 \text{م ج} = ۰ \dots \dots \dots (۵)$$

مساوات (۴) سے م کی دو قیمتیں ملتی ہیں

$$\text{م} = \pm \frac{\text{ب}}{\text{ا}} \dots \dots \dots (۶)$$

اور چونکہ لا اور م دونوں صفر نہیں ہیں اس لیے مساوات (۵) سے ملتا ہے

$$\text{ج} = ۰ \dots \dots \dots (۷)$$

مساواتوں (۶) اور (۷) سے م اور ج کی قیمتوں کو مساوات (۱) میں درج کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ا زائد کے دو متقارب


$$\text{ا} = \frac{\text{ب}}{\text{ا}} \text{ لا} \dots \dots \dots (۸)$$

اور

$$\text{ا} = - \frac{\text{ب}}{\text{ا}} \text{ لا} \dots \dots \dots (۹)$$

ہیں۔ مساواتوں (۸) اور (۹) سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں متقارب مرکز ج میں سے گزرتے ہیں اور محور لا سے زاویہ ط اور (۳۲ - ط)

بناتے ہیں جہاں مس ط = $\frac{ب}{ا}$



شکل میں خطوط ق ج ف اور ق ج ف متقاربوں کو تعبیر کرتے ہیں۔ اور زاویہ ق ج س = ط = مس ا $\frac{ب}{ا}$ زاویہ ف ج س = ۱۸۰ - ط دونوں متقاربوں کی مشترکہ مساوات

$$(۱۰) \quad \dots\dots\dots = \frac{ا}{ب} - \frac{ا}{ا} \dots\dots\dots$$

ہے اور یہ زائد کی مساوات سے صرف بقدر مستقل کے مختلف ہے۔
دونوں متقاربوں کے درمیان زاویہ ۲ ط ہے۔

۶، ۶ - قائم زائد — اس خاص قسم کے زائد کو

جس کے قاطع اور مزدوج محوروں کے طول مساوی ہوں پیسے جس کے لیے

$$(۱۱) \quad \dots\dots\dots ۱ = ب$$

ہو ”قائم زائد“ کہتے ہیں۔ پس قائم زائد کی مساوات حسب ذیل ہوتی ہے :

(۲) قائم زائد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے دونوں متقاربوں کا درمیانی زاویہ قائم ہوتا ہے کیونکہ

$$\text{طہ} = \text{مس}^{-1} \frac{ب}{ج} = \text{مس}^{-1} \frac{ج}{ب} \\ = \text{مس}^{-1} ۱ = ۹۰^\circ$$

یعنی ۲ طہ = ۹۰ (۳)

قائم زائد کا خروج المرکز بھی ہم فوراً معلوم کر سکتے ہیں۔ دفعہ ۶۱، ۳۱ کی مساوات (۴) سے ہم کو معلوم ہے کہ کسی زائد کے لیے

$$ز = \frac{\sqrt{ج^2 + ب^2}}{ج}$$

پس قائم زائد کے لیے

$$(۴) \dots\dots\dots ۳۱ = \frac{\sqrt{ج^2 + ب^2}}{ج} = ز$$

۶۱، ۳۱ - قائم زائد کی مساوات متقاربوں کو محور مانکر۔

دفعہ ۶۱، ۱۱ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ زائد کی معیاری مساوات سادہ ترین


شکل میں نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سادہ مساوات حاصل کی جاسکتی

ہے۔ پہلے قائم زائد کے لیے ہم یہ سادہ ترین مساوات حاصل کرینگے۔

اس کے لیے یہ کافی ہے کہ بجائے قاطع محور کو محور لا اور مزدوج محور

کو محور مان لینے کے متقاربوں کو محور مان لیں۔

فرض کرو کہ شکل میں متقارب ج ق کو ہم محور لا اور متقارب ج ق کو



محور ما لیتے ہیں۔ یعنی مہد کو ثابیت رکھ کر محوروں کو زاویہ (طہ) میں سے گھما دیتے ہیں۔ قائم زاؤ کی پرانی مساوات گزشتہ دفعہ کے بموجب حسب ذیل ہے

$$(۱) \quad \dots \dots \dots \quad \text{لا} = \text{ما} - \text{لا}^2$$

دفعہ ۱۴۹ (ب) سے ہم کو معلوم ہے کہ اگر محوروں کو زاویہ طہ میں سے گھما دیا جائے تو نئے محدودوں (لا، ما) اور پرانے محدودوں (لا، ما) میں حسب ذیل رشتہ ہوتا ہے :-

$$(۲) \quad \dots \dots \dots \quad \text{ما} = \text{لا} \text{ جب طہ} - \text{ما} \text{ جب طہ} + \text{ما} \text{ جب طہ}$$

لیکن موجودہ صورت میں ہم نے چونکہ محوروں کو زاویہ (طہ) میں سے گھمایا ہے اس لیے نئے محدودوں اور پرانے محدودوں میں رشتے حسب ذیل ہونگے :-

$$(۳) \dots \begin{cases} لا = لا جم (- ط) - ما جب (- ط) = لا جم ط + ما جب ط \\ ما = لا جب (- ط) + ما جم (- ط) = لا جب ط + ما جم ط \end{cases}$$

نیز چونکہ قائم زائد کے لیے ط = ۵۴ اس لیے

$$(۴) \dots \dots \dots \frac{1}{۲۱۶} = جم ط = جب ط$$

مساواتوں (۳) سے لا اور ما کی قیمتوں کو قائم زائد کی مساوات (۱) میں درج کرنے پر ملتا ہے

$$۱ = \left(\frac{لا}{۲۱۶} + \frac{ما}{۲۱۶} \right) - \left(\frac{لا}{۲۱۶} + \frac{ما}{۲۱۶} \right)$$

یعنی

$$۱ = \left\{ (لا + ما) - (لا - ما) \right\} \times \frac{1}{۲۱۶}$$

یعنی

$$۱ = لا \times \frac{1}{۲۱۶} + ما \times \frac{1}{۲۱۶}$$

یعنی


$$(۵) \dots \dots \dots \frac{۱}{۲۱۶} = لا + ما$$

سہولت کی خاطر مساوات (۵) میں سے زبروں کو نکال دیں تو قائم زائد کی سادہ ترین مساوات حسب ذیل حاصل ہوتی ہے :-

$$(۶) \dots \dots \dots \frac{۱}{۲} = لا + ما$$

یاد رہے کہ یہ مساوات متقاربوں کو محور مان کر حاصل کی گئی ہے۔ اور مساوات (۱) قاطع اور مزدوج محوروں کو محور لا اور ما مان کر حاصل کی گئی تھی۔

۶۴، ۶۳۔ زائد کی مساوات متقاربوں کو محور مان کر۔



فرض کرو کہ زاہد کی معیاری مساوات

$$(۱) \dots\dots\dots ۱ = \frac{لا^۲}{ب^۲} - \frac{ج^۲}{ا^۲}$$

ہے اور اس پر کوئی نقطہ 'ن' ہے جس کے محدود (لا، ما) ہیں۔ زاہد کے دو متقارب ق ج ق اور ق ج ق ہیں۔ ہم محوروں کو تبدیل کرتے ہیں اور ج ق کو محور لا، ج ق کو محور ما لیتے ہیں۔

نقطہ 'ن' سے ق ج کے متوازی خط کھینچو جو ق ج سے نقطہ 'د' پر ملے تو 'ن' کے نئے محدود ج د = لا اور دن = ما ہوں گے۔ نقطہ 'د' سے ج س پر عمود دہ ڈالو۔

نیز نقطہ 'ن' سے ج س پر عمود ن مر ڈالو۔ نقطہ 'د' سے ج س کے متوازی خط کھینچو جو ن مر محدود سے سر پر ملے۔

فرض کرو کہ زاویہ ق ج س = طہ تو دفعہ ۵ کی مساوات (۶) سے معلوم ہے کہ

$$\begin{aligned} \text{مس ط} &= \frac{ب}{ا} = \frac{\text{جب ط}}{\text{جم ط}} \\ \text{یعنی} \quad \frac{\text{جب ط}}{ب} &= \frac{\text{جم ط}}{ا} = \frac{۱}{\frac{ا}{ب} + ۱} \end{aligned}$$

پس جب ط = $\sqrt{\frac{ب}{ا+ب}}$ ، جم ط = $\sqrt{\frac{ا}{ا+ب}}$ (۲)

اب چونکہ ن د اور دسہ بالترتیب ق ج اور ج س کے متوازی ہیں

اس لیے زاویہ ن د س = زاویہ ق ج س = ط (۳)

پس لا = ج م = ج کا + لا م = ج کا + دس (۴)

لیکن ج کا = ج د جم ط = لا جم ط

اور دس = دن جم ط = ما جم ط

پس مساوات (۴) میں یہ قیمتیں رکھنے سے ملتا ہے

ج کا + دس = (لا + ما) جم ط

یعنی لا = (لا + ما) $\sqrt{\frac{ا}{ا+ب}}$ (۵)

اسی طرح ما = ن م = ن س - م س = ن س - کا د (۶)

لیکن ن س = ن د جب ط = ما جب ط

کا د = ج د جب ط = لا جب ط

پس یہ قیمت مساوات (۶) میں رکھنے سے حاصل ہوتا ہے

ن س - کا د = (ما - لا) جب ط

یعنی ما = (ما - لا) $\sqrt{\frac{ب}{ا+ب}}$ (۷)

مساواتوں (۵) اور (۷) سے لا اور ما کی قیمتوں کو مساوات (۱) میں درج کرنے پر ملتا ہے

$$1 = \frac{(لا + کا)}{ب} - \frac{(کا - لا)}{ب} = \frac{لا}{ب}$$

یعنی

$$(لا + کا) - (کا - لا) = ب$$

یعنی

$$لا + کا = ب$$

یعنی

$$(۸) \dots\dots\dots \frac{لا + کا}{ب} = ۱$$

اس مساوات میں سے سہولت کی خاطر زبروں کو نکال دیتے ہیں تو حاصل ہوتا ہے

$$(۹) \dots\dots\dots \frac{لا + کا}{ب} = ۱$$

یہ یاد رہے کہ مساوات (۹) متقاربوں کو حوالہ کے محور لینے پر

حاصل ہوتی ہے اور مساوات (۱) قاطع اور مزدوج محوروں کو حوالہ کے محور لینے پر ملتی ہے۔ مساوات (۹) زائد کی سادہ ترین مساوات ہے اور قائم زائد کے لیے جو سادہ ترین مساوات حاصل ہوئی تھی وہ اس مساوات سے $ب = ۱$ رکھ کر اخذ کی جاسکتی ہے۔

چونکہ دونوں متقاربوں کا درمیانی زاویہ لازماً قائمہ نہیں ہے اس لیے یہ مساوات ”مائٹل محوروں“ کے لحاظ سے ہے۔ سوائے اُن مسائل کے جن میں متقاربوں سے بحث ہوتی ہے طالب کو اس مساوات کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہی معیاری مساوات استعمال کرنی چاہیے۔

مثال - زائد ۳۶ لا - ۲۵ کا + ۲۱۶ لا + ۱۰۰ کا - ۶۶ = کو

معیاری شکل میں تحویل کرو اور اس کے مرکز، ماسکوں، رأسوں کے محدود قاطع محور اور مزدوج محوروں کے طول، مرتبوں اور متقاربوں کی مساواتیں دریافت کرو۔ حل - لا اور ما میں مربعوں کو پورا کرنے پر حاصل ہوتا ہے کہ

$$۱۰۰ - ۲۲۲ + ۶۶۶ = (۲ + ۶۲ - ۲) ۲۵ - (۹ + ۵۶ + ۱) ۳۶$$

$$۹۰۰ = ۲(۲ - ۶) ۲۵ - ۲(۳ + ۵) ۳۶ \quad \text{یعنی}$$

$$(۱) \dots\dots\dots ۱ = \frac{۲(۲ - ۶)}{۳۶} - \frac{۲(۳ + ۵)}{۲۵} \quad \text{یعنی}$$

مساوات (۱) سے ظاہر ہے کہ اگر مبدأ کو نقطہ $(۲, ۳)$ پر تبدیل کیا جائے تو مساوات ہو جاتی ہے

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ = \frac{۲}{۳۶} - \frac{۱}{۲۵}$$

پس معلوم ہوا کہ مرکز کے محدود $(۲, ۳)$ ہیں۔ اور نصف قاطع محور $۱ = ۵$ نصف مزدوج محور $۶ = ۵$

$$\frac{۶۱۶}{۵} = \frac{۲۵ + ۳۶۶}{۵} = \frac{۲ + ۱۱}{۱} = \text{اس لیے خروج مرکز } z$$

$$\frac{۶۱۶}{۵} = ۱/۲ = \text{مرکزے ماسکوں کا فاصلہ}$$

پس ماسکوں کے محدود $(۲, ۳)$ میں $(۲, ۳)$ سے $(۲, ۳)$ سے

رأس ع کے محدود $(۲, ۳)$ یعنی $(۲, ۲)$

رأس ع کے محدود $(۲, ۳)$ یعنی $(۲, ۸)$

$$\frac{۲۵}{۶۱۶} = \frac{۱}{۲} = \text{مرکز سے مرتب کا فاصلہ}$$

$$\frac{۲۵}{۶۱۶} + ۲ = ۱ = \text{پس ایک مرتب کی مساوات}$$

$$\frac{۲۵}{۶۱۶} - ۳ = ۱ = \text{اور دوسرے مرتب کی مساوات}$$


ایک متقارب کا میلان قاطع محور سے طہ ہو تو مس طہ $\frac{۱}{۵} = \frac{۱}{۲} +$

یہ متقارب مرکز یعنی نقطہ $(۲, ۳)$ میں سے گزرتا ہے۔

اس لیے ایک متقارب کی مساوات $۱ = ۲ - \frac{۱}{۵} = (۳ + ۱) ۶۶ - ۵۵ - ۲۸ = ۰$

دوسرے متقارب کا میلان قاطع محور سے طہ ہو تو مس طہ $\frac{۱}{۵} = \frac{۱}{۲} -$

اس لیے دوسرے متقارب کی مساوات $ma - 2 = \frac{4}{5}(3 + 11)$ یعنی $6a + 8 = 0$
 ذیل کی شکل میں اس زائد کی ترسیم دی گئی ہے:-



زائد پر متفرق مشقیں

(۱) اس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کے ماسکے (۵، ۰) (-۵، ۰) ہیں اور جس کا نصف قاطع محور ۳ ہے۔

$$\text{جواب } \frac{a^2}{9} - \frac{b^2}{16} = 1$$

(۲) ایک زائد کے قاطع محور اور فردوج محور کے طول دیے گئے ہیں۔

پٹری اور پرکار کی مدد سے ماسکوں کا مقام دریافت کرو۔
 (۳) ذیل کی مساواتوں سے تعبیر ہونے والے زائدوں کے ماسکوں کے

محدود اور مرتبوں کی مساوات اور نیز فردوج المکرز معلوم کرو:-

$$(۱) \frac{a^2}{9} - \frac{b^2}{16} = 1 \quad (ب) \frac{a^2}{9} - \frac{b^2}{16} = 1$$

جواب (۱) $(0, 134), (0, 134) \pm 11 \sqrt{134} = 0$ ؛ $\frac{134}{134}$

(ب) $(0, 5), (0, 5) \pm 12 \sqrt{5} = 0$ ؛ $\frac{5}{5}$

(۴) ذیل کی مساواتوں کو معیاری شکل میں تبدیل کرو اور ان سے تعبیر ہونے والے زائدوں کے مرکز کے محدود، ماسکوں کے محدود، مرتبوں کی مساواتیں متقاربوں کی مساواتیں اور خروج مرکز معلوم کرو۔

(۱) $0 = 199 - 663 + 118 - 14 - 2$

(ب) $0 = 1 - 62 - 118 + 14 - 2$

(ج) $0 = 5 - 13 - 2$

(د) $0 = 1 - 65 + 114 - 14 - 2$

جواب (۱) معیاری شکل $\frac{(1-11)}{9} - \frac{(2-1)}{9} = 1$ مرکز $(1, 2)$ $\frac{5}{9} = z$ ماسکے $(2, 1), (2, 2)$

مرتب $11 - 2 = 9$ ؛ $0 = \frac{11}{9} + 1$ اور متقارب $9(1-11) - 2(1-11) = 0$

(ب) معیاری شکل $\frac{(1+11)}{1} - \frac{(2+11)}{1} = 1$ مرکز $(1, 1)$ $\frac{5}{1} = z$ ماسکے $(1, 1), (1, 11)$

مرتب $11 - 1 = 10$ ؛ $0 = \frac{1}{10} + 1$ اور $1 + 11 = 12$ ؛ $0 = \frac{1}{12} + 1$

مقارب $11(1+11) - 2(1+11) = 0$

(ج) معیاری شکل $\frac{(1-11)}{5} - \frac{(2-11)}{5} = 1$ مرکز کے محدود $(0, 0)$ $\frac{5}{5} = z$ ماسکے $(0, 5), (0, 11)$

مرتب $11 - 3 = 8$ ؛ $0 = \frac{11}{8} - 1$ اور $11 - 3 = 8$ ؛ $0 = \frac{11}{8} - 1$ اور متقارب $8(11-3) - 2(11-3) = 0$

(د) $\frac{(1-11)}{8} - \frac{(2-11)}{8} = 1$ مرکز کے محدود $(3, 1)$ $\frac{5}{8} = z$ ماسکے $(1, 1), (1, 11)$

مرتب $11 - 3 = 8$ ؛ $0 = \frac{11}{8} - 3$ اور $11 - 3 = 8$ ؛ $0 = \frac{11}{8} - 3$

اور متقارب $8(11-3) - 2(11-3) = 0$

(۵) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کے ماسکے (۳، ۳) (۳، ۳) ہیں اور قاطع محور ۳ ہے۔

$$\text{جواب } \frac{لا^2}{۳} - \frac{(۳-۳)^2}{۵} = ۱ \text{ یعنی } ۵ لا^2 - ۳ ما^2 + ۳۲ ما - ۸۴ = ۰$$

(۶) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کا قاطع محور خطا = ۲ پر ہے، مزدوج محور کا طول ۶ ہے، خروج المکرز ۵ ہے اور مرکز محور ما پر واقع ہے۔

$$\text{جواب } \frac{لا^2}{۱۶} - \frac{(۲-۶)^2}{۹} = ۱ \text{ یعنی } ۹ لا^2 - ۱۶ ما^2 + ۶۴ ما - ۲۰۸ = ۰$$

(۷) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کے ماسکے (۱، ۲) (۱، ۲) ہیں اور مزدوج محور کا طول ۲ ہے۔

$$\text{جواب } \frac{لا^2}{۸} - \frac{(۱-۲)^2}{۱} = ۱ \text{ یعنی } لا^2 + ۲ لا - ۸ ما^2 + ۱۶ ما - ۱۵ = ۰$$

(۸) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کے مرتبوں کی مساواتیں لا = ۵ اور لا = - ۵ ہیں اور قاطع محور کا طول ۴ ہے۔ مرکز محور لا پر ہے۔

$$\text{جواب } \frac{لا^2}{۴} - \frac{ما^2}{۹} = ۱ \text{ یعنی } ۹ لا^2 - ۱۶ ما^2 - ۳۶ = ۰$$

(۹) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کا قاطع محور، محور لا ہے، مرکز مبدا پر ہے اور جو نقطوں (۴، ۳) اور (۱، ۳) میں سے گزرتا ہے۔

$$\text{جواب } \frac{لا^2}{۳۶} - \frac{ما^2}{۹} = ۱$$

(۱۰) ایک متغیر نقطہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ثابت نقطوں (۰، ۴) اور (۰، -۴) سے اس کے فاصلوں کا فرق ۸ ہے۔ متغیر نقطہ کا طریق دریافت کرو۔

$$\text{جواب } \frac{لا^2}{۱۶} - \frac{ما^2}{۲۰} = ۱$$

(۱۱) ایک زائد کا قاطع محور محور لا پر ہے، مرکز مبدا پر ہے اور خروج المکرز

۲ ہے اور زائد نقطہ (۲، ۳) میں سے گزرتا ہے۔ زائد کی مساوات دریافت کرو۔

$$\text{جواب } 1 = \frac{2^2}{23} - \frac{3^2}{23}$$

(۱۲) متقاربوں کو محور مان کر قائم زائد لا۔ $2^2 = 16$ کو متحول کرو۔

$$\text{جواب لا } 8 =$$

(۱۳) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کا مرکز مبدا پر ہے، قاطع محور کا طول ۲۴ اور ماسکوں کا درمیانی فاصلہ ۳۲ ہے۔

$$\text{جواب } 1 = \frac{2^2}{112} - \frac{3^2}{112}$$

(۱۴) ایک زائد کا مرکز مبدا پر اور قاطع محور کا طول ۲۴ اور مزدوج محور کا طول ماسکوں کے درمیانی فاصلہ کا نصف ہے۔ زائد کی مساوات دریافت کرو۔

$$\text{جواب } 1 = \frac{2^2}{133} - \frac{3^2}{133}$$

(۱۵) ذیل کے زائدوں کے متقارب معلوم کرو اور منحنیوں کی تسمیہ بھی کرو:-

$$(ا) 1 = \frac{2^2}{12} - \frac{3^2}{12} \quad (ب) 1 = \frac{2^2}{16} - \frac{3^2}{16}$$

$$(ج) 9 - 2^2 = 18 - 2^2 \quad (د) 12 - 2^2 = 12 - 2^2$$

$$(ه) 9 - 2^2 = 18 - 2^2 \quad (و) 12 - 2^2 = 12 - 2^2$$

$$\text{جواب (ا) } 1 = \frac{2^2}{12} - \frac{3^2}{12} \quad (ب) 1 = \frac{2^2}{16} - \frac{3^2}{16} \quad (ج) 9 - 2^2 = 18 - 2^2$$

$$(د) 12 - 2^2 = 12 - 2^2 \quad (ه) 9 - 2^2 = 18 - 2^2 \quad (و) 12 - 2^2 = 12 - 2^2$$

(۱۶) اُس زائد کی مساوات معلوم کرو جس کے اس نقطوں (۴، ۰) اور

(۰، ۴) پر ہیں اور جس کے متقاربوں کا درمیانی زاویہ ۹۰ ہے۔

$$\text{جواب } 1 = \frac{2^2}{16} - \frac{3^2}{16}$$

(۱۶) ثابت کرو کہ کسی زائد کے ایک ماسک سے متقارب تک کا فاصلہ نصف مزدوج محور کے مساوی ہے۔

(۱۸) ایک زائد کے ماسک سے متقارب پر عمود ڈالا جاتا ہے۔ ثابت کرو کہ اس عمود کے پائیس سے مرکز تک کا فاصلہ نصف قاطع محور کے مساوی ہے۔

(۱۹) اگر خط مستقیم $MA = 2 + b$ زائد $\frac{a}{4} - \frac{b}{4} = a$ کا مماس ہو تو ب کی قیمت معلوم کرو۔

جواب $b = 2$

(۲۰) اگر خط مستقیم $MA = 2 + b$ زائد $\frac{a}{4} - \frac{b}{4} = a$ کا مماس ہو تو م کی قیمت معلوم کرو۔

جواب $m = \pm \frac{13}{4}$

(۲۱) ایک زائد کا مرکز نقطہ $(-2, 4)$ پر ہے اور ایک مرتب خط $MA = 5$ اور خروج المركز $\frac{5}{4}$ ہے۔ زائد کی مساوات معلوم کرو۔

جواب $1 = \frac{(2+1)^2}{\left(\frac{5}{4} \times \frac{5}{4}\right)} - \frac{(4-2)^2}{\left(\frac{5}{4}\right)^2}$

(۲۲) ذیل کی مساواتوں کو معیاری شکل میں متحول کرو اور ان سے تعبیر ہونے والے زائدوں کے مرکز کے محدّد، راسوں اور ماسکوں کے محدّد، مرتبوں کی مساواتیں اور متقاربوں کی مساواتیں معلوم کرو۔

$$(1) \quad 0 = 36 + 696 + 1108 - 2616 - 9a - 16b$$

$$(2) \quad 0 = 45 + 680 - 116 - 2a - 16b$$

$$(3) \quad 0 = 41 - 628 - 118 - 2a - 16b$$

$$(4) \quad 0 = 52 - 623 - 116 - 2a - 16b$$

$$(5) \quad 0 = 204 + 6100 + 1158 + 225 - 9a - 16b$$

جواب (۱) $1 = \frac{(6-2)^2}{4} - \frac{(16-9)^2}{16}$ مرکز کے محدّد $(4, 3)$

راس کے محدّد $(\frac{13}{5}, 3)$

زائد کی مساوات دریافت کرو۔

$$\text{جواب } 1 = \frac{(3-1)^2}{14} - \frac{(2+1)^2}{25}$$

(۲۴) ذیل کی مساواتوں میں محوروں کو دیے ہوئے زاویہ نہیں سے گھماؤ اور اس طرح تصدیق کرو کہ یہ مساواتیں زائدوں کو تعبیر کرتی ہیں۔ ان زائدوں کے محوروں کا طویل، مرکز اور ماسکوں کے محمد اور متقاربوں کی مساواتیں دریافت کرو۔

$$(ا) \quad 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{فہ } 0 = 10$$

$$(ب) \quad 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{مس فہ } 1$$

$$(ج) \quad 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{فہ } 0 = 10$$

$$(\text{جب فہ } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{جم فہ } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0)$$

$$(۲۵) \quad \text{زائد } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{کے نقطوں}$$

(۲۶) پر کے ماس اور عماد کی مساواتیں دریافت کرو۔

$$\text{جواب ماس کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0$$

$$\text{عماد کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0$$

$$(۲۷) \quad \text{زائد } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{کے نقطوں}$$

(۲۸) اور (۲۹) پر کے ماسوں اور عمادوں کی مساواتیں معلوم کرو۔

$$\text{جواب (ا) ماس کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{اور عماد کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0$$

$$(ب) \quad \text{ماس کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{اور عماد کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0$$

$$(۲۹) \quad \text{زائد } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0 \quad \text{کے نقطوں (۳۰) اور (۳۱) پر کے}$$

ماسوں اور عمادوں کی مساواتیں دریافت کرو۔

$$\text{جواب (ا) ماس کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0$$

$$\text{اور عماد کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0$$

$$(ب) \quad \text{ماس کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0$$

$$\text{عماد کی مساوات } 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 = 0$$

(۲۸) زائد لا - ۳ ما + ۳ = ۰ کے نقطہ (۲، ۳) پر کے مماس اور عماد کی مساواتیں دریافت کرو۔

جواب لا - ۲ + ۱ = ۰ مماس کی مساوات
 ما + ۲ لا = ۸ عماد کی مساوات

اغلاطانا

محدودوں کا ہندسہ

صحيح	غلط	نمبر	نمبر	صحيح	غلط	نمبر	نمبر
دریافت	دریافت	۷	۱۱۳	نقطوں پر پہنچنے کے لیے	نقطوں کے لیے	۷	۱
۲۱	۲۱	۱۳	۱۲۰	ج (۳، ۲)	ج (۳، ۲)	۱۴	۲
۰ = ۳ +	۰ = ۰۳ +	۵	۱۲۴	خط	خط	۱۰	۳
تغیر نقطہ	تغیر لفظ	۸	۱۵۳	محدود تین ابعاد میں	محدود تین ابعاد	۸	۶
نقطہ	نقطہ	۱۱	۱۵۴	اسی	اس	۸	۳۲
مزدوج	مزدوج	۱۶	۱۵۶	زاویہ ۴۵°	زاویہ ۴۵°	۲۱	۳۹
۲۳ = ۲۱ + ۲	۱۳ = ۱۱ + ۲	۲۲	۱۷۲	اور >	اور ≤	۸	۴۷
یا	یا	۳	۲۰۰	(۱ - ۱ - ۱)	(۱ - ۱ - ۱)	۷	۵۱
ن (۱، ۱)	ن (۱، ۱)	۲۱۵	عمودوں	عمود	عمود	۲	۶۵
نقطہ	نقطہ	۲۰	۲۴۲	(۳ - ۲ - ۳)	(۳ - ۳ - ۳)	۱۶	۶۹
ناقص	ناقص	۱۵	۲۵۳	ج = ۰	ج = ۰	۱۵	۷۵
۱ - ۱ = ۱	۱ - ۱ = ۱	۳	۲۵۸	میں سے خط	میں خط	۷	۷۶
۱ - ۱ = ۱	۱ - ۱ = ۱	۱۳	نقطہ	نقطہ	نقطہ	۱۲	۸۱
ایک سے	ایک سے	۸	۲۸۵	(۲ - ۵)	(x - ۵)	۱۴	۸۲
۰ = ۱ ± ۱	۰ = ۱ ± ۱	۱۶	۳۰۶	رأس	راس	۲	۸۲
۱ = ۲(۲ + ۱)	۱ = ۲(۲ + ۱)	۱۵	۳۰۸	۰ = ۱۶ ۶	۰ = ۱۶ ۶	۱۲	۹۶

۲۰۱۴۵۰ ق. ۲

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائیگا۔

25 JAN 1956

07, 12, 13, 00, 11, 19

1. ГКО: 95/04-А-17 60, 1/1

1-4-50

17 FEB 1951

04, 11-12 $\frac{1}{00, 0, 14}$

5831 5861

100, 7, 10

$\frac{0.7}{0.9} = \frac{7}{9}$

1909

29 19 20 11 11

01 2 00, 1, 9

01-21-04

10. 11. 12.

سرپرست

144

